

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE


Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

MESSAGE(S) CLÉ(S) :

- L'utilisation prolongée d'AINS chez les personnes âgées n'est pas recommandée.


⇒ **Pourcentage de patients de 65 ans et plus ayant une prescription d'AINS pour plus de 30 jours.**

L'indicateur représente le pourcentage des patients attribués qui se sont fait prescrire plus de 30 doses journalières d'AINS en 2017 (tous prescripteurs confondus), dont au moins une prescription a été rédigée par la spécialité concernée.



Ce diagramme en bâtons montre le score normalisé pour l'indicateur par province (bleu) ou région (orange). Le bâton vert représente le score normalisé pour la Belgique.

Sur cette carte de la Belgique, les frontières des arrondissements sont tracées par des lignes fines tandis que les frontières provinciales sont tracées par des lignes épaisses. Les arrondissements sont colorés selon une échelle de couleur basée sur le rapport entre le score d'indicateur dans cet arrondissement et le score d'indicateur belge. Ce rapport est exprimé en pourcentage : par exemple, 0 % si le score d'indicateur de l'arrondissement est égal au score d'indicateur belge, 20 % si le score d'indicateur est supérieur de 20 % au score belge et -20 % si le score d'indicateur est inférieur de 20 % au score belge. Les pourcentages sont répartis par tranches de 20 %. Chaque tranche correspond à un code couleur spécifique. Les scores nettement inférieurs au score belge sont affichés en violet, les scores supérieurs en brun. Les scores proches du score belge sont affichés en blanc.



Pourcentage de déviation par rapport au score belge	Score de l'indicateur
-50%	5,5%
-30%	7,7%
-10%	9,9%
0%	11,0%
10%	12,1%
30%	14,3%
50%	16,5%