

CHAPITRE I

HOOFDSTUK I

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|--|---|--------|--------|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i> | Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| AACIDEXAM 5 mg/mL ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02 | | | | | | | | |
| B-83 | 4102-968 | 10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL | 10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 24,56 | 24,56 | 3,85 | 6,47 |
| | 4102-968 | | | | 14,69 | 14,69 | | |
| B-83 * | 0700-013 | 1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 1,8960 | 1,8960 | | |
| B-83 ** | 0700-013 | 1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 1,5570 | 1,5570 | | |
| AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04 | | | | | | | | |
| B-89 | 0016-188 | 30 comprimés, 2 mg | 30 tabletten, 2 mg | | 9,62 | 9,62 | 0,83 | 1,38 |
| | 0016-188 | | | | 3,12 | 3,12 | | |
| B-89 * | 0700-039 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,1343 | 0,1343 | | |
| B-89 ** | 0700-039 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,1103 | 0,1103 | | |
| B-89 *** | 0700-039 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,1364 | 0,1364 | 0,0277 | 0,0460 |
| ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 2237-220 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | R | 56,19 | 56,19 | 8,26 | 12,50 |
| | 2237-220 | | | | 42,22 | 42,22 | | |
| B-72 | 3255-684 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 3255-684 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 0780-288 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 0780-288 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 0780-288 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 4165-536 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | R | 56,19 | 56,19 | 8,26 | 12,50 |
| | 4165-536 | | | | 42,22 | 42,22 | | |
| B-72 | 4165-726 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 4165-726 | | | | 118,25 | 118,25 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-72 * | 7727-704 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7727-704 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7727-704 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 10 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 4771-945 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 4771-945 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 7739-543 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7739-543 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7739-543 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 4201-737 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | R | 56,19 | 56,19 | 8,26 | 12,50 |
| | 4201-737 | | | | 42,22 | 42,22 | | |
| B-72 | 4201-745 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 4201-745 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 7729-528 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7729-528 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7729-528 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3534-807 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | R | 56,19 | 56,19 | 8,26 | 12,50 |
| | 3534-807 | | | | 42,22 | 42,22 | | |
| B-72 | 3573-557 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 3573-557 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 7718-422 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7718-422 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7718-422 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 15 mg | | OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 2237-238 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | R | 56,19 | 56,19 | 8,26 | 12,50 |
| | 2237-238 | | | | 42,22 | 42,22 | | |
| B-72 | 3255-676 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 3255-676 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 0780-296 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 0780-296 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 0780-296 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 15 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 4178-901 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 4178-901 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 7727-712 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7727-712 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7727-712 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |
| ABILIFY 15 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 4771-952 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | R | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 4771-952 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 7739-642 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7739-642 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7739-642 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 |

| ABILIFY 15 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | | ATC: N05AX12 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| B-72 | 4272-100 4272-100 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | R | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7729-536 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | | |
| B-72 ** | 7729-536 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | | |
| B-72 *** | 7729-536 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3534-948 3534-948 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | R | 56,19 42,22 | 56,19 42,22 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 3573-565 3573-565 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | R | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7718-448 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3516 | 1,3516 | | | |
| B-72 ** | 7718-448 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,2791 | 1,2791 | | | |
| B-72 *** | 7718-448 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ABILIFY 30 mg | | OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 2237-246 2237-246 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | R | 64,48 49,43 | 64,48 49,43 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 * | 0780-304 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 2,1254 | 2,1254 | | | |
| B-72 ** | 0780-304 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 1,8714 | 1,8714 | | | |
| B-72 *** | 0780-304 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 2,1052 | 2,1052 | 0,2964 | 0,4464 | |
| ABILIFY 30 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 4753-158 4753-158 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | R | 64,48 49,43 | 64,48 49,43 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 * | 7741-838 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 2,1254 | 2,1254 | | | |
| B-72 ** | 7741-838 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 1,8714 | 1,8714 | | | |
| B-72 *** | 7741-838 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 2,1052 | 2,1052 | 0,2964 | 0,4464 | |
| ABILIFY 30 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 4789-855 4789-855 | 28 comprimés pelliculés, 30 mg | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg | R | 64,48 49,43 | 64,48 49,43 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 * | 7740-194 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | R | 2,1254 | 2,1254 | | | |
| B-72 ** | 7740-194 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | R | 1,8714 | 1,8714 | | | |
| B-72 *** | 7740-194 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | R | 2,1052 | 2,1052 | 0,2964 | 0,4464 | |
| ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3573-573 3573-573 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | R | 64,48 49,43 | 64,48 49,43 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 * | 7718-463 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 2,1254 | 2,1254 | | | |
| B-72 ** | 7718-463 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 1,8714 | 1,8714 | | | |
| B-72 *** | 7718-463 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 2,1052 | 2,1052 | 0,2964 | 0,4464 | |
| ABILIFY 7,5 mg/ml | | OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 2567-576 2567-576 | 1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml | 1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml | r | 8,32 2,09 | 8,32 2,09 | 0,55 | 0,92 | |
| B-72 * | 0790-766 | 1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL | r | 2,7000 | 2,7000 | | | |
| B-72 ** | 0790-766 | 1 flacon injectable 1,3 mL solution | 1 injectieflacon 1,3 mL oplossing | r | 2,2200 | 2,2200 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------------|--|
| | | injectable, 7,5 mg/mL | voor injectie, 7,5 mg/mL | | | | | | |
| ACECLOFENAC EG 100 mg | | EG | | ATC: M01AB16 | | | | | |
| B-60 | 3277-605 | 20 comprimés pelliculés, 100 mg | 20 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 8,64 | 8,64 | 0,63 | 1,05 | |
| | 3277-605 | | | | 2,37 | 2,37 | | | |
| B-60 | 3277-613 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 13,23 | 13,23 | 1,56 | 2,59 | |
| | 3277-613 | | | | 5,87 | 5,87 | | | |
| B-60 * | 7712-706 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1263 | 0,1263 | | | |
| B-60 ** | 7712-706 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1037 | 0,1037 | | | |
| B-60 *** | 7712-706 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1283 | 0,1283 | 0,0260 | 0,0432 | |
| ACETYL CYSTEINE EG 600 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: R05CB01 | |
| | 0748-327 | 60 comprimés effervescents, 600 mg | 60 bruistabletten, 600 mg | | 7,42 | 7,42 | | | |
| C-27 * | 0748-327 | 1 comprimé effervescent, 600 mg | 1 bruistablet, 600 mg | G | 0,1597 | 0,1597 | | | |
| C-27 ** | 0748-327 | 1 comprimé effervescent, 600 mg | 1 bruistablet, 600 mg | G | 0,1312 | 0,1312 | | | |
| ACETYL CYSTEINE EG 600 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: R05CB01 | |
| | 0763-805 | 60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg | 60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg | | 7,42 | 7,42 | | | |
| C-27 * | 0763-805 | 1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg | 1 zakje 600 mg drank, 600 mg | G | 0,1597 | 0,1597 | | | |
| C-27 ** | 0763-805 | 1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg | 1 zakje 600 mg drank, 600 mg | G | 0,1312 | 0,1312 | | | |
| ACICLOVIR AB 200 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 4232-633 | 25 comprimés, 200 mg | 25 tabletten, 200 mg | G | 11,78 | 11,78 | 1,26 | 2,11 | |
| | 4232-633 | | | | 4,77 | 4,77 | | | |
| B-135 * | 7729-338 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2464 | 0,2464 | | | |
| B-135 ** | 7729-338 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2024 | 0,2024 | | | |
| B-135 *** | 7729-338 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2497 | 0,2497 | 0,0504 | 0,0844 | |
| ACICLOVIR AB 800 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 4232-625 | 35 comprimés, 800 mg | 35 tabletten, 800 mg | G | 19,31 | 19,31 | 2,79 | 4,65 | |
| | 4232-625 | | | | 10,52 | 10,52 | | | |
| B-135 * | 7729-346 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3880 | 0,3880 | | | |
| B-135 ** | 7729-346 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3186 | 0,3186 | | | |
| B-135 *** | 7729-346 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3937 | 0,3937 | 0,0797 | 0,1329 | |
| ACICLOVIR APOTEX 800 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 1549-617 | 35 comprimés, 800 mg | 35 tabletten, 800 mg | G | 19,31 | 19,31 | 2,79 | 4,65 | |
| | 1549-617 | | | | 10,52 | 10,52 | | | |
| B-135 * | 0778-365 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3880 | 0,3880 | | | |
| B-135 ** | 0778-365 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3186 | 0,3186 | | | |
| B-135 *** | 0778-365 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3937 | 0,3937 | 0,0797 | 0,1329 | |
| ACICLOVIR EG 200 mg | | EG | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 1464-015 | 25 comprimés, 200 mg | 25 tabletten, 200 mg | G | 11,82 | 11,82 | 1,27 | 2,12 | |
| | 1464-015 | | | | 4,79 | 4,79 | | | |
| B-135 * | 0760-025 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2472 | 0,2472 | | | |
| B-135 ** | 0760-025 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | | |
| B-135 *** | 0760-025 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2514 | 0,2514 | 0,0508 | 0,0848 | |

| ACICLOVIR EG 800 mg | | EG | | ATC: J05AB01 | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-135 | 1464-049 1464-049 | 35 comprimés, 800 mg | 35 tabletten, 800 mg | G | 19,37 10,56 | 19,37 10,56 | 2,80 | 4,67 | |
| B-135 * | 0760-017 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3894 | 0,3894 | | | |
| B-135 ** | 0760-017 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3197 | 0,3197 | | | |
| B-135 *** | 0760-017 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3952 | 0,3952 | 0,0800 | 0,1334 | |
| ACICLOVIR GSK 200 mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 0889-071 0889-071 | 25 comprimés, 200 mg | 25 tabletten, 200 mg | R | 12,19 5,08 | 12,19 5,08 | 1,35 | 2,25 | |
| B-135 * | 0729-228 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,2624 | 0,2624 | | | |
| B-135 ** | 0729-228 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,2152 | 0,2152 | | | |
| B-135 *** | 0729-228 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,2663 | 0,2663 | 0,0540 | 0,0900 | |
| ACICLOVIR GSK 400 mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 1003-607 1003-607 | 1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml | 1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml | R | 18,96 10,25 | 18,96 10,25 | 2,72 | 4,53 | |
| B-135 * | 0740-357 | 5 mL suspension buvable, 80 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL | R | 0,6615 | 0,6615 | | | |
| B-135 ** | 0740-357 | 5 mL suspension buvable, 80 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL | R | 0,5435 | 0,5435 | | | |
| ACICLOVIR GSK 800 mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 0458-133 0458-133 | 35 comprimés, 800 mg | 35 tabletten, 800 mg | R | 20,18 11,18 | 20,18 11,18 | 2,96 | 4,94 | |
| B-135 * | 0735-167 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | R | 0,4123 | 0,4123 | | | |
| B-135 ** | 0735-167 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | R | 0,3386 | 0,3386 | | | |
| B-135 *** | 0735-167 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | R | 0,4185 | 0,4185 | 0,0846 | 0,1411 | |
| ACICLOVIR GSK I.V. | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| | 0721-563 | 5 ampoules 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg | 5 ampullen 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg | | 14,26 | 14,26 | | | |
| B-135 * | 0721-563 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 3,6800 | 3,6800 | | | |
| B-135 ** | 0721-563 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 3,0240 | 3,0240 | | | |
| ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml | | Pfizer | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| | 0770-479 | 1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml | | 19,10 | 19,10 | | | |
| B-135 * | 0770-479 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL | G | 24,6500 | 24,6500 | | | |
| B-135 ** | 0770-479 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL | G | 20,2500 | 20,2500 | | | |
| ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml | | Pfizer | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| | 0770-461 | 5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml | 5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml | | 47,73 | 47,73 | | | |
| B-135 * | 0770-461 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL | G | 11,5400 | 11,5400 | | | |
| B-135 ** | 0770-461 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL | G | 10,1180 | 10,1180 | | | |

| ACICLOVIR SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | ATC: J05AB01 | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-135 | 1679-018 1679-018 | 25 comprimés, 200 mg | 25 tabletten, 200 mg | G | 11,82 4,79 | 11,82 4,79 | 1,27 | 2,12 | |
| B-135 * | 0753-277 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2472 | 0,2472 | | | |
| B-135 ** | 0753-277 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | | |
| B-135 *** | 0753-277 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2514 | 0,2514 | 0,0508 | 0,0848 | |
| ACICLOVIR SANDOZ 800 mg | | SANDOZ | | ATC: J05AB01 | | | | | |
| B-135 | 1679-000 1679-000 | 35 comprimés, 800 mg | 35 tabletten, 800 mg | G | 19,37 10,56 | 19,37 10,56 | 2,80 | 4,67 | |
| B-135 * | 0753-269 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3894 | 0,3894 | | | |
| B-135 ** | 0753-269 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3197 | 0,3197 | | | |
| B-135 *** | 0753-269 | 1 comprimé, 800 mg | 1 tablet, 800 mg | G | 0,3952 | 0,3952 | 0,0800 | 0,1334 | |
| ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA | | PANMEDICA SAS | | ATC: N02BA01 | | | | | |
| B-58 | 0139-592 0139-592 | 6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml | 6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml | | 8,56 2,31 | 8,56 2,31 | 0,61 | 1,02 | |
| B-58 * | 0701-185 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL | | 0,4967 | 0,4967 | | | |
| B-58 ** | 0701-185 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL | | 0,4083 | 0,4083 | | | |
| ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire | | THERAMEX IRELAND Limited | | ATC: M05BA07 | | | | | |
| B-230 | 1768-548 1768-548 | 12 comprimés pelliculés, 35 mg | 12 filmomhulde tabletten, 35 mg | R | 29,28 18,80 | 29,28 18,80 | 4,51 | 7,58 | |
| B-230 * | 0774-414 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | R | 2,0217 | 2,0217 | | | |
| B-230 ** | 0774-414 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | R | 1,6608 | 1,6608 | | | |
| B-230 *** | 0774-414 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | R | 1,9787 | 1,9787 | 0,3758 | 0,6317 | |
| ACTONEL 5 mg | | THERAMEX IRELAND Limited | | ATC: M05BA07 | | | | | |
| B-230 | 1597-863 1597-863 | 84 comprimés pelliculés, 5 mg | 84 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 29,28 18,80 | 29,28 18,80 | 4,51 | 7,58 | |
| B-230 * | 0770-594 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,2888 | 0,2888 | | | |
| B-230 ** | 0770-594 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,2373 | 0,2373 | | | |
| B-230 *** | 0770-594 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,2827 | 0,2827 | 0,0537 | 0,0902 | |
| ACTONEL COMBI D | | THERAMEX IRELAND Limited | | ATC: M05BB04 | | | | | |
| B-230 | 2613-024 2613-024 | 12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | 12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | R | 29,35 18,86 | 29,35 18,86 | 4,52 | 7,59 | |
| B-230 * | 0792-929 | 1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet- doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | 1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | R | 2,0283 | 2,0283 | | | |
| B-230 ** | 0792-929 | 1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet- doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | 1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | R | 1,6658 | 1,6658 | | | |
| B-230 *** | 0792-929 | 1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet- doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | 1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU | R | 1,9849 | 1,9849 | 0,3767 | 0,6325 | |
| ACTOS 15 mg | | EUROCEPT | | ATC: A10BG03 | | | | | |
| A-64 | 1669-373 1669-373 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | | 24,53 14,66 | 24,53 14,66 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-64 | 2494-276 2494-276 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | | 55,99 42,04 | 55,99 42,04 | 0,00 | 0,00 |
| A-64 * | 0769-166 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | | 0,5272 | 0,5272 | | |
| A-64 ** | 0769-166 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | | 0,4547 | 0,4547 | | |
| A-64 *** | 0769-166 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | | 0,5149 | 0,5149 | 0,0000 | 0,0000 |
| ACTOS 30 mg EUROCEPT ATC: A10BG03 | | | | | | | | |
| A-64 | 1732-874 1732-874 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | | 34,42 23,26 | 34,42 23,26 | 0,00 | 0,00 |
| A-64 | 2494-268 2494-268 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | | 83,20 65,99 | 83,20 65,99 | 0,00 | 0,00 |
| A-64 * | 0771-410 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,7863 | 0,7863 | | |
| A-64 ** | 0771-410 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,7138 | 0,7138 | | |
| A-64 *** | 0771-410 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,7925 | 0,7925 | 0,0000 | 0,0000 |
| ACTOS 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: A10BG03 | | | | | | | | |
| A-64 | 4793-550 4793-550 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | | 83,20 65,99 | 83,20 65,99 | 0,00 | 0,00 |
| A-64 * | 7740-319 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,7863 | 0,7863 | | |
| A-64 ** | 7740-319 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,7138 | 0,7138 | | |
| A-64 *** | 7740-319 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,7925 | 0,7925 | 0,0000 | 0,0000 |
| ACTRAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB01 | | | | | | | | |
| A-11 | 0245-399 0245-399 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M | 17,09 8,82 | 17,09 8,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-11 * | 0736-892 | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 1,1380 | 1,1380 | | |
| A-11 ** | 0736-892 | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 0,9350 | 0,9350 | | |
| ACTRAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB01 | | | | | | | | |
| A-11 | 1085-885 1085-885 | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M | 29,35 18,86 | 29,35 18,86 | 0,00 | 0,00 |
| A-11 * | 0741-314 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 4,8680 | 4,8680 | | |
| A-11 ** | 0741-314 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 3,9980 | 3,9980 | | |
| ACULARE 0,5% ABBVIE ATC: S01BC05 | | | | | | | | |
| B-198 | 1198-837 1198-837 | 1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml | | 8,86 2,54 | 8,86 2,54 | 0,67 | 1,12 |
| B-198 * | 0744-896 | 1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | | 3,2800 | 3,2800 | | |
| B-198 ** | 0744-896 | 1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | | 2,6900 | 2,6900 | | |
| ADENOCOR SANOFI BELGIUM ATC: C01EB10 | | | | | | | | |
| | 0746-388 | 6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml | 6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml | | 19,93 | 19,93 | | |
| B-229 * | 0746-388 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL | | 4,2867 | 4,2867 | | |
| B-229 ** | 0746-388 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL | | 3,5217 | 3,5217 | | |

| ADOPORT 0,5 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| A-29 | 2915-304 2915-304 | 100 gélules, 0,5 mg | 100 capsules, hard, 0,5 mg | G | 62,68 47,86 | 62,68 47,86 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 * | 0797-050 | 1 gélule, 0,5 mg | 1 capsule, hard, 0,5 mg | G | 0,5784 | 0,5784 | | | |
| A-29 ** | 0797-050 | 1 gélule, 0,5 mg | 1 capsule, hard, 0,5 mg | G | 0,5073 | 0,5073 | | | |
| A-29 *** | 0797-050 | 1 gélule, 0,5 mg | 1 capsule, hard, 0,5 mg | G | 0,5714 | 0,5714 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ADOPORT 1 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | | |
| A-29 | 2915-312 2915-312 | 100 gélules, 1 mg | 100 capsules, hard, 1 mg | G | 99,19 80,58 | 99,19 80,58 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 * | 0797-068 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | G | 0,9252 | 0,9252 | | | |
| A-29 ** | 0797-068 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | G | 0,8541 | 0,8541 | | | |
| A-29 *** | 0797-068 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | G | 0,9366 | 0,9366 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ADOPORT 2 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | | |
| A-29 | 3187-226 3187-226 | 100 gélules, 2 mg | 100 capsules, hard, 2 mg | G | 187,56 161,18 | 187,56 161,18 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 * | 7709-165 | 1 gélule, 2 mg | 1 capsule, hard, 2 mg | G | 1,7796 | 1,7796 | | | |
| A-29 ** | 7709-165 | 1 gélule, 2 mg | 1 capsule, hard, 2 mg | G | 1,7085 | 1,7085 | | | |
| A-29 *** | 7709-165 | 1 gélule, 2 mg | 1 capsule, hard, 2 mg | G | 1,8202 | 1,8202 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ADOPORT 5 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | | |
| A-29 | 2915-320 2915-320 | 100 gélules, 5 mg | 100 capsules, hard, 5 mg | G | 429,45 381,81 | 429,45 381,81 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 * | 0797-076 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | G | 4,1183 | 4,1183 | | | |
| A-29 ** | 0797-076 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | G | 4,0472 | 4,0472 | | | |
| A-29 *** | 0797-076 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | G | 4,2392 | 4,2392 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg | | Pfizer | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| | 0737-510 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 6,15 | 6,15 | | | |
| A-25 * | 0737-510 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 7,9400 | 7,9400 | | | |
| A-25 ** | 0737-510 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 6,5200 | 6,5200 | | | |
| ADRIPLASTINA READY TO USE 200 mg | | Pfizer | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| | 0744-409 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 97,93 | 97,93 | | | |
| A-25 * | 0744-409 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 110,9200 | 110,9200 | | | |
| A-25 ** | 0744-409 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 103,8100 | 103,8100 | | | |
| ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg | | Pfizer | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| | 0736-785 | 1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 27,38 | 27,38 | | | |
| A-25 * | 0736-785 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 35,3300 | 35,3300 | | | |
| A-25 ** | 0736-785 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 29,0200 | 29,0200 | | | |
| ADVAGRAF 0,5 mg | | ASTELLAS PHARMA | | ATC: L04AD02 | | | | | |
| A-29 | 2657-617 2657-617 | 100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | R | 63,76 48,80 | 63,76 48,80 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-29 * | 0789-628 | 1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | R | 0,5884 | 0,5884 | | |
| A-29 ** | 0789-628 | 1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | R | 0,5173 | 0,5173 | | |
| A-29 *** | 0789-628 | 1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | R | 0,5823 | 0,5823 | 0,0000 | 0,0000 |
| ADVAGRAF 1 mg | | ASTELLAS PHARMA | | | ATC: L04AD02 | | | |
| A-29 | 2495-786 | 100 gélules à libération prolongée, 1 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg | R | 100,95 | 100,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 2495-786 | | | | 82,19 | 82,19 | | |
| A-29 * | 0789-636 | 1 gélule à libération prolongée, 1 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg | R | 0,9423 | 0,9423 | | |
| A-29 ** | 0789-636 | 1 gélule à libération prolongée, 1 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg | R | 0,8712 | 0,8712 | | |
| A-29 *** | 0789-636 | 1 gélule à libération prolongée, 1 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg | R | 0,9542 | 0,9542 | 0,0000 | 0,0000 |
| ADVAGRAF 3 mg | | ASTELLAS PHARMA | | | ATC: L04AD02 | | | |
| A-29 | 2669-216 | 100 gélules à libération prolongée, 3 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 274,07 | 274,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 2669-216 | | | | 240,10 | 240,10 | | |
| A-29 * | 0795-831 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 2,6162 | 2,6162 | | |
| A-29 ** | 0795-831 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 2,5451 | 2,5451 | | |
| A-29 *** | 0795-831 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 2,6854 | 2,6854 | 0,0000 | 0,0000 |
| ADVAGRAF 5 mg | | ASTELLAS PHARMA | | | ATC: L04AD02 | | | |
| A-29 | 2657-625 | 100 gélules à libération prolongée, 5 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg | R | 437,77 | 437,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2657-625 | | | | 389,40 | 389,40 | | |
| A-29 * | 0789-644 | 1 gélule à libération prolongée, 5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg | R | 4,1987 | 4,1987 | | |
| A-29 ** | 0789-644 | 1 gélule à libération prolongée, 5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg | R | 4,1276 | 4,1276 | | |
| A-29 *** | 0789-644 | 1 gélule à libération prolongée, 5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg | R | 4,3224 | 4,3224 | 0,0000 | 0,0000 |
| AERIUS 5 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: R06AX27 | | | |
| Cs-7 | 1635-879 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 9,89 | 9,89 | 3,52 | 3,52 |
| | 1635-879 | | | | 3,32 | 3,32 | | |
| Cs-7 | 2883-122 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 16,44 | 16,44 | 8,82 | 8,82 |
| | 2883-122 | | | | 8,32 | 8,32 | | |
| Cs-7 * | 0768-267 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1074 | 0,1074 | | |
| Cs-7 ** | 0768-267 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,0882 | 0,0882 | | |
| Cs-7 *** | 0768-267 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1091 | 0,1091 | 0,0882 | 0,0882 |
| AERIUS 5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: R06AX27 | | | |
| Cs-7 | 3110-566 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 9,89 | 9,89 | 3,52 | 3,52 |
| | 3110-566 | | | | 3,32 | 3,32 | | |
| Cs-7 | 3146-347 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 16,30 | 16,30 | 8,72 | 8,72 |
| | 3146-347 | | | | 8,22 | 8,22 | | |
| Cs-7 * | 7707-557 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1061 | 0,1061 | | |
| Cs-7 ** | 7707-557 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,0871 | 0,0871 | | |
| Cs-7 *** | 7707-557 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1077 | 0,1077 | 0,0872 | 0,0872 |

| AIR-TAL 100 mg | | ALMIRALL | | ATC: M01AB16 | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-60 | 1306-638 1306-638 | 20 comprimés pelliculés, 100 mg | 20 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 8,64 2,37 | 8,64 2,37 | 0,63 | 1,05 | |
| B-60 | 1306-646 1306-646 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 13,23 5,87 | 13,23 5,87 | 1,56 | 2,59 | |
| B-60 * | 0747-451 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1263 | 0,1263 | | | |
| B-60 ** | 0747-451 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1037 | 0,1037 | | | |
| B-60 *** | 0747-451 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1283 | 0,1283 | 0,0260 | 0,0432 | |
| AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg | | SANDOZ | | ATC: R03AK07 | | | | | |
| B-245 | 3934-080 3934-080 | 120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 29,55 19,03 | 29,55 19,03 | 4,54 | 7,64 | |
| B-245 | 3934-072 3934-072 | 360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 76,62 59,99 | 76,62 59,99 | 8,30 | 12,50 | |
| B-245 * | 7725-815 | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 11,7833 | 11,7833 | | | |
| B-245 ** | 7725-815 | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 10,5983 | 10,5983 | | | |
| AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg | | SANDOZ | | ATC: R03AK07 | | | | | |
| B-245 | 4335-964 4335-964 | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 30,64 19,98 | 30,64 19,98 | 4,70 | 7,89 | |
| B-245 | 4335-972 4335-972 | 180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 74,95 58,55 | 74,95 58,55 | 8,30 | 12,50 | |
| B-245 * | 7730-716 | 1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 23,0567 | 23,0567 | | | |
| B-245 ** | 7730-716 | 1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 20,6867 | 20,6867 | | | |
| AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg | | SANDOZ | | ATC: R03AK06 | | | | | |
| B-245 | 3246-535 3246-535 | 60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg | 60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg | G | 26,92 16,75 | 26,92 16,75 | 4,18 | 7,02 | |
| B-245 | 4250-304 4250-304 | 180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 60,17 45,67 | 60,17 45,67 | 8,30 | 12,50 | |
| B-245 * | 7729-569 | 1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 0,3084 | 0,3084 | | | |
| B-245 ** | 7729-569 | 1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 0,2689 | 0,2689 | | | |
| AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg | | SANDOZ | | ATC: R03AK06 | | | | | |
| B-245 | 3182-557 3182-557 | 60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg | 60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg | G | 33,75 22,69 | 33,75 22,69 | 5,13 | 8,63 | |
| B-245 | 4250-312 4250-312 | 180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 78,72 61,90 | 78,72 61,90 | 8,30 | 12,50 | |
| B-245 * | 7729-577 | 1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 0,4040 | 0,4040 | | | |
| B-245 ** | 7729-577 | 1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 0,3645 | 0,3645 | | | |
| AKINETON | | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT | | ATC: N04AA02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-78 | 0017-913 | 20 comprimés, 2 mg | 20 tabletten, 2 mg | | 6,92 | 6,92 | 0,23 | 0,38 |
| | 0017-913 | | | | 0,87 | 0,87 | | |
| B-78 | 0017-921 | 50 comprimés, 2 mg | 50 tabletten, 2 mg | | 8,09 | 8,09 | 0,50 | 0,84 |
| | 0017-921 | | | | 1,89 | 1,89 | | |
| B-78 * | 0700-260 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,0488 | 0,0488 | | |
| B-78 ** | 0700-260 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,0400 | 0,0400 | | |
| B-78 *** | 0700-260 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,0511 | 0,0511 | 0,0100 | 0,0168 |
| ALDACTONE 100 mg Pfizer | | | | ATC: C03DA01 | | | | |
| B-27 | 0100-966 | 30 comprimés, 100 mg | 30 tabletten, 100 mg | R | 12,26 | 12,26 | 1,36 | 2,27 |
| | 0100-966 | | | | 5,14 | 5,14 | | |
| B-27 | 0863-290 | 50 comprimés, 100 mg | 50 tabletten, 100 mg | R | 13,37 | 13,37 | 1,59 | 2,64 |
| | 0863-290 | | | | 5,98 | 5,98 | | |
| B-27 * | 0700-369 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1544 | 0,1544 | | |
| B-27 ** | 0700-369 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1268 | 0,1268 | | |
| B-27 *** | 0700-369 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1567 | 0,1567 | 0,0318 | 0,0528 |
| ALDACTONE 25 mg Pfizer | | | | ATC: C03DA01 | | | | |
| B-27 | 0100-974 | 50 comprimés, 25 mg | 50 tabletten, 25 mg | R | 8,26 | 8,26 | 0,54 | 0,90 |
| | 0100-974 | | | | 2,04 | 2,04 | | |
| B-27 * | 0700-351 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0526 | 0,0526 | | |
| B-27 ** | 0700-351 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0432 | 0,0432 | | |
| B-27 *** | 0700-351 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0545 | 0,0545 | 0,0108 | 0,0180 |
| ALDACTONE 50 mg Pfizer | | | | ATC: C03DA01 | | | | |
| B-27 | 1337-286 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | R | 10,34 | 10,34 | 0,97 | 1,62 |
| | 1337-286 | | | | 3,67 | 3,67 | | |
| B-27 * | 0746-701 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1580 | 0,1580 | | |
| B-27 ** | 0746-701 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1297 | 0,1297 | | |
| B-27 *** | 0746-701 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1601 | 0,1601 | 0,0323 | 0,0540 |
| ALENDRONATE EG 70 mg EG | | | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 2371-532 | 4 comprimés, 70 mg | 4 tabletten, 70 mg | G | 13,64 | 13,64 | 1,64 | 2,74 |
| | 2371-532 | | | | 6,19 | 6,19 | | |
| B-230 | 2371-540 | 12 comprimés, 70 mg | 12 tabletten, 70 mg | G | 24,26 | 24,26 | 3,81 | 6,40 |
| | 2371-540 | | | | 14,43 | 14,43 | | |
| B-230 * | 0784-645 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5517 | 1,5517 | | |
| B-230 ** | 0784-645 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,2750 | 1,2750 | | |
| B-230 *** | 0784-645 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5609 | 1,5609 | 0,3175 | 0,5333 |
| ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM | | | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 4873-196 | 12 comprimés, 70 mg | 12 tabletten, 70 mg | G | 24,26 | 24,26 | 3,81 | 6,40 |
| | 4873-196 | | | | 14,43 | 14,43 | | |
| B-230 * | 7741-986 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5517 | 1,5517 | | |
| B-230 ** | 7741-986 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,2750 | 1,2750 | | |
| B-230 *** | 7741-986 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5609 | 1,5609 | 0,3175 | 0,5333 |
| ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA | | | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 2616-498 | 12 comprimés, 70 mg | 12 tabletten, 70 mg | G | 24,26 | 24,26 | 3,81 | 6,40 |
| | 2616-498 | | | | 14,43 | 14,43 | | |
| B-230 * | 0793-133 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5517 | 1,5517 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-230 ** | 0793-133 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,2750 | 1,2750 | | |
| B-230 *** | 0793-133 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5609 | 1,5609 | 0,3175 | 0,5333 |
| ALENDRONATE MYLAN 10 mg | | VIATRIS | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 2456-556 2456-556 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 28,26 17,91 | 28,26 17,91 | 4,37 | 7,34 |
| B-230 * | 0784-652 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2358 | 0,2358 | | |
| B-230 ** | 0784-652 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1937 | 0,1937 | | |
| B-230 *** | 0784-652 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2319 | 0,2319 | 0,0446 | 0,0749 |
| ALENDRONATE TEVA 70 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 2363-232 2363-232 | 12 comprimés, 70 mg | 12 tabletten, 70 mg | G | 23,47 13,74 | 23,47 13,74 | 3,64 | 6,07 |
| B-230 * | 0784-967 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,4775 | 1,4775 | | |
| B-230 ** | 0784-967 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,2133 | 1,2133 | | |
| B-230 *** | 0784-967 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,4946 | 1,4946 | 0,3033 | 0,5058 |
| ALENDRONATE VIATRIS 70 mg | | VIATRIS | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 2456-572 2456-572 | 12 comprimés, 70 mg | 12 tabletten, 70 mg | G | 24,26 14,43 | 24,26 14,43 | 3,81 | 6,40 |
| B-230 * | 0784-660 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5517 | 1,5517 | | |
| B-230 ** | 0784-660 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,2750 | 1,2750 | | |
| B-230 *** | 0784-660 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | G | 1,5609 | 1,5609 | 0,3175 | 0,5333 |
| ALGOTRA 325 / 37,5 mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 3154-549 3154-549 | 30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg | 30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg | G | 8,88 2,56 | 8,88 2,56 | 2,26 | 2,26 |
| C-29 | 3154-663 3154-663 | 100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg | 100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg | G | 16,21 8,15 | 16,21 8,15 | 7,20 | 7,20 |
| C-29 * | 7708-399 | 1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1052 | 0,1052 | | |
| C-29 ** | 7708-399 | 1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,0864 | 0,0864 | | |
| C-29 *** | 7708-399 | 1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1067 | 0,1067 | 0,0720 | 0,0720 |
| ALGOTRA 325 mg/37,5 mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 3346-095 3346-095 | 40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg | 40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg | G | 9,89 3,32 | 9,89 3,32 | 2,93 | 2,93 |
| C-29 * | 7714-264 | 1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg | 1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1070 | 0,1070 | | |
| C-29 ** | 7714-264 | 1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg | 1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,0880 | 0,0880 | | |
| C-29 *** | 7714-264 | 1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg | 1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1089 | 0,1089 | 0,0732 | 0,0732 |
| ALKERAN | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: L01AA03 | | | | |
| | 0744-573 | 1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 35,81 | 35,81 | | |
| A-23 * | 0744-573 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | | 45,0700 | 45,0700 | | |
| A-23 ** | 0744-573 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 10 | 1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL | | 37,9600 | 37,9600 | | |

| | | mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| ALKERAN 2 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: L01AA03 | | | | | |
| A-23 | 0018-614 0018-614 | 25 comprimés, 2 mg | 25 tabletten, 2 mg | | 37,56 26,00 | 37,56 26,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-23 * | 0700-450 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 1,3420 | 1,3420 | | | |
| A-23 ** | 0700-450 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 1,1024 | 1,1024 | | | |
| A-23 *** | 0700-450 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 1,2809 | 1,2809 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ALLEGRA TAB 120 mg | | OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA | | ATC: R06AX26 | | | | | |
| Cs-7 | 4568-481 4568-481 | 30 comprimés pelliculés, 120 mg | 30 filmomhulde tabletten, 120 mg | | 15,56 7,65 | 15,56 7,65 | 8,11 | 8,11 | |
| Cs-7 * | 0748-749 | 1 comprimé pelliculé, 120 mg | 1 filmomhulde tablet, 120 mg | | 0,3290 | 0,3290 | | | |
| Cs-7 ** | 0748-749 | 1 comprimé pelliculé, 120 mg | 1 filmomhulde tablet, 120 mg | | 0,2703 | 0,2703 | | | |
| Cs-7 *** | 0748-749 | 1 comprimé pelliculé, 120 mg | 1 filmomhulde tablet, 120 mg | | 0,3343 | 0,3343 | 0,2703 | 0,2703 | |
| ALLOPURINOL EG | | EG | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 0016-832 0016-832 | 90 comprimés, 300 mg | 90 tabletten, 300 mg | G | 10,58 3,85 | 10,58 3,85 | 1,02 | 1,70 | |
| B-68 * | 0729-244 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,0552 | 0,0552 | | | |
| B-68 ** | 0729-244 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,0453 | 0,0453 | | | |
| B-68 *** | 0729-244 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,0561 | 0,0561 | 0,0113 | 0,0189 | |
| ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 4220-653 4220-653 | 100 mg comprimés pelliculés, 100 mg | 100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 7,92 1,74 | 7,92 1,74 | 0,46 | 0,77 | |
| B-68 * | 7728-371 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,0225 | 0,0225 | | | |
| B-68 ** | 7728-371 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,0184 | 0,0184 | | | |
| B-68 *** | 7728-371 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,0239 | 0,0239 | 0,0046 | 0,0077 | |
| ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 4220-463 4220-463 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 11,06 4,22 | 11,06 4,22 | 1,12 | 1,87 | |
| B-68 * | 7728-355 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,0545 | 0,0545 | | | |
| B-68 ** | 7728-355 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,0447 | 0,0447 | | | |
| B-68 *** | 7728-355 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,0552 | 0,0552 | 0,0112 | 0,0187 | |
| ALLOPURINOL TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 2748-150 2748-150 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | G | 7,92 1,74 | 7,92 1,74 | 0,46 | 0,77 | |
| B-68 * | 0758-276 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0225 | 0,0225 | | | |
| B-68 ** | 0758-276 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0184 | 0,0184 | | | |
| B-68 *** | 0758-276 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0239 | 0,0239 | 0,0046 | 0,0077 | |
| ALLOPURINOL TEVA 300 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 2748-119 2748-119 | 100 comprimés, 300 mg | 100 tabletten, 300 mg | G | 10,73 3,97 | 10,73 3,97 | 1,05 | 1,75 | |
| B-68 * | 0758-078 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,0512 | 0,0512 | | | |
| B-68 ** | 0758-078 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,0421 | 0,0421 | | | |
| B-68 *** | 0758-078 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,0519 | 0,0519 | 0,0105 | 0,0175 | |

| ALPHAGAN 2% | | ABBVIE | | ATC: S01EA05 | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-168 | 1534-007 | 3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml | R | 19,61 | 19,61 | 2,85 | 4,75 |
| | 1534-007 | | | | 10,74 | 10,74 | | |
| B-168 * | 0769-869 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL | R | 4,6200 | 4,6200 | | |
| B-168 ** | 0769-869 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL | R | 3,7933 | 3,7933 | | |
| ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML | | ALK ABELLO BV | | ATC: V01AA07 | | | | |
| B-336 | 4166-781 | 4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | 4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | | 460,16 | 460,16 | 8,30 | 12,50 |
| | 4166-781 | | | | 409,82 | 409,82 | | |
| B-336 * | 7728-405 | 1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | 1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | | 441,5200 | 441,5200 | | |
| B-336 ** | 7728-405 | 1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | 1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | | 434,4100 | 434,4100 | | |
| ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML | | ALK ABELLO BV | | ATC: V01AA07 | | | | |
| B-336 | 4166-773 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL | | 460,16 | 460,16 | 8,30 | 12,50 |
| | 4166-773 | | | | 409,82 | 409,82 | | |
| B-336 * | 7728-397 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL | | 441,5200 | 441,5200 | | |
| B-336 ** | 7728-397 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL | | 434,4100 | 434,4100 | | |
| ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML | | ALK ABELLO BV | | ATC: V01AA07 | | | | |
| B-336 | 4166-757 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL | | 545,85 | 545,85 | 8,30 | 12,50 |
| | 4166-757 | | | | 487,98 | 487,98 | | |
| B-336 * | 7728-413 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL | | 524,3700 | 524,3700 | | |
| B-336 ** | 7728-413 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL | | 517,2600 | 517,2600 | | |
| ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML | | ALK ABELLO BV | | ATC: V01AA07 | | | | |
| B-336 | 4166-765 | 4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | 4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | | 545,85 | 545,85 | 8,30 | 12,50 |
| | 4166-765 | | | | 487,98 | 487,98 | | |
| B-336 * | 7728-421 | 1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | 1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | | 524,3700 | 524,3700 | | |
| B-336 ** | 7728-421 | 1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | 1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL | | 517,2600 | 517,2600 | | |
| AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01GB06 | | |
| | 0750-851 | 10 flacons injectables 100 ml | 10 injectieflacons 100 ml | | 96,32 | 96,32 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-116 ** | 0750-851 | <i>solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml</i> | <i>oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml</i> | G | 10,2100 | 10,2100 | | |
| AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01GB06 | | |
| B-116 ** | 0750-869 | 10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | G | 48,23 | 48,23 | | |
| B-116 ** | 0750-869 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 5,1120 | 5,1120 | | |
| AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01GB06 | | |
| B-116 ** | 7732-753 | 10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL | 10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL | G | 48,23 | 48,23 | | |
| B-116 ** | 7732-753 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL | G | 5,1120 | 5,1120 | | |
| AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01GB06 | | |
| B-116 ** | 7732-761 | 10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL | 10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL | G | 96,32 | 96,32 | | |
| B-116 ** | 7732-761 | 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL | G | 10,2100 | 10,2100 | | |
| AMIODARONE AB 200 mg | | AUROBINDO NV | | | | ATC: C01BD01 | | |
| B-11 | 4515-995 | 20 comprimés, 200 mg | 20 tabletten, 200 mg | G | 8,26 | 8,26 | 0,54 | 0,90 |
| | 4515-995 | | | | 2,04 | 2,04 | | |
| B-11 | 4515-987 | 60 comprimés, 200 mg | 60 tabletten, 200 mg | G | 10,84 | 10,84 | 1,07 | 1,79 |
| | 4515-987 | | | | 4,05 | 4,05 | | |
| B-11 | 4515-961 | 100 comprimés, 200 mg | 100 tabletten, 200 mg | G | 14,35 | 14,35 | 1,78 | 2,97 |
| | 4515-961 | | | | 6,73 | 6,73 | | |
| B-11 * | 7735-145 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,0869 | 0,0869 | | |
| B-11 ** | 7735-145 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,0713 | 0,0713 | | |
| B-11 *** | 7735-145 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,0882 | 0,0882 | 0,0178 | 0,0297 |
| AMIODARONE EG | | EG | | | | ATC: C01BD01 | | |
| B-11 | 0468-702 | 60 comprimés, 200 mg | 60 tabletten, 200 mg | G | 10,84 | 10,84 | 1,07 | 1,79 |
| | 0468-702 | | | | 4,05 | 4,05 | | |
| B-11 * | 0735-217 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | |
| B-11 ** | 0735-217 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,0715 | 0,0715 | | |
| B-11 *** | 0735-217 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,0885 | 0,0885 | 0,0178 | 0,0298 |
| AMISULPRIDE EG 100 mg | | EG | | | | ATC: N05AL05 | | |
| B-72 | 2340-636 | 60 comprimés, 100 mg | 60 tabletten, 100 mg | G | 28,59 | 28,59 | 4,41 | 7,41 |
| | 2340-636 | | | | 18,19 | 18,19 | | |
| B-72 | 2340-644 | 150 comprimés, 100 mg | 150 tabletten, 100 mg | G | 50,53 | 50,53 | 7,47 | 12,57 |
| | 2340-644 | | | | 37,29 | 37,29 | | |
| B-72 * | 0784-298 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,3109 | 0,3109 | | |
| B-72 ** | 0784-298 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,2635 | 0,2635 | | |
| B-72 *** | 0784-298 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,3000 | 0,3000 | 0,0498 | 0,0838 |
| AMISULPRIDE EG 200 mg | | EG | | | | ATC: N05AL05 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-72 | 2340-651 2340-651 | 30 comprimés, 200 mg | 30 tabletten, 200 mg | G | 28,59 18,19 | 28,59 18,19 | 4,41 | 7,41 |
| B-72 | 2340-669 2340-669 | 150 comprimés, 200 mg | 150 tabletten, 200 mg | G | 92,83 74,79 | 92,83 74,79 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 0784-306 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,5759 | 0,5759 | | |
| B-72 ** | 0784-306 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,5285 | 0,5285 | | |
| B-72 *** | 0784-306 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,5820 | 0,5820 | 0,0680 | 0,1033 |
| AMISULPRIDE EG 400 mg | | EG | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2340-677 2340-677 | 60 comprimés, 400 mg | 60 tabletten, 400 mg | G | 81,03 64,01 | 81,03 64,01 | 8,30 | 12,50 |
| B-72 | 2340-685 2340-685 | 150 comprimés, 400 mg | 150 tabletten, 400 mg | G | 154,60 131,13 | 154,60 131,13 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 0784-314 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | G | 0,9741 | 0,9741 | | |
| B-72 ** | 0784-314 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | G | 0,9267 | 0,9267 | | |
| B-72 *** | 0784-314 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | G | 0,9938 | 0,9938 | 0,0680 | 0,1033 |
| AMISULPRIDE EG 50 mg | | EG | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2340-628 2340-628 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | G | 11,35 4,44 | 11,35 4,44 | 1,18 | 1,96 |
| B-72 | 2340-610 2340-610 | 60 comprimés, 50 mg | 60 tabletten, 50 mg | G | 14,78 7,06 | 14,78 7,06 | 1,87 | 3,12 |
| B-72 * | 0784-280 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,1518 | 0,1518 | | |
| B-72 ** | 0784-280 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,1247 | 0,1247 | | |
| B-72 *** | 0784-280 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,1541 | 0,1541 | 0,0312 | 0,0520 |
| AMLODIPIN AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C08CA01 | | | | |
| B-20 | 4219-838 4219-838 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,42 3,73 | 10,42 3,73 | 0,99 | 1,65 |
| B-20 | 4219-846 4219-846 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,36 13,65 | 23,36 13,65 | 3,62 | 6,03 |
| B-20 * | 7728-298 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1762 | 0,1762 | | |
| B-20 ** | 7728-298 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1447 | 0,1447 | | |
| B-20 *** | 7728-298 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1629 | 0,1629 | 0,0330 | 0,0550 |
| AMLODIPIN AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C08CA01 | | | | |
| B-20 | 4219-812 4219-812 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 10,45 3,75 | 10,45 3,75 | 0,99 | 1,66 |
| B-20 | 4219-820 4219-820 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 12,50 5,32 | 12,50 5,32 | 1,41 | 2,35 |
| B-20 * | 7728-280 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0701 | 0,0701 | | |
| B-20 ** | 7728-280 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0576 | 0,0576 | | |
| B-20 *** | 7728-280 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0711 | 0,0711 | 0,0144 | 0,0240 |
| AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C08CA01 | | | | |
| B-20 | 4799-656 4799-656 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,78 14,00 | 23,78 14,00 | 3,71 | 6,19 |
| B-20 * | 7740-103 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1807 | 0,1807 | | |
| B-20 ** | 7740-103 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1484 | 0,1484 | | |
| B-20 *** | 7740-103 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1824 | 0,1824 | 0,0371 | 0,0619 |

| AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: C08CA01 | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-20 | 2399-665 2399-665 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,71 3,95 | 10,71 3,95 | 1,05 | 1,75 | |
| B-20 | 2399-657 2399-657 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,78 14,00 | 23,78 14,00 | 3,71 | 6,19 | |
| B-20 * | 0786-079 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1807 | 0,1807 | | | |
| B-20 ** | 0786-079 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1484 | 0,1484 | | | |
| B-20 *** | 0786-079 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1824 | 0,1824 | 0,0371 | 0,0619 | |
| AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 2926-590 2926-590 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,78 14,00 | 23,78 14,00 | 3,71 | 6,19 | |
| B-20 * | 0751-487 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1807 | 0,1807 | | | |
| B-20 ** | 0751-487 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1484 | 0,1484 | | | |
| B-20 *** | 0751-487 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1824 | 0,1824 | 0,0371 | 0,0619 | |
| AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 2399-582 2399-582 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 10,81 4,03 | 10,81 4,03 | 1,07 | 1,78 | |
| B-20 | 2399-590 2399-590 | 60 comprimés, 5 mg | 60 tabletten, 5 mg | G | 11,56 4,60 | 11,56 4,60 | 1,22 | 2,03 | |
| B-20 | 2399-640 2399-640 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 12,73 5,49 | 12,73 5,49 | 1,46 | 2,43 | |
| B-20 * | 0786-061 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0708 | 0,0708 | | | |
| B-20 ** | 0786-061 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0582 | 0,0582 | | | |
| B-20 *** | 0786-061 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0720 | 0,0720 | 0,0146 | 0,0243 | |
| AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg | | EG | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 2430-353 2430-353 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,70 3,94 | 10,70 3,94 | 1,04 | 1,74 | |
| B-20 | 2430-395 2430-395 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,67 13,91 | 23,67 13,91 | 3,69 | 6,15 | |
| B-20 * | 0786-863 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1795 | 0,1795 | | | |
| B-20 ** | 0786-863 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1474 | 0,1474 | | | |
| B-20 *** | 0786-863 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1814 | 0,1814 | 0,0369 | 0,0615 | |
| AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 4776-100 4776-100 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,67 13,91 | 23,67 13,91 | 3,69 | 6,15 | |
| B-20 * | 7739-329 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1795 | 0,1795 | | | |
| B-20 ** | 7739-329 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1474 | 0,1474 | | | |
| B-20 *** | 7739-329 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1814 | 0,1814 | 0,0369 | 0,0615 | |
| AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 3502-515 3502-515 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,67 13,91 | 23,67 13,91 | 3,69 | 6,15 | |
| B-20 * | 7719-578 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1795 | 0,1795 | | | |
| B-20 ** | 7719-578 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1474 | 0,1474 | | | |
| B-20 *** | 7719-578 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1814 | 0,1814 | 0,0369 | 0,0615 | |

| AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg | | EG | | ATC: C08CA01 | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-20 | 2430-361 2430-361 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 10,79 4,01 | 10,79 4,01 | 1,06 | 1,77 | |
| B-20 | 2430-387 2430-387 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 12,58 5,38 | 12,58 5,38 | 1,43 | 2,38 | |
| B-20 * | 0786-855 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0708 | 0,0708 | | | |
| B-20 ** | 0786-855 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0582 | 0,0582 | | | |
| B-20 *** | 0786-855 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0719 | 0,0719 | 0,0146 | 0,0243 | |
| AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 2761-179 2761-179 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 24,71 14,82 | 24,71 14,82 | 3,87 | 6,50 | |
| B-20 * | 0759-464 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1913 | 0,1913 | | | |
| B-20 ** | 0759-464 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1571 | 0,1571 | | | |
| B-20 *** | 0759-464 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1918 | 0,1918 | 0,0387 | 0,0650 | |
| AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg | | VIATRIS | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 2761-138 2761-138 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 11,15 4,29 | 11,15 4,29 | 1,14 | 1,90 | |
| B-20 | 2761-146 2761-146 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 12,73 5,49 | 12,73 5,49 | 1,46 | 2,43 | |
| B-20 * | 0759-472 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0708 | 0,0708 | | | |
| B-20 ** | 0759-472 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0582 | 0,0582 | | | |
| B-20 *** | 0759-472 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0720 | 0,0720 | 0,0146 | 0,0243 | |
| AMLODIPINE KRKA 10 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 3495-348 3495-348 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,42 3,73 | 10,42 3,73 | 0,99 | 1,65 | |
| B-20 | 3495-371 3495-371 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 24,48 14,62 | 24,48 14,62 | 3,84 | 6,45 | |
| B-20 * | 7717-028 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1887 | 0,1887 | | | |
| B-20 ** | 7717-028 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1550 | 0,1550 | | | |
| B-20 *** | 7717-028 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | 0,0384 | 0,0645 | |
| AMLODIPINE KRKA 5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 3495-330 3495-330 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 10,45 3,75 | 10,45 3,75 | 0,99 | 1,66 | |
| B-20 | 3495-355 3495-355 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 11,12 4,26 | 11,12 4,26 | 1,13 | 1,88 | |
| B-20 | 3495-363 3495-363 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 12,55 5,35 | 12,55 5,35 | 1,42 | 2,36 | |
| B-20 * | 7717-010 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0704 | 0,0704 | | | |
| B-20 ** | 7717-010 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0579 | 0,0579 | | | |
| B-20 *** | 7717-010 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0716 | 0,0716 | 0,0145 | 0,0241 | |
| AMLODIPINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C08CA01 | | | | | |
| B-20 | 2549-996 2549-996 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,44 3,74 | 10,44 3,74 | 0,99 | 1,65 | |
| B-20 | 2550-002 2550-002 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 23,61 13,85 | 23,61 13,85 | 3,67 | 6,12 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-20 * | 0790-659 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1787 | 0,1787 | | |
| B-20 ** | 0790-659 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1468 | 0,1468 | | |
| B-20 *** | 0790-659 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1807 | 0,1807 | 0,0367 | 0,0612 |
| AMLODIPINE TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: C08CA01 | | | |
| B-20 | 2550-010 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 10,79 | 10,79 | 1,06 | 1,77 |
| | 2550-010 | | | | 4,01 | 4,01 | | |
| B-20 | 2550-028 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 11,21 | 11,21 | 1,15 | 1,92 |
| | 2550-028 | | | | 4,34 | 4,34 | | |
| B-20 | 2550-036 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 12,57 | 12,57 | 1,42 | 2,37 |
| | 2550-036 | | | | 5,37 | 5,37 | | |
| B-20 * | 0790-642 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0707 | 0,0707 | | |
| B-20 ** | 0790-642 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0581 | 0,0581 | | |
| B-20 *** | 0790-642 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0718 | 0,0718 | 0,0145 | 0,0242 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg | | EG | | | ATC: C09DB01 | | | |
| B-224 | 3979-341 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg | G | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 |
| | 3979-341 | | | | 35,43 | 35,43 | | |
| B-224 * | 7725-567 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | G | 0,4558 | 0,4558 | | |
| B-224 ** | 7725-567 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | G | 0,3833 | 0,3833 | | |
| B-224 *** | 7725-567 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | G | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg | | EG | | | ATC: C09DB01 | | | |
| B-224 | 3979-333 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg | G | 44,48 | 44,48 | 6,62 | 11,15 |
| | 3979-333 | | | | 32,02 | 32,02 | | |
| B-224 * | 7725-559 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | G | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 7725-559 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | G | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 7725-559 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | G | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg | | EG | | | ATC: C09DB01 | | | |
| B-224 | 3979-325 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg | G | 34,44 | 34,44 | 5,22 | 8,79 |
| | 3979-325 | | | | 23,28 | 23,28 | | |
| B-224 * | 7725-542 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg | G | 0,3065 | 0,3065 | | |
| B-224 ** | 7725-542 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg | G | 0,2518 | 0,2518 | | |
| B-224 *** | 7725-542 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg | G | 0,2950 | 0,2950 | 0,0533 | 0,0897 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: C09DB01 | | | |
| B-224 | 3983-566 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg | G | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 |
| | 3983-566 | | | | 35,43 | 35,43 | | |
| B-224 * | 7726-151 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg | G | 0,4558 | 0,4558 | | |
| B-224 ** | 7726-151 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg | G | 0,3833 | 0,3833 | | |
| B-224 *** | 7726-151 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg | G | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: C09DB01 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------------|
| B-224 | 3983-558 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg | G | 44,48 | 44,48 | 6,62 | 11,15 |
| | 3983-558 | | | | 32,02 | 32,02 | | |
| B-224 * | 7726-144 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg | G | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 7726-144 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg | G | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 7726-144 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg | G | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | | | | ATC: C09DB01 |
| B-224 | 3983-541 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg | G | 34,44 | 34,44 | 5,22 | 8,79 |
| | 3983-541 | | | | 23,28 | 23,28 | | |
| B-224 * | 7726-110 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg | G | 0,3065 | 0,3065 | | |
| B-224 ** | 7726-110 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg | G | 0,2518 | 0,2518 | | |
| B-224 *** | 7726-110 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg | G | 0,2950 | 0,2950 | 0,0533 | 0,0897 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ | | | | | | | | ATC: C09DB01 |
| B-224 | 3491-313 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg | G | 48,39 | 48,39 | 7,17 | 12,06 |
| | 3491-313 | | | | 35,42 | 35,42 | | |
| B-224 * | 7717-622 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | G | 0,4557 | 0,4557 | | |
| B-224 ** | 7717-622 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | G | 0,3832 | 0,3832 | | |
| B-224 *** | 7717-622 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | G | 0,4373 | 0,4373 | 0,0732 | 0,1231 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ | | | | | | | | ATC: C09DB01 |
| B-224 | 3491-297 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg | G | 44,47 | 44,47 | 6,62 | 11,14 |
| | 3491-297 | | | | 32,01 | 32,01 | | |
| B-224 * | 7717-614 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | G | 0,4188 | 0,4188 | | |
| B-224 ** | 7717-614 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | G | 0,3462 | 0,3462 | | |
| B-224 *** | 7717-614 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | G | 0,3973 | 0,3973 | 0,0676 | 0,1137 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ | | | | | | | | ATC: C09DB01 |
| B-224 | 3491-271 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg | G | 34,43 | 34,43 | 5,22 | 8,78 |
| | 3491-271 | | | | 23,27 | 23,27 | | |
| B-224 * | 7717-606 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg | G | 0,3064 | 0,3064 | | |
| B-224 ** | 7717-606 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg | G | 0,2517 | 0,2517 | | |
| B-224 *** | 7717-606 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg | G | 0,2949 | 0,2949 | 0,0533 | 0,0896 |
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | | | | ATC: C09DX01 |
| KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg | | | | | | | | |
| B-224 | 3936-655 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 |
| | 3936-655 | | | | 35,43 | 35,43 | | |
| B-224 * | 7725-740 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,4558 | 0,4558 | | |
| B-224 ** | 7725-740 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,3833 | 0,3833 | | |
| B-224 *** | 7725-740 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--|--|
| | | mg/ 12,5 mg | mg/ 12,5 mg | | | | | | | |
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX01 | | | | | | |
| KRKA 10 mg/160 mg/25 mg | | | | | | | | | | |
| B-224 | 3936-663 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 | | |
| | 3936-663 | | | | 35,43 | 35,43 | | | | |
| B-224 * | 7725-757 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 0,4558 | 0,4558 | | | | |
| B-224 ** | 7725-757 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 0,3833 | 0,3833 | | | | |
| B-224 *** | 7725-757 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 | | |
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX01 | | | | | | |
| KRKA 10 mg/320 mg/25 mg | | | | | | | | | | |
| B-224 | 3936-671 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | G | 49,45 | 49,45 | 7,31 | 12,31 | | |
| | 3936-671 | | | | 36,34 | 36,34 | | | | |
| B-224 * | 7725-765 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | G | 0,4656 | 0,4656 | | | | |
| B-224 ** | 7725-765 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | G | 0,3931 | 0,3931 | | | | |
| B-224 *** | 7725-765 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | G | 0,4481 | 0,4481 | 0,0746 | 0,1256 | | |
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX01 | | | | | | |
| KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg | | | | | | | | | | |
| B-224 | 3936-630 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 44,48 | 44,48 | 6,62 | 11,15 | | |
| | 3936-630 | | | | 32,02 | 32,02 | | | | |
| B-224 * | 7725-724 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,4189 | 0,4189 | | | | |
| B-224 ** | 7725-724 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,3463 | 0,3463 | | | | |
| B-224 *** | 7725-724 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 | | |
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX01 | | | | | | |
| KRKA 5 mg/160 mg/25 mg | | | | | | | | | | |
| B-224 | 3936-648 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 44,48 | 44,48 | 6,62 | 11,15 | | |
| | 3936-648 | | | | 32,02 | 32,02 | | | | |
| B-224 * | 7725-732 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 0,4189 | 0,4189 | | | | |
| B-224 ** | 7725-732 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 0,3463 | 0,3463 | | | | |
| B-224 *** | 7725-732 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | G | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 | | |
| AMLOGAL DIVULE 10 mg | | | | LABORATOIRES SMB | | | | ATC: C08CA01 | | |
| B-20 | 2215-853 | 28 comprimés enrobés, 10 mg | 28 omhulde tabletten, 10 mg | G | 10,45 | 10,45 | 0,99 | 1,66 | | |
| | 2215-853 | | | | 3,75 | 3,75 | | | | |
| B-20 | 2215-861 | 98 comprimés enrobés, 10 mg | 98 omhulde tabletten, 10 mg | G | 22,94 | 22,94 | 3,52 | 5,87 | | |
| | 2215-861 | | | | 13,28 | 13,28 | | | | |
| B-20 * | 0780-866 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,1749 | 0,1749 | | | | |
| B-20 ** | 0780-866 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,1437 | 0,1437 | | | | |
| B-20 *** | 0780-866 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,1776 | 0,1776 | 0,0359 | 0,0599 | | |
| AMLOR 10 mg | | | | VIATRIS | | | | ATC: C08CA01 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-20 | 1588-581 1588-581 | 30 gélules, 10 mg | 30 capsules, hard, 10 mg | R | 10,80 4,02 | 10,80 4,02 | 1,07 | 1,78 |
| B-20 | 1752-542 1752-542 | 100 gélules, 10 mg | 100 capsules, hard, 10 mg | R | 24,48 14,62 | 24,48 14,62 | 3,84 | 6,45 |
| B-20 * | 0767-384 | 1 gélule, 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg | R | 0,1887 | 0,1887 | | |
| B-20 ** | 0767-384 | 1 gélule, 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg | R | 0,1550 | 0,1550 | | |
| B-20 *** | 0767-384 | 1 gélule, 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg | R | 0,1894 | 0,1894 | 0,0384 | 0,0645 |
| AMLOR 5 mg | | VIATRIS | | ATC: C08CA01 | | | | |
| B-20 | 0447-706 0447-706 | 28 gélules, 5 mg | 28 capsules, hard, 5 mg | R | 10,79 4,01 | 10,79 4,01 | 1,06 | 1,77 |
| B-20 | 1799-501 1799-501 | 56 gélules, 5 mg | 56 capsules, hard, 5 mg | R | 11,29 4,39 | 11,29 4,39 | 1,16 | 1,94 |
| B-20 | 2837-409 2837-409 | 98 gélules, 5 mg | 98 capsules, hard, 5 mg | R | 12,58 5,38 | 12,58 5,38 | 1,43 | 2,38 |
| B-20 * | 0734-459 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | R | 0,0708 | 0,0708 | | |
| B-20 ** | 0734-459 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | R | 0,0582 | 0,0582 | | |
| B-20 *** | 0734-459 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | R | 0,0719 | 0,0719 | 0,0146 | 0,0243 |
| AMOCLANE 875/125 mg | | EG | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 2297-455 2297-455 | 20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg | 20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg | G | 14,59 6,91 | 14,59 6,91 | 6,11 | 6,11 |
| C-37 * | 0782-649 | 1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg | 1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4460 | 0,4460 | | |
| C-37 ** | 0782-649 | 1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg | 1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg | G | 0,3660 | 0,3660 | | |
| C-37 *** | 0782-649 | 1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg | 1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4526 | 0,4526 | 0,3055 | 0,3055 |
| AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg | | EG | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 2622-298 2622-298 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | G | 7,50 1,38 | 7,50 1,38 | 1,22 | 1,22 |
| C-37 * | 0794-537 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | G | 0,0890 | 0,0890 | | |
| C-37 ** | 0794-537 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | G | 0,0730 | 0,0730 | | |
| AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg | | EG | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 2622-314 2622-314 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | G | 9,01 2,65 | 9,01 2,65 | 2,34 | 2,34 |
| C-37 * | 0794-545 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | G | 0,1710 | 0,1710 | | |
| C-37 ** | 0794-545 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | G | 0,1405 | 0,1405 | | |
| AMOCLANEEG 500 mg/125 mg | | EG | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 2622-330 2622-330 | 16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg | 16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg | G | 10,89 4,09 | 10,89 4,09 | 3,62 | 3,62 |
| C-37 | 2622-355 | 30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg | 30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg | G | 14,29 | 14,29 | 5,90 | 5,90 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | 2622-355 | | | | 6,68 | 6,68 | | |
| C-37 * | 0794-552 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2873 | 0,2873 | | |
| C-37 ** | 0794-552 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2360 | 0,2360 | | |
| C-37 *** | 0794-552 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2919 | 0,2919 | 0,1967 | 0,1967 |
| AMOCLANEEG 875 mg/125 mg | | EG | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 2622-389 | 10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg | 10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg | G | 10,38 | 10,38 | 3,27 | 3,27 |
| | 2622-389 | | | | 3,70 | 3,70 | | |
| C-37 | 2622-264 | 20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg | 20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg | G | 14,59 | 14,59 | 6,11 | 6,11 |
| | 2622-264 | | | | 6,91 | 6,91 | | |
| C-37 * | 0794-941 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4460 | 0,4460 | | |
| C-37 ** | 0794-941 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,3660 | 0,3660 | | |
| C-37 *** | 0794-941 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4526 | 0,4526 | 0,3055 | 0,3055 |
| AMOCLANEEUROGENERICIS 875 mg/125 mg | | EG | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 4250-007 | 20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg | 20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg | G | 14,83 | 14,83 | 6,27 | 6,27 |
| | 4250-007 | | | | 7,09 | 7,09 | | |
| C-37 * | 7729-809 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4575 | 0,4575 | | |
| C-37 ** | 7729-809 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,3760 | 0,3760 | | |
| C-37 *** | 7729-809 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4648 | 0,4648 | 0,3135 | 0,3135 |
| AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 3532-579 | 16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg | 16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg | G | 10,89 | 10,89 | 3,62 | 3,62 |
| | 3532-579 | | | | 4,09 | 4,09 | | |
| C-37 * | 7718-141 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,3300 | 0,3300 | | |
| C-37 ** | 7718-141 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2713 | 0,2713 | | |
| C-37 *** | 7718-141 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,3346 | 0,3346 | 0,2262 | 0,2262 |
| AMOXICILLIN AB 1000 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 4254-835 | 24 comprimés dispersibles, 1000 mg | 24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg | G | 14,13 | 14,13 | 5,80 | 5,80 |
| | 4254-835 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| C-37 * | 7729-783 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 dispergeerbare tablet, 1000 mg | G | 0,3529 | 0,3529 | | |
| C-37 ** | 7729-783 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 dispergeerbare tablet, 1000 mg | G | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 7729-783 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 dispergeerbare tablet, 1000 mg | G | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| AMOXICILLIN AB 1000 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 4364-246 | 8 comprimés pelliculés, 1000 mg | 8 filmomhulde tabletten, 1000 mg | G | 8,44 | 8,44 | 1,94 | 1,94 |
| | 4364-246 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| C-37 | 4364-238 | 20 comprimés pelliculés, 1000 mg | 20 filmomhulde tabletten, 1000 mg | G | 13,25 | 13,25 | 5,21 | 5,21 |
| | 4364-238 | | | | 5,89 | 5,89 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| C-37 | 4364-253 4364-253 | 24 comprimés pelliculés, 1000 mg | 24 filmomhulde tabletten, 1000 mg | G | 14,13 6,56 | 14,13 6,56 | 5,80 | 5,80 |
| C-37 * | 7731-318 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | G | 0,3529 | 0,3529 | | |
| C-37 ** | 7731-318 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | G | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 7731-318 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | G | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| AMOXICILLIN AB 500 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 4364-279 4364-279 | 16 comprimés pelliculés, 500 mg | 16 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 7,67 1,53 | 7,67 1,53 | 1,35 | 1,35 |
| C-37 | 4364-261 4364-261 | 30 comprimés pelliculés, 500 mg | 30 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 12,42 5,26 | 12,42 5,26 | 4,65 | 4,65 |
| C-37 * | 7731-292 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,2263 | 0,2263 | | |
| C-37 ** | 7731-292 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,1860 | 0,1860 | | |
| C-37 *** | 7731-292 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,2297 | 0,2297 | 0,1550 | 0,1550 |
| AMOXICILLIN AB 500 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 4254-793 4254-793 | 30 comprimés dispersibles, 500 mg | 30 disperseerbare tabletten, 500 mg | G | 12,42 5,26 | 12,42 5,26 | 4,65 | 4,65 |
| C-37 * | 7729-775 | 1 comprimé dispersible, 500 mg | 1 disperseerbare tablet, 500 mg | G | 0,2263 | 0,2263 | | |
| C-37 ** | 7729-775 | 1 comprimé dispersible, 500 mg | 1 disperseerbare tablet, 500 mg | G | 0,1860 | 0,1860 | | |
| C-37 *** | 7729-775 | 1 comprimé dispersible, 500 mg | 1 disperseerbare tablet, 500 mg | G | 0,2297 | 0,2297 | 0,1550 | 0,1550 |
| AMOXICILLIN AB 750 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 4254-827 4254-827 | 16 comprimés dispersibles, 750 mg | 16 disperseerbare tabletten, 750 mg | G | 8,54 2,29 | 8,54 2,29 | 2,02 | 2,02 |
| C-37 * | 7729-619 | 1 comprimé dispersible, 750 mg | 1 disperseerbare tablet, 750 mg | G | 0,1850 | 0,1850 | | |
| C-37 ** | 7729-619 | 1 comprimé dispersible, 750 mg | 1 disperseerbare tablet, 750 mg | G | 0,1519 | 0,1519 | | |
| C-37 *** | 7729-619 | 1 comprimé dispersible, 750 mg | 1 disperseerbare tablet, 750 mg | G | 0,1882 | 0,1882 | 0,1262 | 0,1262 |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 3532-587 3532-587 | 10 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg | 10 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg | G | 10,25 3,60 | 10,25 3,60 | 3,18 | 3,18 |
| C-37 | 3532-595 3532-595 | 20 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg | 20 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg | G | 14,37 6,75 | 14,37 6,75 | 5,97 | 5,97 |
| C-37 * | 7718-000 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg | G | 0,4355 | 0,4355 | | |
| C-37 ** | 7718-000 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg | G | 0,3580 | 0,3580 | | |
| C-37 *** | 7718-000 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg | G | 0,4420 | 0,4420 | 0,2985 | 0,2985 |
| AMOXICILLINE EG 1000 mg | | EG | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 4247-714 4247-714 | 8 comprimés dispersibles, 1000 mg | 8 disperseerbare tabletten, 1000 mg | G | 8,44 2,20 | 8,44 2,20 | 1,94 | 1,94 |
| C-37 | 4247-722 4247-722 | 20 comprimés dispersibles, 1000 mg | 20 disperseerbare tabletten, 1000 mg | G | 13,52 6,09 | 13,52 6,09 | 5,38 | 5,38 |
| C-37 | 4247-730 | 24 comprimés dispersibles, 1000 mg | 24 disperseerbare tabletten, 1000 mg | G | 14,13 | 14,13 | 5,80 | 5,80 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|---|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | 4247-730 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| C-37 * | 7729-353 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | G | 0,3529 | 0,3529 | | |
| C-37 ** | 7729-353 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | G | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 7729-353 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | G | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| AMOXICILLINE EG 1000 mg | | EG | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 1373-158 | 8 comprimés pelliculés, 1000 mg | 8 filmomhulde tabletten, 1000 mg | G | 8,44 | 8,44 | 1,94 | 1,94 |
| | 1373-158 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| C-37 | 2207-512 | 20 comprimés pelliculés, 1000 mg | 20 filmomhulde tabletten, 1000 mg | G | 13,52 | 13,52 | 5,38 | 5,38 |
| | 2207-512 | | | | 6,09 | 6,09 | | |
| C-37 | 2744-761 | 24 comprimés pelliculés, 1000 mg | 24 filmomhulde tabletten, 1000 mg | G | 14,13 | 14,13 | 5,80 | 5,80 |
| | 2744-761 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| C-37 * | 0747-105 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | G | 0,3529 | 0,3529 | | |
| C-37 ** | 0747-105 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | G | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 0747-105 | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | G | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml | | EG | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 1722-651 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml | G | 7,97 | 7,97 | 1,58 | 1,58 |
| | 1722-651 | | | | 1,79 | 1,79 | | |
| C-37 * | 0733-550 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | G | 0,1155 | 0,1155 | | |
| C-37 ** | 0733-550 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | G | 0,0950 | 0,0950 | | |
| AMOXICILLINE EG 500 mg | | EG | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 0613-364 | 16 gélules, 500 mg | 16 capsules, hard, 500 mg | G | 7,67 | 7,67 | 1,35 | 1,35 |
| | 0613-364 | | | | 1,53 | 1,53 | | |
| C-37 | 2208-783 | 30 gélules, 500 mg | 30 capsules, hard, 500 mg | G | 12,54 | 12,54 | 4,72 | 4,72 |
| | 2208-783 | | | | 5,34 | 5,34 | | |
| C-37 * | 0731-083 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,2297 | 0,2297 | | |
| C-37 ** | 0731-083 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1887 | 0,1887 | | |
| C-37 *** | 0731-083 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,2336 | 0,2336 | 0,1573 | 0,1573 |
| AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml | | EG | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 3491-859 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg | G | 8,49 | 8,49 | 1,98 | 1,98 |
| | 3491-859 | | | | 2,24 | 2,24 | | |
| C-37 * | 7717-101 | 5 mL suspension buvable, 100 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL | G | 0,1445 | 0,1445 | | |
| C-37 ** | 7717-101 | 5 mL suspension buvable, 100 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL | G | 0,1185 | 0,1185 | | |
| AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 1525-518 | 8 comprimés dispersibles, 1000 mg | 8 disperseerbare tabletten, 1000 mg | G | 8,44 | 8,44 | 1,94 | 1,94 |
| | 1525-518 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| C-37 | 2202-372 | 20 comprimés dispersibles, 1000 mg | 20 disperseerbare tabletten, 1000 mg | G | 13,25 | 13,25 | 5,21 | 5,21 |
| | 2202-372 | | | | 5,89 | 5,89 | | |
| C-37 | 2697-670 | 24 comprimés dispersibles, 1000 mg | 24 disperseerbare tabletten, 1000 mg | G | 14,13 | 14,13 | 5,80 | 5,80 |
| | 2697-670 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| C-37 * | 0799-080 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | G | 0,3529 | 0,3529 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| C-37 ** | 0799-080 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 dispergeerbare tablet, 1000 mg | G | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 0799-080 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 dispergeerbare tablet, 1000 mg | G | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| AMOXICILLINE SANDOZ 250 | | SANDOZ | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 2114-346 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml | G | 7,95 | 7,95 | 1,56 | 1,56 |
| | 2114-346 | | | | 1,77 | 1,77 | | |
| C-37 * | 0778-068 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | G | 0,1140 | 0,1140 | | |
| C-37 ** | 0778-068 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | G | 0,0940 | 0,0940 | | |
| AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 2358-810 | 16 gélules, 500 mg | 16 capsules, hard, 500 mg | G | 7,67 | 7,67 | 1,35 | 1,35 |
| | 2358-810 | | | | 1,53 | 1,53 | | |
| C-37 * | 7701-527 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1231 | 0,1231 | | |
| C-37 ** | 7701-527 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1013 | 0,1013 | | |
| C-37 *** | 7701-527 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1338 | 0,1338 | 0,0844 | 0,0844 |
| AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 1525-500 | 16 comprimés pour solution buvable, 500 mg | 16 oplosbare tabletten, 500 mg | G | 7,67 | 7,67 | 1,35 | 1,35 |
| | 1525-500 | | | | 1,53 | 1,53 | | |
| C-37 | 2202-364 | 30 comprimés pour solution buvable, 500 mg | 30 oplosbare tabletten, 500 mg | G | 12,42 | 12,42 | 4,65 | 4,65 |
| | 2202-364 | | | | 5,26 | 5,26 | | |
| C-37 * | 0762-732 | 1 comprimé pour solution buvable, 500 mg | 1 oplosbare tablet, 500 mg | G | 0,2263 | 0,2263 | | |
| C-37 ** | 0762-732 | 1 comprimé pour solution buvable, 500 mg | 1 oplosbare tablet, 500 mg | G | 0,1860 | 0,1860 | | |
| C-37 *** | 0762-732 | 1 comprimé pour solution buvable, 500 mg | 1 oplosbare tablet, 500 mg | G | 0,2297 | 0,2297 | 0,1550 | 0,1550 |
| AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml | | SANDOZ | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 2707-180 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml | G | 8,49 | 8,49 | 1,98 | 1,98 |
| | 2707-180 | | | | 2,24 | 2,24 | | |
| C-37 * | 0797-241 | 5 mL suspension buvable, 100 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL | G | 0,1445 | 0,1445 | | |
| C-37 ** | 0797-241 | 5 mL suspension buvable, 100 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL | G | 0,1185 | 0,1185 | | |
| AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | |
| | 0782-508 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | | 26,29 | 26,29 | | |
| B-107 * | 0782-508 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | G | 3,3930 | 3,3930 | | |
| B-107 ** | 0782-508 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | G | 2,7870 | 2,7870 | | |
| AMOXICLAV SANDOZ 125 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 1541-440 | 1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | 1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | G | 6,97 | 6,97 | 0,80 | 0,80 |
| | 1541-440 | | | | 0,91 | 0,91 | | |
| C-37 | 1541-457 | 1 flacon 100 ml poudre pour | 1 fles 100 ml poeder voor orale | G | 7,47 | 7,47 | 1,19 | 1,19 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| | | suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | | | | | | |
| | 1541-457 | | | | 1,35 | 1,35 | | | |
| C-37 * | 0764-209 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | G | 0,0870 | 0,0870 | | | |
| C-37 ** | 0764-209 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL | G | 0,0715 | 0,0715 | | | |
| AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| | 0782-516 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis | | 35,23 | 35,23 | | | |
| B-107 * | 0782-516 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | G | 4,4450 | 4,4450 | | | |
| B-107 ** | 0782-516 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | G | 3,7340 | 3,7340 | | | |
| AMOXICLAV SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| C-37 | 1541-465 | 1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | 1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | G | 8,94 | 8,94 | 2,30 | 2,30 | |
| | 1541-465 | | | | 2,60 | 2,60 | | | |
| C-37 | 1541-549 | 1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | 1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | G | 8,05 | 8,05 | 1,64 | 1,64 | |
| | 1541-549 | | | | 1,85 | 1,85 | | | |
| C-37 * | 0764-217 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | G | 0,1680 | 0,1680 | | | |
| C-37 ** | 0764-217 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL | G | 0,1380 | 0,1380 | | | |
| AMOXICLAV SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| C-37 | 1541-556 | 16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg | 16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg | G | 10,79 | 10,79 | 3,54 | 3,54 | |
| | 1541-556 | | | | 4,01 | 4,01 | | | |
| C-37 | 1715-119 | 30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg | 30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg | G | 14,11 | 14,11 | 5,78 | 5,78 | |
| | 1715-119 | | | | 6,54 | 6,54 | | | |
| C-37 * | 0764-225 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2813 | 0,2813 | | | |
| C-37 ** | 0764-225 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2310 | 0,2310 | | | |
| C-37 *** | 0764-225 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg | G | 0,2858 | 0,2858 | 0,1927 | 0,1927 | |
| AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| | 7713-126 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis | | 11,76 | 11,76 | | | |
| B-107 * | 7713-126 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis | G | 1,5180 | 1,5180 | | | |
| B-107 ** | 7713-126 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis | G | 1,2470 | 1,2470 | | | |
| AMOXICLAV SANDOZ 875 mg | | SANDOZ | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| C-37 | 1645-241 | 10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg | 10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg | G | 10,28 | 10,28 | 3,20 | 3,20 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| C-37 | 1645-241 1715-127 | 20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg | 20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg | G | 3,62 14,43 | 3,62 14,43 | 6,00 | 6,00 |
| | 1715-127 | | | | 6,79 | 6,79 | | |
| C-37 * | 0768-275 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4380 | 0,4380 | | |
| C-37 ** | 0768-275 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,3600 | 0,3600 | | |
| C-37 *** | 0768-275 | 1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg | 1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg | G | 0,4447 | 0,4447 | 0,3000 | 0,3000 |
| AMUKIN | | LABORATOIRES DELBERT | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01GB06 | |
| | 7731-557 | 2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL | 2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL | | 9,65 | 9,65 | | |
| B-116 ** | 7731-557 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL | R | 5,1150 | 5,1150 | | |
| ANAFRANIL | | ALFASIGMA BELGIUM | | | | | ATC: N06AA04 | |
| B-73 | 0101-626 | 10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml | 10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml | | 11,41 | 11,41 | 1,19 | 1,98 |
| | 0101-626 | | | | 4,48 | 4,48 | | |
| B-73 * | 0700-815 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL | | 0,5780 | 0,5780 | | |
| B-73 ** | 0700-815 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL | | 0,4750 | 0,4750 | | |
| ANAFRANIL 10 mg | | ALFASIGMA BELGIUM | | | | | ATC: N06AA04 | |
| B-73 | 3427-259 | 120 comprimés enrobés, 10 mg | 120 omhulde tabletten, 10 mg | | 10,36 | 10,36 | 0,98 | 1,63 |
| | 3427-259 | | | | 3,68 | 3,68 | | |
| B-73 * | 0700-823 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | | 0,0396 | 0,0396 | | |
| B-73 ** | 0700-823 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | | 0,0325 | 0,0325 | | |
| B-73 *** | 0700-823 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | | 0,0402 | 0,0402 | 0,0082 | 0,0136 |
| ANAFRANIL 25 mg | | ALFASIGMA BELGIUM | | | | | ATC: N06AA04 | |
| B-73 | 0101-618 | 30 comprimés enrobés, 25 mg | 30 omhulde tabletten, 25 mg | | 8,22 | 8,22 | 0,53 | 0,88 |
| | 0101-618 | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| B-73 | 3427-267 | 120 comprimés enrobés, 25 mg | 120 omhulde tabletten, 25 mg | | 15,29 | 15,29 | 1,97 | 3,29 |
| | 3427-267 | | | | 7,44 | 7,44 | | |
| B-73 * | 0700-831 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | | 0,0800 | 0,0800 | | |
| B-73 ** | 0700-831 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | | 0,0658 | 0,0658 | | |
| B-73 *** | 0700-831 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | | 0,0813 | 0,0813 | 0,0164 | 0,0274 |
| ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS | | ALFASIGMA BELGIUM | | | | | ATC: N06AA04 | |
| B-73 | 0812-461 | 42 comprimés à libération prolongée, 75 mg | 42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg | | 16,78 | 16,78 | 2,28 | 3,79 |
| | 0812-461 | | | | 8,58 | 8,58 | | |
| B-73 * | 0726-992 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | | 0,2636 | 0,2636 | | |
| B-73 ** | 0726-992 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | | 0,2164 | 0,2164 | | |
| B-73 *** | 0726-992 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | | 0,2678 | 0,2678 | 0,0543 | 0,0902 |
| ANASTROZOL SANDOZ 1 mg | | SANDOZ | | | | | ATC: L02BG03 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-27 | 2681-401 2681-401 | 28 comprimés pelliculés, 1 mg | 28 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 31,27 20,53 | 31,27 20,53 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 | 2681-419 2681-419 | 98 comprimés pelliculés, 1 mg | 98 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 76,30 59,72 | 76,30 59,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0797-688 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,7185 | 0,7185 | | |
| A-27 ** | 0797-688 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,6459 | 0,6459 | | |
| A-27 *** | 0797-688 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,7221 | 0,7221 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANASTROZOLE EG 1 mg | | EG | | ATC: L02BG03 | | | | |
| A-27 | 2664-621 2664-621 | 98 comprimés pelliculés, 1 mg | 98 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 76,30 59,72 | 76,30 59,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0797-670 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,7185 | 0,7185 | | |
| A-27 ** | 0797-670 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,6459 | 0,6459 | | |
| A-27 *** | 0797-670 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,7221 | 0,7221 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANASTROZOLE TEVA 1 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L02BG03 | | | | |
| A-27 | 2683-340 2683-340 | 28 comprimés pelliculés, 1 mg | 28 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 31,27 20,53 | 31,27 20,53 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 | 2713-055 2713-055 | 98 comprimés pelliculés, 1 mg | 98 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 76,30 59,72 | 76,30 59,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0797-662 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,7185 | 0,7185 | | |
| A-27 ** | 0797-662 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,6459 | 0,6459 | | |
| A-27 *** | 0797-662 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,7221 | 0,7221 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AL03 | | | | |
| B-267 | 3153-699 3153-699 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis | | 49,80 36,65 | 49,80 36,65 | 7,36 | 12,40 |
| B-267 | 3153-707 3153-707 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis | | 128,98 107,75 | 128,98 107,75 | 8,30 | 12,50 |
| B-267 * | 7709-124 | 1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 40,4433 | 40,4433 | | |
| B-267 ** | 7709-124 | 1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 38,0733 | 38,0733 | | |
| APOCARD Retard 100 mg | | VIATRIS | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 2076-123 2076-123 | 60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg | 60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg | R | 25,41 15,43 | 25,41 15,43 | 3,97 | 6,67 |
| B-8 * | 0776-039 | 1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg | R | 0,3318 | 0,3318 | | |
| B-8 ** | 0776-039 | 1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg | R | 0,2727 | 0,2727 | | |
| B-8 *** | 0776-039 | 1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg | R | 0,3313 | 0,3313 | 0,0662 | 0,1112 |
| APOCARD Retard 150 mg | | VIATRIS | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 2076-149 2076-149 | 60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg | 60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg | R | 32,41 21,52 | 32,41 21,52 | 4,94 | 8,31 |
| B-8 * | 0776-047 | 1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg | R | 0,4628 | 0,4628 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-8 ** | 0776-047 | 1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg | R | 0,3802 | 0,3802 | | |
| B-8 *** | 0776-047 | 1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg | R | 0,4480 | 0,4480 | 0,0823 | 0,1385 |
| APOCARD Retard 200 mg | | VIATRIS | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 2076-156 | 60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg | R | 39,06 | 39,06 | 5,87 | 9,87 |
| | 2076-156 | | | | 27,30 | 27,30 | | |
| B-8 * | 0776-054 | 1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg | R | 0,5872 | 0,5872 | | |
| B-8 ** | 0776-054 | 1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg | R | 0,4823 | 0,4823 | | |
| B-8 *** | 0776-054 | 1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg | R | 0,5588 | 0,5588 | 0,0978 | 0,1645 |
| APRANAX 275 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | ATC: M01AE02 | | | | |
| B-60 | 0020-594 | 30 comprimés pelliculés, 275 mg | 30 filmomhulde tabletten, 275 mg | R | 8,44 | 8,44 | 0,58 | 0,97 |
| | 0020-594 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| B-60 * | 0701-011 | 1 comprimé pelliculé, 275 mg | 1 filmomhulde tablet, 275 mg | R | 0,0947 | 0,0947 | | |
| B-60 ** | 0701-011 | 1 comprimé pelliculé, 275 mg | 1 filmomhulde tablet, 275 mg | R | 0,0777 | 0,0777 | | |
| B-60 *** | 0701-011 | 1 comprimé pelliculé, 275 mg | 1 filmomhulde tablet, 275 mg | R | 0,0968 | 0,0968 | 0,0193 | 0,0323 |
| APRANAX 550 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | ATC: M01AE02 | | | | |
| B-60 | 0249-623 | 30 comprimés pelliculés, 550 mg | 30 filmomhulde tabletten, 550 mg | R | 10,13 | 10,13 | 0,93 | 1,55 |
| | 0249-623 | | | | 3,51 | 3,51 | | |
| B-60 * | 0736-793 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | R | 0,1510 | 0,1510 | | |
| B-60 ** | 0736-793 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | R | 0,1240 | 0,1240 | | |
| B-60 *** | 0736-793 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | R | 0,1533 | 0,1533 | 0,0310 | 0,0517 |
| APROVEL 150 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09CA04 | | | | |
| B-224 | 1356-575 | 28 comprimés, 150 mg | 28 tabletten, 150 mg | R | 13,72 | 13,72 | 1,66 | 2,76 |
| | 1356-575 | | | | 6,25 | 6,25 | | |
| B-224 * | 0749-028 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | R | 0,2882 | 0,2882 | | |
| B-224 ** | 0749-028 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | R | 0,2368 | 0,2368 | | |
| B-224 *** | 0749-028 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | R | 0,2923 | 0,2923 | 0,0593 | 0,0986 |
| APROVEL 300 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09CA04 | | | | |
| B-224 | 1356-583 | 28 comprimés pelliculés, 300 mg | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg | R | 13,23 | 13,23 | 1,56 | 2,59 |
| | 1356-583 | | | | 5,87 | 5,87 | | |
| B-224 | 1569-375 | 98 comprimés, 300 mg | 98 tabletten, 300 mg | R | 23,64 | 23,64 | 3,68 | 6,13 |
| | 1569-375 | | | | 13,88 | 13,88 | | |
| B-224 * | 0749-192 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,1828 | 0,1828 | | |
| B-224 ** | 0749-192 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,1501 | 0,1501 | | |
| B-224 *** | 0749-192 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,1847 | 0,1847 | 0,0376 | 0,0626 |
| ARIMIDEX 1 mg | | JUVISE PHARMACEUTICALS | | ATC: L02BG03 | | | | |
| A-27 | 1217-488 | 28 comprimés pelliculés, 1 mg | 28 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 31,27 | 31,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 1217-488 | | | | 20,53 | 20,53 | | |
| A-27 | 1749-167 | 84 comprimés pelliculés, 1 mg | 84 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 75,79 | 75,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 1749-167 | | | | 59,27 | 59,27 | | |
| A-27 * | 0749-937 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,8326 | 0,8326 | | |
| A-27 ** | 0749-937 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,7480 | 0,7480 | | |
| A-27 *** | 0749-937 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,8364 | 0,8364 | 0,0000 | 0,0000 |

| ARIMIDEX 1 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | | ATC: L02BG03 | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| A-27 | 4873-170 4873-170 | 84 comprimés pelliculés, 1 mg | 84 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 75,79 59,27 | 75,79 59,27 | 0,00 | 0,00 | |
| A-27 * | 7741-903 | 1 comprimé péliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,8326 | 0,8326 | | | |
| A-27 ** | 7741-903 | 1 comprimé péliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,7480 | 0,7480 | | | |
| A-27 *** | 7741-903 | 1 comprimé péliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,8364 | 0,8364 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3315-322 3315-322 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 56,20 42,23 | 56,20 42,23 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 3380-110 3380-110 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7713-712 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3516 | 1,3516 | | | |
| B-72 ** | 7713-712 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2791 | 1,2791 | | | |
| B-72 *** | 7713-712 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3315-330 3315-330 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | G | 56,20 42,23 | 56,20 42,23 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 3380-128 3380-128 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7713-811 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3516 | 1,3516 | | | |
| B-72 ** | 7713-811 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2791 | 1,2791 | | | |
| B-72 *** | 7713-811 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3315-348 3315-348 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | G | 64,49 49,44 | 64,49 49,44 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 | 3380-136 3380-136 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,58 138,40 | 162,58 138,40 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7713-720 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5695 | 1,5695 | | | |
| B-72 ** | 7713-720 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4969 | 1,4969 | | | |
| B-72 *** | 7713-720 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,6025 | 1,6025 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3356-037 3356-037 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 56,20 42,23 | 56,20 42,23 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 3356-045 3356-045 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 142,46 120,05 | 142,46 120,05 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7714-637 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 1,3710 | 1,3710 | | | |
| B-72 ** | 7714-637 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 1,2985 | 1,2985 | | | |
| B-72 *** | 7714-637 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 1,3973 | 1,3973 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | | | ATC: N05AX12 | | | |
| B-72 | 3351-731 3351-731 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 56,19 42,22 | 56,19 42,22 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 3351-756 3351-756 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7714-488 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-72 ** | 7714-488 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7714-488 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ | | | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 3356-052 | 28 comprimés orodispersibles, 15 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 56,20 | 56,20 | 8,26 | 12,50 |
| | 3356-052 | | | | 42,23 | 42,23 | | |
| B-72 | 3356-060 | 98 comprimés orodispersibles, 15 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 140,49 | 140,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 3356-060 | | | | 118,25 | 118,25 | | |
| B-72 * | 7714-645 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 1,3516 | 1,3516 | | |
| B-72 ** | 7714-645 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 1,2791 | 1,2791 | | |
| B-72 *** | 7714-645 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 1,8096 | 1,8096 | 0,2950 | 0,4464 |
| ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ | | | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 3351-764 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | G | 56,19 | 56,19 | 8,26 | 12,50 |
| | 3351-764 | | | | 42,22 | 42,22 | | |
| B-72 | 3351-780 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 140,47 | 140,47 | 10,20 | 15,50 |
| | 3351-780 | | | | 118,23 | 118,23 | | |
| B-72 * | 7714-496 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7714-496 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7714-496 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ | | | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 3356-078 | 28 comprimés orodispersibles, 30 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 64,49 | 64,49 | 8,30 | 12,50 |
| | 3356-078 | | | | 49,44 | 49,44 | | |
| B-72 | 3356-086 | 98 comprimés orodispersibles, 30 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 162,58 | 162,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 3356-086 | | | | 138,40 | 138,40 | | |
| B-72 * | 7714-652 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 1,5695 | 1,5695 | | |
| B-72 ** | 7714-652 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 1,4969 | 1,4969 | | |
| B-72 *** | 7714-652 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 1,6025 | 1,6025 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ | | | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 3351-798 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | G | 64,46 | 64,46 | 8,30 | 12,50 |
| | 3351-798 | | | | 49,41 | 49,41 | | |
| B-72 | 3351-814 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,58 | 162,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 3351-814 | | | | 138,40 | 138,40 | | |
| B-72 * | 7714-504 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5695 | 1,5695 | | |
| B-72 ** | 7714-504 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4969 | 1,4969 | | |
| B-72 *** | 7714-504 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,6025 | 1,6025 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPRAZOLE AB 10 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 4405-940 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 56,11 | 56,11 | 8,24 | 12,50 |
| | 4405-940 | | | | 42,14 | 42,14 | | |
| B-72 | 4405-957 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,47 | 140,47 | 10,20 | 15,50 |
| | 4405-957 | | | | 118,23 | 118,23 | | |
| B-72 * | 7715-048 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7715-048 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7715-048 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPRAZOLE AB 15 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: N05AX12 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-72 | 4405-973 4405-973 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7715-055 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7715-055 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7715-055 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIRAZOLE AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 4405-965 4405-965 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,24 138,09 | 162,24 138,09 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7715-063 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5662 | 1,5662 | | |
| B-72 ** | 7715-063 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4937 | 1,4937 | | |
| B-72 *** | 7715-063 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5991 | 1,5991 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIRAZOLE EG 10 mg EG ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 3366-408 3366-408 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 56,19 42,22 | 56,19 42,22 | 8,26 | 12,50 |
| B-72 | 3366-424 3366-424 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7714-348 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7714-348 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7714-348 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIRAZOLE EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 4873-204 4873-204 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7741-994 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7741-994 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7741-994 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 3566-585 3566-585 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7719-792 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7719-792 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7719-792 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIRAZOLE EG 15 mg EG ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 3366-432 3366-432 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | G | 56,19 42,22 | 56,19 42,22 | 8,26 | 12,50 |
| B-72 | 3366-440 3366-440 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7714-355 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7714-355 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7714-355 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12 | | | | | | | | |
| B-72 | 3566-601 3566-601 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 140,47 118,23 | 140,47 118,23 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7719-800 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3513 | 1,3513 | | |
| B-72 ** | 7719-800 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2788 | 1,2788 | | |
| B-72 *** | 7719-800 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3769 | 1,3769 | 0,1041 | 0,1582 |

| ARIPIRAZOLE EG 30 mg | | EG | | ATC: N05AX12 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| B-72 | 3366-457 3366-457 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | G | 64,46 49,41 | 64,46 49,41 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 | 3366-465 3366-465 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,57 138,39 | 162,57 138,39 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7714-363 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5694 | 1,5694 | | | |
| B-72 ** | 7714-363 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4968 | 1,4968 | | | |
| B-72 *** | 7714-363 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,6024 | 1,6024 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N05AX12 | | | | | |
| B-72 | 3566-627 3566-627 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,57 138,39 | 162,57 138,39 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7719-818 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5694 | 1,5694 | | | |
| B-72 ** | 7719-818 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4968 | 1,4968 | | | |
| B-72 *** | 7719-818 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,6024 | 1,6024 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg | | VIATRIS | | ATC: N05AX12 | | | | | |
| B-72 | 4148-771 4148-771 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 56,20 42,23 | 56,20 42,23 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 4148-789 4148-789 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7726-672 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3516 | 1,3516 | | | |
| B-72 ** | 7726-672 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2791 | 1,2791 | | | |
| B-72 *** | 7726-672 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,8096 | 1,8096 | 0,2950 | 0,4464 | |
| ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg | | VIATRIS | | ATC: N05AX12 | | | | | |
| B-72 | 4148-797 4148-797 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | G | 56,20 42,23 | 56,20 42,23 | 8,26 | 12,50 | |
| B-72 | 4148-805 4148-805 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7726-680 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3516 | 1,3516 | | | |
| B-72 ** | 7726-680 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2791 | 1,2791 | | | |
| B-72 *** | 7726-680 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3771 | 1,3771 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg | | VIATRIS | | ATC: N05AX12 | | | | | |
| B-72 | 4148-813 4148-813 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | G | 64,49 49,44 | 64,49 49,44 | 8,30 | 12,50 | |
| B-72 | 4148-821 4148-821 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,58 138,40 | 162,58 138,40 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7726-698 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5695 | 1,5695 | | | |
| B-72 ** | 7726-698 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4969 | 1,4969 | | | |
| B-72 *** | 7726-698 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,6025 | 1,6025 | 0,1041 | 0,1582 | |
| ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX12 | | | | | |
| B-72 | 3327-707 3327-707 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 56,11 42,14 | 56,11 42,14 | 8,24 | 12,50 | |
| B-72 | 3327-715 3327-715 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 139,63 117,47 | 139,63 117,47 | 10,20 | 15,50 | |
| B-72 * | 7713-951 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3432 | 1,3432 | | | |
| B-72 ** | 7713-951 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,2706 | 1,2706 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-72 *** | 7713-951 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 1,3684 | 1,3684 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPIRAZOLE TEVA 15 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 3327-723 | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg | G | 56,11 | 56,11 | 8,24 | 12,50 |
| | 3327-723 | | | | 42,14 | 42,14 | | |
| B-72 | 3327-731 | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg | G | 139,63 | 139,63 | 10,20 | 15,50 |
| | 3327-731 | | | | 117,47 | 117,47 | | |
| B-72 * | 7713-969 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3432 | 1,3432 | | |
| B-72 ** | 7713-969 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,2706 | 1,2706 | | |
| B-72 *** | 7713-969 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 1,3684 | 1,3684 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIPIPIRAZOLE TEVA 30 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX12 | | | | |
| B-72 | 3327-756 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 162,24 | 162,24 | 10,20 | 15,50 |
| | 3327-756 | | | | 138,09 | 138,09 | | |
| B-72 * | 7713-977 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5662 | 1,5662 | | |
| B-72 ** | 7713-977 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,4937 | 1,4937 | | |
| B-72 *** | 7713-977 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 1,5991 | 1,5991 | 0,1041 | 0,1582 |
| ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml | | VIATRIS | | ATC: B01AX05 | | | | |
| B-263 | 1720-143 | 10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 49,80 | 49,80 | 7,36 | 12,40 |
| | 1720-143 | | | | 36,65 | 36,65 | | |
| B-263 * | 0773-002 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 4,5960 | 4,5960 | | |
| B-263 ** | 0773-002 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 3,8850 | 3,8850 | | |
| ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: B01AX05 | | | | |
| B-263 | 4751-830 | 10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL | 10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 49,80 | 49,80 | 7,36 | 12,40 |
| | 4751-830 | | | | 36,65 | 36,65 | | |
| B-263 * | 7738-735 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 4,5960 | 4,5960 | | |
| B-263 ** | 7738-735 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 3,8850 | 3,8850 | | |
| AROMASIN 25 mg | | Pfizer | | ATC: L02BG06 | | | | |
| A-27 | 1537-364 | 30 comprimés enrobés, 25 mg | 30 omhulde tabletten, 25 mg | R | 40,97 | 40,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 1537-364 | | | | 28,97 | 28,97 | | |
| A-27 | 1537-380 | 100 comprimés enrobés, 25 mg | 100 omhulde tabletten, 25 mg | R | 95,54 | 95,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 1537-380 | | | | 77,25 | 77,25 | | |
| A-27 * | 0765-107 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | R | 0,8900 | 0,8900 | | |
| A-27 ** | 0765-107 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | R | 0,8189 | 0,8189 | | |
| A-27 *** | 0765-107 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | R | 0,9000 | 0,9000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ARTANE 2 mg | | TEOFARMA | | ATC: N04AA01 | | | | |
| B-78 | 3481-322 | 50 comprimés sécables, 2 mg | 50 deelbare tabletten, 2 mg | | 7,59 | 7,59 | 0,38 | 0,64 |
| | 3481-322 | | | | 1,45 | 1,45 | | |
| B-78 * | 0701-136 | 1 comprimé sécable, 2 mg | 1 deelbare tablet, 2 mg | | 0,0374 | 0,0374 | | |
| B-78 ** | 0701-136 | 1 comprimé sécable, 2 mg | 1 deelbare tablet, 2 mg | | 0,0308 | 0,0308 | | |
| B-78 *** | 0701-136 | 1 comprimé sécable, 2 mg | 1 deelbare tablet, 2 mg | | 0,0411 | 0,0411 | 0,0076 | 0,0128 |
| ARTANE 5 mg | | TEOFARMA | | ATC: N04AA01 | | | | |
| B-78 | 3481-314 | 50 comprimés sécables, 5 mg | 50 deelbare tabletten, 5 mg | | 9,39 | 9,39 | 0,78 | 1,30 |
| | 3481-314 | | | | 2,94 | 2,94 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-78 * | 0701-144 | 1 comprimé sécable, 5 mg | 1 deelbare tablet, 5 mg | | 0,0758 | 0,0758 | | |
| B-78 ** | 0701-144 | 1 comprimé sécable, 5 mg | 1 deelbare tablet, 5 mg | | 0,0624 | 0,0624 | | |
| B-78 *** | 0701-144 | 1 comprimé sécable, 5 mg | 1 deelbare tablet, 5 mg | | 0,0772 | 0,0772 | 0,0156 | 0,0260 |
| ARTEOPTIC LA 2% | | BAUSCH & LOMB PHARMA | | | ATC: S01ED05 | | | |
| B-168 | 2244-911 | 3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml | R | 13,85 | 13,85 | 1,68 | 2,81 |
| | 2244-911 | | | | 6,35 | 6,35 | | |
| B-168 * | 0782-979 | 1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL | R | 2,7300 | 2,7300 | | |
| B-168 ** | 0782-979 | 1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL | R | 2,2433 | 2,2433 | | |
| ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: S01ED05 | | | |
| B-168 | 3383-544 | 3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml | R | 13,85 | 13,85 | 1,68 | 2,81 |
| | 3383-544 | | | | 6,35 | 6,35 | | |
| B-168 * | 7717-333 | 1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL | 1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL | R | 2,7300 | 2,7300 | | |
| B-168 ** | 7717-333 | 1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL | 1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL | R | 2,2433 | 2,2433 | | |
| ASA 100 EG 100 mg | | EG | | | ATC: B01AC06 | | | |
| B-293 | 4287-314 | 100 comprimés gastro-résistants, 100 mg | 100 maagsapresistente tabletten, 100 mg | | 8,37 | 8,37 | 0,57 | 0,95 |
| | 4287-314 | | | | 2,14 | 2,14 | | |
| B-293 * | 7705-569 | 1 comprimé gastro-résistant, 100 mg | 1 maagsapresistente tablet, 100 mg | | 0,0276 | 0,0276 | | |
| B-293 ** | 7705-569 | 1 comprimé gastro-résistant, 100 mg | 1 maagsapresistente tablet, 100 mg | | 0,0227 | 0,0227 | | |
| B-293 *** | 7705-569 | 1 comprimé gastro-résistant, 100 mg | 1 maagsapresistente tablet, 100 mg | | 0,0284 | 0,0284 | 0,0057 | 0,0095 |
| ASAFLOW 80 mg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | | ATC: B01AC06 | | | |
| B-293 | 1365-543 | 56 comprimés gastro-résistants, 80 mg | 56 maagsapresistente tabletten, 80 mg | | 7,64 | 7,64 | 0,40 | 0,66 |
| | 1365-543 | | | | 1,50 | 1,50 | | |
| B-293 | 2542-462 | 112 comprimés gastro-résistants, 80 mg | 112 maagsapresistente tabletten, 80 mg | | 9,08 | 9,08 | 0,72 | 1,20 |
| | 2542-462 | | | | 2,71 | 2,71 | | |
| B-293 | 2542-488 | 168 comprimés gastro-résistants, 80 mg | 168 maagsapresistente tabletten, 80 mg | | 11,42 | 11,42 | 1,19 | 1,98 |
| | 2542-488 | | | | 4,49 | 4,49 | | |
| B-293 * | 0789-537 | 1 comprimé gastro-résistant, 80 mg | 1 maagsapresistente tablet, 80 mg | | 0,0345 | 0,0345 | | |
| B-293 ** | 0789-537 | 1 comprimé gastro-résistant, 80 mg | 1 maagsapresistente tablet, 80 mg | | 0,0283 | 0,0283 | | |
| B-293 *** | 0789-537 | 1 comprimé gastro-résistant, 80 mg | 1 maagsapresistente tablet, 80 mg | | 0,0350 | 0,0350 | 0,0071 | 0,0118 |
| ASAMOYON 1600 mg | | TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS | | | ATC: A07EC02 | | | |
| B-55 | 4636-700 | 60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg | 60 tabletten met geregleerde afgifte, 1600 mg | G | 70,52 | 70,52 | 8,30 | 12,50 |
| | 4636-700 | | | | 54,68 | 54,68 | | |
| B-55 * | 7736-978 | 1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg | 1 tablet met geregleerde afgifte, 1600 mg | G | 1,0845 | 1,0845 | | |
| B-55 ** | 7736-978 | 1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg | 1 tablet met geregleerde afgifte, 1600 mg | G | 0,9660 | 0,9660 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-55 *** | 7736-978 | 1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg | G | 1,0831 | 1,0831 | 0,1383 | 0,2083 |
| ATACAND 16 mg | | EUROCEPT | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 1381-458 1381-458 | 28 comprimés, 16 mg | 28 tabletten, 16 mg | R | 14,32 6,70 | 14,32 6,70 | 1,78 | 2,96 |
| B-224 | 1721-125 1721-125 | 98 comprimés, 16 mg | 98 tabletten, 16 mg | R | 25,32 15,35 | 25,32 15,35 | 3,96 | 6,64 |
| B-224 * | 0749-903 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2021 | 0,2021 | | |
| B-224 ** | 0749-903 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,1660 | 0,1660 | | |
| B-224 *** | 0749-903 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2019 | 0,2019 | 0,0404 | 0,0678 |
| ATACAND 8 mg | | EUROCEPT | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 1381-466 1381-466 | 28 comprimés, 8 mg | 28 tabletten, 8 mg | R | 13,37 5,98 | 13,37 5,98 | 1,59 | 2,64 |
| B-224 | 1721-141 1721-141 | 98 comprimés, 8 mg | 98 tabletten, 8 mg | R | 21,90 12,49 | 21,90 12,49 | 3,31 | 5,52 |
| B-224 * | 0749-911 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | R | 0,1645 | 0,1645 | | |
| B-224 ** | 0749-911 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | R | 0,1351 | 0,1351 | | |
| B-224 *** | 0749-911 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | R | 0,1670 | 0,1670 | 0,0338 | 0,0563 |
| ATACAND PLUS 16/12,5 mg | | EUROCEPT | | ATC: C09DA06 | | | | |
| B-224 | 1571-629 1571-629 | 28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg | 28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg | R | 14,54 6,88 | 14,54 6,88 | 1,82 | 3,04 |
| B-224 | 1721-166 1721-166 | 98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg | R | 23,11 13,42 | 23,11 13,42 | 3,56 | 5,93 |
| B-224 * | 0766-253 | 1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg / 12,5 mg | R | 0,1767 | 0,1767 | | |
| B-224 ** | 0766-253 | 1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg / 12,5 mg | R | 0,1452 | 0,1452 | | |
| B-224 *** | 0766-253 | 1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg / 12,5 mg | R | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 | 0,0605 |
| ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03AK14 | | | | |
| B-245 | 4237-285 4237-285 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis | CR | 93,07 75,00 | 93,07 75,00 | 10,20 | 15,50 |
| B-245 * | 7730-476 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis | CR | 0,9623 | 0,9623 | | |
| B-245 ** | 7730-476 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis | CR | 0,8833 | 0,8833 | | |
| ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03AK14 | | | | |
| B-245 | 4237-269 4237-269 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis | CR | 93,07 75,00 | 93,07 75,00 | 10,20 | 15,50 |
| B-245 * | 7730-484 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis | CR | 0,9623 | 0,9623 | | |
| B-245 ** | 7730-484 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis | CR | 0,8833 | 0,8833 | | |
| ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03AK14 | | | | |
| B-245 | 4237-301 4237-301 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis | CR | 93,07 75,00 | 93,07 75,00 | 10,20 | 15,50 |
| B-245 * | 7730-468 | 1 poudre pour inhalation en gélule, | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, | CR | 0,9623 | 0,9623 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-245 ** | 7730-468 | 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose 1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose | 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis | CR | 0,8833 | 0,8833 | | |
| ATENOLOL EG 100 mg | | EG | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 2548-451 2548-451 | 98 comprimés, 100 mg | 98 tabletten, 100 mg | G | 20,38 11,33 | 20,38 11,33 | 3,00 | 5,01 |
| B-15 | 2520-963 2520-963 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | G | 21,49 12,18 | 21,49 12,18 | 3,23 | 5,38 |
| B-15 * | 0749-390 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1572 | 0,1572 | | |
| B-15 ** | 0749-390 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1291 | 0,1291 | | |
| B-15 *** | 0749-390 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1515 | 0,1515 | 0,0306 | 0,0511 |
| ATENOLOL EG 25 mg | | EG | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 2548-428 2548-428 | 98 comprimés, 25 mg | 98 tabletten, 25 mg | G | 9,84 3,29 | 9,84 3,29 | 0,87 | 1,45 |
| B-15 | 2520-930 2520-930 | 100 comprimés, 25 mg | 100 tabletten, 25 mg | G | 10,11 3,49 | 10,11 3,49 | 0,93 | 1,54 |
| B-15 * | 0749-382 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0450 | 0,0450 | | |
| B-15 ** | 0749-382 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0370 | 0,0370 | | |
| B-15 *** | 0749-382 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0458 | 0,0458 | 0,0093 | 0,0154 |
| ATENOLOL EG 50 mg | | EG | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 2548-444 2548-444 | 98 comprimés, 50 mg | 98 tabletten, 50 mg | G | 13,78 6,29 | 13,78 6,29 | 1,67 | 2,78 |
| B-15 | 2520-955 2520-955 | 100 comprimés, 50 mg | 100 tabletten, 50 mg | G | 14,03 6,49 | 14,03 6,49 | 1,72 | 2,87 |
| B-15 * | 0749-655 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0838 | 0,0838 | | |
| B-15 ** | 0749-655 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0688 | 0,0688 | | |
| B-15 *** | 0749-655 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0842 | 0,0842 | 0,0170 | 0,0284 |
| ATENOLOL TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 1373-372 1373-372 | 60 comprimés, 100 mg | 60 tabletten, 100 mg | G | 14,37 6,75 | 14,37 6,75 | 1,79 | 2,98 |
| B-15 | 1378-819 1378-819 | 90 comprimés, 100 mg | 90 tabletten, 100 mg | G | 20,71 11,58 | 20,71 11,58 | 3,07 | 5,12 |
| B-15 * | 0747-139 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1660 | 0,1660 | | |
| B-15 ** | 0747-139 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1363 | 0,1363 | | |
| B-15 *** | 0747-139 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1687 | 0,1687 | 0,0341 | 0,0569 |
| ATENOLOL TEVA 25 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 1373-331 1373-331 | 60 comprimés, 25 mg | 60 tabletten, 25 mg | G | 8,51 2,26 | 8,51 2,26 | 0,60 | 1,00 |
| B-15 * | 0747-154 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0487 | 0,0487 | | |
| B-15 ** | 0747-154 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0400 | 0,0400 | | |
| B-15 *** | 0747-154 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0496 | 0,0496 | 0,0100 | 0,0167 |
| ATENOLOL TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 1373-356 1373-356 | 60 comprimés, 50 mg | 60 tabletten, 50 mg | G | 10,63 3,89 | 10,63 3,89 | 1,03 | 1,72 |
| B-15 | 1378-827 1378-827 | 90 comprimés, 50 mg | 90 tabletten, 50 mg | G | 12,59 5,39 | 12,59 5,39 | 1,43 | 2,38 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-15 * | 0747-147 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0773 | 0,0773 | | |
| B-15 ** | 0747-147 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0634 | 0,0634 | | |
| B-15 *** | 0747-147 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0784 | 0,0784 | 0,0159 | 0,0264 |
| ATENOLOL VIATRIS 100 mg | | VIATRIS | | ATC: C07AB03 | | | | |
| B-15 | 1537-091 | 56 comprimés, 100 mg | 56 tabletten, 100 mg | G | 12,84 | 12,84 | 1,48 | 2,47 |
| | 1537-091 | | | | 5,58 | 5,58 | | |
| B-15 * | 0763-607 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1286 | 0,1286 | | |
| B-15 ** | 0763-607 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1055 | 0,1055 | | |
| B-15 *** | 0763-607 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1304 | 0,1304 | 0,0264 | 0,0441 |
| ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg | | EG | | ATC: C07CB03 | | | | |
| B-15 | 2561-553 | 98 comprimés, 100 mg / 25 mg | 98 tabletten, 100 mg / 25 mg | G | 20,36 | 20,36 | 3,00 | 5,00 |
| | 2561-553 | | | | 11,32 | 11,32 | | |
| B-15 * | 0747-113 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1491 | 0,1491 | | |
| B-15 ** | 0747-113 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1224 | 0,1224 | | |
| B-15 *** | 0747-113 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1513 | 0,1513 | 0,0306 | 0,0510 |
| ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg | | EG | | ATC: C07CB03 | | | | |
| B-15 | 2564-177 | 98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg | G | 15,49 | 15,49 | 2,02 | 3,36 |
| | 2564-177 | | | | 7,60 | 7,60 | | |
| B-15 * | 0791-012 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1001 | 0,1001 | | |
| B-15 ** | 0791-012 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,0822 | 0,0822 | | |
| B-15 *** | 0791-012 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1016 | 0,1016 | 0,0206 | 0,0343 |
| ATORSTATINEG 10 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 4221-214 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,95 | 9,95 | 0,89 | 1,49 |
| | 4221-214 | | | | 3,37 | 3,37 | | |
| B-41 | 4221-222 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 13,38 | 13,38 | 1,59 | 2,65 |
| | 4221-222 | | | | 5,99 | 5,99 | | |
| B-41 * | 7727-779 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0773 | 0,0773 | | |
| B-41 ** | 7727-779 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0635 | 0,0635 | | |
| B-41 *** | 7727-779 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0784 | 0,0784 | 0,0159 | 0,0265 |
| ATORSTATINEG 20 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 4221-230 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,86 | 11,86 | 1,28 | 2,13 |
| | 4221-230 | | | | 4,83 | 4,83 | | |
| B-41 | 4221-248 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 24,59 | 24,59 | 3,86 | 6,47 |
| | 4221-248 | | | | 14,72 | 14,72 | | |
| B-41 * | 7727-787 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-41 ** | 7727-787 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1560 | 0,1560 | | |
| B-41 *** | 7727-787 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1906 | 0,1906 | 0,0386 | 0,0647 |
| ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 3377-272 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 24,59 | 24,59 | 3,86 | 6,47 |
| | 3377-272 | | | | 14,72 | 14,72 | | |
| B-41 * | 7719-958 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-41 ** | 7719-958 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1560 | 0,1560 | | |
| B-41 *** | 7719-958 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1906 | 0,1906 | 0,0386 | 0,0647 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 3377-280 3377-280 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,59 14,72 | 24,59 14,72 | 3,86 | 6,47 |
| B-41 * | 7719-966 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-41 ** | 7719-966 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1560 | 0,1560 | | |
| B-41 *** | 7719-966 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1906 | 0,1906 | 0,0386 | 0,0647 |
| ATORSTATINEG 40mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 4221-255 4221-255 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,59 14,72 | 24,59 14,72 | 3,86 | 6,47 |
| B-41 * | 7727-795 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-41 ** | 7727-795 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1560 | 0,1560 | | |
| B-41 *** | 7727-795 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1906 | 0,1906 | 0,0386 | 0,0647 |
| ATORSTATINEG 80 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 4221-263 4221-263 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 24,56 14,69 | 24,56 14,69 | 3,85 | 6,47 |
| B-41 * | 7727-803 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1896 | 0,1896 | | |
| B-41 ** | 7727-803 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1557 | 0,1557 | | |
| B-41 *** | 7727-803 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1903 | 0,1903 | 0,0385 | 0,0647 |
| ATORVASTATIN AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 4183-513 4183-513 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,28 2,86 | 9,28 2,86 | 0,76 | 1,26 |
| B-41 | 4183-521 4183-521 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 12,79 5,54 | 12,79 5,54 | 1,47 | 2,45 |
| B-41 * | 7728-017 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0730 | 0,0730 | | |
| B-41 ** | 7728-017 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0599 | 0,0599 | | |
| B-41 *** | 7728-017 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0741 | 0,0741 | 0,0150 | 0,0250 |
| ATORVASTATIN AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 4183-554 4183-554 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,03 4,20 | 11,03 4,20 | 1,11 | 1,86 |
| B-41 | 4183-539 4183-539 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,28 13,57 | 23,28 13,57 | 3,60 | 6,00 |
| B-41 * | 7728-025 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1787 | 0,1787 | | |
| B-41 ** | 7728-025 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1467 | 0,1467 | | |
| B-41 *** | 7728-025 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | 0,0367 | 0,0612 |
| ATORVASTATIN AB 40 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 4183-562 4183-562 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,28 13,57 | 23,28 13,57 | 3,60 | 6,00 |
| B-41 * | 7728-033 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1787 | 0,1787 | | |
| B-41 ** | 7728-033 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1467 | 0,1467 | | |
| B-41 *** | 7728-033 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | 0,0367 | 0,0612 |
| ATORVASTATIN AB 80 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 * | 0751-883 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1817 | 0,1817 | | |
| B-41 ** | 0751-883 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1492 | 0,1492 | | |
| B-41 *** | 0751-883 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1833 | 0,1833 | 0,0373 | 0,0622 |
| ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4280-020 4280-020 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,60 14,73 | 24,60 14,73 | 3,86 | 6,48 |
| B-41 * | 0754-986 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-41 ** | 0754-986 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1561 | 0,1561 | | |
| B-41 *** | 0754-986 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1907 | 0,1907 | 0,0386 | 0,0648 |
| ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 3064-813 3064-813 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,28 2,86 | 9,28 2,86 | 0,76 | 1,26 |
| B-41 | 3064-839 3064-839 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 12,79 5,54 | 12,79 5,54 | 1,47 | 2,45 |
| B-41 * | 7705-254 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0730 | 0,0730 | | |
| B-41 ** | 7705-254 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0599 | 0,0599 | | |
| B-41 *** | 7705-254 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0741 | 0,0741 | 0,0150 | 0,0250 |
| ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 3064-847 3064-847 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,03 4,20 | 11,03 4,20 | 1,11 | 1,86 |
| B-41 | 3064-862 3064-862 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,30 13,59 | 23,30 13,59 | 3,60 | 6,01 |
| B-41 * | 7705-262 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1790 | 0,1790 | | |
| B-41 ** | 7705-262 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1470 | 0,1470 | | |
| B-41 *** | 7705-262 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1813 | 0,1813 | 0,0367 | 0,0613 |
| ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 3064-870 3064-870 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 11,56 4,60 | 11,56 4,60 | 1,22 | 2,03 |
| B-41 | 3064-896 3064-896 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,37 13,66 | 23,37 13,66 | 3,62 | 6,04 |
| B-41 * | 7705-270 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1799 | 0,1799 | | |
| B-41 ** | 7705-270 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1478 | 0,1478 | | |
| B-41 *** | 7705-270 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1820 | 0,1820 | 0,0369 | 0,0616 |
| ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 2813-244 2813-244 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,75 3,22 | 9,75 3,22 | 0,85 | 1,42 |
| B-41 | 2813-251 2813-251 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 13,35 5,96 | 13,35 5,96 | 1,58 | 2,63 |
| B-41 * | 0754-929 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0769 | 0,0769 | | |
| B-41 ** | 0754-929 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0632 | 0,0632 | | |
| B-41 *** | 0754-929 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0781 | 0,0781 | 0,0158 | 0,0263 |
| ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 | 2813-269 2813-269 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,69 4,70 | 11,69 4,70 | 1,25 | 2,08 |
| B-41 | 2813-277 2813-277 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,81 14,03 | 23,81 14,03 | 3,72 | 6,20 |
| B-41 * | 0754-911 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-41 ** | 0754-911 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-41 *** | 0754-911 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4662-078 4662-078 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,81 14,03 | 23,81 14,03 | 3,72 | 6,20 |
| B-41 * | 7738-347 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-41 ** | 7738-347 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-41 *** | 7738-347 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 2813-285 2813-285 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 11,69 4,70 | 11,69 4,70 | 1,25 | 2,08 |
| B-41 | 2813-293 2813-293 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,81 14,03 | 23,81 14,03 | 3,72 | 6,20 |
| B-41 * | 0754-903 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-41 ** | 0754-903 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-41 *** | 0754-903 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4581-112 4581-112 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,81 14,03 | 23,81 14,03 | 3,72 | 6,20 |
| B-41 * | 7735-277 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-41 ** | 7735-277 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-41 *** | 7735-277 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4816-922 4816-922 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,81 14,03 | 23,81 14,03 | 3,72 | 6,20 |
| B-41 * | 7740-996 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-41 ** | 7740-996 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-41 *** | 7740-996 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 2813-228 2813-228 | 30 comprimés pelliculés, 80 mg | 30 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 11,69 4,70 | 11,69 4,70 | 1,25 | 2,08 |
| B-41 | 2813-236 2813-236 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 23,81 14,03 | 23,81 14,03 | 3,72 | 6,20 |
| B-41 * | 0754-895 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-41 ** | 0754-895 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-41 *** | 0754-895 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 | 4613-543 4613-543 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,96 3,38 | 9,96 3,38 | 0,90 | 1,49 |
| B-41 | 4613-550 4613-550 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 13,38 5,99 | 13,38 5,99 | 1,59 | 2,65 |
| B-41 * | 0751-743 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0773 | 0,0773 | | |
| B-41 ** | 0751-743 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0635 | 0,0635 | | |
| B-41 *** | 0751-743 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0784 | 0,0784 | 0,0159 | 0,0265 |
| ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4613-568 4613-568 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,86 4,83 | 11,86 4,83 | 1,28 | 2,13 |
| B-41 | 4613-576 4613-576 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 24,60 14,73 | 24,60 14,73 | 3,86 | 6,48 |
| B-41 * | 0751-735 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-41 ** | 0751-735 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1561 | 0,1561 | | |
| B-41 *** | 0751-735 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2109 | 0,2109 | 0,0427 | 0,0710 |
| ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4613-584 4613-584 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,60 14,73 | 24,60 14,73 | 3,86 | 6,48 |
| B-41 * | 0751-727 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-41 ** | 0751-727 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1561 | 0,1561 | | |
| B-41 *** | 0751-727 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1907 | 0,1907 | 0,0386 | 0,0648 |
| ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | |
| B-41 | 4613-592 4613-592 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 24,60 14,73 | 24,60 14,73 | 3,86 | 6,48 |
| B-41 * | 0751-719 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-41 ** | 0751-719 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1561 | 0,1561 | | |
| B-41 *** | 0751-719 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1907 | 0,1907 | 0,0386 | 0,0648 |
| ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml CONGRESS PHARMA ATC: G02CX01 | | | | | | | | |
| | 7739-006 | 1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL | | 30,86 | 30,86 | | |
| B-94 * | 7739-006 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL | G | 39,8200 | 39,8200 | | |
| B-94 ** | 7739-006 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL | G | 32,7100 | 32,7100 | | |
| ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml CONGRESS PHARMA ATC: G02CX01 | | | | | | | | |
| | 7738-990 | 1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL | | 9,95 | 9,95 | | |
| B-94 * | 7738-990 | 1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL | G | 12,8400 | 12,8400 | | |
| B-94 ** | 7738-990 | 1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL | G | 10,5500 | 10,5500 | | |
| ATOZET 10 mg/10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05 | | | | | | | | |
| B-289 | 3256-062 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 44,98 | 44,98 | 6,69 | 11,26 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 3256-062 | | | | | 32,45 | 32,45 | | |
| B-289 * | 7714-272 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4612 | 0,4612 | | | |
| B-289 ** | 7714-272 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,3822 | 0,3822 | | | |
| B-289 *** | 7714-272 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4383 | 0,4383 | 0,0743 | 0,1251 | |
| ATOZET 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05 | | | | | | | | | |
| B-289 | 3256-096 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 | |
| | 3256-096 | | | | 40,90 | 40,90 | | | |
| B-289 * | 7714-280 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | | |
| B-289 ** | 7714-280 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | | |
| B-289 *** | 7714-280 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 | |
| ATOZET 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05 | | | | | | | | | |
| B-289 | 3256-088 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 | |
| | 3256-088 | | | | 40,90 | 40,90 | | | |
| B-289 * | 7714-298 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | | |
| B-289 ** | 7714-298 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | | |
| B-289 *** | 7714-298 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 | |
| ATOZET 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05 | | | | | | | | | |
| B-289 | 3256-104 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 | |
| | 3256-104 | | | | 40,90 | 40,90 | | | |
| B-289 * | 7714-306 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | | |
| B-289 ** | 7714-306 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | | |
| B-289 *** | 7714-306 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 | |
| ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: M03AC04 | | | | | | | | | |
| | 7741-598 | 5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 11,57 | 11,57 | | | |
| B-140 * | 7741-598 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 2,9860 | 2,9860 | | | |
| B-140 ** | 7741-598 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 2,4520 | 2,4520 | | | |
| ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: M03AC04 | | | | | | | | | |
| | 7741-663 | 5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 6,10 | 6,10 | | | |
| B-140 * | 7741-663 | 1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 1,5740 | 1,5740 | | | |
| B-140 ** | 7741-663 | 1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 1,2940 | 1,2940 | | | |
| ATROVENT 0,125 mg/ml BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: R03BB01 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-98 | 1543-305 | 20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml | 20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml | R | 10,42 | 10,42 | 0,99 | 1,65 |
| | 1543-305 | | | | 3,73 | 3,73 | | |
| B-98 * | 0763-037 | 1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL | R | 0,2405 | 0,2405 | | |
| B-98 ** | 0763-037 | 1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL | R | 0,1975 | 0,1975 | | |
| ATROVENT 0,25 mg/ml | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: R03BB01 | | | | |
| B-98 | 1543-313 | 20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml | R | 12,69 | 12,69 | 1,45 | 2,41 |
| | 1543-313 | | | | 5,46 | 5,46 | | |
| B-98 * | 0763-045 | 1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL | R | 0,3525 | 0,3525 | | |
| B-98 ** | 0763-045 | 1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL | R | 0,2895 | 0,2895 | | |
| ATROVENT HFA 20 µg/dose | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: R03BB01 | | | | |
| B-98 | 2084-556 | 200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose | 200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis | R | 10,90 | 10,90 | 1,09 | 1,81 |
| | 2084-556 | | | | 4,10 | 4,10 | | |
| B-98 * | 0775-130 | 1 cartouche, 20 µg/dose | 1 patroon, 20 µg/dosis | R | 5,2900 | 5,2900 | | |
| B-98 ** | 0775-130 | 1 cartouche, 20 µg/dose | 1 patroon, 20 µg/dosis | R | 4,3500 | 4,3500 | | |
| AUGMENTIN | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 0033-548 | 1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | 1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml | R | 7,52 | 7,52 | 1,23 | 1,23 |
| | 0033-548 | | | | 1,39 | 1,39 | | |
| C-37 * | 0727-396 | 5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL | 5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL | R | 0,1119 | 0,1119 | | |
| C-37 ** | 0727-396 | 5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL | 5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL | R | 0,0919 | 0,0919 | | |
| AUGMENTIN | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 0034-637 | 1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | 1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml | R | 8,83 | 8,83 | 2,22 | 2,22 |
| | 0034-637 | | | | 2,51 | 2,51 | | |
| C-37 * | 0727-404 | 5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL | 5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL | R | 0,2025 | 0,2025 | | |
| C-37 ** | 0727-404 | 5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL | 5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL | R | 0,1663 | 0,1663 | | |
| AUGMENTIN 500 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 0029-025 | 16 comprimés, 500 mg / 125 mg | 16 tabletten, 500 mg / 125 mg | R | 10,89 | 10,89 | 3,62 | 3,62 |
| | 0029-025 | | | | 4,09 | 4,09 | | |
| C-37 * | 0727-388 | 1 comprimé, 500 mg/ 125 mg | 1 tablet, 500 mg/ 125 mg | R | 0,3300 | 0,3300 | | |
| C-37 ** | 0727-388 | 1 comprimé, 500 mg/ 125 mg | 1 tablet, 500 mg/ 125 mg | R | 0,2713 | 0,2713 | | |
| C-37 *** | 0727-388 | 1 comprimé, 500 mg/ 125 mg | 1 tablet, 500 mg/ 125 mg | R | 0,3346 | 0,3346 | 0,2262 | 0,2262 |
| AUGMENTIN 500 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 0263-715 | 16 sachet-doses 1 doses poudre | 16 sachets 1 doses poeder voor | R | 10,89 | 10,89 | 3,62 | 3,62 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|---|----|---|--------------|-------------|--------------|--|
| | | pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg | orale suspensie, 500 mg / 125 mg | | | | | | |
| | 0263-715 | | | | | 4,09 | 4,09 | | |
| C-37 * | 0739-847 | 1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg | 1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg | R | 0,3300 | 0,3300 | | | |
| C-37 ** | 0739-847 | 1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg | 1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg | R | 0,2713 | 0,2713 | | | |
| C-37 *** | 0739-847 | 1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg | 1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg | R | 0,3346 | 0,3346 | 0,2262 | 0,2262 | |
| AUGMENTIN 875 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | ATC: J01CR02 | | | | |
| C-37 | 1458-736 | 10 comprimés, 875 mg / 125 mg | 10 tabletten, 875 mg / 125 mg | R | 10,38 | 10,38 | 3,27 | 3,27 | |
| | 1458-736 | | | | 3,70 | 3,70 | | | |
| C-37 | 1705-789 | 20 comprimés, 875 mg / 125 mg | 20 tabletten, 875 mg / 125 mg | R | 14,59 | 14,59 | 6,11 | 6,11 | |
| | 1705-789 | | | | 6,91 | 6,91 | | | |
| C-37 * | 0765-115 | 1 comprimé, 875 mg/ 125 mg | 1 tablet, 875 mg/ 125 mg | R | 0,4460 | 0,4460 | | | |
| C-37 ** | 0765-115 | 1 comprimé, 875 mg/ 125 mg | 1 tablet, 875 mg/ 125 mg | R | 0,3660 | 0,3660 | | | |
| C-37 *** | 0765-115 | 1 comprimé, 875 mg/ 125 mg | 1 tablet, 875 mg/ 125 mg | R | 0,4526 | 0,4526 | 0,3055 | 0,3055 | |
| AVELOX 400 mg | | AMDIPHARM | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA14 | |
| | 0768-283 | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | | 12,94 | 12,94 | | | |
| C-37 * | 0768-283 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,6700 | 1,6700 | | | |
| C-37 ** | 0768-283 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,3720 | 1,3720 | | | |
| AVELOX 400 mg/ 250 ml | | AMDIPHARM | | | ATC: J01MA14 | | | | |
| | 0774-448 | 5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL | 5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL | | 57,54 | 57,54 | | | |
| B-125 * | 0774-448 | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL | R | 13,6200 | 13,6200 | | | |
| B-125 ** | 0774-448 | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL | R | 12,1980 | 12,1980 | | | |
| AZACTAM | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DF01 | |
| | 0729-038 | 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g | | 15,69 | 15,69 | | | |
| B-115 * | 0729-038 | 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g | | 20,2500 | 20,2500 | | | |
| B-115 ** | 0729-038 | 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g | | 16,6300 | 16,6300 | | | |
| AZACTAM | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DF01 | |
| | 0729-020 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | | 7,95 | 7,95 | | | |
| B-115 ** | 0729-020 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | | 8,4300 | 8,4300 | | | |
| AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: S01ED51 | | | | |
| B-168 | 2565-885 | 3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml | CR | 31,01 | 31,01 | 4,75 | 7,98 | |
| | 2565-885 | | | | 20,29 | 20,29 | | | |
| B-168 * | 0793-422 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL | CR | 8,7267 | 8,7267 | | | |
| B-168 ** | 0793-422 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL | 1 container met druppelpipet 5 mL | CR | 7,1700 | 7,1700 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|--|
| | | collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL | oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL | | | | | | |
| AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AX01 | | | | | |
| A-29 | 2834-844 2834-844 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 33,60 22,56 | 33,60 22,56 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 * | 0755-371 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2911 | 0,2911 | | | |
| A-29 ** | 0755-371 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2391 | 0,2391 | | | |
| A-29 *** | 0755-371 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2807 | 0,2807 | 0,0000 | 0,0000 | |
| AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AX01 | | | | | |
| A-29 | 2057-214 2057-214 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 11,08 4,23 | 11,08 4,23 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 | 2057-222 2057-222 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 23,84 14,06 | 23,84 14,06 | 0,00 | 0,00 | |
| A-29 * | 0774-026 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1814 | 0,1814 | | | |
| A-29 ** | 0774-026 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1490 | 0,1490 | | | |
| A-29 *** | 0774-026 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1831 | 0,1831 | 0,0000 | 0,0000 | |
| AZITHROMYCIN AB 250 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01FA10 | | | | | |
| C-37 | 3538-527 3538-527 | 6 comprimés pelliculés, 250 mg | 6 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 | |
| C-37 | 3531-985 3531-985 | 12 comprimés pelliculés, 250 mg | 12 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 14,59 6,91 | 14,59 6,91 | 6,11 | 6,11 | |
| C-37 * | 7719-826 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,7433 | 0,7433 | | | |
| C-37 ** | 7719-826 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6100 | 0,6100 | | | |
| C-37 *** | 7719-826 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,7544 | 0,7544 | 0,5092 | 0,5092 | |
| AZITHROMYCIN AB 500 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: J01FA10 | | | | | |
| C-37 | 3531-993 3531-993 | 3 comprimés pelliculés, 500 mg | 3 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 | |
| C-37 | 3532-009 3532-009 | 6 comprimés pelliculés, 500 mg | 6 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 14,44 6,80 | 14,44 6,80 | 6,01 | 6,01 | |
| C-37 * | 7719-115 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4633 | 1,4633 | | | |
| C-37 ** | 7719-115 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2017 | 1,2017 | | | |
| C-37 *** | 7719-115 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4840 | 1,4840 | 1,0017 | 1,0017 | |
| AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml | | EG | | ATC: J01FA10 | | | | | |
| C-37 | 2720-712 2720-712 | 1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | G | 11,12 4,26 | 11,12 4,26 | 3,77 | 3,77 | |
| C-37 | 2720-720 2720-720 | 1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | G | 7,87 1,69 | 7,87 1,69 | 1,49 | 1,49 | |
| C-37 | 2720-738 2720-738 | 1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | G | 8,87 2,55 | 8,87 2,55 | 2,25 | 2,25 | |
| C-37 * | 0799-833 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | G | 0,7857 | 0,7857 | | | |
| C-37 ** | 0799-833 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | G | 0,6457 | 0,6457 | | | |
| AZITHROMYCINE EG 250 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01FA10 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| C-37 | 2369-999 2369-999 | 6 comprimés pelliculés, 250 mg | 6 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 10,17 3,54 | 10,17 3,54 | 3,13 | 3,13 |
| C-37 | 3175-494 3175-494 | 12 comprimés pelliculés, 250 mg | 12 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 14,78 7,06 | 14,78 7,06 | 6,24 | 6,24 |
| C-37 * | 0784-702 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6733 | 0,6733 | | |
| C-37 ** | 0784-702 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,5529 | 0,5529 | | |
| C-37 *** | 0784-702 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6837 | 0,6837 | 0,4250 | 0,4612 |
| AZITHROMYCINE EG 500 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01FA10 | |
| C-37 | 2369-981 2369-981 | 3 comprimés pelliculés, 500 mg | 3 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 10,17 3,54 | 10,17 3,54 | 3,13 | 3,13 |
| C-37 | 2371-722 2371-722 | 6 comprimés pelliculés, 500 mg | 6 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 14,83 7,09 | 14,83 7,09 | 6,27 | 6,27 |
| C-37 * | 0784-710 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,3413 | 1,3413 | | |
| C-37 ** | 0784-710 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,1017 | 1,1017 | | |
| C-37 *** | 0784-710 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2835 | 1,2835 | 0,4250 | 0,6458 |
| AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml | | SANDOZ | | | | | ATC: J01FA10 | |
| C-37 | 2481-687 2481-687 | 1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | G | 7,82 1,66 | 7,82 1,66 | 1,47 | 1,47 |
| C-37 | 2481-695 2481-695 | 1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | G | 8,82 2,50 | 8,82 2,50 | 2,21 | 2,21 |
| C-37 | 2481-703 2481-703 | 1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | G | 11,01 4,18 | 11,01 4,18 | 3,69 | 3,69 |
| C-37 * | 0789-008 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | G | 0,7700 | 0,7700 | | |
| C-37 ** | 0789-008 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | G | 0,6329 | 0,6329 | | |
| AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01FA10 | |
| C-37 | 2312-627 2312-627 | 6 comprimés pelliculés, 250 mg | 6 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 |
| C-37 | 3050-184 3050-184 | 12 comprimés pelliculés, 250 mg | 12 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 14,59 6,91 | 14,59 6,91 | 6,11 | 6,11 |
| C-37 * | 0783-282 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,5958 | 0,5958 | | |
| C-37 ** | 0783-282 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,4892 | 0,4892 | | |
| C-37 *** | 0783-282 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6046 | 0,6046 | 0,4079 | 0,4079 |
| AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01FA10 | |
| C-37 | 2312-635 2312-635 | 3 comprimés pelliculés, 500 mg | 3 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 |
| C-37 | 2351-740 2351-740 | 6 comprimés pelliculés, 500 mg | 6 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 14,44 6,80 | 14,44 6,80 | 6,01 | 6,01 |
| C-37 * | 0783-290 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,1904 | 1,1904 | | |
| C-37 ** | 0783-290 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,9779 | 0,9779 | | |
| C-37 *** | 0783-290 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2093 | 1,2093 | 0,8158 | 0,8158 |
| AZITHROMYCINE TEVA 250 mg | | AREGA PHARMA | | | | | ATC: J01FA10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| C-37 | 2659-092 2659-092 | 6 comprimés pelliculés, 250 mg | 6 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 |
| C-37 | 3249-273 3249-273 | 12 comprimés pelliculés, 250 mg | 12 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 14,59 6,91 | 14,59 6,91 | 6,11 | 6,11 |
| C-37 * | 0796-086 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,7433 | 0,7433 | | |
| C-37 ** | 0796-086 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6100 | 0,6100 | | |
| C-37 *** | 0796-086 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,7544 | 0,7544 | 0,5092 | 0,5092 |
| AZITHROMYCINE TEVA 500 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: J01FA10 | | | | |
| C-37 | 2659-076 2659-076 | 3 comprimés pelliculés, 500 mg | 3 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 |
| C-37 | 2659-084 2659-084 | 6 comprimés pelliculés, 500 mg | 6 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 14,44 6,80 | 14,44 6,80 | 6,01 | 6,01 |
| C-37 * | 0796-094 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4633 | 1,4633 | | |
| C-37 ** | 0796-094 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2017 | 1,2017 | | |
| C-37 *** | 0796-094 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4840 | 1,4840 | 1,0017 | 1,0017 |
| AZOPT 10 mg/ml | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: S01EC04 | | | | |
| B-168 | 1480-201 1480-201 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml | | 10,00 3,41 | 10,00 3,41 | 0,90 | 1,51 |
| B-168 * | 0771-741 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL | | 4,4000 | 4,4000 | | |
| B-168 ** | 0771-741 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL | | 3,6100 | 3,6100 | | |
| BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml | | AGUETTANT | | ATC: M03BX01 | | | | |
| B-80 * | 0751-289 | 1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | | 37,20 | 37,20 | | |
| B-80 * | 0751-289 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G | 46,5400 | 46,5400 | | |
| B-80 ** | 0751-289 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G | 39,4300 | 39,4300 | | |
| BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml | | AGUETTANT | | ATC: M03BX01 | | | | |
| B-80 * | 0751-297 | 10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | 10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 373,23 | 373,23 | | |
| B-80 * | 0751-297 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 40,2730 | 40,2730 | | |
| B-80 ** | 0751-297 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 39,5620 | 39,5620 | | |
| BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml | | AGUETTANT | | ATC: M03BX01 | | | | |
| B-80 * | 0751-271 | 1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 133,96 | 133,96 | | |
| B-80 * | 0751-271 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 149,1100 | 149,1100 | | |
| B-80 ** | 0751-271 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 142,0000 | 142,0000 | | |
| BACLOFEN VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: M03BX01 | | | | |
| B-80 | 1559-657 1559-657 | 50 comprimés, 10 mg | 50 tabletten, 10 mg | G | 8,19 1,98 | 8,19 1,98 | 0,52 | 0,88 |
| B-80 * | 0763-862 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0512 | 0,0512 | | |
| B-80 ** | 0763-862 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0420 | 0,0420 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-80 *** | 0763-862 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0532 | 0,0532 | 0,0104 | 0,0176 |
| BACLOFEN VIATRIS 25 mg | | VIATRIS | | ATC: M03BX01 | | | | |
| B-80 | 1559-673 1559-673 | 50 comprimés, 25 mg | 50 tabletten, 25 mg | G | 11,52 4,57 | 11,52 4,57 | 1,21 | 2,02 |
| B-80 * | 0763-870 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1180 | 0,1180 | | |
| B-80 ** | 0763-870 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0968 | 0,0968 | | |
| B-80 *** | 0763-870 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1198 | 0,1198 | 0,0242 | 0,0404 |
| BACTRIM FORTE | | EUMEDICA | | ATC: J01EE01 | | | | |
| C-37 | 0022-277 0022-277 | 10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg | 10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg | R | 8,42 2,18 | 8,42 2,18 | 1,93 | 1,93 |
| C-37 * | 0701-383 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg | R | 0,2810 | 0,2810 | | |
| C-37 ** | 0701-383 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg | R | 0,2310 | 0,2310 | | |
| C-37 *** | 0701-383 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg | R | 0,2883 | 0,2883 | 0,1930 | 0,1930 |
| BAQSIMI 3 mg | | AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS | | ATC: H04AA01 | | | | |
| B-95 | 4185-682 4185-682 | 3 mg poudre nasale, 3 mg | 3 mg snuifpoeder, 3 mg | | 66,28 51,00 | 66,28 51,00 | 8,30 | 12,50 |
| B-95 * | 7734-148 | 1 récipient unidose, 3 mg | 1 container unidose, 3 mg | | 61,1700 | 61,1700 | | |
| B-95 ** | 7734-148 | 1 récipient unidose, 3 mg | 1 container unidose, 3 mg | | 54,0600 | 54,0600 | | |
| BELLOZAL 20 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: R06AX29 | | | | |
| Cs-7 | 2915-387 2915-387 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | R | 8,52 2,27 | 8,52 2,27 | 2,41 | 2,41 |
| Cs-7 | 2915-361 2915-361 | 50 comprimés, 20 mg | 50 tabletten, 20 mg | R | 10,26 3,61 | 10,26 3,61 | 3,83 | 3,83 |
| Cs-7 * | 7700-040 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,0932 | 0,0932 | | |
| Cs-7 ** | 7700-040 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,0766 | 0,0766 | | |
| Cs-7 *** | 7700-040 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,0946 | 0,0946 | 0,0766 | 0,0766 |
| BELSAR 10 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 2115-541 2115-541 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 12,78 5,53 | 12,78 5,53 | 1,47 | 2,44 |
| B-224 * | 0777-250 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,2550 | 0,2550 | | |
| B-224 ** | 0777-250 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,2093 | 0,2093 | | |
| B-224 *** | 0777-250 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,2589 | 0,2589 | 0,0525 | 0,0871 |
| BELSAR 20 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 2115-533 2115-533 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 14,20 6,62 | 14,20 6,62 | 1,76 | 2,93 |
| B-224 | 2115-517 2115-517 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 28,95 18,51 | 28,95 18,51 | 4,46 | 7,50 |
| B-224 * | 0777-243 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 0777-243 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 0777-243 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| BELSAR 40 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 2115-509 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 14,47 | 14,47 | 1,81 | 3,01 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-224 | 2115-509 2115-491 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 6,82 31,41 | 6,82 31,41 | 4,80 | 8,08 |
| | 2115-491 | | | | 20,65 | 20,65 | | |
| B-224 * | 0777-268 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2719 | 0,2719 | | |
| B-224 ** | 0777-268 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2234 | 0,2234 | | |
| B-224 *** | 0777-268 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2640 | 0,2640 | 0,0490 | 0,0824 |
| BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2363-109 | 28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg | R | 14,20 | 14,20 | 1,76 | 2,93 |
| | 2363-109 | | | | 6,62 | 6,62 | | |
| B-224 | 2363-117 | 98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg | R | 28,95 | 28,95 | 4,46 | 7,50 |
| | 2363-117 | | | | 18,51 | 18,51 | | |
| B-224 * | 0784-504 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 0784-504 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 0784-504 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2363-133 | 28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg | R | 14,20 | 14,20 | 1,76 | 2,93 |
| | 2363-133 | | | | 6,62 | 6,62 | | |
| B-224 | 2363-083 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg | R | 28,95 | 28,95 | 4,46 | 7,50 |
| | 2363-083 | | | | 18,51 | 18,51 | | |
| B-224 * | 0784-454 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | R | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 0784-454 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | R | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 0784-454 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2736-320 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | R | 14,51 | 14,51 | 1,82 | 3,03 |
| | 2736-320 | | | | 6,85 | 6,85 | | |
| B-224 | 2736-338 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | R | 33,02 | 33,02 | 5,03 | 8,45 |
| | 2736-338 | | | | 22,04 | 22,04 | | |
| B-224 * | 0759-233 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | R | 0,2902 | 0,2902 | | |
| B-224 ** | 0759-233 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | R | 0,2384 | 0,2384 | | |
| B-224 *** | 0759-233 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | R | 0,2805 | 0,2805 | 0,0513 | 0,0862 |
| BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2736-312 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg | R | 16,23 | 16,23 | 2,16 | 3,61 |
| | 2736-312 | | | | 8,16 | 8,16 | | |
| B-224 | 2736-304 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg | R | 32,51 | 32,51 | 4,96 | 8,33 |
| | 2736-304 | | | | 21,61 | 21,61 | | |
| B-224 * | 0759-225 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | R | 0,2846 | 0,2846 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-224 ** | 0759-225 | mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | R | 0,2338 | 0,2338 | | |
| B-224 *** | 0759-225 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | R | 0,2753 | 0,2753 | 0,0506 | 0,0850 |
| BETAHISTINE EG 16 mg | | EG | | ATC: N07CA01 | | | | |
| Cx-11 | 1657-691 1657-691 | 42 comprimés, 16 mg | 42 tabletten, 16 mg | G | 9,97 3,39 | 9,97 3,39 | 4,79 | 4,79 |
| Cx-11 | 1657-709 1657-709 | 84 comprimés, 16 mg | 84 tabletten, 16 mg | G | 12,20 5,09 | 12,20 5,09 | 7,20 | 7,20 |
| Cx-11 * | 0767-632 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0782 | 0,0782 | | |
| Cx-11 ** | 0767-632 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0643 | 0,0643 | | |
| Cx-11 *** | 0767-632 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 |
| BETAHISTINE EG 24 mg | | EG | | ATC: N07CA01 | | | | |
| Cx-11 | 3075-793 3075-793 | 30 comprimés, 24 mg | 30 tabletten, 24 mg | G | 9,34 2,90 | 9,34 2,90 | 4,10 | 4,10 |
| Cx-11 | 3075-801 3075-801 | 100 comprimés, 24 mg | 100 tabletten, 24 mg | G | 16,48 8,36 | 16,48 8,36 | 11,82 | 11,82 |
| Cx-11 * | 7706-351 | 1 comprimé, 24 mg | 1 tablet, 24 mg | G | 0,1079 | 0,1079 | | |
| Cx-11 ** | 7706-351 | 1 comprimé, 24 mg | 1 tablet, 24 mg | G | 0,0886 | 0,0886 | | |
| Cx-11 *** | 7706-351 | 1 comprimé, 24 mg | 1 tablet, 24 mg | G | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 |
| BETAHISTINE EG 8 mg | | EG | | ATC: N07CA01 | | | | |
| Cx-11 | 1657-683 1657-683 | 100 comprimés, 8 mg | 100 tabletten, 8 mg | G | 9,92 3,35 | 9,92 3,35 | 4,74 | 4,74 |
| Cx-11 * | 0767-939 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0432 | 0,0432 | | |
| Cx-11 ** | 0767-939 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0355 | 0,0355 | | |
| Cx-11 *** | 0767-939 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 |
| BETAHISTINE SANDOZ 16 mg | | SANDOZ | | ATC: N07CA01 | | | | |
| Cx-11 | 2725-901 2725-901 | 84 comprimés, 16 mg | 84 tabletten, 16 mg | G | 11,44 4,51 | 11,44 4,51 | 6,38 | 6,38 |
| Cx-11 * | 0798-512 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0693 | 0,0693 | | |
| Cx-11 ** | 0798-512 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0569 | 0,0569 | | |
| Cx-11 *** | 0798-512 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0703 | 0,0703 | 0,0703 | 0,0703 |
| BETAHISTINE TEVA 16 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N07CA01 | | | | |
| Cx-11 | 1644-756 1644-756 | 100 comprimés, 16 mg | 100 tabletten, 16 mg | G | 15,07 7,28 | 15,07 7,28 | 10,30 | 10,30 |
| Cx-11 * | 0768-309 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0939 | 0,0939 | | |
| Cx-11 ** | 0768-309 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0772 | 0,0772 | | |
| Cx-11 *** | 0768-309 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0954 | 0,0954 | 0,0954 | 0,0954 |
| BETAHISTINE TEVA 8 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N07CA01 | | | | |
| Cx-11 | 1644-764 1644-764 | 100 comprimés, 8 mg | 100 tabletten, 8 mg | G | 9,49 3,02 | 9,49 3,02 | 4,27 | 4,27 |
| Cx-11 * | 0768-291 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0390 | 0,0390 | | |
| Cx-11 ** | 0768-291 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0320 | 0,0320 | | |
| Cx-11 *** | 0768-291 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 |
| BETAHISTINE VIATRIS 16 mg | | VIATRIS | | ATC: N07CA01 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| Cx-11 | 1588-631 1588-631 | 84 comprimés, 16 mg | 84 tabletten, 16 mg | G | 11,44 4,51 | 11,44 4,51 | 6,38 | 6,38 |
| Cx-11 * | 0766-386 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0693 | 0,0693 | | |
| Cx-11 ** | 0766-386 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0569 | 0,0569 | | |
| Cx-11 *** | 0766-386 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,0703 | 0,0703 | 0,0703 | 0,0703 |
| BETAHISTINE VIATRIS 24 mg VIATRIS ATC: N07CA01 | | | | | | | | |
| Cx-11 | 4495-065 4495-065 | 20 comprimés, 24 mg | 20 tabletten, 24 mg | G | 8,20 1,99 | 8,20 1,99 | 2,81 | 2,81 |
| Cx-11 | 2678-977 2678-977 | 60 comprimés, 24 mg | 60 tabletten, 24 mg | G | 14,14 6,57 | 14,14 6,57 | 9,29 | 9,29 |
| Cx-11 | 2678-969 2678-969 | 100 comprimés, 24 mg | 100 tabletten, 24 mg | G | 16,62 8,46 | 16,62 8,46 | 11,96 | 11,96 |
| Cx-11 * | 0797-985 | 1 comprimé, 24 mg | 1 tablet, 24 mg | G | 0,1092 | 0,1092 | | |
| Cx-11 ** | 0797-985 | 1 comprimé, 24 mg | 1 tablet, 24 mg | G | 0,0897 | 0,0897 | | |
| Cx-11 *** | 0797-985 | 1 comprimé, 24 mg | 1 tablet, 24 mg | G | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 |
| BETAHISTINE VIATRIS 8 mg VIATRIS ATC: N07CA01 | | | | | | | | |
| Cx-11 | 1588-623 1588-623 | 100 comprimés, 8 mg | 100 tabletten, 8 mg | G | 9,49 3,02 | 9,49 3,02 | 4,27 | 4,27 |
| Cx-11 * | 0766-378 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0390 | 0,0390 | | |
| Cx-11 ** | 0766-378 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0320 | 0,0320 | | |
| Cx-11 *** | 0766-378 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 |
| BETASERC VIATRIS ATC: N07CA01 | | | | | | | | |
| Cx-11 | 0024-935 0024-935 | 100 comprimés, 8 mg | 100 tabletten, 8 mg | R | 9,84 3,29 | 9,84 3,29 | 4,65 | 4,65 |
| Cx-11 * | 0701-748 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | R | 0,0425 | 0,0425 | | |
| Cx-11 ** | 0701-748 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | R | 0,0349 | 0,0349 | | |
| Cx-11 *** | 0701-748 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | R | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
| BETASERC 16 VIATRIS ATC: N07CA01 | | | | | | | | |
| Cx-11 | 0495-473 0495-473 | 42 comprimés, 16 mg | 42 tabletten, 16 mg | R | 10,09 3,48 | 10,09 3,48 | 4,92 | 4,92 |
| Cx-11 | 1430-628 1430-628 | 84 comprimés, 16 mg | 84 tabletten, 16 mg | R | 12,11 5,02 | 12,11 5,02 | 7,10 | 7,10 |
| Cx-11 * | 0736-140 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,0771 | 0,0771 | | |
| Cx-11 ** | 0736-140 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,0633 | 0,0633 | | |
| Cx-11 *** | 0736-140 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 |
| BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01 | | | | | | | | |
| B-157 | 0103-895 0103-895 | 1 tube 30 g pommade, 1 mg/g | 1 tube 30 g zalf, 1 mg/g | | 7,96 1,78 | 7,96 1,78 | 0,47 | 0,79 |
| B-157 * | 0701-789 | 1 g pommade, 1 mg/g | 1 g zalf, 1 mg/g | | 0,0767 | 0,0767 | | |
| B-157 ** | 0701-789 | 1 g pommade, 1 mg/g | 1 g zalf, 1 mg/g | | 0,0630 | 0,0630 | | |
| BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01 | | | | | | | | |
| B-157 | 0102-780 0102-780 | 30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g | 30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g | | 7,96 1,78 | 7,96 1,78 | 0,47 | 0,79 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|--|---|--------------|-------------|--------|--------|
| B-157 * | 0701-805 | 1 g, 1 mg/g | 1 g, 1 mg/g | | 0,0767 | 0,0767 | | |
| B-157 ** | 0701-805 | 1 g, 1 mg/g | 1 g, 1 mg/g | | 0,0630 | 0,0630 | | |
| BETOPTIC | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: S01ED02 | | | |
| B-168 | 0012-138 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml | | 8,61 | 8,61 | 0,62 | 1,04 |
| | 0012-138 | | | | 2,35 | 2,35 | | |
| B-168 * | 0725-895 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | | 3,0300 | 3,0300 | | |
| B-168 ** | 0725-895 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | | 2,4900 | 2,4900 | | |
| BETOPTIC SUSPENSION | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: S01ED02 | | | |
| B-168 | 1073-899 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml | | 9,44 | 9,44 | 0,79 | 1,32 |
| | 1073-899 | | | | 2,99 | 2,99 | | |
| B-168 * | 0742-437 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL | | 3,8600 | 3,8600 | | |
| B-168 ** | 0742-437 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL | | 3,1700 | 3,1700 | | |
| BICLAR 125 JUNIOR | | VIATRIS | | | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 1321-389 | 1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml | 1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml | R | 11,02 | 11,02 | 3,70 | 3,70 |
| | 1321-389 | | | | 4,19 | 4,19 | | |
| C-37 * | 0741-959 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL | R | 0,2254 | 0,2254 | | |
| C-37 ** | 0741-959 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL | R | 0,1850 | 0,1850 | | |
| BICLAR 250 Kids | | VIATRIS | | | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 1635-655 | 1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml | R | 12,84 | 12,84 | 4,93 | 4,93 |
| | 1635-655 | | | | 5,58 | 5,58 | | |
| C-37 * | 0768-317 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,4500 | 0,4500 | | |
| C-37 ** | 0768-317 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,3694 | 0,3694 | | |
| BICLAR 500 FORTE | | VIATRIS | | | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 1321-413 | 10 comprimés enrobés, 500 mg | 10 omhulde tabletten, 500 mg | R | 11,41 | 11,41 | 3,96 | 3,96 |
| | 1321-413 | | | | 4,48 | 4,48 | | |
| C-37 * | 0746-586 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,5780 | 0,5780 | | |
| C-37 ** | 0746-586 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,4750 | 0,4750 | | |
| C-37 *** | 0746-586 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,5872 | 0,5872 | 0,3960 | 0,3960 |
| BICLAR I.V. | | VIATRIS | | | ATC: J01FA09 | | | |
| B-119 | 1375-930 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg | r | 16,02 | 16,02 | 2,12 | 3,54 |
| | 1375-930 | | | | 8,00 | 8,00 | | |
| B-119 * | 0747-493 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg | r | 10,3200 | 10,3200 | | |
| B-119 ** | 0747-493 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg | r | 8,4800 | 8,4800 | | |
| BICLAR UNO 500 | | VIATRIS | | | ATC: J01FA09 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| C-37 | 1321-405 | 10 comprimés à libération modifiée, 500 mg | 10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg | R | 13,14 | 13,14 | 5,14 | 5,14 |
| | 1321-405 | | | | 5,81 | 5,81 | | |
| C-37 | 2121-200 | 20 comprimés à libération modifiée, 500 mg | 20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg | R | 19,02 | 19,02 | 9,10 | 9,10 |
| | 2121-200 | | | | 10,29 | 10,29 | | |
| C-37 * | 0749-622 | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg | R | 0,6640 | 0,6640 | | |
| C-37 ** | 0749-622 | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg | R | 0,5455 | 0,5455 | | |
| C-37 *** | 0749-622 | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg | R | 0,6742 | 0,6742 | 0,4550 | 0,4550 |
| BILASTINE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: R06AX29 | | | | | | | | |
| Cs-7 | 4619-615 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | G | 8,52 | 8,52 | 2,41 | 2,41 |
| | 4619-615 | | | | 2,27 | 2,27 | | |
| Cs-7 | 4619-623 | 50 comprimés, 20 mg | 50 tabletten, 20 mg | G | 9,59 | 9,59 | 3,29 | 3,29 |
| | 4619-623 | | | | 3,10 | 3,10 | | |
| Cs-7 | 4570-321 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 13,67 | 13,67 | 6,59 | 6,59 |
| | 4570-321 | | | | 6,21 | 6,21 | | |
| Cs-7 * | 7736-564 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0801 | 0,0801 | | |
| Cs-7 ** | 7736-564 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0658 | 0,0658 | | |
| Cs-7 *** | 7736-564 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0814 | 0,0814 | 0,0659 | 0,0659 |
| BILASTINE EG 20 mg EG ATC: R06AX29 | | | | | | | | |
| Cs-7 | 4650-073 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | G | 8,52 | 8,52 | 2,41 | 2,41 |
| | 4650-073 | | | | 2,27 | 2,27 | | |
| Cs-7 | 4655-171 | 50 comprimés, 20 mg | 50 tabletten, 20 mg | G | 10,26 | 10,26 | 3,83 | 3,83 |
| | 4655-171 | | | | 3,61 | 3,61 | | |
| Cs-7 | 4643-490 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 14,03 | 14,03 | 6,88 | 6,88 |
| | 4643-490 | | | | 6,49 | 6,49 | | |
| Cs-7 * | 7736-606 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0838 | 0,0838 | | |
| Cs-7 ** | 7736-606 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0688 | 0,0688 | | |
| Cs-7 *** | 7736-606 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0850 | 0,0850 | 0,0688 | 0,0688 |
| BILASTINE EUROGENERICS 20 mg EG ATC: R06AX29 | | | | | | | | |
| Cs-7 | 4844-429 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | G | 8,52 | 8,52 | 2,41 | 2,41 |
| | 4844-429 | | | | 2,27 | 2,27 | | |
| Cs-7 | 4844-437 | 50 comprimés, 20 mg | 50 tabletten, 20 mg | G | 10,26 | 10,26 | 3,83 | 3,83 |
| | 4844-437 | | | | 3,61 | 3,61 | | |
| Cs-7 | 4844-445 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 14,03 | 14,03 | 6,88 | 6,88 |
| | 4844-445 | | | | 6,49 | 6,49 | | |
| Cs-7 * | 7740-574 | 1 comprimé péliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0838 | 0,0838 | | |
| Cs-7 ** | 7740-574 | 1 comprimé péliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0688 | 0,0688 | | |
| Cs-7 *** | 7740-574 | 1 comprimé péliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0850 | 0,0850 | 0,0688 | 0,0688 |
| BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml EG ATC: S01EE03 | | | | | | | | |
| B-168 | 3520-814 | 3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml | G | 19,05 | 19,05 | 2,73 | 4,56 |
| | 3520-814 | | | | 10,31 | 10,31 | | |
| B-168 * | 7718-182 | 1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL | G | 4,4367 | 4,4367 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-168 ** | 7718-182 | 1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL | G | 3,6433 | 3,6433 | | |
| BIOFENAC 100 mg | | ALMIRALL | | ATC: M01AB16 | | | | |
| B-60 | 1264-530 1264-530 | 20 comprimés pelliculés, 100 mg | 20 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 8,64 2,37 | 8,64 2,37 | 0,63 | 1,05 |
| B-60 | 1264-548 1264-548 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 13,23 5,87 | 13,23 5,87 | 1,56 | 2,59 |
| B-60 * | 0747-469 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1263 | 0,1263 | | |
| B-60 ** | 0747-469 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1037 | 0,1037 | | |
| B-60 *** | 0747-469 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1283 | 0,1283 | 0,0260 | 0,0432 |
| BIPRESSIL 10 mg + 10 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BX02 | | | | |
| B-21 | 3414-109 3414-109 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 24,88 14,96 | 24,88 14,96 | 3,89 | 6,54 |
| B-21 | 3414-117 3414-117 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 48,92 35,89 | 48,92 35,89 | 7,24 | 12,19 |
| B-21 * | 7716-343 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5017 | 0,5017 | | |
| B-21 ** | 7716-343 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4227 | 0,4227 | | |
| B-21 *** | 7716-343 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4821 | 0,4821 | 0,0804 | 0,1354 |
| BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BX02 | | | | |
| B-21 | 3813-144 3813-144 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 48,92 35,89 | 48,92 35,89 | 7,24 | 12,19 |
| B-21 * | 7724-859 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5017 | 0,5017 | | |
| B-21 ** | 7724-859 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4227 | 0,4227 | | |
| B-21 *** | 7724-859 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4821 | 0,4821 | 0,0804 | 0,1354 |
| BIPRESSIL 10 mg + 5 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BX02 | | | | |
| B-21 | 3414-174 3414-174 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 17,60 9,21 | 17,60 9,21 | 2,44 | 4,07 |
| B-21 | 3414-166 3414-166 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 33,08 22,10 | 33,08 22,10 | 5,04 | 8,47 |
| B-21 * | 7716-335 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3169 | 0,3169 | | |
| B-21 ** | 7716-335 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,2603 | 0,2603 | | |
| B-21 *** | 7716-335 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3061 | 0,3061 | 0,0560 | 0,0941 |
| BIPRESSIL 5 mg + 10 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BX02 | | | | |
| B-21 | 3414-158 3414-158 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg | R | 23,21 13,52 | 23,21 13,52 | 3,59 | 5,98 |
| B-21 | 3414-141 3414-141 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg | R | 44,13 31,72 | 44,13 31,72 | 6,58 | 11,06 |
| B-21 * | 7716-327 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,4526 | 0,4526 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 ** | 7716-327 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3736 | 0,3736 | | |
| B-21 *** | 7716-327 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,4288 | 0,4288 | 0,0731 | 0,1229 |
| BIPRESSIL 5 mg + 5 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C09BX02 | | | |
| B-21 | 3414-125 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 15,72 | 15,72 | 2,06 | 3,43 |
| | 3414-125 | | | | 7,77 | 7,77 | | |
| B-21 | 3414-133 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 28,27 | 28,27 | 4,37 | 7,34 |
| | 3414-133 | | | | 17,92 | 17,92 | | |
| B-21 * | 7716-319 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2570 | 0,2570 | | |
| B-21 ** | 7716-319 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2111 | 0,2111 | | |
| B-21 *** | 7716-319 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2526 | 0,2526 | 0,0486 | 0,0816 |
| BISOPROLOL EG 10 mg | | EG | | | ATC: C07AB07 | | | |
| B-15 | 3090-073 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,65 | 10,65 | 1,04 | 1,73 |
| | 3090-073 | | | | 3,91 | 3,91 | | |
| B-15 | 2455-400 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 15,35 | 15,35 | 1,99 | 3,31 |
| | 2455-400 | | | | 7,49 | 7,49 | | |
| B-15 * | 0770-438 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0967 | 0,0967 | | |
| B-15 ** | 0770-438 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | | |
| B-15 *** | 0770-438 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0982 | 0,0982 | 0,0199 | 0,0331 |
| BISOPROLOL EG 2,5 mg | | EG | | | ATC: C07AB07 | | | |
| B-15 | 3090-032 | 30 comprimés, 2,5 mg | 30 tabletten, 2,5 mg | G | 7,08 | 7,08 | 0,27 | 0,45 |
| | 3090-032 | | | | 1,01 | 1,01 | | |
| B-15 | 2663-508 | 100 comprimés, 2,5 mg | 100 tabletten, 2,5 mg | G | 11,00 | 11,00 | 1,11 | 1,84 |
| | 2663-508 | | | | 4,17 | 4,17 | | |
| B-15 * | 0798-322 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0538 | 0,0538 | | |
| B-15 ** | 0798-322 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0442 | 0,0442 | | |
| B-15 *** | 0798-322 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0547 | 0,0547 | 0,0111 | 0,0184 |
| BISOPROLOL EG 5 mg | | EG | | | ATC: C07AB07 | | | |
| B-15 | 3090-057 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 8,49 | 8,49 | 0,59 | 0,99 |
| | 3090-057 | | | | 2,24 | 2,24 | | |
| B-15 | 2455-418 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 11,42 | 11,42 | 1,19 | 1,98 |
| | 2455-418 | | | | 4,49 | 4,49 | | |
| B-15 * | 0770-446 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0579 | 0,0579 | | |
| B-15 ** | 0770-446 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0476 | 0,0476 | | |
| B-15 *** | 0770-446 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0588 | 0,0588 | 0,0119 | 0,0198 |
| BISOPROLOL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | | ATC: C07AB07 | | | |
| B-15 | 1645-126 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,66 | 9,66 | 0,84 | 1,39 |
| | 1645-126 | | | | 3,15 | 3,15 | | |
| B-15 | 1645-142 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,45 | 10,45 | 0,99 | 1,66 |
| | 1645-142 | | | | 3,75 | 3,75 | | |
| B-15 | 2352-383 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 14,97 | 14,97 | 1,91 | 3,18 |
| | 2352-383 | | | | 7,20 | 7,20 | | |
| B-15 * | 0769-224 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0948 | 0,0948 | | |
| B-15 ** | 0769-224 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0779 | 0,0779 | | |
| B-15 *** | 0769-224 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0963 | 0,0963 | 0,0195 | 0,0324 |

| BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AB07 | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--|
| B-15 | 2585-552 2585-552 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 6,97 0,91 | 6,97 0,91 | 0,24 | 0,40 | |
| B-15 | 2622-447 2622-447 | 60 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 7,62 1,48 | 7,62 1,48 | 0,39 | 0,65 | |
| B-15 | 2878-148 2878-148 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 10,61 3,87 | 10,61 3,87 | 1,03 | 1,71 | |
| B-15 * | 0793-463 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0499 | 0,0499 | | | |
| B-15 ** | 0793-463 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0410 | 0,0410 | | | |
| B-15 *** | 0793-463 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0508 | 0,0508 | 0,0103 | 0,0171 | |
| BISOPROLOL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AB07 | | | | | |
| B-15 | 1645-167 1645-167 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,93 1,75 | 7,93 1,75 | 0,46 | 0,77 | |
| B-15 | 1645-159 1645-159 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 8,32 2,09 | 8,32 2,09 | 0,55 | 0,92 | |
| B-15 | 2352-359 2352-359 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 10,92 4,11 | 10,92 4,11 | 1,09 | 1,82 | |
| B-15 * | 0769-216 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0541 | 0,0541 | | | |
| B-15 ** | 0769-216 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0445 | 0,0445 | | | |
| B-15 *** | 0769-216 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0549 | 0,0549 | 0,0111 | 0,0186 | |
| BISOPROLOL TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB07 | | | | | |
| B-15 | 1671-825 1671-825 | 100 comprimés enrobés, 10 mg | 100 omhulde tabletten, 10 mg | G | 14,85 7,11 | 14,85 7,11 | 1,89 | 3,14 | |
| B-15 * | 0768-358 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,0918 | 0,0918 | | | |
| B-15 ** | 0768-358 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,0754 | 0,0754 | | | |
| B-15 *** | 0768-358 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,0932 | 0,0932 | 0,0189 | 0,0314 | |
| BISOPROLOL TEVA 2,5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB07 | | | | | |
| B-15 | 3083-144 3083-144 | 30 comprimés, 2,5 mg | 30 tabletten, 2,5 mg | G | 7,03 0,96 | 7,03 0,96 | 0,25 | 0,42 | |
| B-15 | 3083-151 3083-151 | 100 comprimés, 2,5 mg | 100 tabletten, 2,5 mg | G | 10,80 4,02 | 10,80 4,02 | 1,07 | 1,78 | |
| B-15 * | 7706-427 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0519 | 0,0519 | | | |
| B-15 ** | 7706-427 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0426 | 0,0426 | | | |
| B-15 *** | 7706-427 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0527 | 0,0527 | 0,0107 | 0,0178 | |
| BISOPROLOL TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB07 | | | | | |
| B-15 | 1671-809 1671-809 | 100 comprimés enrobés, 5 mg | 100 omhulde tabletten, 5 mg | G | 11,14 4,28 | 11,14 4,28 | 1,13 | 1,89 | |
| B-15 * | 0768-341 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | G | 0,0552 | 0,0552 | | | |
| B-15 ** | 0768-341 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | G | 0,0454 | 0,0454 | | | |
| B-15 *** | 0768-341 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | G | 0,0561 | 0,0561 | 0,0113 | 0,0189 | |
| BISOPROLOL VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: C07AB07 | | | | | |
| B-15 | 1608-694 1608-694 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 9,76 3,23 | 9,76 3,23 | 0,86 | 1,43 | |
| B-15 | 2866-457 2866-457 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,02 4,19 | 11,02 4,19 | 1,11 | 1,85 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-15 | 2866-473 2866-473 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 15,35 7,49 | 15,35 7,49 | 1,99 | 3,31 |
| B-15 * | 0755-512 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0967 | 0,0967 | | |
| B-15 ** | 0755-512 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | | |
| B-15 *** | 0755-512 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0982 | 0,0982 | 0,0199 | 0,0331 |
| BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg VIATRIS ATC: C07AB07 | | | | | | | | |
| B-15 | 3172-152 3172-152 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 7,03 0,96 | 7,03 0,96 | 0,25 | 0,42 |
| B-15 | 3172-178 3172-178 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 10,79 4,01 | 10,79 4,01 | 1,06 | 1,77 |
| B-15 * | 0755-538 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0517 | 0,0517 | | |
| B-15 ** | 0755-538 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0425 | 0,0425 | | |
| B-15 *** | 0755-538 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0526 | 0,0526 | 0,0106 | 0,0177 |
| BISOPROLOL VIATRIS 5 mg VIATRIS ATC: C07AB07 | | | | | | | | |
| B-15 | 2866-390 2866-390 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,98 1,80 | 7,98 1,80 | 0,48 | 0,80 |
| B-15 | 2866-408 2866-408 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 8,34 2,11 | 8,34 2,11 | 0,56 | 0,93 |
| B-15 | 2866-424 2866-424 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 11,14 4,28 | 11,14 4,28 | 1,13 | 1,89 |
| B-15 * | 0755-520 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0552 | 0,0552 | | |
| B-15 ** | 0755-520 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0454 | 0,0454 | | |
| B-15 *** | 0755-520 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0561 | 0,0561 | 0,0113 | 0,0189 |
| BLEOMYCINE 15 mg SANOFI BELGIUM ATC: L01DC01 | | | | | | | | |
| A-25 | 0025-825 0025-825 | 1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU | 1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU | R | 16,48 8,36 | 16,48 8,36 | 0,00 | 0,00 |
| A-25 * | 0701-979 | 1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU | 1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU | R | 10,7900 | 10,7900 | | |
| A-25 ** | 0701-979 | 1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU | 1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU | R | 8,8600 | 8,8600 | | |
| BONVIVA PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA06 | | | | | | | | |
| B-230 | 2243-822 2243-822 | 3 comprimés pelliculés, 150 mg | 3 filmomhulde tabletten, 150 mg | R | 26,67 16,52 | 26,67 16,52 | 4,14 | 6,96 |
| B-230 * | 0782-953 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 7,1067 | 7,1067 | | |
| B-230 ** | 0782-953 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 5,8367 | 5,8367 | | |
| B-230 *** | 0782-953 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 7,0455 | 7,0455 | 1,3800 | 2,3200 |
| BONVIVA 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA06 | | | | | | | | |
| B-230 | 3138-617 3138-617 | 3 comprimés pelliculés, 150 mg | 3 filmomhulde tabletten, 150 mg | R | 26,67 16,52 | 26,67 16,52 | 4,14 | 6,96 |
| B-230 * | 7707-565 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 7,1067 | 7,1067 | | |
| B-230 ** | 7707-565 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 5,8367 | 5,8367 | | |
| B-230 *** | 7707-565 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 7,0455 | 7,0455 | 1,3800 | 2,3200 |
| BONVIVA 3 mg/3 ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA06 | | | | | | | | |
| B-230 | 2321-685 2321-685 | 1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | R | 31,92 21,09 | 31,92 21,09 | 4,87 | 8,19 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|--|--|
| B-230 * | 0785-501 | 1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 27,2200 | 27,2200 | | |
| B-230 ** | 0785-501 | 1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 22,3600 | 22,3600 | | |
| BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7735-012 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | | 321,57 | 321,57 | | |
| A-76 * | 7735-012 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | G | 347,9700 | 347,9700 | | |
| A-76 ** | 7735-012 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | G | 340,8600 | 340,8600 | | |
| BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7727-381 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg | | 321,57 | 321,57 | | |
| A-76 * | 7727-381 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 347,9700 | 347,9700 | | |
| A-76 ** | 7727-381 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 340,8600 | 340,8600 | | |
| BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL EG ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7724-040 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | | 340,67 | 340,67 | | |
| A-76 * | 7724-040 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | G | 368,2200 | 368,2200 | | |
| A-76 ** | 7724-040 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | G | 361,1100 | 361,1100 | | |
| BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg AUROBINDO NV ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7730-583 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg | | 321,55 | 321,55 | | |
| A-76 * | 7730-583 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 347,9500 | 347,9500 | | |
| A-76 ** | 7730-583 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 340,8400 | 340,8400 | | |
| BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7737-091 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | | 337,66 | 337,66 | | |
| A-76 * | 7737-091 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | G | 365,0300 | 365,0300 | | |
| A-76 ** | 7737-091 | 1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | G | 357,9200 | 357,9200 | | |
| BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg FRESENIUS KABI ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7733-975 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg | | 321,57 | 321,57 | | |
| A-76 * | 7733-975 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 347,9700 | 347,9700 | | |
| A-76 ** | 7733-975 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 340,8600 | 340,8600 | | |
| BORTEZOMIB KRKA 1 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L01XG01 | | | | | | | | |
| | 7732-118 | 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, | 1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of | | 98,81 | 98,81 | | |
| A-76 * | 7732-118 | 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, | 1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of | G | 111,8500 | 111,8500 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| A-76 ** | 7732-118 | infusion ou inhalation, 1 mg 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg | inhalatie, 1 mg 1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg | G | 104,7400 | 104,7400 | | |
| BORTEZOMIB KRKA 3,5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: L01XG01 | | | | |
| A-76 * | 7732-126 7732-126 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg | G | 321,57 347,9700 | 321,57 347,9700 | | |
| A-76 ** | 7732-126 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg | G | 340,8600 | 340,8600 | | |
| BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg | | SANDOZ | | ATC: L01XG01 | | | | |
| A-76 * | 7726-847 7726-847 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 337,62 364,9900 | 337,62 364,9900 | | |
| A-76 ** | 7726-847 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 357,8800 | 357,8800 | | |
| BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01XG01 | | | | |
| A-76 * | 7723-455 7723-455 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 321,57 347,9700 | 321,57 347,9700 | | |
| A-76 ** | 7723-455 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 340,8600 | 340,8600 | | |
| BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg | | VIATRIS | | ATC: L01XG01 | | | | |
| A-76 * | 7731-821 7731-821 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 321,57 347,9700 | 321,57 347,9700 | | |
| A-76 ** | 7731-821 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | G | 340,8600 | 340,8600 | | |
| BRETARIS GENUAIR 322 µg | | ZENTIVA k.s. | | ATC: R03BB05 | | | | |
| B-267 | 3000-072 | 60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis | | 38,94 | 38,94 | 5,85 | 9,84 |
| B-267 | 3000-072 3337-854 | 180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis | | 27,20 91,80 | 27,20 91,80 | 8,30 | 12,50 |
| B-267 * | 3337-854 7705-528 | 1 nébulisateur, 322 µg/dose | 1 vernevelaar, 322 µg/dosis | | 73,84 28,4600 | 73,84 28,4600 | | |
| B-267 ** | 7705-528 | 1 nébulisateur, 322 µg/dose | 1 vernevelaar, 322 µg/dosis | | 26,0900 | 26,0900 | | |
| BROXIL 250 mg | | ACE PHARMACEUTICALS BV | | ATC: J01CE05 | | | | |
| C-37 | 4409-827 | 20 gélules, 250 mg | 20 capsules, hard, 250 mg | | 17,74 | 17,74 | 8,24 | 8,24 |
| C-37 * | 4409-827 7734-387 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | | 9,32 0,6015 | 9,32 0,6015 | | |
| C-37 ** | 7734-387 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | | 0,4940 | 0,4940 | | |
| C-37 *** | 7734-387 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | | 0,6106 | 0,6106 | 0,4120 | 0,4120 |
| BROXIL 500 mg | | ACE PHARMACEUTICALS BV | | ATC: J01CE05 | | | | |
| C-37 | 4409-835 | 20 gélules, 500 mg | 20 capsules, hard, 500 mg | | 30,87 | 30,87 | 10,20 | 15,50 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--|--------------|--------------|--------|--------|
| | 4409-835 | | | | | 20,17 | 20,17 | | |
| C-37 * | 7734-395 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | | 1,3015 | 1,3015 | | |
| C-37 ** | 7734-395 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | | 1,0690 | 1,0690 | | |
| C-37 *** | 7734-395 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | | 1,2667 | 1,2667 | 0,5100 | 0,7750 |
| BRUFEN FORTE 600 mg VIATRIS ATC: M01AE01 | | | | | | | | | |
| B-60 | 0867-556 | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | R | | 7,66 | 7,66 | 0,40 | 0,67 |
| | 0867-556 | | | | | 1,52 | 1,52 | | |
| B-60 | 2639-763 | 60 comprimés pelliculés, 600 mg | 60 filmomhulde tabletten, 600 mg | R | | 8,79 | 8,79 | 0,66 | 1,10 |
| | 2639-763 | | | | | 2,49 | 2,49 | | |
| B-60 * | 0702-167 | 1 comprimé, 600 mg | 1 tablet, 600 mg | R | | 0,0535 | 0,0535 | | |
| B-60 ** | 0702-167 | 1 comprimé, 600 mg | 1 tablet, 600 mg | R | | 0,0440 | 0,0440 | | |
| B-60 *** | 0702-167 | 1 comprimé, 600 mg | 1 tablet, 600 mg | R | | 0,0542 | 0,0542 | 0,0110 | 0,0183 |
| BUDENOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EA06 | | | | | | | | | |
| B-55 | 1556-406 | 100 gélules gastro-résistantes, 3 mg | 100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg | R | | 65,89 | 65,89 | 9,60 | 15,50 |
| | 1556-406 | | | | | 50,65 | 50,65 | | |
| B-55 * | 0764-548 | 1 gélule gastro-résistante, 3 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg | R | | 0,6080 | 0,6080 | | |
| B-55 ** | 0764-548 | 1 gélule gastro-résistante, 3 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg | R | | 0,5369 | 0,5369 | | |
| B-55 *** | 0764-548 | 1 gélule gastro-résistante, 3 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg | R | | 0,6036 | 0,6036 | 0,0960 | 0,1550 |
| BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml SANDOZ ATC: R03BA02 | | | | | | | | | |
| B-99 | 2870-582 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | G | | 20,03 | 20,03 | 2,94 | 4,89 |
| | 2870-582 | | | | | 11,07 | 11,07 | | |
| B-99 | 3026-200 | 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | G | | 40,86 | 40,86 | 6,12 | 10,30 |
| | 3026-200 | | | | | 28,88 | 28,88 | | |
| B-99 * | 0750-190 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | | 0,6212 | 0,6212 | | |
| B-99 ** | 0750-190 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | | 0,5102 | 0,5102 | | |
| BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml SANDOZ ATC: R03BA02 | | | | | | | | | |
| B-99 | 2870-574 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml | G | | 29,66 | 29,66 | 4,56 | 7,66 |
| | 2870-574 | | | | | 19,12 | 19,12 | | |
| B-99 | 3026-218 | 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | 60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml | G | | 65,04 | 65,04 | 8,30 | 12,50 |
| | 3026-218 | | | | | 49,92 | 49,92 | | |
| B-99 * | 0750-182 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | | 1,0005 | 1,0005 | | |
| B-99 ** | 0750-182 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | | 0,8820 | 0,8820 | | |
| BUDESONIDE EASYHALER 200 µg ORION CORPORATION ATC: R03BA02 | | | | | | | | | |
| B-99 | 2224-269 | 200 doses poudre pour inhalation, | 200 doses inhalatiepoeder, 200 | G | | 20,27 | 20,27 | 2,98 | 4,97 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | 200 µg/dose | µg/dosis | | | 11,25 | 11,25 | | |
| B-99 * | 2224-269 0779-991 | 1 nébulisateur, 200 µg/dose | 1 vernevelaar, 200 µg/dosis | G | 14,5200 | 14,5200 | | | |
| B-99 ** | 0779-991 | 1 nébulisateur, 200 µg/dose | 1 vernevelaar, 200 µg/dosis | G | 11,9300 | 11,9300 | | | |
| BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml | | EG | | ATC: R03BA02 | | | | | |
| B-99 | 3816-550 | 20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | 21,56 | 21,56 | 3,24 | 5,41 | |
| | 3816-550 | | | | 12,23 | 12,23 | | | |
| B-99 | 3816-543 | 60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | 44,17 | 44,17 | 6,58 | 11,07 | |
| | 3816-543 | | | | 31,75 | 31,75 | | | |
| B-99 * | 7723-729 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | 0,6795 | 0,6795 | | | |
| B-99 ** | 7723-729 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | 0,5610 | 0,5610 | | | |
| BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml | | EG | | ATC: R03BA02 | | | | | |
| B-99 | 3814-670 | 20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | 31,90 | 31,90 | 4,87 | 8,19 | |
| | 3814-670 | | | | 21,07 | 21,07 | | | |
| B-99 | 3814-662 | 60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | 70,92 | 70,92 | 8,30 | 12,50 | |
| | 3814-662 | | | | 55,04 | 55,04 | | | |
| B-99 * | 7723-737 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | 1,0908 | 1,0908 | | | |
| B-99 ** | 7723-737 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | 0,9723 | 0,9723 | | | |
| BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: R03BA02 | | | | | |
| B-99 | 2886-653 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | G | 20,03 | 20,03 | 2,94 | 4,89 | |
| | 2886-653 | | | | 11,07 | 11,07 | | | |
| B-99 | 2886-661 | 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | G | 42,48 | 42,48 | 6,34 | 10,68 | |
| | 2886-661 | | | | 30,28 | 30,28 | | | |
| B-99 * | 0754-432 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | 0,6513 | 0,6513 | | | |
| B-99 ** | 0754-432 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | G | 0,5350 | 0,5350 | | | |
| BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: R03BA02 | | | | | |
| B-99 | 3116-308 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml | G | 29,66 | 29,66 | 4,56 | 7,66 | |
| | 3116-308 | | | | 19,12 | 19,12 | | | |
| B-99 | 3116-316 | 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | 60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml | G | 67,99 | 67,99 | 8,30 | 12,50 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-99 * | 3116-316 7708-159 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | 52,49 1,0458 | 52,49 1,0458 | | |
| B-99 ** | 7708-159 | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | G | 0,9273 | 0,9273 | | |
| BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07 | | | | | | | | |
| B-245 | 3172-467 | 120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | G | 32,90 | 32,90 | 5,01 | 8,43 |
| | 3172-467 | | | | 21,95 | 21,95 | | |
| B-245 | 3789-872 | 360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 76,62 | 76,62 | 8,30 | 12,50 |
| | 3789-872 | | | | 59,99 | 59,99 | | |
| B-245 * | 7708-282 | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 23,5667 | 23,5667 | | |
| B-245 ** | 7708-282 | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | G | 21,1967 | 21,1967 | | |
| BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07 | | | | | | | | |
| B-245 | 3172-483 | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | G | 32,90 | 32,90 | 5,01 | 8,43 |
| | 3172-483 | | | | 21,95 | 21,95 | | |
| B-245 | 3789-880 | 180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 76,62 | 76,62 | 8,30 | 12,50 |
| | 3789-880 | | | | 59,99 | 59,99 | | |
| B-245 * | 7708-290 | 1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 23,5667 | 23,5667 | | |
| B-245 ** | 7708-290 | 1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | G | 21,1967 | 21,1967 | | |
| BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07 | | | | | | | | |
| B-245 | 4844-015 | 120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis | G | 26,60 | 26,60 | 4,13 | 6,94 |
| | 4844-015 | | | | 16,46 | 16,46 | | |
| B-245 * | 7740-962 | 1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose | 1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis | G | 21,2400 | 21,2400 | | |
| B-245 ** | 7740-962 | 1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose | 1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis | G | 17,4500 | 17,4500 | | |
| BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12 | | | | | | | | |
| B-73 | 3550-662 | 30 comprimés à libération modifiée, 150 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg | G | 18,39 | 18,39 | 2,60 | 4,34 |
| | 3550-662 | | | | 9,81 | 9,81 | | |
| B-73 | 3551-132 | 90 comprimés à libération modifiée, 150 mg | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg | G | 34,53 | 34,53 | 5,24 | 8,81 |
| | 3551-132 | | | | 23,37 | 23,37 | | |
| B-73 * | 7719-834 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg | G | 0,3351 | 0,3351 | | |
| B-73 ** | 7719-834 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg | G | 0,2752 | 0,2752 | | |
| B-73 *** | 7719-834 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg | G | 0,4286 | 0,4286 | 0,0867 | 0,1447 |
| BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12 | | | | | | | | |
| B-73 | 4130-209 | 30 comprimés à libération modifiée, 150 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg | G | 17,76 | 17,76 | 2,47 | 4,12 |
| | 4130-209 | | | | 9,33 | 9,33 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 | 4130-217 | 90 comprimés à libération modifiée, 150 mg | 90 tabletten met geregeleerde afgifte, 150 mg | G | 33,40 | 33,40 | 5,08 | 8,54 |
| | 4130-217 | | | | 22,38 | 22,38 | | |
| B-73 * | 7727-548 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 150 mg | G | 0,3209 | 0,3209 | | |
| B-73 ** | 7727-548 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 150 mg | G | 0,2636 | 0,2636 | | |
| B-73 *** | 7727-548 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 150 mg | G | 0,3096 | 0,3096 | 0,0564 | 0,0949 |
| BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12 | | | | | | | | |
| B-73 | 4135-737 | 30 comprimés à libération modifiée, 300 mg | 30 tabletten met geregeleerde afgifte, 300 mg | G | 26,97 | 26,97 | 4,18 | 7,03 |
| | 4135-737 | | | | 16,78 | 16,78 | | |
| B-73 | 4135-745 | 90 comprimés à libération modifiée, 300 mg | 90 tabletten met geregeleerde afgifte, 300 mg | G | 53,96 | 53,96 | 7,94 | 13,38 |
| | 4135-745 | | | | 40,28 | 40,28 | | |
| B-73 * | 7727-555 | 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 300 mg | G | 0,5534 | 0,5534 | | |
| B-73 ** | 7727-555 | 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 300 mg | G | 0,4744 | 0,4744 | | |
| B-73 *** | 7727-555 | 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 300 mg | G | 0,7144 | 0,7144 | 0,1393 | 0,2343 |
| BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02 | | | | | | | | |
| B-25 | 0675-850 | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | | 10,79 | 10,79 | 1,06 | 1,77 |
| | 0675-850 | | | | 4,01 | 4,01 | | |
| B-25 * | 0736-157 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | | 1,0340 | 1,0340 | | |
| B-25 ** | 0736-157 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | | 0,8500 | 0,8500 | | |
| BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02 | | | | | | | | |
| B-25 | 0675-835 | 20 comprimés, 5 mg | 20 tabletten, 5 mg | | 13,35 | 13,35 | 1,58 | 2,63 |
| | 0675-835 | | | | 5,96 | 5,96 | | |
| B-25 * | 0736-165 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,3845 | 0,3845 | | |
| B-25 ** | 0736-165 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,3160 | 0,3160 | | |
| B-25 *** | 0736-165 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,3906 | 0,3906 | 0,0790 | 0,1315 |
| BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02 | | | | | | | | |
| B-25 | 1414-309 | 30 comprimés, 1 mg | 30 tabletten, 1 mg | | 9,44 | 9,44 | 0,79 | 1,32 |
| | 1414-309 | | | | 2,99 | 2,99 | | |
| B-25 * | 0702-217 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,1287 | 0,1287 | | |
| B-25 ** | 0702-217 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,1057 | 0,1057 | | |
| B-25 *** | 0702-217 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,1304 | 0,1304 | 0,0263 | 0,0440 |
| CABESOL 500 µg/g LABORATOIRES MEDGEN SAS ATC: D07AD01 | | | | | | | | |
| B-156 | 4826-657 | 1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g | 1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g | G | 14,42 | 14,42 | 1,80 | 3,00 |
| | 4826-657 | | | | 6,78 | 6,78 | | |
| B-156 * | 7741-515 | 1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g | 1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g | G | 8,7500 | 8,7500 | | |
| B-156 ** | 7741-515 | 1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g | 1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g | G | 7,1900 | 7,1900 | | |
| CAMCOLIT 400 mg ESSENTIAL PHARMA ATC: N05AN01 | | | | | | | | |
| B-75 | 0805-358 | 100 comprimés pelliculés, 400 mg | 100 filmomhulde tabletten, 400 mg | | 30,50 | 30,50 | 4,68 | 7,86 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 0805-358 | | | | | 19,86 | 19,86 | | |
| B-75 * | 7726-284 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | | | 0,2563 | 0,2563 | | |
| B-75 ** | 7726-284 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | | | 0,2105 | 0,2105 | | |
| B-75 *** | 7726-284 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | | | 0,2496 | 0,2496 | 0,0468 | 0,0786 |
| CAMPRAL | | MERCK | | | ATC: N07BB03 | | | | |
| C-21 | 1284-280 | 84 comprimés gastro-résistants, 333 mg | 84 maagsapresistente tabletten, 333 mg | | | 16,88 | 16,88 | 7,65 | 7,65 |
| | 1284-280 | | | | | 8,66 | 8,66 | | |
| C-21 | 1741-487 | 168 comprimés gastro-résistants, 333 mg | 168 maagsapresistente tabletten, 333 mg | | | 26,57 | 26,57 | 10,20 | 13,88 |
| | 1741-487 | | | | | 16,44 | 16,44 | | |
| C-21 * | 0763-029 | 1 comprimé gastro-résistant, 333 mg | 1 maagsapresistente tablet, 333 mg | | | 0,1263 | 0,1263 | | |
| C-21 ** | 0763-029 | 1 comprimé gastro-résistant, 333 mg | 1 maagsapresistente tablet, 333 mg | | | 0,1038 | 0,1038 | | |
| C-21 *** | 0763-029 | 1 comprimé gastro-résistant, 333 mg | 1 maagsapresistente tablet, 333 mg | | | 0,1252 | 0,1252 | 0,0607 | 0,0826 |
| CAMPTO 20 mg/ml | | Pfizer | | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0760-504 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/ml | | | 52,41 | 52,41 | | |
| A-28 * | 0760-504 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | | 62,6600 | 62,6600 | | |
| A-28 ** | 0760-504 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | | 55,5500 | 55,5500 | | |
| CAMPTO 20 mg/ml | | Pfizer | | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0760-496 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/ml | | | 19,71 | 19,71 | | |
| A-28 * | 0760-496 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | | 25,4400 | 25,4400 | | |
| A-28 ** | 0760-496 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | | 20,8900 | 20,8900 | | |
| CAMPTO 20 mg/ml | | Pfizer | | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0791-319 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | | 167,02 | 167,02 | | |
| A-28 * | 0791-319 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | | 184,1500 | 184,1500 | | |
| A-28 ** | 0791-319 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | | 177,0400 | 177,0400 | | |
| CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg | | EG | | | ATC: C09DA06 | | | | |
| B-224 | 2898-294 | 98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg | 98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg | G | | 23,10 | 23,10 | 3,56 | 5,93 |
| | 2898-294 | | | | | 13,41 | 13,41 | | |
| B-224 * | 0751-834 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | | 0,1766 | 0,1766 | | |
| B-224 ** | 0751-834 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | | 0,1450 | 0,1450 | | |
| B-224 *** | 0751-834 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | | 0,1792 | 0,1792 | 0,0363 | 0,0605 |
| CANDESARTAN EG 16 mg | | EG | | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 2898-278 | 28 comprimés, 16 mg | 28 tabletten, 16 mg | G | | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| B-224 | 2898-278 2898-286 | 98 comprimés, 16 mg | 98 tabletten, 16 mg | G | 6,70 24,37 | 6,70 24,37 | 3,82 | 6,42 |
| B-224 * | 2898-286 0751-222 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 14,52 0,1912 | 14,52 0,1912 | | |
| B-224 ** | 0751-222 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1570 | 0,1570 | | |
| B-224 *** | 0751-222 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1922 | 0,1922 | 0,0390 | 0,0655 |
| CANDESARTAN EG 32 mg EG ATC: C09CA06 | | | | | | | | |
| B-224 | 2898-245 2898-245 | 98 comprimés, 32 mg | 98 tabletten, 32 mg | G | 29,27 18,79 | 29,27 18,79 | 4,51 | 7,57 |
| B-224 * | 0751-230 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2474 | 0,2474 | | |
| B-224 ** | 0751-230 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2033 | 0,2033 | | |
| B-224 *** | 0751-230 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2422 | 0,2422 | 0,0460 | 0,0772 |
| CANDESARTAN EG 8 mg EG ATC: C09CA06 | | | | | | | | |
| B-224 | 2898-252 2898-252 | 28 comprimés, 8 mg | 28 tabletten, 8 mg | G | 13,06 5,74 | 13,06 5,74 | 1,52 | 2,54 |
| B-224 | 2898-260 2898-260 | 98 comprimés, 8 mg | 98 tabletten, 8 mg | G | 20,47 11,39 | 20,47 11,39 | 3,02 | 5,03 |
| B-224 * | 0751-214 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1500 | 0,1500 | | |
| B-224 ** | 0751-214 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1232 | 0,1232 | | |
| B-224 *** | 0751-214 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1524 | 0,1524 | 0,0308 | 0,0513 |
| CANDESARTAN KRKA 16 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06 | | | | | | | | |
| B-224 | 3318-623 3318-623 | 98 comprimés, 16 mg | 98 tabletten, 16 mg | G | 24,31 14,47 | 24,31 14,47 | 3,82 | 6,41 |
| B-224 * | 7713-365 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1905 | 0,1905 | | |
| B-224 ** | 7713-365 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1565 | 0,1565 | | |
| B-224 *** | 7713-365 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1916 | 0,1916 | 0,0390 | 0,0654 |
| CANDESARTAN KRKA 32 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06 | | | | | | | | |
| B-224 | 3318-599 3318-599 | 98 comprimés, 32 mg | 98 tabletten, 32 mg | G | 29,22 18,75 | 29,22 18,75 | 4,50 | 7,56 |
| B-224 * | 7713-373 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2469 | 0,2469 | | |
| B-224 ** | 7713-373 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-224 *** | 7713-373 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2417 | 0,2417 | 0,0459 | 0,0771 |
| CANDESARTAN KRKA 8 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06 | | | | | | | | |
| B-224 | 3318-672 3318-672 | 28 comprimés, 8 mg | 28 tabletten, 8 mg | G | 13,03 5,72 | 13,03 5,72 | 1,52 | 2,53 |
| B-224 | 3318-656 3318-656 | 98 comprimés, 8 mg | 98 tabletten, 8 mg | G | 20,41 11,35 | 20,41 11,35 | 3,01 | 5,02 |
| B-224 * | 7713-357 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1495 | 0,1495 | | |
| B-224 ** | 7713-357 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1228 | 0,1228 | | |
| B-224 *** | 7713-357 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1518 | 0,1518 | 0,0307 | 0,0512 |
| CANDESARTAN SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: C09CA06 | | | | | | | | |
| B-224 | 2828-309 2828-309 | 28 comprimés, 16 mg | 28 tabletten, 16 mg | G | 14,32 6,70 | 14,32 6,70 | 1,78 | 2,96 |
| B-224 | 2828-325 2828-325 | 98 comprimés, 16 mg | 98 tabletten, 16 mg | G | 24,35 14,50 | 24,35 14,50 | 3,82 | 6,41 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 * | 0752-311 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1909 | 0,1909 | | |
| B-224 ** | 0752-311 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1568 | 0,1568 | | |
| B-224 *** | 0752-311 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1920 | 0,1920 | 0,0390 | 0,0654 |
| CANDESARTAN SANDOZ 32 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 2828-333 | 98 comprimés, 32 mg | 98 tabletten, 32 mg | G | 29,26 | 29,26 | 4,50 | 7,57 |
| | 2828-333 | | | | 18,78 | 18,78 | | |
| B-224 * | 0752-493 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2473 | 0,2473 | | |
| B-224 ** | 0752-493 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | |
| B-224 *** | 0752-493 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | G | 0,2421 | 0,2421 | 0,0459 | 0,0772 |
| CANDESARTAN SANDOZ 8 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 2828-283 | 56 comprimés, 8 mg | 56 tabletten, 8 mg | G | 18,07 | 18,07 | 2,54 | 4,23 |
| | 2828-283 | | | | 9,57 | 9,57 | | |
| B-224 | 2828-291 | 98 comprimés, 8 mg | 98 tabletten, 8 mg | G | 20,44 | 20,44 | 3,02 | 5,03 |
| | 2828-291 | | | | 11,38 | 11,38 | | |
| B-224 * | 0752-329 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1499 | 0,1499 | | |
| B-224 ** | 0752-329 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1231 | 0,1231 | | |
| B-224 *** | 0752-329 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1521 | 0,1521 | 0,0308 | 0,0513 |
| CANDESARTAN TEVA 16 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 2880-821 | 98 comprimés, 16 mg | 98 tabletten, 16 mg | G | 24,31 | 24,31 | 3,82 | 6,41 |
| | 2880-821 | | | | 14,47 | 14,47 | | |
| B-224 * | 0753-434 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1905 | 0,1905 | | |
| B-224 ** | 0753-434 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1565 | 0,1565 | | |
| B-224 *** | 0753-434 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | G | 0,1916 | 0,1916 | 0,0390 | 0,0654 |
| CANDESARTAN TEVA 8 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA06 | | | | |
| B-224 | 2880-805 | 98 comprimés, 8 mg | 98 tabletten, 8 mg | G | 20,41 | 20,41 | 3,01 | 5,02 |
| | 2880-805 | | | | 11,35 | 11,35 | | |
| B-224 * | 0753-442 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1495 | 0,1495 | | |
| B-224 ** | 0753-442 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1228 | 0,1228 | | |
| B-224 *** | 0753-442 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,1518 | 0,1518 | 0,0307 | 0,0512 |
| CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09DA06 | | | | |
| B-224 | 3322-476 | 28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg | 28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg | G | 14,54 | 14,54 | 1,82 | 3,04 |
| | 3322-476 | | | | 6,88 | 6,88 | | |
| B-224 | 3322-484 | 98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg | G | 21,61 | 21,61 | 3,25 | 5,42 |
| | 3322-484 | | | | 12,27 | 12,27 | | |
| B-224 * | 7713-381 | 1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg / 12,5 mg | G | 0,1615 | 0,1615 | | |
| B-224 ** | 7713-381 | 1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg / 12,5 mg | G | 0,1328 | 0,1328 | | |
| B-224 *** | 7713-381 | 1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg / 12,5 mg | G | 0,1641 | 0,1641 | 0,0332 | 0,0553 |
| CAPECITABINE ACCORD 150 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC06 | | | | |
| A-28 | 3036-035 | 60 comprimés pelliculés, 150 mg | 60 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 32,30 | 32,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 3036-035 | | | | 21,42 | 21,42 | | |
| A-28 * | 7703-473 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,4607 | 0,4607 | | |
| A-28 ** | 7703-473 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,3785 | 0,3785 | | |
| A-28 *** | 7703-473 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,4461 | 0,4461 | 0,0000 | 0,0000 |
| CAPECITABINE ACCORD 500 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC06 | | | | |
| A-28 | 3036-043 | 120 comprimés pelliculés, 500 mg | 120 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | 3036-043 | | | | | 133,22 | 133,22 | | |
| A-28 * | 7703-481 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2360 | 1,2360 | | | |
| A-28 ** | 7703-481 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,1768 | 1,1768 | | | |
| A-28 *** | 7703-481 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2614 | 1,2614 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CAPTOPRIL EG 100 mg | | EG | | ATC: C09AA01 | | | | | |
| B-21 | 1622-745 | 60 comprimés, 100 mg | 60 tabletten, 100 mg | G | 13,43 | 13,43 | 1,60 | 2,66 | |
| | 1622-745 | | | | 6,02 | 6,02 | | | |
| B-21 * | 0766-774 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1295 | 0,1295 | | | |
| B-21 ** | 0766-774 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1063 | 0,1063 | | | |
| B-21 *** | 0766-774 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1316 | 0,1316 | 0,0267 | 0,0443 | |
| CAPTOPRIL EG 50 mg | | EG | | ATC: C09AA01 | | | | | |
| B-21 | 1770-700 | 60 comprimés, 50 mg | 60 tabletten, 50 mg | G | 10,28 | 10,28 | 0,96 | 1,60 | |
| | 1770-700 | | | | 3,62 | 3,62 | | | |
| B-21 * | 0766-766 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0778 | 0,0778 | | | |
| B-21 ** | 0766-766 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0640 | 0,0640 | | | |
| B-21 *** | 0766-766 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0791 | 0,0791 | 0,0160 | 0,0267 | |
| CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA02 | | | | | |
| | 7703-291 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 40,83 | 40,83 | | | |
| A-23 * | 7703-291 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 50,3900 | 50,3900 | | | |
| A-23 ** | 7703-291 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 43,2800 | 43,2800 | | | |
| CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA02 | | | | | |
| | 7703-309 | 1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 112,50 | 112,50 | | | |
| A-23 * | 7703-309 | 1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 126,3600 | 126,3600 | | | |
| A-23 ** | 7703-309 | 1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 119,2500 | 119,2500 | | | |
| CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA02 | | | | | |
| | 7702-053 | 1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 149,99 | 149,99 | | | |
| A-23 * | 7702-053 | 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 166,1000 | 166,1000 | | | |
| A-23 ** | 7702-053 | 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 158,9900 | 158,9900 | | | |
| CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA02 | | | | | |
| | 0753-327 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 15,47 | 15,47 | | | |
| A-23 * | 0753-327 | 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 19,9600 | 19,9600 | | | |
| A-23 ** | 0753-327 | 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 16,4000 | 16,4000 | | | |
| CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA02 | | | | | |
| | 7703-358 | 1 flacon injectable 15 ml solution | 1 injectieflacon 15 ml | | 40,83 | 40,83 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|------|------|
| A-23 * | 7703-358 | <i>à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</i> 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | <i>concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</i> 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 50,3900 | 50,3900 | | |
| A-23 ** | 7703-358 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 43,2800 | 43,2800 | | |
| CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA02 | | | | |
| A-23 * | 7703-366 | 1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 45 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 112,50 | 112,50 | | |
| A-23 * | 7703-366 | 1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 126,3600 | 126,3600 | | |
| A-23 ** | 7703-366 | 1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 119,2500 | 119,2500 | | |
| CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA02 | | | | |
| A-23 * | 7703-341 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 15,30 | 15,30 | | |
| A-23 * | 7703-341 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 19,7400 | 19,7400 | | |
| A-23 ** | 7703-341 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 16,2200 | 16,2200 | | |
| CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA02 | | | | |
| A-23 * | 7703-374 | 1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 60 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 149,99 | 149,99 | | |
| A-23 * | 7703-374 | 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 166,1000 | 166,1000 | | |
| A-23 ** | 7703-374 | 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 158,9900 | 158,9900 | | |
| CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain | | Pfizer | | ATC: L01XA02 | | | | |
| A-23 * | 0787-499 | 1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 143,32 | 143,32 | | |
| A-23 * | 0787-499 | 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 159,0300 | 159,0300 | | |
| A-23 ** | 0787-499 | 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 151,9200 | 151,9200 | | |
| CARBOSIN 450 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01XA02 | | | | |
| A-23 | 2322-584 | 1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 45 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | R | 134,19 | 134,19 | 0,00 | 0,00 |
| A-23 * | 2322-584 | | | | 112,50 | 112,50 | | |
| A-23 * | 0783-639 | 1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | R | 126,3600 | 126,3600 | | |
| A-23 ** | 0783-639 | 1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | R | 119,2500 | 119,2500 | | |
| CARBOSIN 600 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01XA02 | | | | |
| A-23 | 2322-576 | 1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 60 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | R | 175,29 | 175,29 | 0,00 | 0,00 |
| A-23 * | 2322-576 | | | | 149,99 | 149,99 | | |
| A-23 * | 0783-647 | 1 flacon injectable 60 mL solution | 1 injectieflacon 60 mL oplossing | R | 166,1000 | 166,1000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-23 ** | 0783-647 | pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | R | 158,9900 | 158,9900 | | |
| CARTEABAK 2 % | | THEA PHARMA | | ATC: S01ED05 | | | | |
| B-168 | 2862-274 2862-274 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | G | 10,98 4,16 | 10,98 4,16 | 1,10 | 1,84 |
| B-168 * | 7725-401 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | G | 5,3700 | 5,3700 | | |
| B-168 ** | 7725-401 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | G | 4,4100 | 4,4100 | | |
| CARVEDILOL EG 25 mg | | EG | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2141-240 2141-240 | 56 comprimés, 25 mg | 56 tabletten, 25 mg | G | 15,03 7,25 | 15,03 7,25 | 1,92 | 3,20 |
| B-16 | 2503-795 2503-795 | 98 comprimés, 25 mg | 98 tabletten, 25 mg | G | 23,40 13,68 | 23,40 13,68 | 3,63 | 6,05 |
| B-16 * | 0778-050 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1801 | 0,1801 | | |
| B-16 ** | 0778-050 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1480 | 0,1480 | | |
| B-16 *** | 0778-050 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1824 | 0,1824 | 0,0370 | 0,0617 |
| CARVEDILOL EG 6,25 mg | | EG | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2141-232 2141-232 | 56 comprimés, 6,25 mg | 56 tabletten, 6,25 mg | G | 8,58 2,32 | 8,58 2,32 | 0,62 | 1,03 |
| B-16 | 2503-787 2503-787 | 98 comprimés, 6,25 mg | 98 tabletten, 6,25 mg | G | 11,05 4,21 | 11,05 4,21 | 1,12 | 1,86 |
| B-16 * | 0778-035 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0554 | 0,0554 | | |
| B-16 ** | 0778-035 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0455 | 0,0455 | | |
| B-16 *** | 0778-035 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0562 | 0,0562 | 0,0114 | 0,0190 |
| CARVEDILOL SANDOZ 25 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2071-603 2071-603 | 60 comprimés, 25 mg | 60 tabletten, 25 mg | G | 15,71 7,76 | 15,71 7,76 | 2,06 | 3,43 |
| B-16 | 2564-102 2564-102 | 100 comprimés, 25 mg | 100 tabletten, 25 mg | G | 23,72 13,95 | 23,72 13,95 | 3,70 | 6,17 |
| B-16 * | 0776-179 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1800 | 0,1800 | | |
| B-16 ** | 0776-179 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1479 | 0,1479 | | |
| B-16 *** | 0776-179 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1819 | 0,1819 | 0,0370 | 0,0617 |
| CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 4367-645 4367-645 | 100 comprimés, 25 mg | 100 tabletten, 25 mg | G | 23,72 13,95 | 23,72 13,95 | 3,70 | 6,17 |
| B-16 * | 7734-031 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1800 | 0,1800 | | |
| B-16 ** | 7734-031 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1479 | 0,1479 | | |
| B-16 *** | 7734-031 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1819 | 0,1819 | 0,0370 | 0,0617 |
| CARVEDILOL SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2071-611 2071-611 | 60 comprimés, 50 mg | 60 tabletten, 50 mg | G | 28,33 17,97 | 28,33 17,97 | 4,38 | 7,35 |
| B-16 * | 0775-098 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,3865 | 0,3865 | | |
| B-16 ** | 0775-098 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,3175 | 0,3175 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-16 *** | 0775-098 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,3800 | 0,3800 | 0,0730 | 0,1225 |
| CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2071-637 | 60 comprimés, 6,25 mg | 60 tabletten, 6,25 mg | G | 8,64 | 8,64 | 0,63 | 1,05 |
| | 2071-637 | | | | 2,37 | 2,37 | | |
| B-16 | 2564-086 | 100 comprimés, 6,25 mg | 100 tabletten, 6,25 mg | G | 11,15 | 11,15 | 1,14 | 1,90 |
| | 2564-086 | | | | 4,29 | 4,29 | | |
| B-16 * | 0776-161 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0554 | 0,0554 | | |
| B-16 ** | 0776-161 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0455 | 0,0455 | | |
| B-16 *** | 0776-161 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0562 | 0,0562 | 0,0114 | 0,0190 |
| CARVEDILOL TEVA 25 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2259-240 | 100 comprimés, 25 mg | 100 tabletten, 25 mg | G | 25,07 | 25,07 | 3,92 | 6,59 |
| | 2259-240 | | | | 15,13 | 15,13 | | |
| B-16 * | 0782-102 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1953 | 0,1953 | | |
| B-16 ** | 0782-102 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1604 | 0,1604 | | |
| B-16 *** | 0782-102 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,1954 | 0,1954 | 0,0392 | 0,0659 |
| CARVEDILOL TEVA 6,25 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 2259-190 | 100 comprimés, 6,25 mg | 100 tabletten, 6,25 mg | G | 11,15 | 11,15 | 1,14 | 1,90 |
| | 2259-190 | | | | 4,29 | 4,29 | | |
| B-16 * | 0782-094 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0554 | 0,0554 | | |
| B-16 ** | 0782-094 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0455 | 0,0455 | | |
| B-16 *** | 0782-094 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | G | 0,0562 | 0,0562 | 0,0114 | 0,0190 |
| CATAFLAM | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 0444-166 | 30 comprimés enrobés, 50 mg | 30 omhulde tabletten, 50 mg | R | 8,83 | 8,83 | 0,67 | 1,11 |
| | 0444-166 | | | | 2,51 | 2,51 | | |
| B-60 * | 0734-137 | 1 comprimé enrobé, 50 mg | 1 omhulde tablet, 50 mg | R | 0,1080 | 0,1080 | | |
| B-60 ** | 0734-137 | 1 comprimé enrobé, 50 mg | 1 omhulde tablet, 50 mg | R | 0,0887 | 0,0887 | | |
| B-60 *** | 0734-137 | 1 comprimé enrobé, 50 mg | 1 omhulde tablet, 50 mg | R | 0,1099 | 0,1099 | 0,0223 | 0,0370 |
| CATAPRESSAN | | BEPHARBEL | | ATC: C02AC01 | | | | |
| B-17 | 0029-546 | 5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml | 5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml | | 8,64 | 8,64 | 0,63 | 1,05 |
| | 0029-546 | | | | 2,37 | 2,37 | | |
| B-17 * | 0702-563 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL | | 0,6120 | 0,6120 | | |
| B-17 ** | 0702-563 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL | | 0,5020 | 0,5020 | | |
| CATAPRESSAN 0,15 mg | | BEPHARBEL | | ATC: C02AC01 | | | | |
| B-17 | 1115-013 | 100 comprimés, 0,15 mg | 100 tabletten, 0,15 mg | | 15,50 | 15,50 | 2,02 | 3,36 |
| | 1115-013 | | | | 7,61 | 7,61 | | |
| B-17 * | 0702-571 | 1 comprimé, 0,15 mg | 1 tablet, 0,15 mg | | 0,0982 | 0,0982 | | |
| B-17 ** | 0702-571 | 1 comprimé, 0,15 mg | 1 tablet, 0,15 mg | | 0,0807 | 0,0807 | | |
| B-17 *** | 0702-571 | 1 comprimé, 0,15 mg | 1 tablet, 0,15 mg | | 0,0996 | 0,0996 | 0,0202 | 0,0336 |
| CEDOCARD | | EUROCEPT | | ATC: C01DA08 | | | | |
| | 0728-477 | 10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | 10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | | 11,98 | 11,98 | | |
| B-3 * | 0728-477 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de | 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel | | 1,5460 | 1,5460 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-3 ** | 0728-477 | l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | | 1,2700 | 1,2700 | | |
| CEDOCARD | | EUROCEPT | | ATC: C01DA08 | | | | |
| B-3 | 0029-710 0029-710 | 60 comprimés, 5 mg | 60 tabletten, 5 mg | | 7,62 1,48 | 7,62 1,48 | 0,39 | 0,65 |
| B-3 * | 0702-621 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0318 | 0,0318 | | |
| B-3 ** | 0702-621 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0262 | 0,0262 | | |
| B-3 *** | 0702-621 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0348 | 0,0348 | 0,0065 | 0,0108 |
| CEDOCARD 20 | | EUROCEPT | | ATC: C01DA08 | | | | |
| B-3 | 0029-686 0029-686 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | | 11,17 4,30 | 11,17 4,30 | 1,14 | 1,90 |
| B-3 * | 0702-647 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | | 0,0555 | 0,0555 | | |
| B-3 ** | 0702-647 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | | 0,0456 | 0,0456 | | |
| B-3 *** | 0702-647 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | | 0,0564 | 0,0564 | 0,0114 | 0,0190 |
| CEFADROXIL SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: J01DB05 | | | | |
| C-37 | 1756-733 1756-733 | 16 gélules, 500 mg | 16 capsules, hard, 500 mg | G | 8,54 2,29 | 8,54 2,29 | 2,02 | 2,02 |
| C-37 * | 0774-083 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1850 | 0,1850 | | |
| C-37 ** | 0774-083 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1519 | 0,1519 | | |
| C-37 *** | 0774-083 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | G | 0,1882 | 0,1882 | 0,1262 | 0,1262 |
| CEFAZOLINE SANDOZ 1g | | SANDOZ | | ATC: J01DB04 | | | | |
| B-110 | 2218-204 2218-204 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | G | 23,19 13,50 | 23,19 13,50 | 3,58 | 5,97 |
| B-110 * | 0769-232 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | G | 1,7420 | 1,7420 | | |
| B-110 ** | 0769-232 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | G | 1,4310 | 1,4310 | | |
| CEFAZOLINE SANDOZ 2 g | | SANDOZ | | ATC: J01DB04 | | | | |
| | 0769-240 | 10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g | 10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g | | 31,01 | 31,01 | | |
| B-110 * | 0769-240 | 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g | G | 3,9980 | 3,9980 | | |
| B-110 ** | 0769-240 | 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g | G | 3,2870 | 3,2870 | | |
| CEFAZOLINE VIATRIS 1 g | | VIATRIS | | ATC: J01DB04 | | | | |
| | 0790-782 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g | | 14,37 | 14,37 | | |
| B-110 * | 0790-782 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 1,8540 | 1,8540 | | |
| B-110 ** | 0790-782 | 1 flacon injectable 1 g solution | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor | G | 1,5230 | 1,5230 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | | | | | | |
| CEFAZOLINE VIATRIS 2 g | | VIATRIS | | ATC: J01DB04 | | | | | |
| B-110 * | 0790-774 | 10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g | 10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g | | 29,14 | 29,14 | | | |
| | 0790-774 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | G | 3,7610 | 3,7610 | | | |
| B-110 ** | 0790-774 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | G | 3,0890 | 3,0890 | | | |
| CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DE01 | | |
| B-112 ** | 0756-874 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g | | 5,62 | 5,62 | | | |
| | 0756-874 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 5,9600 | 5,9600 | | | |
| CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DE01 | | |
| B-112 ** | 0756-866 | 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g | | 11,12 | 11,12 | | | |
| | 0756-866 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 11,7900 | 11,7900 | | | |
| CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg | | BIOQ PHARMA B.V. | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DE01 | | |
| B-112 ** | 7735-046 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g | | 5,62 | 5,62 | | | |
| | 7735-046 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 5,9600 | 5,9600 | | | |
| CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg | | BIOQ PHARMA B.V. | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DE01 | | |
| B-112 ** | 7735-053 | 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g | 1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g | | 11,12 | 11,12 | | | |
| | 7735-053 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 11,7900 | 11,7900 | | | |
| CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DD02 | | |
| | 0795-047 | 1 flacon injectable 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg poeder | | 5,68 | 5,68 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|---|--------------------|---|---------|--------------|--|
| B-112 ** | 0795-047 | poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | G | 6,0200 | 6,0200 | | |
| CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg | | | | FRESENIUS KABI | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD02 | |
| B-112 ** | 0795-054 | 1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | G | 11,8800 | 11,8800 | | |
| CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg | | | | FRESENIUS KABI | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD02 | |
| B-112 ** | 0795-039 | 1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | G | 3,1000 | 3,1000 | | |
| CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g | | | | VIATRIS | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD02 | |
| B-112 ** | 7714-934 | 5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g | 5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 6,0160 | 6,0160 | | |
| CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g | | | | VIATRIS | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD02 | |
| B-112 ** | 7714-942 | 5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | G | 11,8820 | 11,8820 | | |
| CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g | | | | FRESENIUS KABI | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD04 | |
| B-112 ** | 0792-127 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | G | 4,4330 | 4,4330 | | |
| CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g | | | | FRESENIUS KABI | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD04 | |
| B-112 ** | 0792-531 | 10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g | 10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g | G | 8,7660 | 8,7660 | | |
| CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g | | | | GRINDEKS - KALCEKS | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD04 | |
| B-112 ** | 7739-626 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 4,4330 | 4,4330 | | |
| CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g | | | | GRINDEKS - KALCEKS | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DD04 | |
| B-112 ** | 7739-634 | 10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | G | 8,7700 | 8,7700 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DC02 | | | |
| B-111 ** | 0797-282 0797-282 | 10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg 1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg | 10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg 1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg | G | 32,17 3,4100 | 32,17 3,4100 | | | |
| CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DC02 | | | |
| B-111 ** | 0797-274 0797-274 | 10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg 1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg | 10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg 1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg | G | 32,17 3,4100 | 32,17 3,4100 | | | |
| CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01DC02 | | | |
| B-111 ** | 0797-258 0797-258 | 10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg 1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg | 10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg 1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg | G | 16,09 1,7060 | 16,09 1,7060 | | | |
| CEFUROXIM SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | | | ATC: J01DC02 | | | |
| C-37 | 2217-941 2217-941 | 10 comprimés, 250 mg | 10 tabletten, 250 mg | G | 8,48 2,23 | 8,48 2,23 | 1,97 | 1,97 | |
| C-37 * | 0779-777 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,2880 | 0,2880 | | | |
| C-37 ** | 0779-777 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,2360 | 0,2360 | | | |
| C-37 *** | 0779-777 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,2947 | 0,2947 | 0,1970 | 0,1970 | |
| CEFUROXIM SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | | | ATC: J01DC02 | | | |
| C-37 | 3008-406 3008-406 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 16,31 8,23 | 16,31 8,23 | 7,27 | 7,27 | |
| C-37 * | 7702-020 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5310 | 0,5310 | | | |
| C-37 ** | 7702-020 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4360 | 0,4360 | | | |
| C-37 *** | 7702-020 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5390 | 0,5390 | 0,3635 | 0,3635 | |
| CEFUROXIM SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | | | ATC: J01DC02 | | | |
| C-37 | 2217-958 2217-958 | 10 comprimés, 500 mg | 10 tabletten, 500 mg | G | 11,29 4,39 | 11,29 4,39 | 3,88 | 3,88 | |
| C-37 | 2217-966 2217-966 | 24 comprimés, 500 mg | 24 tabletten, 500 mg | G | 18,25 9,71 | 18,25 9,71 | 8,58 | 8,58 | |
| C-37 * | 0779-785 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,5221 | 0,5221 | | | |
| C-37 ** | 0779-785 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,4288 | 0,4288 | | | |
| C-37 *** | 0779-785 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,5300 | 0,5300 | 0,3575 | 0,3575 | |
| CEFUROXIME EG 500 mg | | EG | | | | ATC: J01DC02 | | | |
| C-37 | 2813-442 2813-442 | 10 comprimés pelliculés, 500 mg | 10 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 11,29 4,39 | 11,29 4,39 | 3,88 | 3,88 | |
| C-37 | 3604-816 3604-816 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 16,32 8,24 | 16,32 8,24 | 7,28 | 7,28 | |
| C-37 | 2815-306 2815-306 | 24 comprimés pelliculés, 500 mg | 24 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 18,77 10,10 | 18,77 10,10 | 8,93 | 8,93 | |
| C-37 * | 0756-270 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5429 | 0,5429 | | | |
| C-37 ** | 0756-270 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4463 | 0,4463 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| C-37 *** | 0756-270 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5516 | 0,5516 | 0,3721 | 0,3721 |
| CELESTONE | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: H02AB01 | | | |
| B-83 | 0105-692 | 1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml | | 7,60 | 7,60 | 0,39 | 0,65 |
| | 0105-692 | | | | 1,46 | 1,46 | | |
| B-83 * | 0702-753 | 1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL | | 0,0627 | 0,0627 | | |
| B-83 ** | 0702-753 | 1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL | | 0,0517 | 0,0517 | | |
| CELESTONE CHRONODOSE | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: H02AB01 | | | |
| B-83 | 0105-700 | 1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml | | 8,90 | 8,90 | 0,68 | 1,14 |
| | 0105-700 | | | | 2,57 | 2,57 | | |
| B-83 * | 0702-761 | 1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL | | 3,3200 | 3,3200 | | |
| B-83 ** | 0702-761 | 1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL | | 2,7200 | 2,7200 | | |
| CELLCEPT 250 mg | | ROCHE | | | ATC: L04AA06 | | | |
| A-29 | 1223-148 | 300 gélules, 250 mg | 300 capsules, hard, 250 mg | R | 131,92 | 131,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 1223-148 | | | | 110,43 | 110,43 | | |
| A-29 * | 0748-236 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 0,4139 | 0,4139 | | |
| A-29 ** | 0748-236 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 0,3902 | 0,3902 | | |
| A-29 *** | 0748-236 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 0,4213 | 0,4213 | 0,0000 | 0,0000 |
| CELLCEPT 500 mg | | ROCHE | | | ATC: L04AA06 | | | |
| A-29 | 1223-155 | 150 comprimés pelliculés, 500 mg | 150 filmomhulde tabletten, 500 mg | R | 131,92 | 131,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 1223-155 | | | | 110,43 | 110,43 | | |
| A-29 * | 0748-244 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,8278 | 0,8278 | | |
| A-29 ** | 0748-244 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,7804 | 0,7804 | | |
| A-29 *** | 0748-244 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,8426 | 0,8426 | 0,0000 | 0,0000 |
| CELLCEPT I.V. | | ROCHE | | | ATC: L04AA06 | | | |
| | 0764-605 | 4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg | 4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg | | 23,50 | 23,50 | | |
| A-29 * | 0764-605 | 1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg | R | 7,5825 | 7,5825 | | |
| A-29 ** | 0764-605 | 1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg | R | 6,2275 | 6,2275 | | |
| CELLCEPT suspension buvable | | ROCHE | | | ATC: L04AA06 | | | |
| A-29 | 1468-172 | 1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml | 1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml | R | 68,09 | 68,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 1468-172 | | | | 52,58 | 52,58 | | |
| A-29 * | 0768-119 | 5 mL suspension buvable, 200 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL | R | 1,7954 | 1,7954 | | |
| A-29 ** | 0768-119 | 5 mL suspension buvable, 200 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL | R | 1,5923 | 1,5923 | | |
| CELLTOP 50 mg | | BAXTER | | | ATC: L01CB01 | | | |
| A-28 | 1524-206 | 20 capsules molles, 50 mg | 20 capsules, zacht, 50 mg | R | 48,33 | 48,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 1524-206 | | | | 35,37 | 35,37 | | |
| A-28 * | 0762-211 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | R | 2,2300 | 2,2300 | | |
| A-28 ** | 0762-211 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | R | 1,8745 | 1,8745 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-28 *** | 0762-211 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | R | 2,1396 | 2,1396 | 0,0000 | 0,0000 |
| CERTICAN 0,25 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AH02 | | | | |
| A-29 | 2156-255 2156-255 | 60 comprimés, 0,25 mg | 60 tabletten, 0,25 mg | R | 69,96 54,20 | 69,96 54,20 | 0,00 | 0,00 |
| A-29 * | 0779-884 | 1 comprimé, 0,25 mg | 1 tablet, 0,25 mg | R | 1,0760 | 1,0760 | | |
| A-29 ** | 0779-884 | 1 comprimé, 0,25 mg | 1 tablet, 0,25 mg | R | 0,9575 | 0,9575 | | |
| A-29 *** | 0779-884 | 1 comprimé, 0,25 mg | 1 tablet, 0,25 mg | R | 1,0738 | 1,0738 | 0,0000 | 0,0000 |
| CERTICAN 0,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AH02 | | | | |
| A-29 | 2156-271 2156-271 | 60 comprimés, 0,5 mg | 60 tabletten, 0,5 mg | R | 129,71 108,42 | 129,71 108,42 | 0,00 | 0,00 |
| A-29 * | 0779-892 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | R | 2,0340 | 2,0340 | | |
| A-29 ** | 0779-892 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | R | 1,9155 | 1,9155 | | |
| A-29 *** | 0779-892 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | R | 2,0697 | 2,0697 | 0,0000 | 0,0000 |
| CERTICAN 0,75 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AH02 | | | | |
| A-29 | 2156-289 2156-289 | 60 comprimés, 0,75 mg | 60 tabletten, 0,75 mg | R | 189,14 162,62 | 189,14 162,62 | 0,00 | 0,00 |
| A-29 * | 0779-900 | 1 comprimé, 0,75 mg | 1 tablet, 0,75 mg | R | 2,9915 | 2,9915 | | |
| A-29 ** | 0779-900 | 1 comprimé, 0,75 mg | 1 tablet, 0,75 mg | R | 2,8730 | 2,8730 | | |
| A-29 *** | 0779-900 | 1 comprimé, 0,75 mg | 1 tablet, 0,75 mg | R | 3,0600 | 3,0600 | 0,0000 | 0,0000 |
| CERUBIDINE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: L01DB02 | | | | |
| | 0702-878 | 1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 16,52 | 16,52 | | |
| A-25 * | 0702-878 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 21,3200 | 21,3200 | | |
| A-25 ** | 0702-878 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 17,5100 | 17,5100 | | |
| CETIRIZIN AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: R06AE07 | | | | |
| Cs-7 | 3612-298 3612-298 | 20 comprimés pelliculés, 10 mg | 20 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 7,81 1,65 | 7,81 1,65 | 1,75 | 1,75 |
| Cs-7 | 3612-314 3612-314 | 50 comprimés pelliculés, 10 mg | 50 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,47 3,77 | 10,47 3,77 | 4,00 | 4,00 |
| Cs-7 | 3612-322 3612-322 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 14,39 6,76 | 14,39 6,76 | 7,17 | 7,17 |
| Cs-7 * | 7720-451 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | |
| Cs-7 ** | 7720-451 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0717 | 0,0717 | | |
| Cs-7 *** | 7720-451 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0886 | 0,0886 | 0,0717 | 0,0717 |
| CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: R06AE07 | | | | |
| Cs-7 | 4830-923 4830-923 | 20 comprimés pelliculés, 10 mg | 20 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 7,73 1,57 | 7,73 1,57 | 1,67 | 1,67 |
| Cs-7 | 4830-931 4830-931 | 50 comprimés pelliculés, 10 mg | 50 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,47 3,77 | 10,47 3,77 | 4,00 | 4,00 |
| Cs-7 | 4830-949 4830-949 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 14,39 6,76 | 14,39 6,76 | 7,17 | 7,17 |
| Cs-7 * | 7742-521 | 1 comprimé péliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | |
| Cs-7 ** | 7742-521 | 1 comprimé péliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0717 | 0,0717 | | |
| Cs-7 *** | 7742-521 | 1 comprimé péliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0886 | 0,0886 | 0,0717 | 0,0717 |

| CETIRIZINE EG 10 mg | | EG | | ATC: R06AE07 | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| Cs-7 | 1736-248 1736-248 | 50 comprimés pelliculés, 10 mg | 50 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,98 4,16 | 10,98 4,16 | 4,41 | 4,41 | |
| Cs-7 | 2544-997 2544-997 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 15,35 7,49 | 15,35 7,49 | 7,94 | 7,94 | |
| Cs-7 * | 0771-188 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0967 | 0,0967 | | | |
| Cs-7 ** | 0771-188 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | | | |
| Cs-7 *** | 0771-188 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0982 | 0,0982 | 0,0794 | 0,0794 | |
| CETIRIZINE SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: R06AE07 | | | | | |
| Cs-7 | 1690-510 1690-510 | 20 comprimés pelliculés, 10 mg | 20 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 7,82 1,66 | 7,82 1,66 | 1,76 | 1,76 | |
| Cs-7 | 1738-947 1738-947 | 50 comprimés pelliculés, 10 mg | 50 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,98 4,16 | 10,98 4,16 | 4,41 | 4,41 | |
| Cs-7 | 2582-179 2582-179 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 15,15 7,34 | 15,15 7,34 | 7,79 | 7,79 | |
| Cs-7 * | 0792-572 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0947 | 0,0947 | | | |
| Cs-7 ** | 0792-572 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0778 | 0,0778 | | | |
| Cs-7 *** | 0792-572 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0961 | 0,0961 | 0,0779 | 0,0779 | |
| CETIRIZINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R06AE07 | | | | | |
| Cs-7 | 3028-040 3028-040 | 20 comprimés pelliculés, 10 mg | 20 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 7,73 1,57 | 7,73 1,57 | 1,67 | 1,67 | |
| Cs-7 | 3028-057 3028-057 | 50 comprimés pelliculés, 10 mg | 50 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,98 4,16 | 10,98 4,16 | 4,41 | 4,41 | |
| Cs-7 | 3028-065 3028-065 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 15,15 7,34 | 15,15 7,34 | 7,79 | 7,79 | |
| Cs-7 * | 0773-283 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0947 | 0,0947 | | | |
| Cs-7 ** | 0773-283 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0778 | 0,0778 | | | |
| Cs-7 *** | 0773-283 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0961 | 0,0961 | 0,0779 | 0,0779 | |
| CETISANDOZ 1 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: R06AE07 | | | | | |
| Cs-7 | 2274-611 2274-611 | 1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml | G | 8,45 2,21 | 8,45 2,21 | 2,34 | 2,34 | |
| Cs-7 * | 0782-342 | 10 mL solution buvable, 1 mg/mL | 10 mL drank, 1 mg/mL | G | 0,1425 | 0,1425 | | | |
| Cs-7 ** | 0782-342 | 10 mL solution buvable, 1 mg/mL | 10 mL drank, 1 mg/mL | G | 0,1170 | 0,1170 | | | |
| CHOLECOMB 10 mg/10 mg | | SERVIER BENELUX | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | | | |
| B-289 | 4484-747 4484-747 | 30 gélules, 10 mg/ 10 mg | 30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 26,57 16,44 | 26,57 16,44 | 4,13 | 6,94 | |
| B-289 | 4484-754 4484-754 | 90 gélules, 10 mg/ 10 mg | 90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 54,67 40,90 | 54,67 40,90 | 8,04 | 13,54 | |
| B-289 * | 7736-507 | 1 gélule, 10 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | | |
| B-289 ** | 7736-507 | 1 gélule, 10 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | | |
| B-289 *** | 7736-507 | 1 gélule, 10 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 | |
| CHOLECOMB 20 mg/10 mg | | SERVIER BENELUX | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | | | |
| B-289 | 4484-762 | 30 gélules, 20 mg/ 10 mg | 30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg | R | 26,79 | 26,79 | 4,16 | 6,99 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-289 | 4484-762 4484-770 | 90 gélules, 20 mg/ 10 mg | 90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg | R | 16,63 54,67 | 16,63 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4484-770 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7736-515 | 1 gélule, 20 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7736-515 | 1 gélule, 20 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7736-515 | 1 gélule, 20 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 2118-354 2118-354 | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,44 6,80 | 14,44 6,80 | 1,80 | 3,01 |
| B-41 * | 0777-276 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1045 | 0,1045 | | |
| B-41 ** | 0777-276 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0858 | 0,0858 | | |
| B-41 *** | 0777-276 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1060 | 0,1060 | 0,0214 | 0,0358 |
| CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 2118-339 2118-339 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 21,00 11,80 | 21,00 11,80 | 3,13 | 5,22 |
| B-41 * | 0777-284 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1554 | 0,1554 | | |
| B-41 ** | 0777-284 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1277 | 0,1277 | | |
| B-41 *** | 0777-284 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1578 | 0,1578 | 0,0319 | 0,0533 |
| CILOXAN NOVARTIS PHARMA ATC: S01AE03 | | | | | | | | |
| B-162 | 1085-141 1085-141 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml | R | 7,78 1,62 | 7,78 1,62 | 0,43 | 0,72 |
| B-162 * | 0746-685 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL | R | 2,0900 | 2,0900 | | |
| B-162 ** | 0746-685 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL | R | 1,7200 | 1,7200 | | |
| CIPRAMIL 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB04 | | | | | | | | |
| B-73 | 0497-388 0497-388 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 13,79 6,30 | 13,79 6,30 | 1,67 | 2,78 |
| B-73 * | 0737-072 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2904 | 0,2904 | | |
| B-73 ** | 0737-072 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2386 | 0,2386 | | |
| B-73 *** | 0737-072 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2949 | 0,2949 | 0,0596 | 0,0993 |
| CIPRAMIL 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N06AB04 | | | | | | | | |
| B-73 | 2990-869 2990-869 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 13,79 6,30 | 13,79 6,30 | 1,67 | 2,78 |
| B-73 * | 7700-768 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2904 | 0,2904 | | |
| B-73 ** | 7700-768 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2386 | 0,2386 | | |
| B-73 *** | 7700-768 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2949 | 0,2949 | 0,0596 | 0,0993 |
| CIPROFLOXACINE AB 250 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 7719-859 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 2,89 | 2,89 | | |
| C-37 * | 7719-859 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3730 | 0,3730 | | |
| C-37 ** | 7719-859 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3060 | 0,3060 | | |
| CIPROFLOXACINE AB 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 7719-867 | 20 comprimés pelliculés, 500 | 20 filmomhulde tabletten, 500 | | 8,35 | 8,35 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--|--|
| C-37 * | 7719-867 | <i>mg</i> 1 comprimé pelliculé, 500 mg | <i>mg</i> 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5390 | 0,5390 | | |
| C-37 ** | 7719-867 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4425 | 0,4425 | | |
| CIPROFLOXACINE AB 750 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 7719-099 | 20 comprimés pelliculés, 750 mg | 20 filmomhulde tabletten, 750 mg | | 13,70 | 13,70 | | |
| C-37 * | 7719-099 | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | G | 0,8840 | 0,8840 | | |
| C-37 ** | 7719-099 | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | G | 0,7260 | 0,7260 | | |
| CIPROFLOXACINE EG 250 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0773-648 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 2,89 | 2,89 | | |
| C-37 * | 0773-648 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3730 | 0,3730 | | |
| C-37 ** | 0773-648 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3060 | 0,3060 | | |
| CIPROFLOXACINE EG 500 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0773-655 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 8,35 | 8,35 | | |
| C-37 * | 0773-655 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5390 | 0,5390 | | |
| C-37 ** | 0773-655 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4425 | 0,4425 | | |
| CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0794-206 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 8,35 | 8,35 | | |
| C-37 * | 0794-206 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5390 | 0,5390 | | |
| C-37 ** | 0794-206 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4425 | 0,4425 | | |
| CIPROFLOXACINE EG 750 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0773-663 | 20 comprimés pelliculés, 750 mg | 20 filmomhulde tabletten, 750 mg | | 13,70 | 13,70 | | |
| C-37 * | 0773-663 | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | G | 0,8840 | 0,8840 | | |
| C-37 ** | 0773-663 | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | G | 0,7260 | 0,7260 | | |
| CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0793-612 | 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 7,30 | 7,30 | | |
| B-125 * | 0793-612 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 9,4200 | 9,4200 | | |
| B-125 ** | 0793-612 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 7,7400 | 7,7400 | | |
| CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0788-174 | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 7,30 | 7,30 | | |
| B-125 * | 0788-174 | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 9,4200 | 9,4200 | | |
| B-125 ** | 0788-174 | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 7,7400 | 7,7400 | | |
| CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex) ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02 | | | | | | | | |
| | 0756-148 | 1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 7,02 | 7,02 | | |
| B-125 * | 0756-148 | 1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion | 1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 9,0600 | 9,0600 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--|--|
| B-125 ** | 0756-148 | (intraveineuse), 2 mg/mL 1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 7,4400 | 7,4400 | | |
| CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| B-125 * | 0793-620 | 1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 11,91 | 11,91 | | |
| | 0793-620 | 1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 15,3700 | 15,3700 | | |
| B-125 ** | 0793-620 | 1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 12,6200 | 12,6200 | | |
| CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex) | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| B-125 * | 0756-130 | 1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 11,91 | 11,91 | | |
| | 0756-130 | 1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 15,3700 | 15,3700 | | |
| B-125 ** | 0756-130 | 1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 12,6200 | 12,6200 | | |
| CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| C-37 * | 0771-204 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 2,89 | 2,89 | | |
| | 0771-204 | 1 comprimé enrobé, 250 mg | 1 omhulde tablet, 250 mg | G | 0,3730 | 0,3730 | | |
| C-37 ** | 0771-204 | 1 comprimé enrobé, 250 mg | 1 omhulde tablet, 250 mg | G | 0,3060 | 0,3060 | | |
| CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| C-37 * | 0771-212 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 8,35 | 8,35 | | |
| | 0771-212 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | G | 0,5390 | 0,5390 | | |
| C-37 ** | 0771-212 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | G | 0,4425 | 0,4425 | | |
| CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| C-37 * | 7731-870 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 8,35 | 8,35 | | |
| | 7731-870 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5390 | 0,5390 | | |
| C-37 ** | 7731-870 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4425 | 0,4425 | | |
| CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| C-37 * | 0771-790 | 20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg | 20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg | | 13,70 | 13,70 | | |
| | 0771-790 | 1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg | 1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg | G | 0,8840 | 0,8840 | | |
| C-37 ** | 0771-790 | 1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg | 1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg | G | 0,7260 | 0,7260 | | |
| CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |
| C-37 * | 0798-611 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 7,98 | 7,98 | | |
| | 0798-611 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5150 | 0,5150 | | |
| C-37 ** | 0798-611 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4230 | 0,4230 | | |
| CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA02 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------------|--|
| | 0783-035 | 10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 68,72 | 68,72 | | |
| B-125 * | 0783-035 | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 7,9950 | 7,9950 | | |
| B-125 ** | 0783-035 | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 7,2840 | 7,2840 | | |
| CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA02 | |
| | 0768-572 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 3,04 | 3,04 | | |
| C-37 * | 0768-572 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3920 | 0,3920 | | |
| C-37 ** | 0768-572 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3220 | 0,3220 | | |
| CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA02 | |
| | 0783-043 | 10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 123,47 | 123,47 | | |
| B-125 * | 0783-043 | 1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 13,7990 | 13,7990 | | |
| B-125 ** | 0783-043 | 1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 13,0880 | 13,0880 | | |
| CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA02 | |
| | 0769-208 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 8,38 | 8,38 | | |
| C-37 * | 0769-208 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5405 | 0,5405 | | |
| C-37 ** | 0769-208 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4440 | 0,4440 | | |
| CIPROXINE | | AMDIPHARM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA02 | |
| | 0737-833 | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 6,38 | 6,38 | | |
| B-125 * | 0737-833 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | R | 8,2300 | 8,2300 | | |
| B-125 ** | 0737-833 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | R | 6,7600 | 6,7600 | | |
| CIPROXINE | | AMDIPHARM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA02 | |
| | 0770-610 | 2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml | 2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml | | 14,39 | 14,39 | | |
| C-37 * | 0770-610 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,4643 | 0,4643 | | |
| C-37 ** | 0770-610 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,3813 | 0,3813 | | |
| CIPROXINE 500 | | AMDIPHARM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA02 | |
| | 0739-466 | 20 comprimés, 500 mg | 20 tabletten, 500 mg | | 8,35 | 8,35 | | |
| C-37 * | 0739-466 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,5390 | 0,5390 | | |
| C-37 ** | 0739-466 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,4425 | 0,4425 | | |
| CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/mL | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: M03AC11 | |
| | 0752-519 | 1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 1,62 | 1,62 | | |
| B-140 * | 0752-519 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 2,0900 | 2,0900 | | |
| B-140 ** | 0752-519 | 1 ampoule 5 mL solution pour | 1 ampul 5 mL oplossing voor | G | 1,7200 | 1,7200 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | perfusion et injection, 2 mg/mL | infusie en injectie, 2 mg/mL | | | | | | |
| CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: M03AC11 | | | | | |
| | 0751-065 | 1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 0,80 | 0,80 | | | |
| B-140 * | 0751-065 | 1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 1,0300 | 1,0300 | | | |
| B-140 ** | 0751-065 | 1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 0,8500 | 0,8500 | | | |
| CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: M03AC11 | | | | | |
| | 0752-501 | 1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 3,23 | 3,23 | | | |
| B-140 * | 0752-501 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 4,1700 | 4,1700 | | | |
| B-140 ** | 0752-501 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 3,4200 | 3,4200 | | | |
| CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: M03AC11 | | | | | |
| | 7740-590 | 5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | | 6,20 | 6,20 | | | |
| B-140 * | 7740-590 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 1,6000 | 1,6000 | | | |
| B-140 ** | 7740-590 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 1,3140 | 1,3140 | | | |
| CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: M03AC11 | | | | | |
| | 7740-582 | 5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | | 12,41 | 12,41 | | | |
| B-140 * | 7740-582 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 3,2040 | 3,2040 | | | |
| B-140 ** | 7740-582 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 2,6300 | 2,6300 | | | |
| CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA01 | | | | | |
| | 0752-956 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 23,64 | 23,64 | | | |
| A-23 * | 0752-956 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 30,5100 | 30,5100 | | | |
| A-23 ** | 0752-956 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 25,0600 | 25,0600 | | | |
| CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA01 | | | | | |
| | 0752-964 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 5,40 | 5,40 | | | |
| A-23 * | 0752-964 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 6,9700 | 6,9700 | | | |
| A-23 ** | 0752-964 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 5,7200 | 5,7200 | | | |
| CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01XA01 | | | | | |
| | 7702-871 | 1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 41,93 | 41,93 | | | |
| A-23 * | 7702-871 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | G | 51,5600 | 51,5600 | | | |
| A-23 ** | 7702-871 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | G | 44,4500 | 44,4500 | | | |

| CISPLATINE TEVA 1 mg/ml | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01XA01 | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 0797-977 | 1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 41,09 | 41,09 | | |
| A-23 * | 0797-977 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 50,6700 | 50,6700 | | |
| A-23 ** | 0797-977 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 43,5600 | 43,5600 | | |
| CISPLATINE TEVA 1 mg/ml | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01XA01 | | |
| | 0797-969 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 23,16 | 23,16 | | |
| A-23 * | 0797-969 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 29,8900 | 29,8900 | | |
| A-23 ** | 0797-969 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 24,5500 | 24,5500 | | |
| CITALOPRAM AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | | | ATC: N06AB04 | | |
| B-73 | 4510-038 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 13,78 | 13,78 | 1,67 | 2,78 |
| | 4510-038 | | | | 6,29 | 6,29 | | |
| B-73 | 4510-020 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 27,87 | 27,87 | 4,31 | 7,24 |
| | 4510-020 | | | | 17,57 | 17,57 | | |
| B-73 * | 7734-908 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 7734-908 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 7734-908 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | 0,0440 | 0,0739 |
| CITALOPRAM EG 20 mg | | EG | | | | ATC: N06AB04 | | |
| B-73 | 2116-945 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,19 | 29,19 | 4,50 | 7,55 |
| | 2116-945 | | | | 18,72 | 18,72 | | |
| B-73 * | 0772-681 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2465 | 0,2465 | | |
| B-73 ** | 0772-681 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2024 | 0,2024 | | |
| B-73 *** | 0772-681 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2414 | 0,2414 | 0,0459 | 0,0770 |
| CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | | ATC: N06AB04 | | |
| B-73 | 4851-853 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,19 | 29,19 | 4,50 | 7,55 |
| | 4851-853 | | | | 18,72 | 18,72 | | |
| B-73 * | 7740-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2465 | 0,2465 | | |
| B-73 ** | 7740-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2024 | 0,2024 | | |
| B-73 *** | 7740-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2414 | 0,2414 | 0,0459 | 0,0770 |
| CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | ATC: N06AB04 | | |
| B-73 | 2612-844 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 16,40 | 16,40 | 2,20 | 3,66 |
| | 2612-844 | | | | 8,29 | 8,29 | | |
| B-73 | 2669-232 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 27,87 | 27,87 | 4,31 | 7,24 |
| | 2669-232 | | | | 17,57 | 17,57 | | |
| B-73 * | 0792-986 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 0792-986 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 0792-986 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | 0,0440 | 0,0739 |
| CITALOPRAM SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | | | ATC: N06AB04 | | |
| B-73 | 2066-728 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 13,79 | 13,79 | 1,67 | 2,78 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2066-728 | | | | 6,30 | 6,30 | | |
| B-73 | 2066-751 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 16,40 | 16,40 | 2,20 | 3,66 |
| | 2066-751 | | | | 8,29 | 8,29 | | |
| B-73 | 2220-697 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,65 | 29,65 | 4,56 | 7,66 |
| | 2220-697 | | | | 19,11 | 19,11 | | |
| B-73 * | 0775-791 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2466 | 0,2466 | | |
| B-73 ** | 0775-791 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2026 | 0,2026 | | |
| B-73 *** | 0775-791 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2412 | 0,2412 | 0,0456 | 0,0766 |
| CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N06AB04 | | | |
| B-73 | 2711-976 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,65 | 29,65 | 4,56 | 7,66 |
| | 2711-976 | | | | 19,11 | 19,11 | | |
| B-73 * | 0794-172 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2466 | 0,2466 | | |
| B-73 ** | 0794-172 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2026 | 0,2026 | | |
| B-73 *** | 0794-172 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2412 | 0,2412 | 0,0456 | 0,0766 |
| CITALOPRAM SANDOZ 30 mg | | SANDOZ | | | ATC: N06AB04 | | | |
| B-73 | 2154-862 | 28 comprimés pelliculés, 30 mg | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 21,04 | 21,04 | 3,14 | 5,23 |
| | 2154-862 | | | | 11,83 | 11,83 | | |
| B-73 | 2154-870 | 56 comprimés pelliculés, 30 mg | 56 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 31,79 | 31,79 | 4,86 | 8,16 |
| | 2154-870 | | | | 20,98 | 20,98 | | |
| B-73 | 2220-705 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 51,20 | 51,20 | 7,56 | 12,72 |
| | 2220-705 | | | | 37,87 | 37,87 | | |
| B-73 * | 0777-045 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,4725 | 0,4725 | | |
| B-73 ** | 0777-045 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,4014 | 0,4014 | | |
| B-73 *** | 0777-045 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,4566 | 0,4566 | 0,0756 | 0,1272 |
| CITALOPRAM SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | | ATC: N06AB04 | | | |
| B-73 | 2134-062 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 25,80 | 25,80 | 4,02 | 6,76 |
| | 2134-062 | | | | 15,77 | 15,77 | | |
| B-73 | 2154-854 | 56 comprimés pelliculés, 40 mg | 56 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 37,26 | 37,26 | 5,62 | 9,45 |
| | 2154-854 | | | | 25,74 | 25,74 | | |
| B-73 | 2220-689 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 29,65 | 29,65 | 4,56 | 7,66 |
| | 2220-689 | | | | 19,11 | 19,11 | | |
| B-73 * | 0777-052 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2466 | 0,2466 | | |
| B-73 ** | 0777-052 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2026 | 0,2026 | | |
| B-73 *** | 0777-052 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2412 | 0,2412 | 0,0456 | 0,0766 |
| CITALOPRAM TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: N06AB04 | | | |
| B-73 | 2173-235 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 15,64 | 15,64 | 2,04 | 3,41 |
| | 2173-235 | | | | 7,71 | 7,71 | | |
| B-73 | 2567-378 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 27,87 | 27,87 | 4,31 | 7,24 |
| | 2567-378 | | | | 17,57 | 17,57 | | |
| B-73 * | 0777-102 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 0777-102 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 0777-102 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | 0,0440 | 0,0739 |
| CITALOPRAM TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: N06AB04 | | | |
| B-73 | 3056-090 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 28,27 | 28,27 | 4,37 | 7,34 |
| | 3056-090 | | | | 17,92 | 17,92 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-73 * | 7705-304 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 7705-304 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 7705-304 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2274 | 0,2274 | 0,0437 | 0,0734 |
| CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N06AB04 | | | | |
| B-73 | 2067-015 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 16,40 | 16,40 | 2,20 | 3,66 |
| | 2067-015 | | | | 8,29 | 8,29 | | |
| B-73 | 2435-048 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,65 | 29,65 | 4,56 | 7,66 |
| | 2435-048 | | | | 19,11 | 19,11 | | |
| B-73 * | 0772-608 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2466 | 0,2466 | | |
| B-73 ** | 0772-608 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2026 | 0,2026 | | |
| B-73 *** | 0772-608 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2412 | 0,2412 | 0,0456 | 0,0766 |
| CLAFORAN 1000 mg | | AMDIPHARM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DD01 | |
| | 0703-090 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml | | 3,08 | 3,08 | | |
| B-112 ** | 0703-090 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL | R | 3,2600 | 3,2600 | | |
| CLAMOXYL | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 0107-235 | 16 capsules molles, 500 mg | 16 capsules, zacht, 500 mg | R | 7,67 | 7,67 | 1,35 | 1,35 |
| | 0107-235 | | | | 1,53 | 1,53 | | |
| C-37 * | 0703-165 | 1 capsule molle, 500 mg | 1 capsule, zacht, 500 mg | R | 0,1231 | 0,1231 | | |
| C-37 ** | 0703-165 | 1 capsule molle, 500 mg | 1 capsule, zacht, 500 mg | R | 0,1013 | 0,1013 | | |
| C-37 *** | 0703-165 | 1 capsule molle, 500 mg | 1 capsule, zacht, 500 mg | R | 0,1338 | 0,1338 | 0,0844 | 0,0844 |
| CLAMOXYL 1 g | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 1100-239 | 8 comprimés dispersibles, 1000 mg | 8 disperseerbare tabletten, 1000 mg | R | 8,44 | 8,44 | 1,94 | 1,94 |
| | 1100-239 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| C-37 | 2312-619 | 24 comprimés dispersibles, 1000 mg | 24 disperseerbare tabletten, 1000 mg | R | 14,13 | 14,13 | 5,80 | 5,80 |
| | 2312-619 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| C-37 * | 0741-504 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | R | 0,3529 | 0,3529 | | |
| C-37 ** | 0741-504 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | R | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 0741-504 | 1 comprimé dispersible, 1000 mg | 1 disperseerbare tablet, 1000 mg | R | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| CLAMOXYL 125 mg /5 ml | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 3677-820 | 1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL | 1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL | R | 7,42 | 7,42 | 1,15 | 1,15 |
| | 3677-820 | | | | 1,30 | 1,30 | | |
| C-37 * | 0703-199 | 5 mL sirop, 25 mg/mL | 5 mL stroop, 25 mg/mL | R | 0,0840 | 0,0840 | | |
| C-37 ** | 0703-199 | 5 mL sirop, 25 mg/mL | 5 mL stroop, 25 mg/mL | R | 0,0690 | 0,0690 | | |
| CLAMOXYL 250 mg/5 ml | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 3677-838 | 1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL | 1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL | R | 7,97 | 7,97 | 1,58 | 1,58 |
| | 3677-838 | | | | 1,79 | 1,79 | | |
| C-37 * | 0703-207 | 5 mL poudre orale, 50 mg/mL | 5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,1155 | 0,1155 | | |
| C-37 ** | 0703-207 | 5 mL poudre orale, 50 mg/mL | 5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 | R | 0,0950 | 0,0950 | | |

| | | | | mg/mL | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| CLARELUX 500 µg/g | | | | PIERRE FABRE BENELUX | ATC: D07AD01 | | | |
| B-156 | 2217-123 | 1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g | 1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g | | 16,51 | 16,51 | 2,22 | 3,70 |
| | 2217-123 | | | | 8,38 | 8,38 | | |
| B-156 * | 0787-366 | 1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 10,8100 | 10,8100 | | |
| B-156 ** | 0787-366 | 1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 8,8800 | 8,8800 | | |
| CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg | | | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 3559-176 | 14 comprimés pelliculés, 500 mg | 14 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 16,96 | 16,96 | 7,71 | 7,71 |
| | 3559-176 | | | | 8,72 | 8,72 | | |
| C-37 | 3566-767 | 21 comprimés pelliculés, 500 mg | 21 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 22,38 | 22,38 | 10,20 | 11,37 |
| | 3566-767 | | | | 12,86 | 12,86 | | |
| C-37 * | 7719-487 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,7905 | 0,7905 | | |
| C-37 ** | 7719-487 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,6490 | 0,6490 | | |
| C-37 *** | 7719-487 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8162 | 0,8162 | 0,5507 | 0,5507 |
| CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml | | | | SANDOZ | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 2916-534 | 1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml | 1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml | G | 11,02 | 11,02 | 3,70 | 3,70 |
| | 2916-534 | | | | 4,19 | 4,19 | | |
| C-37 * | 0751-024 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL | G | 0,2254 | 0,2254 | | |
| C-37 ** | 0751-024 | 5 mL suspension buvable, 25 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL | G | 0,1850 | 0,1850 | | |
| CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml | | | | SANDOZ | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 2968-204 | 1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml | G | 14,67 | 14,67 | 6,16 | 6,16 |
| | 2968-204 | | | | 6,97 | 6,97 | | |
| C-37 | 2968-212 | 1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL | 1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL | G | 12,84 | 12,84 | 4,93 | 4,93 |
| | 2968-212 | | | | 5,58 | 5,58 | | |
| C-37 * | 7700-511 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | G | 0,4495 | 0,4495 | | |
| C-37 ** | 7700-511 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | G | 0,3695 | 0,3695 | | |
| CLARITHROMYCINE EG 250 mg | | | | EG | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 2211-241 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 9,52 | 9,52 | 2,69 | 2,69 |
| | 2211-241 | | | | 3,04 | 3,04 | | |
| C-37 * | 0779-843 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3920 | 0,3920 | | |
| C-37 ** | 0779-843 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3220 | 0,3220 | | |
| C-37 *** | 0779-843 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,3986 | 0,3986 | 0,2690 | 0,2690 |
| CLARITHROMYCINE EG 500 mg | | | | EG | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 2219-566 | 10 comprimés pelliculés, 500 mg | 10 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 11,26 | 11,26 | 3,86 | 3,86 |
| | 2219-566 | | | | 4,37 | 4,37 | | |
| C-37 | 2211-233 | 21 comprimés pelliculés, 500 mg | 21 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 22,71 | 22,71 | 10,20 | 11,59 |
| | 2211-233 | | | | 13,11 | 13,11 | | |
| C-37 * | 0779-850 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8057 | 0,8057 | | |
| C-37 ** | 0779-850 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,6619 | 0,6619 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| C-37 *** | 0779-850 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8177 | 0,8177 | 0,4857 | 0,5519 |
| CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | ATC: J01FA09 | | | | |
| C-37 | 2968-261 2968-261 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | G | 9,52 3,04 | 9,52 3,04 | 2,69 | 2,69 |
| C-37 | 2915-338 2915-338 | 14 comprimés pelliculés, 250 mg | 14 filmomhulde tabletten, 250 mg | R | 10,29 3,63 | 10,29 3,63 | 3,21 | 3,21 |
| C-37 * | 0785-733 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | R | 0,3343 | 0,3343 | | |
| C-37 ** | 0785-733 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | R | 0,2750 | 0,2750 | | |
| C-37 *** | 0785-733 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | R | 0,3400 | 0,3400 | 0,2293 | 0,2293 |
| CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: J01FA09 | | | | |
| C-37 | 2968-253 2968-253 | 10 comprimés pelliculés, 500 mg | 10 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 11,23 4,35 | 11,23 4,35 | 3,84 | 3,84 |
| C-37 | 2915-346 2915-346 | 14 comprimés pelliculés, 500 mg | 14 filmomhulde tabletten, 500 mg | R | 16,96 8,72 | 16,96 8,72 | 7,71 | 7,71 |
| C-37 | 2915-353 2915-353 | 21 comprimés pelliculés, 500 mg | 21 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 22,38 12,86 | 22,38 12,86 | 10,20 | 11,37 |
| C-37 * | 7701-535 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,7905 | 0,7905 | | |
| C-37 ** | 7701-535 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,6490 | 0,6490 | | |
| C-37 *** | 7701-535 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8021 | 0,8021 | 0,4857 | 0,5414 |
| CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg | | EG | | ATC: J01FA09 | | | | |
| C-37 | 2885-465 2885-465 | 10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg | 10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg | G | 13,14 5,81 | 13,14 5,81 | 5,14 | 5,14 |
| C-37 | 2885-994 2885-994 | 20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg | G | 18,41 9,83 | 18,41 9,83 | 8,69 | 8,69 |
| C-37 * | 0752-246 | 1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg | 1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,6345 | 0,6345 | | |
| C-37 ** | 0752-246 | 1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg | 1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,5210 | 0,5210 | | |
| C-37 *** | 0752-246 | 1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg | 1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,6440 | 0,6440 | 0,4345 | 0,4345 |
| CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg | | VIATRIS | | ATC: J01FA09 | | | | |
| C-37 | 2164-127 2164-127 | 14 comprimés pelliculés, 500 mg | 14 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 17,53 9,16 | 17,53 9,16 | 8,10 | 8,10 |
| C-37 | 2164-119 2164-119 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 16,92 8,69 | 16,92 8,69 | 7,68 | 7,68 |
| C-37 * | 0778-498 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5605 | 0,5605 | | |
| C-37 ** | 0778-498 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,4605 | 0,4605 | | |
| C-37 *** | 0778-498 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,5692 | 0,5692 | 0,3840 | 0,3840 |
| CLAUDIA-35 | | SANDOZ | | ATC: G03HB01 | | | | |
| Cx-13 | 2157-352 2157-352 | 63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg | 63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg | G | 13,89 6,38 | 13,89 6,38 | 9,02 | 9,02 |
| Cx-13 | 2164-929 2164-929 | 126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg | 126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg | G | 19,36 10,55 | 19,36 10,55 | 14,92 | 14,92 |
| Cx-13 * | 0782-706 | 1 comprimé enrobé, 2 mg / 0,035 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg / 0,035 mg | G | 0,1080 | 0,1080 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| Cx-13 ** | 0782-706 | 1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg | G | 0,0887 | 0,0887 | | |
| Cx-13 *** | 0782-706 | 1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg | G | 0,1097 | 0,1097 | 0,1097 | 0,1097 |
| CLAVERSAL | | TRUVION HEALTHCARE | | | ATC: A07EC02 | | | |
| B-55 | 0668-376 0668-376 | 15 suppositoires, 500 mg | 15 zetpillen, 500 mg | R | 14,56 6,89 | 14,56 6,89 | 1,83 | 3,05 |
| B-55 | 0668-384 0668-384 | 60 suppositoires, 500 mg | 60 zetpillen, 500 mg | R | 36,20 24,82 | 36,20 24,82 | 5,47 | 9,20 |
| B-55 | 1622-463 1622-463 | 120 suppositoires, 500 mg | 120 zetpillen, 500 mg | R | 63,22 48,33 | 63,22 48,33 | 9,23 | 15,50 |
| B-55 * | 0733-295 | 1 suppositoire, 500 mg | 1 zetpil, 500 mg | R | 0,4862 | 0,4862 | | |
| B-55 ** | 0733-295 | 1 suppositoire, 500 mg | 1 zetpil, 500 mg | R | 0,4269 | 0,4269 | | |
| CLAVERSAL | | TRUVION HEALTHCARE | | | ATC: A07EC02 | | | |
| B-55 | 1608-488 1608-488 | 100 comprimés, 500 mg | 100 tabletten, 500 mg | R | 34,11 23,00 | 34,11 23,00 | 5,18 | 8,71 |
| B-55 | 1608-496 1608-496 | 300 comprimés, 500 mg | 300 tabletten, 500 mg | R | 60,54 46,00 | 60,54 46,00 | 8,86 | 14,92 |
| B-55 * | 0766-790 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,1862 | 0,1862 | | |
| B-55 ** | 0766-790 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,1625 | 0,1625 | | |
| B-55 *** | 0766-790 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,2858 | 0,2858 | 0,0518 | 0,0871 |
| CLAVERSAL FOAM | | TRUVION HEALTHCARE | | | ATC: A07EC02 | | | |
| B-55 | 1181-296 1181-296 | 14 doses mousse rectale, 1 g/dose | 14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis | R | 32,50 21,60 | 32,50 21,60 | 4,96 | 8,33 |
| B-55 * | 0744-664 | 1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose | 1 spraypomp, 1 g/dosis | R | 27,8700 | 27,8700 | | |
| B-55 ** | 0744-664 | 1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose | 1 spraypomp, 1 g/dosis | R | 22,9000 | 22,9000 | | |
| CLEXANE 100 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | |
| B-33 | 1027-705 1027-705 | 10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml | 10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | BioR | 64,98 49,86 | 64,98 49,86 | 8,30 | 12,50 |
| B-33 * | 0743-849 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 5,9960 | 5,9960 | | |
| B-33 ** | 0743-849 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 5,2850 | 5,2850 | | |
| CLEXANE 120 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | |
| B-33 | 2266-070 2266-070 | 10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml | BioR | 90,23 72,40 | 90,23 72,40 | 8,30 | 12,50 |
| B-33 * | 0781-070 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioR | 8,3850 | 8,3850 | | |
| B-33 ** | 0781-070 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioR | 7,6740 | 7,6740 | | |
| CLEXANE 150 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | |
| B-33 | 1708-619 1708-619 | 10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml | 10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml | BioR | 93,89 75,75 | 93,89 75,75 | 8,30 | 12,50 |
| B-33 * | 0771-998 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioR | 8,7410 | 8,7410 | | |
| B-33 ** | 0771-998 | 1 seringue préremplie 1 mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing | BioR | 8,0300 | 8,0300 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| | | solution injectable, 150 mg/mL | voor injectie, 150 mg/mL | | | | | | |
| CLEXANE 20 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 0251-298 | 10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml | 10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | BioR | 26,60 | 26,60 | 4,13 | 6,94 | |
| | 0251-298 | | | | 16,46 | 16,46 | | | |
| B-33 * | 0733-527 | 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 2,1240 | 2,1240 | | | |
| B-33 ** | 0733-527 | 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 1,7450 | 1,7450 | | | |
| CLEXANE 40 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 0278-192 | 10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml | 10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | BioR | 43,87 | 43,87 | 6,54 | 11,00 | |
| | 0278-192 | | | | 31,49 | 31,49 | | | |
| B-33 * | 0733-543 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 4,0490 | 4,0490 | | | |
| B-33 ** | 0733-543 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 3,3380 | 3,3380 | | | |
| CLEXANE 60 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 1594-878 | 10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml | 10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | BioR | 50,91 | 50,91 | 7,52 | 12,50 | |
| | 1594-878 | | | | 37,62 | 37,62 | | | |
| B-33 * | 0766-444 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 4,6990 | 4,6990 | | | |
| B-33 ** | 0766-444 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 3,9880 | 3,9880 | | | |
| CLEXANE 80 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 1027-697 | 10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml | 10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | BioR | 57,92 | 57,92 | 8,30 | 12,50 | |
| | 1027-697 | | | | 43,72 | 43,72 | | | |
| B-33 * | 0743-856 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 5,3450 | 5,3450 | | | |
| B-33 ** | 0743-856 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioR | 4,6340 | 4,6340 | | | |
| CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | | ATC: J01FF01 | | | | |
| C-37 | 3016-938 | 16 gélules, 150 mg | 16 capsules, hard, 150 mg | G | 9,14 | 9,14 | 2,43 | 2,43 | |
| | 3016-938 | | | | 2,75 | 2,75 | | | |
| C-37 * | 0755-983 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2219 | 0,2219 | | | |
| C-37 ** | 0755-983 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,1825 | 0,1825 | | | |
| C-37 *** | 0755-983 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2253 | 0,2253 | 0,1519 | 0,1519 | |
| CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | | ATC: J01FF01 | | | | |
| C-37 | 2979-573 | 16 gélules, 300 mg | 16 capsules, hard, 300 mg | G | 11,35 | 11,35 | 3,92 | 3,92 | |
| | 2979-573 | | | | 4,44 | 4,44 | | | |
| C-37 | 2807-618 | 20 gélules, 300 mg | 20 capsules, hard, 300 mg | G | 15,61 | 15,61 | 6,80 | 6,80 | |
| | 2807-618 | | | | 7,69 | 7,69 | | | |
| C-37 | 3046-117 | 32 gélules, 300 mg | 32 capsules, hard, 300 mg | G | 17,15 | 17,15 | 7,83 | 7,83 | |
| | 3046-117 | | | | 8,86 | 8,86 | | | |
| C-37 * | 0755-975 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3572 | 0,3572 | | | |
| C-37 ** | 0755-975 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,2934 | 0,2934 | | | |
| C-37 *** | 0755-975 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3631 | 0,3631 | 0,2447 | 0,2447 | |
| CLINDAMYCINE EG 300 mg | | EG | | | ATC: J01FF01 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| C-37 | 2826-790 2826-790 | 16 gélules, 300 mg | 16 capsules, hard, 300 mg | G | 11,35 4,44 | 11,35 4,44 | 3,92 | 3,92 |
| C-37 | 2826-782 2826-782 | 32 gélules, 300 mg | 32 capsules, hard, 300 mg | G | 17,65 9,24 | 17,65 9,24 | 8,17 | 8,17 |
| C-37 * | 0755-157 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3725 | 0,3725 | | |
| C-37 ** | 0755-157 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3059 | 0,3059 | | |
| C-37 *** | 0755-157 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3786 | 0,3786 | 0,2553 | 0,2553 |
| CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01 | | | | | | | | |
| B-119 ** | 0798-637 0798-637 | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 10,33 2,1900 | 10,33 2,1900 | | |
| CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01 | | | | | | | | |
| B-119 ** | 0798-645 0798-645 | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 18,90 4,0060 | 18,90 4,0060 | | |
| CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01 | | | | | | | | |
| B-119 ** | 0798-652 0798-652 | 5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | G | 26,01 5,5140 | 26,01 5,5140 | | |
| CLIPPER 5 mg CHIESI ATC: A07EA07 | | | | | | | | |
| B-55 | 2341-451 2341-451 | 30 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | R | 62,77 47,94 | 62,77 47,94 | 8,30 | 12,50 |
| B-55 * | 0783-555 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | R | 1,9310 | 1,9310 | | |
| B-55 ** | 0783-555 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | R | 1,6940 | 1,6940 | | |
| B-55 *** | 0783-555 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | R | 1,9080 | 1,9080 | 0,2767 | 0,4167 |
| CLOBEX 500 µg/g GALDERMA BENELUX ATC: D07AD01 | | | | | | | | |
| B-156 | 2399-772 2399-772 | 1 flacon 125 ml shampooing, 500 µg/g | 1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g | | 21,62 12,28 | 21,62 12,28 | 3,26 | 5,43 |
| B-156 * | 0788-778 | 1 flacon 125 mL shampooing, 0,5 mg/g | 1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g | | 15,8500 | 15,8500 | | |
| B-156 ** | 0788-778 | 1 flacon 125 mL shampooing, 0,5 mg/g | 1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g | | 13,0200 | 13,0200 | | |

| CLOMID | | SANOFI BELGIUM | | | | ATC: G03GB02 | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--|
| B-92 | 0031-450 0031-450 | 10 comprimés, 50 mg | 10 tabletten, 50 mg | | 10,40 3,71 | 10,40 3,71 | 0,98 | 1,64 | |
| B-92 * | 0703-264 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,4790 | 0,4790 | | | |
| B-92 ** | 0703-264 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,3930 | 0,3930 | | | |
| B-92 *** | 0703-264 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,4865 | 0,4865 | 0,0980 | 0,1640 | |
| CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg | | SANDOZ | | | | ATC: B01AC04 | | | |
| B-243 | 2633-444 2633-444 | 28 comprimés pelliculés, 75 mg | 28 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 8,66 2,38 | 8,66 2,38 | 0,63 | 1,05 | |
| B-243 | 2692-564 2692-564 | 84 comprimés pelliculés, 75 mg | 84 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 14,92 7,17 | 14,92 7,17 | 1,90 | 3,17 | |
| B-243 | 2633-451 2633-451 | 98 comprimés pelliculés, 75 mg | 98 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 16,53 8,39 | 16,53 8,39 | 2,22 | 3,71 | |
| B-243 * | 0796-839 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1105 | 0,1105 | | | |
| B-243 ** | 0796-839 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,0907 | 0,0907 | | | |
| B-243 *** | 0796-839 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1122 | 0,1122 | 0,0227 | 0,0379 | |
| CLOPIDOGREL AB 75 mg | | AUROBINDO NV | | | | ATC: B01AC04 | | | |
| B-243 | 4582-433 4582-433 | 28 comprimés pelliculés, 75 mg | 28 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 8,66 2,38 | 8,66 2,38 | 0,63 | 1,05 | |
| B-243 | 4582-474 4582-474 | 98 comprimés pelliculés, 75 mg | 98 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 16,53 8,39 | 16,53 8,39 | 2,22 | 3,71 | |
| B-243 * | 7735-996 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1105 | 0,1105 | | | |
| B-243 ** | 7735-996 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,0907 | 0,0907 | | | |
| B-243 *** | 7735-996 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1122 | 0,1122 | 0,0227 | 0,0379 | |
| CLOPIDOGREL EG 75 mg | | EG | | | | ATC: B01AC04 | | | |
| B-243 | 2656-957 2656-957 | 28 comprimés pelliculés, 75 mg | 28 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 8,66 2,38 | 8,66 2,38 | 0,63 | 1,05 | |
| B-243 | 2656-940 2656-940 | 98 comprimés pelliculés, 75 mg | 98 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 16,53 8,39 | 16,53 8,39 | 2,22 | 3,71 | |
| B-243 * | 0795-815 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1105 | 0,1105 | | | |
| B-243 ** | 0795-815 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,0907 | 0,0907 | | | |
| B-243 *** | 0795-815 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1122 | 0,1122 | 0,0227 | 0,0379 | |
| CLOPIDOGREL KRKA 75 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: B01AC04 | | | |
| B-243 | 3483-161 3483-161 | 28 comprimés pelliculés, 75 mg | 28 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 8,66 2,38 | 8,66 2,38 | 0,63 | 1,05 | |
| B-243 | 3483-179 3483-179 | 84 comprimés pelliculés, 75 mg | 84 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 14,95 7,19 | 14,95 7,19 | 1,91 | 3,18 | |
| B-243 | 3483-187 3483-187 | 100 comprimés pelliculés, 75 mg | 100 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 16,77 8,57 | 16,77 8,57 | 2,27 | 3,79 | |
| B-243 * | 7717-929 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1106 | 0,1106 | | | |
| B-243 ** | 7717-929 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,0908 | 0,0908 | | | |
| B-243 *** | 7717-929 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1124 | 0,1124 | 0,0227 | 0,0379 | |
| CLOPIDOGREL TEVA 75 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: B01AC04 | | | |
| B-243 | 3242-542 3242-542 | 100 comprimés pelliculés, 75 mg | 100 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 16,72 8,54 | 16,72 8,54 | 2,26 | 3,77 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-243 * | 7712-664 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1102 | 0,1102 | | |
| B-243 ** | 7712-664 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,0905 | 0,0905 | | |
| B-243 *** | 7712-664 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1118 | 0,1118 | 0,0226 | 0,0377 |
| CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg | | VIATRIS | | ATC: B01AC04 | | | | |
| B-243 | 4413-969 | 30 comprimés pelliculés, 75 mg | 30 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 8,87 | 8,87 | 0,68 | 1,13 |
| | 4413-969 | | | | 2,55 | 2,55 | | |
| B-243 | 4413-977 | 90 comprimés pelliculés, 75 mg | 90 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 15,59 | 15,59 | 2,04 | 3,39 |
| | 4413-977 | | | | 7,68 | 7,68 | | |
| B-243 * | 7731-839 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1101 | 0,1101 | | |
| B-243 ** | 7731-839 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,0904 | 0,0904 | | |
| B-243 *** | 7731-839 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1113 | 0,1113 | 0,0227 | 0,0377 |
| CLOPIXOL | | LUNDBECK | | ATC: N05AF05 | | | | |
| B-70 | 0022-731 | 1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml | 1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml | | 10,97 | 10,97 | 1,10 | 1,83 |
| | 0022-731 | | | | 4,15 | 4,15 | | |
| B-70 * | 0728-055 | 1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL | | 0,2680 | 0,2680 | | |
| B-70 ** | 0728-055 | 1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL | | 0,2200 | 0,2200 | | |
| CLOPIXOL | | LUNDBECK | | ATC: N05AF05 | | | | |
| B-70 | 0022-574 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | | 13,97 | 13,97 | 1,71 | 2,85 |
| | 0022-574 | | | | 6,44 | 6,44 | | |
| B-70 * | 0728-030 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,0831 | 0,0831 | | |
| B-70 ** | 0728-030 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,0683 | 0,0683 | | |
| B-70 *** | 0728-030 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,0844 | 0,0844 | 0,0171 | 0,0285 |
| CLOPIXOL | | LUNDBECK | | ATC: N05AF05 | | | | |
| B-70 | 0022-715 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | | 22,19 | 22,19 | 3,37 | 5,62 |
| | 0022-715 | | | | 12,71 | 12,71 | | |
| B-70 * | 0728-048 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 0,1640 | 0,1640 | | |
| B-70 ** | 0728-048 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 0,1347 | 0,1347 | | |
| B-70 *** | 0728-048 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 0,1665 | 0,1665 | 0,0337 | 0,0562 |
| CLOPIXOL | | LUNDBECK | | ATC: N05AF05 | | | | |
| B-70 | 0022-533 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | | 7,79 | 7,79 | 0,43 | 0,72 |
| | 0022-533 | | | | 1,63 | 1,63 | | |
| B-70 * | 0728-022 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | | 0,0210 | 0,0210 | | |
| B-70 ** | 0728-022 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | | 0,0173 | 0,0173 | | |
| B-70 *** | 0728-022 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | | 0,0226 | 0,0226 | 0,0043 | 0,0072 |
| CLOPIXOL DEPOT | | LUNDBECK | | ATC: N05AF05 | | | | |
| B-70 | 0081-554 | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml | | 9,40 | 9,40 | 0,78 | 1,30 |
| | 0081-554 | | | | 2,95 | 2,95 | | |
| B-70 * | 0703-272 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL | | 3,8100 | 3,8100 | | |
| B-70 ** | 0703-272 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL | | 3,1300 | 3,1300 | | |
| CLOZAPINE SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH02 | | | | |
| B-72 | 2220-721 | 30 comprimés, 100 mg | 30 tabletten, 100 mg | G | 13,84 | 13,84 | 1,68 | 2,80 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2220-721 | | | | | 6,34 | 6,34 | | |
| B-72 * | 0780-023 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | | 0,2727 | 0,2727 | | |
| B-72 ** | 0780-023 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | | 0,2240 | 0,2240 | | |
| B-72 *** | 0780-023 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | | 0,2770 | 0,2770 | 0,0560 | 0,0933 |
| CLOZAPINE SANDOZ 25 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AH02 | | | | |
| B-72 | 2220-747 | 30 comprimés, 25 mg | 30 tabletten, 25 mg | G | | 6,97 | 6,97 | 0,24 | 0,40 |
| | 2220-747 | | | | | 0,91 | 0,91 | | |
| B-72 * | 0780-007 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | | 0,0390 | 0,0390 | | |
| B-72 ** | 0780-007 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | | 0,0320 | 0,0320 | | |
| B-72 *** | 0780-007 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | | 0,0481 | 0,0481 | 0,0080 | 0,0133 |
| CLOZAPINE SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AH02 | | | | |
| B-72 | 2220-739 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | G | | 9,03 | 9,03 | 0,71 | 1,18 |
| | 2220-739 | | | | | 2,67 | 2,67 | | |
| B-72 * | 0780-015 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | | 0,1150 | 0,1150 | | |
| B-72 ** | 0780-015 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | | 0,0943 | 0,0943 | | |
| B-72 *** | 0780-015 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | | 0,1166 | 0,1166 | 0,0237 | 0,0393 |
| CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg | | EG | | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2051-852 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | | 11,85 | 11,85 | 1,28 | 2,13 |
| | 2051-852 | | | | | 4,82 | 4,82 | | |
| B-15 | 2574-812 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | | 18,66 | 18,66 | 2,66 | 4,43 |
| | 2574-812 | | | | | 10,02 | 10,02 | | |
| B-15 * | 0774-315 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | | 0,1319 | 0,1319 | | |
| B-15 ** | 0774-315 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | | 0,1084 | 0,1084 | | |
| B-15 *** | 0774-315 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | | 0,1339 | 0,1339 | 0,0271 | 0,0452 |
| CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg | | EG | | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2051-811 | 56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg | 56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg | G | | 10,82 | 10,82 | 1,07 | 1,79 |
| | 2051-811 | | | | | 4,04 | 4,04 | | |
| B-15 | 2544-948 | 98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg | G | | 13,97 | 13,97 | 1,71 | 2,85 |
| | 2544-948 | | | | | 6,44 | 6,44 | | |
| B-15 * | 0775-148 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg | G | | 0,0848 | 0,0848 | | |
| B-15 ** | 0775-148 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg | G | | 0,0697 | 0,0697 | | |
| B-15 *** | 0775-148 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg | G | | 0,0861 | 0,0861 | 0,0174 | 0,0291 |
| CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg | | EG | | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2051-837 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | G | | 9,03 | 9,03 | 0,71 | 1,18 |
| | 2051-837 | | | | | 2,67 | 2,67 | | |
| B-15 | 2574-804 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | G | | 12,75 | 12,75 | 1,46 | 2,44 |
| | 2574-804 | | | | | 5,51 | 5,51 | | |
| B-15 * | 0774-307 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | | 0,0726 | 0,0726 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-15 ** | 0774-307 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0596 | 0,0596 | | |
| B-15 *** | 0774-307 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0737 | 0,0737 | 0,0149 | 0,0249 |
| CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg | | SANDOZ | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2697-647 | 60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg | 60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | 12,00 | 12,00 | 1,31 | 2,18 |
| | 2697-647 | | | | 4,93 | 4,93 | | |
| B-15 | 2697-589 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | 17,33 | 17,33 | 2,39 | 3,98 |
| | 2697-589 | | | | 9,00 | 9,00 | | |
| B-15 * | 0798-025 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | 0,1161 | 0,1161 | | |
| B-15 ** | 0798-025 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | 0,0954 | 0,0954 | | |
| B-15 *** | 0798-025 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | 0,1180 | 0,1180 | 0,0239 | 0,0398 |
| CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2697-597 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | G | 8,61 | 8,61 | 0,62 | 1,04 |
| | 2697-597 | | | | 2,35 | 2,35 | | |
| B-15 | 2697-621 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | G | 11,27 | 11,27 | 1,16 | 1,94 |
| | 2697-621 | | | | 4,38 | 4,38 | | |
| B-15 * | 0798-017 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0565 | 0,0565 | | |
| B-15 ** | 0798-017 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0464 | 0,0464 | | |
| B-15 *** | 0798-017 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0573 | 0,0573 | 0,0116 | 0,0194 |
| CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg | | VIATRIS | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2082-410 | 56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg | 56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | 12,65 | 12,65 | 1,44 | 2,40 |
| | 2082-410 | | | | 5,43 | 5,43 | | |
| B-15 | 2490-944 | 84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg | 84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | 15,34 | 15,34 | 1,98 | 3,31 |
| | 2490-944 | | | | 7,48 | 7,48 | | |
| B-15 | 2655-009 | 100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg | 100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg | G | 18,69 | 18,69 | 2,66 | 4,44 |
| | 2655-009 | | | | 10,04 | 10,04 | | |
| B-15 * | 0776-849 | 1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | 0,1296 | 0,1296 | | |
| B-15 ** | 0776-849 | 1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | 0,1064 | 0,1064 | | |
| B-15 *** | 0776-849 | 1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg | G | 0,1167 | 0,1167 | 0,0236 | 0,0394 |
| CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg | | VIATRIS | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2082-436 | 56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg | 56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | G | 9,82 | 9,82 | 0,87 | 1,45 |
| | 2082-436 | | | | 3,27 | 3,27 | | |
| B-15 | 2654-994 | 100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg | 100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | G | 12,74 | 12,74 | 1,46 | 2,43 |
| | 2654-994 | | | | 5,50 | 5,50 | | |
| B-15 * | 0776-831 | 1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0710 | 0,0710 | | |
| B-15 ** | 0776-831 | 1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0583 | 0,0583 | | |
| B-15 *** | 0776-831 | 1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,0721 | 0,0721 | 0,0146 | 0,0243 |

| CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg | | SANDOZ | | | | ATC: C09DA06 | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| B-224 | 2895-175 2895-175 | 98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg | 98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg | G | 23,11 13,42 | 23,11 13,42 | 3,56 5,93 |
| B-224 * | 0752-402 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | |
| B-224 ** | 0752-402 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | |
| B-224 *** | 0752-402 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 0,0605 |
| CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg | | SANDOZ | | | | ATC: C09DA06 | |
| B-224 | 3029-790 3029-790 | 98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg | G | 32,35 21,47 | 32,35 21,47 | 4,94 8,30 |
| B-224 * | 7703-697 | 1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg | G | 0,2828 | 0,2828 | |
| B-224 ** | 7703-697 | 1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg | G | 0,2322 | 0,2322 | |
| B-224 *** | 7703-697 | 1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg | G | 0,2737 | 0,2737 | 0,0504 0,0847 |
| CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg | | SANDOZ | | | | ATC: C09DA06 | |
| B-224 | 2895-142 2895-142 | 98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg | G | 32,35 21,47 | 32,35 21,47 | 4,94 8,30 |
| B-224 * | 0752-410 | 1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg | G | 0,2828 | 0,2828 | |
| B-224 ** | 0752-410 | 1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg | G | 0,2322 | 0,2322 | |
| B-224 *** | 0752-410 | 1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg | G | 0,2737 | 0,2737 | 0,0504 0,0847 |
| CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: C09DA06 | |
| B-224 | 2881-035 2881-035 | 98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg | G | 23,11 13,42 | 23,11 13,42 | 3,56 5,93 |
| B-224 * | 0752-931 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | |
| B-224 ** | 0752-931 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | |
| B-224 *** | 0752-931 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 0,0605 |
| CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg | | VIATRIS | | | | ATC: C09DA06 | |
| B-224 | 2896-108 2896-108 | 98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg | G | 23,11 13,42 | 23,11 13,42 | 3,56 5,93 |
| B-224 * | 0753-681 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | |
| B-224 ** | 0753-681 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | |
| B-224 *** | 0753-681 | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg | G | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 0,0605 |
| CO-DIOVANE | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: C09DA03 | |
| B-224 | 1415-397 1415-397 | 56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg | R | 18,26 9,72 | 18,26 9,72 | 2,58 4,30 |
| B-224 * | 0760-736 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | R | 0,2239 | 0,2239 | |
| B-224 ** | 0760-736 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | R | 0,1839 | 0,1839 | |
| B-224 *** | 0760-736 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | R | 0,2273 | 0,2273 | 0,0461 0,0768 |
| CO-DIOVANE 160 mg/25 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: C09DA03 | |
| B-224 | 2204-154 2204-154 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg | R | 26,92 16,75 | 26,92 16,75 | 4,18 7,02 |
| B-224 * | 0781-740 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | R | 0,2206 | 0,2206 | |
| B-224 ** | 0781-740 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | R | 0,1812 | 0,1812 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-224 *** | 0781-740 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | R | 0,2183 | 0,2183 | 0,0427 | 0,0716 | |
| CO-DIOVANE 160/12,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DA03 | | | | | |
| B-224 | 2092-948 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg | R | 26,92 | 26,92 | 4,18 | 7,02 | |
| | 2092-948 | | | | 16,75 | 16,75 | | | |
| B-224 * | 0777-292 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,2206 | 0,2206 | | | |
| B-224 ** | 0777-292 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,1812 | 0,1812 | | | |
| B-224 *** | 0777-292 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,2183 | 0,2183 | 0,0427 | 0,0716 | |
| CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg | | EG | | ATC: C09BA02 | | | | | |
| B-21 | 2051-068 | 98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 14,41 | 14,41 | 1,80 | 2,99 | |
| | 2051-068 | | | | 6,77 | 6,77 | | | |
| B-21 * | 0774-331 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,0892 | 0,0892 | | | |
| B-21 ** | 0774-331 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,0733 | 0,0733 | | | |
| B-21 *** | 0774-331 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,0905 | 0,0905 | 0,0184 | 0,0305 | |
| CO-INHIBACE | | EUROCEPT | | ATC: C09BA08 | | | | | |
| B-21 | 1194-943 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | | 20,87 | 20,87 | 3,10 | 5,17 | |
| | 1194-943 | | | | 11,70 | 11,70 | | | |
| B-21 * | 0745-620 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | | 0,5393 | 0,5393 | | | |
| B-21 ** | 0745-620 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | | 0,4429 | 0,4429 | | | |
| B-21 *** | 0745-620 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | | 0,5478 | 0,5478 | 0,1107 | 0,1846 | |
| CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg | | EG | | ATC: C09BA03 | | | | | |
| B-21 | 2156-594 | 56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 14,66 | 14,66 | 1,85 | 3,08 | |
| | 2156-594 | | | | 6,96 | 6,96 | | | |
| B-21 | 2154-714 | 98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 | |
| | 2154-714 | | | | 14,60 | 14,60 | | | |
| B-21 * | 0778-183 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1922 | 0,1922 | | | |
| B-21 ** | 0778-183 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1580 | 0,1580 | | | |
| B-21 *** | 0778-183 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1931 | 0,1931 | 0,0392 | 0,0657 | |
| CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09BA03 | | | | | |
| B-21 | 2139-764 | 30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg | 30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg | G | 9,04 | 9,04 | 0,71 | 1,18 | |
| | 2139-764 | | | | 2,68 | 2,68 | | | |
| B-21 * | 0777-482 | 1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,1153 | 0,1153 | | | |
| B-21 ** | 0777-482 | 1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,0947 | 0,0947 | | | |
| B-21 *** | 0777-482 | 1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,1170 | 0,1170 | 0,0237 | 0,0393 | |
| CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09BA03 | | | | | |
| B-21 | 2139-780 | 30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 12,27 | 12,27 | 1,37 | 2,28 | |
| | 2139-780 | | | | 5,15 | 5,15 | | | |
| B-21 * | 0777-474 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2217 | 0,2217 | | | |
| B-21 ** | 0777-474 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1820 | 0,1820 | | | |
| B-21 *** | 0777-474 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2247 | 0,2247 | 0,0457 | 0,0760 | |
| CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09BA03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-21 | 2116-903 2116-903 | 56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 14,62 6,94 | 14,62 6,94 | 1,84 | 3,07 |
| B-21 | 2380-533 2380-533 | 98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 22,81 13,18 | 22,81 13,18 | 3,50 | 5,83 |
| B-21 * | 0778-084 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| B-21 ** | 0778-084 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1426 | 0,1426 | | |
| B-21 *** | 0778-084 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1622 | 0,1622 | 0,0329 | 0,0548 |
| CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA03 | | | | | | | | |
| B-21 | 2185-486 2185-486 | 100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 23,47 13,74 | 23,47 13,74 | 3,64 | 6,07 |
| B-21 * | 0779-108 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1773 | 0,1773 | | |
| B-21 ** | 0779-108 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1456 | 0,1456 | | |
| B-21 *** | 0779-108 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,1794 | 0,1794 | 0,0364 | 0,0607 |
| CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2631-372 2631-372 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg | G | 23,75 13,98 | 23,75 13,98 | 3,71 | 6,18 |
| B-224 * | 0795-518 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1841 | 0,1841 | | |
| B-224 ** | 0795-518 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1512 | 0,1512 | | |
| B-224 *** | 0795-518 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1859 | 0,1859 | 0,0379 | 0,0631 |
| CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2631-349 2631-349 | 28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | G | 13,43 6,02 | 13,43 6,02 | 1,60 | 2,66 |
| B-224 | 2631-331 2631-331 | 56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | G | 18,39 9,81 | 18,39 9,81 | 2,60 | 4,34 |
| B-224 | 2631-364 2631-364 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | G | 23,75 13,98 | 23,75 13,98 | 3,71 | 6,18 |
| B-224 * | 0795-500 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1841 | 0,1841 | | |
| B-224 ** | 0795-500 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1512 | 0,1512 | | |
| B-224 *** | 0795-500 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1859 | 0,1859 | 0,0379 | 0,0631 |
| CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2656-320 2656-320 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg | G | 23,68 13,92 | 23,68 13,92 | 3,69 | 6,15 |
| B-224 * | 0795-385 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1833 | 0,1833 | | |
| B-224 ** | 0795-385 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1506 | 0,1506 | | |
| B-224 *** | 0795-385 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1852 | 0,1852 | 0,0377 | 0,0628 |
| CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2656-312 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | G | 23,68 | 23,68 | 3,69 | 6,15 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2656-312 | | | | 13,92 | 13,92 | | |
| B-224 * | 0795-377 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1833 | 0,1833 | | |
| B-224 ** | 0795-377 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1506 | 0,1506 | | |
| B-224 *** | 0795-377 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1852 | 0,1852 | 0,0377 | 0,0628 |
| CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 4425-138 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 4425-138 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 4425-120 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg | G | 28,95 | 28,95 | 4,46 | 7,50 |
| | 4425-120 | | | | 18,51 | 18,51 | | |
| B-224 * | 7733-884 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 7733-884 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 7733-884 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 4425-104 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 4425-104 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 4425-112 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg | G | 28,95 | 28,95 | 4,46 | 7,50 |
| | 4425-112 | | | | 18,51 | 18,51 | | |
| B-224 * | 7733-892 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 7733-892 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 7733-892 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 4425-096 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 4425-096 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 4425-088 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 4425-088 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7733-900 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7733-900 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7733-900 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 4425-062 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 4425-062 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 4425-070 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 4425-070 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7733-918 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 7733-918 | mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7733-918 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ | | | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3564-721 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg | G | 30,29 | 30,29 | 4,65 | 7,81 |
| | 3564-721 | | | | 19,68 | 19,68 | | |
| B-224 * | 7719-172 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2592 | 0,2592 | | |
| B-224 ** | 7719-172 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2129 | 0,2129 | | |
| B-224 *** | 7719-172 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2527 | 0,2527 | 0,0474 | 0,0797 |
| CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ | | | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3458-742 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3458-742 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7717-259 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7717-259 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7717-259 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ | | | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3458-767 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3458-767 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7717-267 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7717-267 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7717-267 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ | | | | ATC: C09BA05 | | | | |
| B-21 | 2318-517 | 50 comprimés, 25 mg / 5 mg | 50 tabletten, 25 mg / 5 mg | G | 16,35 | 16,35 | 2,19 | 3,65 |
| | 2318-517 | | | | 8,25 | 8,25 | | |
| B-21 | 2318-525 | 100 comprimés, 25 mg / 5 mg | 100 tabletten, 25 mg / 5 mg | G | 26,99 | 26,99 | 4,19 | 7,04 |
| | 2318-525 | | | | 16,80 | 16,80 | | |
| B-21 * | 0783-936 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | G | 0,2168 | 0,2168 | | |
| B-21 ** | 0783-936 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | G | 0,1781 | 0,1781 | | |
| B-21 *** | 0783-936 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | G | 0,2145 | 0,2145 | 0,0419 | 0,0704 |
| CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV | | | | ATC: C09BA02 | | | | |
| B-21 | 1459-791 | 98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | R | 15,03 | 15,03 | 1,92 | 3,20 |
| | 1459-791 | | | | 7,25 | 7,25 | | |
| B-21 * | 0734-277 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,0955 | 0,0955 | | |
| B-21 ** | 0734-277 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,0785 | 0,0785 | | |
| B-21 *** | 0734-277 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,0969 | 0,0969 | 0,0196 | 0,0327 |
| CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EG | | | | ATC: C09DA03 | | | | |
| B-224 | 2854-701 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg | G | 25,23 | 25,23 | 3,94 | 6,62 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2854-701 | | | | 15,27 | 15,27 | | |
| B-224 * | 0756-379 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,2011 | 0,2011 | | |
| B-224 ** | 0756-379 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,1652 | 0,1652 | | |
| B-224 *** | 0756-379 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,2010 | 0,2010 | 0,0402 | 0,0676 |
| CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg | | EG | | ATC: C09DA03 | | | | |
| B-224 | 2854-735 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg | G | 25,23 | 25,23 | 3,94 | 6,62 |
| | 2854-735 | | | | 15,27 | 15,27 | | |
| B-224 * | 0756-361 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,2011 | 0,2011 | | |
| B-224 ** | 0756-361 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,1652 | 0,1652 | | |
| B-224 *** | 0756-361 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,2010 | 0,2010 | 0,0402 | 0,0676 |
| CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg | | EG | | ATC: C09DA03 | | | | |
| B-224 | 2854-669 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg | G | 26,38 | 26,38 | 4,10 | 6,89 |
| | 2854-669 | | | | 16,27 | 16,27 | | |
| B-224 * | 0756-387 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,2143 | 0,2143 | | |
| B-224 ** | 0756-387 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1760 | 0,1760 | | |
| B-224 *** | 0756-387 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,2128 | 0,2128 | 0,0418 | 0,0703 |
| CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09DA03 | | | | |
| B-224 | 2748-481 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg | G | 13,60 | 13,60 | 1,63 | 2,72 |
| | 2748-481 | | | | 6,15 | 6,15 | | |
| B-224 | 2748-507 | 56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg | G | 21,61 | 21,61 | 3,25 | 5,42 |
| | 2748-507 | | | | 12,27 | 12,27 | | |
| B-224 | 2748-515 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg | G | 26,92 | 26,92 | 4,18 | 7,02 |
| | 2748-515 | | | | 16,75 | 16,75 | | |
| B-224 * | 0757-781 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,2206 | 0,2206 | | |
| B-224 ** | 0757-781 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,1812 | 0,1812 | | |
| B-224 *** | 0757-781 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,2183 | 0,2183 | 0,0427 | 0,0716 |
| CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg | | SANDOZ | | ATC: C09DA03 | | | | |
| B-224 | 2748-390 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg | G | 14,54 | 14,54 | 1,82 | 3,04 |
| | 2748-390 | | | | 6,88 | 6,88 | | |
| B-224 | 2748-358 | 56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg | 56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg | G | 21,61 | 21,61 | 3,25 | 5,42 |
| | 2748-358 | | | | 12,27 | 12,27 | | |
| B-224 | 2748-341 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg | G | 26,92 | 26,92 | 4,18 | 7,02 |
| | 2748-341 | | | | 16,75 | 16,75 | | |
| B-224 * | 0757-773 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 | G | 0,2206 | 0,2206 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 0757-773 | mg 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | mg 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,1812 | 0,1812 | | |
| B-224 *** | 0757-773 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,2183 | 0,2183 | 0,0427 | 0,0716 |
| CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09DA03 | | | | |
| B-224 | 2748-440 | 56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg | G | 18,24 | 18,24 | 2,57 | 4,29 |
| | 2748-440 | | | | 9,70 | 9,70 | | |
| B-224 | 2748-457 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg | G | 24,27 | 24,27 | 3,81 | 6,40 |
| | 2748-457 | | | | 14,44 | 14,44 | | |
| B-224 * | 0757-799 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-224 ** | 0757-799 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | |
| B-224 *** | 0757-799 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1912 | 0,1912 | 0,0389 | 0,0653 |
| COAPROVEL 150/12,5 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 1485-911 | 28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg | 28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg | R | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 |
| | 1485-911 | | | | 6,70 | 6,70 | | |
| B-224 * | 0761-593 | 1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg | R | 0,3089 | 0,3089 | | |
| B-224 ** | 0761-593 | 1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg | R | 0,2536 | 0,2536 | | |
| B-224 *** | 0761-593 | 1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg | R | 0,3138 | 0,3138 | 0,0636 | 0,1057 |
| COAPROVEL 300 mg/25 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 2345-502 | 28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg | R | 13,23 | 13,23 | 1,56 | 2,59 |
| | 2345-502 | | | | 5,87 | 5,87 | | |
| B-224 | 2345-510 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg | R | 25,45 | 25,45 | 3,97 | 6,67 |
| | 2345-510 | | | | 15,46 | 15,46 | | |
| B-224 * | 0786-202 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg | R | 0,2036 | 0,2036 | | |
| B-224 ** | 0786-202 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg | R | 0,1672 | 0,1672 | | |
| B-224 *** | 0786-202 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg | R | 0,2032 | 0,2032 | 0,0405 | 0,0681 |
| COAPROVEL 300/12,5 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 1530-336 | 28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg | R | 13,23 | 13,23 | 1,56 | 2,59 |
| | 1530-336 | | | | 5,87 | 5,87 | | |
| B-224 | 1569-367 | 98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg | R | 25,82 | 25,82 | 4,03 | 6,76 |
| | 1569-367 | | | | 15,79 | 15,79 | | |
| B-224 * | 0763-144 | 1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg | R | 0,2080 | 0,2080 | | |
| B-224 ** | 0763-144 | 1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg | R | 0,1708 | 0,1708 | | |
| B-224 *** | 0763-144 | 1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg | R | 0,2070 | 0,2070 | 0,0411 | 0,0690 |
| COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg | | MAYOLY BENELUX | | ATC: L01CC | | | | |
| B-68 | 1127-299 | 20 comprimés, 1 mg | 20 tabletten, 1 mg | | 10,49 | 10,49 | 1,01 | 1,68 |
| | 1127-299 | | | | 3,79 | 3,79 | | |
| B-68 * | 0703-306 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,2445 | 0,2445 | | |
| B-68 ** | 0703-306 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,2010 | 0,2010 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|----------------------------|---|---------------|--------------|--------|
| B-68 *** | 0703-306 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,2480 | 0,2480 | 0,0505 | 0,0840 |
| COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E. | | | | ACCORD HEALTHCARE | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01XB01 | |
| | 7741-671 | 10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU | 10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU | | 81,18 | 81,18 | | |
| B-121 ** | 7741-671 | 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU | 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU | G | 8,6050 | 8,6050 | | |
| COLISTINEB 2.000.000 I.E. | | | | TEVA PHARMA BELGIUM | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01XB01 | |
| | 0782-631 | 60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU | 60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU | | 488,58 | 488,58 | | |
| B-121 ** | 0782-631 | 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU | 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU | G | 8,6315 | 8,6315 | | |
| COLITOFALK 1 g | | | | DR FALK PHARMA BENELUX | | | ATC: A07EC02 | |
| B-55 | 2843-191 | 30 suppositoires, 1 g | 30 zetpillen, 1 g | R | 41,08 | 41,08 | 6,15 | 10,35 |
| | 2843-191 | | | | 29,06 | 29,06 | | |
| B-55 * | 7707-755 | 1 suppositoire, 1 g | 1 zetpil, 1 g | R | 1,2500 | 1,2500 | | |
| B-55 ** | 7707-755 | 1 suppositoire, 1 g | 1 zetpil, 1 g | R | 1,0267 | 1,0267 | | |
| COLITOFALK 1,5 g | | | | DR FALK PHARMA BENELUX | | | ATC: A07EC02 | |
| B-55 | 3067-899 | 135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g | 135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g | R | 76,57 | 76,57 | 10,20 | 15,50 |
| | 3067-899 | | | | 59,95 | 59,95 | | |
| B-55 * | 7707-763 | 1 sachet-dose, 1,5 g | 1 sachet, 1,5 g | R | 0,7851 | 0,7851 | | |
| B-55 ** | 7707-763 | 1 sachet-dose, 1,5 g | 1 sachet, 1,5 g | R | 0,7061 | 0,7061 | | |
| B-55 *** | 7707-763 | 1 sachet-dose, 1,5 g | 1 sachet, 1,5 g | R | 0,7893 | 0,7893 | 0,1133 | 0,1722 |
| COLITOFALK 3 g | | | | DR FALK PHARMA BENELUX | | | ATC: A07EC02 | |
| B-55 | 3067-907 | 180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g | 180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g | R | 94,48 | 94,48 | 8,30 | 12,50 |
| | 3067-907 | | | | 76,28 | 76,28 | | |
| B-55 * | 7707-771 | 1 sachet-dose, 3 g | 1 sachet, 3 g | R | 1,4662 | 1,4662 | | |
| B-55 ** | 7707-771 | 1 sachet-dose, 3 g | 1 sachet, 3 g | R | 1,3477 | 1,3477 | | |
| B-55 *** | 7707-771 | 1 sachet-dose, 3 g | 1 sachet, 3 g | R | 1,4824 | 1,4824 | 0,1383 | 0,2083 |
| COLITOFALK LAVEMENT | | | | DR FALK PHARMA BENELUX | | | ATC: A07EC02 | |
| B-55 | 0323-451 | 420 g suspension rectale, 33,33 mg/g | 420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g | R | 31,34 | 31,34 | 4,79 | 8,06 |
| | 0323-451 | | | | 20,59 | 20,59 | | |
| B-55 * | 0740-449 | 1 récipient unidose, 33,33 mg/g | 1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g | R | 3,7957 | 3,7957 | | |
| B-55 ** | 0740-449 | 1 récipient unidose, 33,33 mg/g | 1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g | R | 3,1186 | 3,1186 | | |
| COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml | | | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | | ATC: R03AL02 | |
| B-98 | 1404-920 | 20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml | 20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml | R | 12,39 | 12,39 | 1,39 | 2,31 |
| | 1404-920 | | | | 5,23 | 5,23 | | |
| B-98 | 1688-951 | 60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml | 60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml | R | 22,13 | 22,13 | 3,36 | 5,60 |
| | 1688-951 | | | | 12,67 | 12,67 | | |
| B-98 * | 0768-382 | 1 récipient unidose 2,5 mL solution | 1 verpakking voor éénmalig | R | 0,2725 | 0,2725 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| B-98 ** | 0768-382 | pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL 1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL | gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL | R | 0,2238 | 0,2238 | | | |
| COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL | | ECO PHARMA SUPPLY SRL | | ATC: N02BE51 | | | | | |
| B-313 * | 7738-123 7738-123 | 10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL | 10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL | R | 38,13 4,7530 | 38,13 4,7530 | | | |
| B-313 ** | 7738-123 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL | R | 4,0420 | 4,0420 | | | |
| CONTRAMAL | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 1070-382 | 10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml | 10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | R | 9,39 | 9,39 | 0,78 | 1,30 | |
| | 1070-382 | | | | 2,94 | 2,94 | | | |
| B-56 * | 0743-948 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 0,3790 | 0,3790 | | | |
| B-56 ** | 0743-948 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 0,3120 | 0,3120 | | | |
| CONTRAMAL | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 1426-121 | 1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL | 1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL | R | 13,05 | 13,05 | 1,52 | 2,53 | |
| | 1426-121 | | | | 5,73 | 5,73 | | | |
| B-56 | 1070-358 | 1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | R | 7,53 | 7,53 | 0,37 | 0,62 | |
| | 1070-358 | | | | 1,40 | 1,40 | | | |
| B-56 | 1070-366 | 3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | R | 10,61 | 10,61 | 1,03 | 1,71 | |
| | 1070-366 | | | | 3,87 | 3,87 | | | |
| B-56 * | 0743-963 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | R | 0,1478 | 0,1478 | | | |
| B-56 ** | 0743-963 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | R | 0,1214 | 0,1214 | | | |
| CONTRAMAL 50 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 1070-390 | 30 gélules, 50 mg | 30 capsules, hard, 50 mg | R | 8,29 | 8,29 | 0,55 | 0,91 | |
| | 1070-390 | | | | 2,07 | 2,07 | | | |
| B-56 | 1070-408 | 60 gélules, 50 mg | 60 capsules, hard, 50 mg | R | 10,40 | 10,40 | 0,98 | 1,64 | |
| | 1070-408 | | | | 3,71 | 3,71 | | | |
| B-56 * | 0743-799 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,0798 | 0,0798 | | | |
| B-56 ** | 0743-799 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,0655 | 0,0655 | | | |
| B-56 *** | 0743-799 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,0811 | 0,0811 | 0,0163 | 0,0273 | |
| CONTRAMAL RETARD 100 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 1360-130 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | R | 10,61 | 10,61 | 1,03 | 1,71 | |
| | 1360-130 | | | | 3,87 | 3,87 | | | |
| B-56 | 2246-551 | 60 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | R | 13,92 | 13,92 | 1,70 | 2,83 | |
| | 2246-551 | | | | 6,40 | 6,40 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 | 3677-887 | 100 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | R | 21,27 | 21,27 | 3,18 | 5,31 |
| | 3677-887 | | | | 12,01 | 12,01 | | |
| B-56 * | 0749-408 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | R | 0,1550 | 0,1550 | | |
| B-56 ** | 0749-408 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | R | 0,1273 | 0,1273 | | |
| B-56 *** | 0749-408 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | R | 0,1574 | 0,1574 | 0,0318 | 0,0531 |
| CONTRAMAL RETARD 150 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 2246-577 | 60 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | R | 18,97 | 18,97 | 2,72 | 4,53 |
| | 2246-577 | | | | 10,26 | 10,26 | | |
| B-56 | 3677-903 | 100 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | R | 26,36 | 26,36 | 4,10 | 6,89 |
| | 3677-903 | | | | 16,25 | 16,25 | | |
| B-56 * | 0749-416 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | R | 0,2097 | 0,2097 | | |
| B-56 ** | 0749-416 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | R | 0,1723 | 0,1723 | | |
| B-56 *** | 0749-416 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | R | 0,2083 | 0,2083 | 0,0410 | 0,0689 |
| CONTRAMAL RETARD 200 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 2246-544 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | R | 21,32 | 21,32 | 3,20 | 5,33 |
| | 2246-544 | | | | 12,05 | 12,05 | | |
| B-56 | 3677-895 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | R | 30,09 | 30,09 | 4,62 | 7,76 |
| | 3677-895 | | | | 19,50 | 19,50 | | |
| B-56 * | 0749-424 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | R | 0,2516 | 0,2516 | | |
| B-56 ** | 0749-424 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | R | 0,2067 | 0,2067 | | |
| B-56 *** | 0749-424 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | R | 0,2456 | 0,2456 | 0,0462 | 0,0776 |
| CONTRAMAL RETARD 50 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 2437-184 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | R | 10,49 | 10,49 | 1,01 | 1,68 |
| | 2437-184 | | | | 3,79 | 3,79 | | |
| B-56 * | 0786-723 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,0815 | 0,0815 | | |
| B-56 ** | 0786-723 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,0670 | 0,0670 | | |
| B-56 *** | 0786-723 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,0827 | 0,0827 | 0,0168 | 0,0280 |
| COPERINDO 10 mg/2,5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09BA04 | | | | |
| B-21 | 3535-515 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | G | 19,45 | 19,45 | 2,82 | 4,69 |
| | 3535-515 | | | | 10,62 | 10,62 | | |
| B-21 | 3535-523 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | G | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 |
| | 3535-523 | | | | 25,48 | 25,48 | | |
| B-21 * | 7719-685 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | G | 0,3653 | 0,3653 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-21 ** | 7719-685 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | G | 0,3001 | 0,3001 | | |
| B-21 *** | 7719-685 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | G | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 |
| COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09BA04 | | | | |
| B-21 | 3353-521 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg | G | 13,79 | 13,79 | 1,67 | 2,78 |
| | 3353-521 | | | | 6,30 | 6,30 | | |
| B-21 | 3353-554 | 90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg | 90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg | G | 25,10 | 25,10 | 3,93 | 6,59 |
| | 3353-554 | | | | 15,16 | 15,16 | | |
| B-21 * | 7713-910 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 0,2173 | 0,2173 | | |
| B-21 ** | 7713-910 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 0,1786 | 0,1786 | | |
| B-21 *** | 7713-910 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 0,2174 | 0,2174 | 0,0437 | 0,0732 |
| COPERINDO 5 mg/1,25 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09BA04 | | | | |
| B-21 | 3353-570 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | G | 14,62 | 14,62 | 1,84 | 3,07 |
| | 3353-570 | | | | 6,94 | 6,94 | | |
| B-21 | 3353-588 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | G | 26,80 | 26,80 | 4,16 | 6,99 |
| | 3353-588 | | | | 16,64 | 16,64 | | |
| B-21 * | 7713-928 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2386 | 0,2386 | | |
| B-21 ** | 7713-928 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,1960 | 0,1960 | | |
| B-21 *** | 7713-928 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2363 | 0,2363 | 0,0462 | 0,0777 |
| CORDARONE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C01BD01 | | | | |
| | 0703-595 | 6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml | 6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | | 2,41 | 2,41 | | |
| B-11 * | 0703-595 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | r | 0,5183 | 0,5183 | | |
| B-11 ** | 0703-595 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | r | 0,4250 | 0,4250 | | |
| CORDARONE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C01BD01 | | | | |
| B-11 | 0106-989 | 60 comprimés, 200 mg | 60 tabletten, 200 mg | R | 11,91 | 11,91 | 1,29 | 2,15 |
| | 0106-989 | | | | 4,87 | 4,87 | | |
| B-11 * | 0703-587 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,1047 | 0,1047 | | |
| B-11 ** | 0703-587 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,0860 | 0,0860 | | |
| B-11 *** | 0703-587 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,1064 | 0,1064 | 0,0215 | 0,0358 |
| COROTROPE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C01CE02 | | | | |
| | 0734-368 | 10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml | 10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 144,45 | 144,45 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-2 * | 0734-368 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | | 16,0230 | 16,0230 | | |
| B-2 ** | 0734-368 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | | 15,3120 | 15,3120 | | |
| COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2574-960 2574-960 | 60 comprimés, 10 mg / 10 mg | 60 tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 39,01 27,26 | 39,01 27,26 | 5,86 | 9,86 |
| B-21 | 2574-978 2574-978 | 90 comprimés, 10 mg / 10 mg | 90 tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 54,97 41,16 | 54,97 41,16 | 8,09 | 13,61 |
| B-21 * | 0790-956 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5638 | 0,5638 | | |
| B-21 ** | 0790-956 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4848 | 0,4848 | | |
| B-21 *** | 0790-956 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5493 | 0,5493 | 0,0899 | 0,1512 |
| COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4849-840 4849-840 | 90 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,97 41,16 | 54,97 41,16 | 8,09 | 13,61 |
| B-21 * | 7741-549 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5638 | 0,5638 | | |
| B-21 ** | 7741-549 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4848 | 0,4848 | | |
| B-21 *** | 7741-549 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5493 | 0,5493 | 0,0899 | 0,1512 |
| COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2854-594 2854-594 | 60 comprimés, 10 mg / 10 mg | 60 tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 39,01 27,26 | 39,01 27,26 | 5,86 | 9,86 |
| B-21 | 2854-602 2854-602 | 90 comprimés, 10 mg / 10 mg | 90 tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 54,97 41,16 | 54,97 41,16 | 8,09 | 13,61 |
| B-21 * | 0756-098 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5638 | 0,5638 | | |
| B-21 ** | 0756-098 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4848 | 0,4848 | | |
| B-21 *** | 0756-098 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5493 | 0,5493 | 0,0899 | 0,1512 |
| COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4685-962 4685-962 | 90 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,97 41,16 | 54,97 41,16 | 8,09 | 13,61 |
| B-21 * | 7737-356 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5638 | 0,5638 | | |
| B-21 ** | 7737-356 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4848 | 0,4848 | | |
| B-21 *** | 7737-356 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5493 | 0,5493 | 0,0899 | 0,1512 |
| COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2765-030 2765-030 | 60 comprimés, 10 mg / 10 mg | 60 tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 39,01 27,26 | 39,01 27,26 | 5,86 | 9,86 |
| B-21 | 2764-991 2764-991 | 90 comprimés, 10 mg / 10 mg | 90 tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 54,97 41,16 | 54,97 41,16 | 8,09 | 13,61 |
| B-21 * | 0759-027 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5638 | 0,5638 | | |
| B-21 ** | 0759-027 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4848 | 0,4848 | | |
| B-21 *** | 0759-027 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5493 | 0,5493 | 0,0899 | 0,1512 |
| COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2574-945 2574-945 | 60 comprimés, 10 mg / 5 mg | 60 tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 34,82 23,62 | 34,82 23,62 | 5,28 | 8,88 |
| B-21 | 2574-952 2574-952 | 90 comprimés, 10 mg / 5 mg | 90 tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 43,78 31,41 | 43,78 31,41 | 6,53 | 10,98 |
| B-21 * | 0791-145 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4489 | 0,4489 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 ** | 0791-145 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 0791-145 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4849-857 | 90 comprimés, 10 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 5 mg | R | 43,78 | 43,78 | 6,53 | 10,98 |
| | 4849-857 | | | | 31,41 | 31,41 | | |
| B-21 * | 7741-556 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4489 | 0,4489 | | |
| B-21 ** | 7741-556 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 7741-556 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 2854-578 | 60 comprimés, 10 mg / 5 mg | 60 tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 34,82 | 34,82 | 5,28 | 8,88 |
| | 2854-578 | | | | 23,62 | 23,62 | | |
| B-21 | 2854-586 | 90 comprimés, 10 mg / 5 mg | 90 tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 43,78 | 43,78 | 6,53 | 10,98 |
| | 2854-586 | | | | 31,41 | 31,41 | | |
| B-21 * | 0756-106 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4489 | 0,4489 | | |
| B-21 ** | 0756-106 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 0756-106 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4685-970 | 90 comprimés, 10 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 5 mg | R | 43,78 | 43,78 | 6,53 | 10,98 |
| | 4685-970 | | | | 31,41 | 31,41 | | |
| B-21 * | 7737-364 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4489 | 0,4489 | | |
| B-21 ** | 7737-364 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 7737-364 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 2765-014 | 60 comprimés, 10 mg / 5 mg | 60 tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 34,82 | 34,82 | 5,28 | 8,88 |
| | 2765-014 | | | | 23,62 | 23,62 | | |
| B-21 | 2765-022 | 90 comprimés, 10 mg / 5 mg | 90 tabletten, 10 mg / 5 mg | R | 43,78 | 43,78 | 6,53 | 10,98 |
| | 2765-022 | | | | 31,41 | 31,41 | | |
| B-21 * | 0759-035 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4489 | 0,4489 | | |
| B-21 ** | 0759-035 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 0759-035 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| COVERAM 5 mg/10 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 2574-929 | 30 comprimés, 5 mg / 10 mg | 30 tabletten, 5 mg / 10 mg | R | 17,97 | 17,97 | 2,52 | 4,19 |
| | 2574-929 | | | | 9,49 | 9,49 | | |
| B-21 | 2574-937 | 90 comprimés, 5 mg / 10 mg | 90 tabletten, 5 mg / 10 mg | R | 39,18 | 39,18 | 5,89 | 9,90 |
| | 2574-937 | | | | 27,41 | 27,41 | | |
| B-21 * | 0791-392 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3930 | 0,3930 | | |
| B-21 ** | 0791-392 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3228 | 0,3228 | | |
| B-21 *** | 0791-392 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3738 | 0,3738 | 0,0654 | 0,1100 |
| COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4849-832 | 90 comprimés, 5 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 10 mg | R | 39,18 | 39,18 | 5,89 | 9,90 |
| | 4849-832 | | | | 27,41 | 27,41 | | |
| B-21 * | 7741-531 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3930 | 0,3930 | | |
| B-21 ** | 7741-531 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3228 | 0,3228 | | |
| B-21 *** | 7741-531 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3738 | 0,3738 | 0,0654 | 0,1100 |
| COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BB04 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-21 | 2854-545 2854-545 | 30 comprimés, 5 mg / 10 mg | 30 tabletten, 5 mg / 10 mg | R | 17,97 9,49 | 17,97 9,49 | 2,52 | 4,19 |
| B-21 | 2854-560 2854-560 | 90 comprimés, 5 mg / 10 mg | 90 tabletten, 5 mg / 10 mg | R | 39,18 27,41 | 39,18 27,41 | 5,89 | 9,90 |
| B-21 * | 0756-114 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3930 | 0,3930 | | |
| B-21 ** | 0756-114 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3228 | 0,3228 | | |
| B-21 *** | 0756-114 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3738 | 0,3738 | 0,0654 | 0,1100 |
| COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 3595-675 3595-675 | 30 comprimés, 5 mg/ 10 mg | 30 tabletten, 5 mg/ 10 mg | R | 17,97 9,49 | 17,97 9,49 | 2,52 | 4,19 |
| B-21 | 3001-294 3001-294 | 90 comprimés, 5 mg | 90 tabletten, 5 mg | R | 39,18 27,41 | 39,18 27,41 | 5,89 | 9,90 |
| B-21 * | 7701-147 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3930 | 0,3930 | | |
| B-21 ** | 7701-147 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3228 | 0,3228 | | |
| B-21 *** | 7701-147 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3738 | 0,3738 | 0,0654 | 0,1100 |
| COVERAM 5 mg/5 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 2574-747 2574-747 | 30 comprimés, 5 mg / 5 mg | 30 tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 16,68 8,51 | 16,68 8,51 | 2,26 | 3,76 |
| B-21 | 2574-911 2574-911 | 90 comprimés, 5 mg / 5 mg | 90 tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 28,78 18,36 | 28,78 18,36 | 4,44 | 7,46 |
| B-21 * | 0791-152 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 0791-152 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 0791-152 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4849-824 4849-824 | 90 comprimés, 5 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 5 mg | R | 28,78 18,36 | 28,78 18,36 | 4,44 | 7,46 |
| B-21 * | 7741-523 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 7741-523 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 7741-523 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 2854-529 2854-529 | 30 comprimés, 5 mg / 5 mg | 30 tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 16,68 8,51 | 16,68 8,51 | 2,26 | 3,76 |
| B-21 | 2854-537 2854-537 | 90 comprimés, 5 mg / 5 mg | 90 tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 28,78 18,36 | 28,78 18,36 | 4,44 | 7,46 |
| B-21 * | 0756-122 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 0756-122 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 0756-122 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4685-954 4685-954 | 90 comprimés, 5 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 5 mg | R | 28,78 18,36 | 28,78 18,36 | 4,44 | 7,46 |
| B-21 * | 7737-349 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 7737-349 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 7737-349 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 3439-759 | 30 comprimés, 5 mg/ 5 mg | 30 tabletten, 5 mg/ 5 mg | R | 16,68 | 16,68 | 2,26 | 3,76 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-21 | 3439-759 2765-006 | 90 comprimés, 5 mg / 5 mg | 90 tabletten, 5 mg / 5 mg | R | 8,51 28,78 | 8,51 28,78 | 4,44 | 7,46 |
| | 2765-006 | | | | 18,36 | 18,36 | | |
| B-21 * | 0759-043 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 0759-043 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 0759-043 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2509-420 | 60 comprimés pelliculés, 10 mg | 60 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 29,62 | 29,62 | 4,55 | 7,65 |
| | 2509-420 | | | | 19,08 | 19,08 | | |
| B-21 | 2572-485 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 36,99 | 36,99 | 5,58 | 9,39 |
| | 2572-485 | | | | 25,51 | 25,51 | | |
| B-21 * | 0789-123 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3658 | 0,3658 | | |
| B-21 ** | 0789-123 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3004 | 0,3004 | | |
| B-21 *** | 0789-123 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3496 | 0,3496 | 0,0620 | 0,1043 |
| COVERSYL 10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4200-432 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 36,99 | 36,99 | 5,58 | 9,39 |
| | 4200-432 | | | | 25,51 | 25,51 | | |
| B-21 * | 7736-523 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3658 | 0,3658 | | |
| B-21 ** | 7736-523 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3004 | 0,3004 | | |
| B-21 *** | 7736-523 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3496 | 0,3496 | 0,0620 | 0,1043 |
| COVERSYL 10 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4787-909 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 36,99 | 36,99 | 5,58 | 9,39 |
| | 4787-909 | | | | 25,51 | 25,51 | | |
| B-21 * | 7740-137 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3658 | 0,3658 | | |
| B-21 ** | 7740-137 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3004 | 0,3004 | | |
| B-21 *** | 7740-137 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3496 | 0,3496 | 0,0620 | 0,1043 |
| COVERSYL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2678-605 | 60 comprimés pelliculés, 10 mg | 60 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 29,49 | 29,49 | 4,54 | 7,62 |
| | 2678-605 | | | | 18,97 | 18,97 | | |
| B-21 | 2678-613 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 36,99 | 36,99 | 5,58 | 9,39 |
| | 2678-613 | | | | 25,51 | 25,51 | | |
| B-21 * | 0796-565 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3658 | 0,3658 | | |
| B-21 ** | 0796-565 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3004 | 0,3004 | | |
| B-21 *** | 0796-565 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3496 | 0,3496 | 0,0620 | 0,1043 |
| COVERSYL 10mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4630-216 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 36,99 | 36,99 | 5,58 | 9,39 |
| | 4630-216 | | | | 25,51 | 25,51 | | |
| B-21 * | 7736-242 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3658 | 0,3658 | | |
| B-21 ** | 7736-242 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3004 | 0,3004 | | |
| B-21 *** | 7736-242 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,3496 | 0,3496 | 0,0620 | 0,1043 |
| COVERSYL 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2509-412 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 11,60 | 11,60 | 1,23 | 2,05 |
| | 2509-412 | | | | 4,63 | 4,63 | | |
| B-21 | 2572-477 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 21,62 | 21,62 | 3,26 | 5,43 |
| | 2572-477 | | | | 12,28 | 12,28 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 * | 0789-115 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1761 | 0,1761 | | |
| B-21 ** | 0789-115 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1447 | 0,1447 | | |
| B-21 *** | 0789-115 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1788 | 0,1788 | 0,0362 | 0,0603 |
| COVERSYL 5 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | | ATC: C09AA04 | | | |
| B-21 | 4754-784 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 21,62 | 21,62 | 3,26 | 5,43 |
| | 4754-784 | | | | 12,28 | 12,28 | | |
| B-21 * | 7739-311 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1761 | 0,1761 | | |
| B-21 ** | 7739-311 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1447 | 0,1447 | | |
| B-21 *** | 7739-311 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1788 | 0,1788 | 0,0362 | 0,0603 |
| COVERSYL 5 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: C09AA04 | | | |
| B-21 | 2678-589 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 11,60 | 11,60 | 1,23 | 2,05 |
| | 2678-589 | | | | 4,63 | 4,63 | | |
| B-21 | 2678-597 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 21,62 | 21,62 | 3,26 | 5,43 |
| | 2678-597 | | | | 12,28 | 12,28 | | |
| B-21 * | 0796-557 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1761 | 0,1761 | | |
| B-21 ** | 0796-557 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1447 | 0,1447 | | |
| B-21 *** | 0796-557 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,1788 | 0,1788 | 0,0362 | 0,0603 |
| COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg | | EUTHERAPIE BENELUX | | | ATC: C09BA04 | | | |
| B-21 | 2734-523 | 60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg | 60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg | R | 27,95 | 27,95 | 4,32 | 7,26 |
| | 2734-523 | | | | 17,64 | 17,64 | | |
| B-21 | 2734-531 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg | R | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 |
| | 2734-531 | | | | 25,48 | 25,48 | | |
| B-21 * | 0757-765 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3653 | 0,3653 | | |
| B-21 ** | 0757-765 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3001 | 0,3001 | | |
| B-21 *** | 0757-765 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 |
| COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | | ATC: C09BA04 | | | |
| B-21 | 4771-960 | 60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | R | 27,95 | 27,95 | 4,32 | 7,26 |
| | 4771-960 | | | | 17,64 | 17,64 | | |
| B-21 | 4771-978 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | R | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 |
| | 4771-978 | | | | 25,48 | 25,48 | | |
| B-21 * | 7739-659 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3653 | 0,3653 | | |
| B-21 ** | 7739-659 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3001 | 0,3001 | | |
| B-21 *** | 7739-659 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 |
| COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: C09BA04 | | | |
| B-21 | 3606-100 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | R | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 |
| | 3606-100 | | | | 25,48 | 25,48 | | |
| B-21 * | 7722-044 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3653 | 0,3653 | | |
| B-21 ** | 7722-044 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3001 | 0,3001 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 *** | 7722-044 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg | R | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 |
| COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg | | EUTHERAPIE BENELUX | | | ATC: C09BA04 | | | |
| B-21 | 2595-569 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | R | 14,62 | 14,62 | 1,84 | 3,07 |
| | 2595-569 | | | | 6,94 | 6,94 | | |
| B-21 | 2595-551 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | R | 27,23 | 27,23 | 4,22 | 7,09 |
| | 2595-551 | | | | 17,01 | 17,01 | | |
| B-21 * | 0799-171 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg | R | 0,2439 | 0,2439 | | |
| B-21 ** | 0799-171 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg | R | 0,2003 | 0,2003 | | |
| B-21 *** | 0799-171 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg | R | 0,2411 | 0,2411 | 0,0469 | 0,0788 |
| COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: C09BA04 | | | |
| B-21 | 3606-092 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | R | 27,23 | 27,23 | 4,22 | 7,09 |
| | 3606-092 | | | | 17,01 | 17,01 | | |
| B-21 * | 7721-962 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg | R | 0,2439 | 0,2439 | | |
| B-21 ** | 7721-962 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg | R | 0,2003 | 0,2003 | | |
| B-21 *** | 7721-962 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg | R | 0,2411 | 0,2411 | 0,0469 | 0,0788 |
| COZAAR 100 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: C09CA01 | | | |
| B-224 | 2093-474 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 22,75 | 22,75 | 3,48 | 5,81 |
| | 2093-474 | | | | 13,14 | 13,14 | | |
| B-224 * | 0776-294 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1731 | 0,1731 | | |
| B-224 ** | 0776-294 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1421 | 0,1421 | | |
| B-224 *** | 0776-294 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 |
| COZAAR 50 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: C09CA01 | | | |
| B-224 | 1432-822 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 22,75 | 22,75 | 3,48 | 5,81 |
| | 1432-822 | | | | 13,14 | 13,14 | | |
| B-224 * | 0745-703 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1731 | 0,1731 | | |
| B-224 ** | 0745-703 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1421 | 0,1421 | | |
| B-224 *** | 0745-703 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 |
| COZAAR 50 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: C09CA01 | | | |
| B-224 | 2866-713 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 22,75 | 22,75 | 3,48 | 5,81 |
| | 2866-713 | | | | 13,14 | 13,14 | | |
| B-224 * | 0755-595 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1731 | 0,1731 | | |
| B-224 ** | 0755-595 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1421 | 0,1421 | | |
| B-224 *** | 0755-595 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 |
| COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: C09DA01 | | | |
| B-224 | 1432-830 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | R | 23,83 | 23,83 | 3,73 | 6,21 |
| | 1432-830 | | | | 14,05 | 14,05 | | |
| B-224 * | 0760-744 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg | R | 0,1850 | 0,1850 | | |
| B-224 ** | 0760-744 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg | R | 0,1519 | 0,1519 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-224 *** | 0760-744 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg | R | 0,1867 | 0,1867 | 0,0381 | 0,0634 |
| COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09DA01 | | | | |
| B-224 | 2218-006 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg | R | 23,83 | 23,83 | 3,73 | 6,21 |
| | 2218-006 | | | | 14,05 | 14,05 | | |
| B-224 * | 0779-751 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg | R | 0,1850 | 0,1850 | | |
| B-224 ** | 0779-751 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg | R | 0,1519 | 0,1519 | | |
| B-224 *** | 0779-751 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg | R | 0,1867 | 0,1867 | 0,0381 | 0,0634 |
| CRESTOR 10 mg | | GRUNENTHAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 2040-418 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 11,09 | 11,09 | 1,12 | 1,87 |
| | 2040-418 | | | | 4,24 | 4,24 | | |
| B-41 | 2055-200 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 23,24 | 23,24 | 3,59 | 5,98 |
| | 2055-200 | | | | 13,54 | 13,54 | | |
| B-41 * | 0774-869 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1783 | 0,1783 | | |
| B-41 ** | 0774-869 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1464 | 0,1464 | | |
| B-41 *** | 0774-869 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1806 | 0,1806 | 0,0366 | 0,0610 |
| CRESTOR 20 mg | | GRUNENTHAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 2040-400 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 11,27 | 11,27 | 1,16 | 1,94 |
| | 2040-400 | | | | 4,38 | 4,38 | | |
| B-41 | 2055-192 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 23,52 | 23,52 | 3,66 | 6,10 |
| | 2055-192 | | | | 13,79 | 13,79 | | |
| B-41 * | 0774-877 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1816 | 0,1816 | | |
| B-41 ** | 0774-877 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1492 | 0,1492 | | |
| B-41 *** | 0774-877 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1836 | 0,1836 | 0,0373 | 0,0622 |
| CRESTOR 40 mg | | GRUNENTHAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 2055-176 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 24,06 | 24,06 | 3,78 | 6,30 |
| | 2055-176 | | | | 14,25 | 14,25 | | |
| B-41 * | 0774-885 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,1877 | 0,1877 | | |
| B-41 ** | 0774-885 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,1542 | 0,1542 | | |
| B-41 *** | 0774-885 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,1891 | 0,1891 | 0,0386 | 0,0643 |
| CRESTOR 5 mg | | GRUNENTHAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 4867-156 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 9,37 | 9,37 | 0,78 | 1,29 |
| | 4867-156 | | | | 2,93 | 2,93 | | |
| B-41 | 4867-149 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | 13,86 | 13,86 | 1,69 | 2,81 |
| | 4867-149 | | | | 6,36 | 6,36 | | |
| B-41 * | 0783-050 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,0838 | 0,0838 | | |
| B-41 ** | 0783-050 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,0688 | 0,0688 | | |
| B-41 *** | 0783-050 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | 0,0850 | 0,0850 | 0,0172 | 0,0287 |
| CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g | | LABORATOIRES MEDGEN SAS | | ATC: D05AX52 | | | | |
| B-275 | 4825-253 | 1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g | G | 25,04 | 25,04 | 3,92 | 6,58 |
| | 4825-253 | | | | 15,10 | 15,10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-275 * | 7741-507 | 1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | G | 19,4900 | 19,4900 | | |
| B-275 ** | 7741-507 | 1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | G | 16,0100 | 16,0100 | | |
| CRYSSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g | | LABORATOIRES MEDGEN SAS | | | ATC: D05AX52 | | | |
| B-275 | 4614-335 | 1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | G | 25,04 | 25,04 | 3,92 | 6,58 |
| | 4614-335 | | | | 15,10 | 15,10 | | |
| B-275 * | 7735-467 | 1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | G | 0,3248 | 0,3248 | | |
| B-275 ** | 7735-467 | 1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | G | 0,2668 | 0,2668 | | |
| CURATODERM | | ALMIRALL | | | ATC: D05AX04 | | | |
| B-222 | 1313-279 | 1 tube 150 g pommade, 4 µg/g | 1 tube 150 g zalf, 4 µg/g | | 61,23 | 61,23 | 8,30 | 12,50 |
| | 1313-279 | | | | 46,59 | 46,59 | | |
| B-222 * | 0749-432 | 1 g pommade, 4 µg/g | 1 g zalf, 4 µg/g | | 0,3767 | 0,3767 | | |
| B-222 ** | 0749-432 | 1 g pommade, 4 µg/g | 1 g zalf, 4 µg/g | | 0,3293 | 0,3293 | | |
| CURATODERM 4 µg/g | | ALMIRALL | | | ATC: D05AX04 | | | |
| B-222 | 2373-348 | 2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g | 2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g | | 31,48 | 31,48 | 4,81 | 8,09 |
| | 2373-348 | | | | 20,71 | 20,71 | | |
| B-222 * | 0784-892 | 1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g | 1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g | | 0,4455 | 0,4455 | | |
| B-222 ** | 0784-892 | 1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g | 1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g | | 0,3658 | 0,3658 | | |
| CYMBALTA 30 mg | | ELI LILLY BENELUX | | | ATC: N06AX21 | | | |
| B-73 | 2217-842 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | R | 13,80 | 13,80 | 1,67 | 2,79 |
| | 2217-842 | | | | 6,31 | 6,31 | | |
| B-73 * | 7709-215 | 1 gélule, 30 mg | 1 capsule, hard, 30 mg | R | 0,2907 | 0,2907 | | |
| B-73 ** | 7709-215 | 1 gélule, 30 mg | 1 capsule, hard, 30 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | | |
| B-73 *** | 7709-215 | 1 gélule, 30 mg | 1 capsule, hard, 30 mg | R | 0,2953 | 0,2953 | 0,0596 | 0,0996 |
| CYMBALTA 60 mg | | ELI LILLY BENELUX | | | ATC: N06AX21 | | | |
| B-73 | 2217-859 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | R | 18,62 | 18,62 | 2,65 | 4,42 |
| | 2217-859 | | | | 9,99 | 9,99 | | |
| B-73 | 3183-092 | 98 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | R | 36,19 | 36,19 | 5,47 | 9,20 |
| | 3183-092 | | | | 24,81 | 24,81 | | |
| B-73 * | 0782-219 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | R | 0,3267 | 0,3267 | | |
| B-73 ** | 0782-219 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | R | 0,2684 | 0,2684 | | |
| B-73 *** | 0782-219 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | R | 0,3128 | 0,3128 | 0,0558 | 0,0939 |
| CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N06AX21 | | | |
| B-73 | 3240-157 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | R | 18,62 | 18,62 | 2,65 | 4,42 |
| | 3240-157 | | | | 9,99 | 9,99 | | |
| B-73 | 3585-288 | 98 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | R | 36,19 | 36,19 | 5,47 | 9,20 |
| | 3585-288 | | | | 24,81 | 24,81 | | |
| B-73 * | 7719-883 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | R | 0,3267 | 0,3267 | | |
| B-73 ** | 7719-883 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, | R | 0,2684 | 0,2684 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-73 *** | 7719-883 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | hard, 60 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | R | 0,4675 | 0,4675 | 0,0946 | 0,1579 |
| CYMEVENE | | EUROCEPT | | ATC: J05AB06 | | | | |
| A-54 * | 0731-935 | 0731-935 1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg | | 22,55 | 22,55 | | |
| A-54 ** | 0731-935 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg | | 29,1000 | 29,1000 | | |
| A-54 ** | 0731-935 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg | | 23,9000 | 23,9000 | | |
| CYSTAGON | | RECORDATI | | ATC: A16AA04 | | | | |
| A-31 | 1550-839 | 100 gélules, 50 mg | 100 capsules, hard, 50 mg | | 86,32 | 86,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550-839 | | | | 68,84 | 68,84 | | |
| A-31 * | 0763-250 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | | 0,8008 | 0,8008 | | |
| A-31 ** | 0763-250 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | | 0,7297 | 0,7297 | | |
| A-31 *** | 0763-250 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | | 0,8078 | 0,8078 | 0,0000 | 0,0000 |
| CYSTAGON 150 mg | | RECORDATI | | ATC: A16AA04 | | | | |
| A-31 | 1550-847 | 100 gélules, 150 mg | 100 capsules, hard, 150 mg | | 204,93 | 204,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550-847 | | | | 177,03 | 177,03 | | |
| A-31 * | 0787-457 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | | 1,9476 | 1,9476 | | |
| A-31 ** | 0787-457 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | | 1,8765 | 1,8765 | | |
| A-31 *** | 0787-457 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | | 1,9940 | 1,9940 | 0,0000 | 0,0000 |
| CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC01 | | | | |
| A-24 * | 7705-486 | 7705-486 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | 21,18 | 21,18 | | |
| A-24 ** | 7705-486 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL | G | 27,3300 | 27,3300 | | |
| A-24 ** | 7705-486 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL | G | 22,4500 | 22,4500 | | |
| CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC01 | | | | |
| A-24 * | 7705-478 | 7705-478 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | 11,77 | 11,77 | | |
| A-24 ** | 7705-478 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL | G | 15,1900 | 15,1900 | | |
| A-24 ** | 7705-478 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL | G | 12,4800 | 12,4800 | | |
| CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC01 | | | | |
| A-24 | 3029-592 | 1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml | G | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,00 |
| A-24 * | 3029-592 | | | | 7,89 | 7,89 | | |
| A-24 * | 7702-368 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 10,1800 | 10,1800 | | |
| A-24 ** | 7702-368 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 8,3600 | 8,3600 | | |
| CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC01 | | | | |
| A-24 | 3029-600 | 1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml | G | 29,73 | 29,73 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|
| | 3029-600 | mg/ml | | | | 19,19 | 19,19 | | |
| A-24 * | 7702-376 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 24,7600 | 24,7600 | | | |
| A-24 ** | 7702-376 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 20,3400 | 20,3400 | | | |
| CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC01 | | | | | |
| | 7703-812 | 1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml | | | 0,79 | 0,79 | | |
| A-24 * | 7703-812 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 1,0200 | 1,0200 | | | |
| A-24 ** | 7703-812 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 0,8400 | 0,8400 | | | |
| CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC01 | | | | | |
| | 7703-820 | 1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml | | | 3,94 | 3,94 | | |
| A-24 * | 7703-820 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 5,0800 | 5,0800 | | | |
| A-24 ** | 7703-820 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL | G | 4,1800 | 4,1800 | | | |
| CYTOSAR 1 g | | Pfizer | | ATC: L01BC01 | | | | | |
| | 0746-867 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | | 11,77 | 11,77 | | |
| A-24 * | 0746-867 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 mg/mL | R | 15,1900 | 15,1900 | | | |
| A-24 ** | 0746-867 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 mg/mL | R | 12,4800 | 12,4800 | | | |
| CYTOSAR 100 mg | | Pfizer | | ATC: L01BC01 | | | | | |
| | 0746-842 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml | | | 1,61 | 1,61 | | |
| A-24 * | 0746-842 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL | R | 2,0800 | 2,0800 | | | |
| A-24 ** | 0746-842 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL | R | 1,7100 | 1,7100 | | | |
| CYTOSAR 2 g | | Pfizer | | ATC: L01BC01 | | | | | |
| | 0746-875 | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | | 21,18 | 21,18 | | |
| A-24 * | 0746-875 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 mg/mL | R | 27,3300 | 27,3300 | | | |
| A-24 ** | 0746-875 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 mg/mL | R | 22,4500 | 22,4500 | | | |
| DACARBAZINE MEDAC 1000 mg | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | ATC: L01AX04 | | | | | |
| | 0762-583 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg | | | 51,86 | 51,86 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-28 * | 0762-583 | 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg | G | 62,0800 | 62,0800 | | |
| A-28 ** | 0762-583 | 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg | G | 54,9700 | 54,9700 | | |
| DACARBAZINE MEDAC 500 mg | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | ATC: L01AX04 | | | | |
| | 0762-575 | 1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg | | 28,68 | 28,68 | | |
| A-28 * | 0762-575 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg | G | 37,0100 | 37,0100 | | |
| A-28 ** | 0762-575 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg | G | 30,4000 | 30,4000 | | |
| DAILIPOINT 0,5 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | |
| A-29 | 4133-930 | 100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | G | 63,76 | 63,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133-930 | | | | 48,80 | 48,80 | | |
| A-29 * | 7727-662 | 1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | G | 0,5884 | 0,5884 | | |
| A-29 ** | 7727-662 | 1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| A-29 *** | 7727-662 | 1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg | G | 0,5823 | 0,5823 | 0,0000 | 0,0000 |
| DAILIPOINT 1 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | |
| A-29 | 4133-963 | 100 gélules à libération prolongée, 1 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg | G | 100,95 | 100,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133-963 | | | | 82,19 | 82,19 | | |
| A-29 * | 7727-670 | 1 gélule à libération prolongée, 1 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg | G | 0,9423 | 0,9423 | | |
| A-29 ** | 7727-670 | 1 gélule à libération prolongée, 1 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg | G | 0,8712 | 0,8712 | | |
| A-29 *** | 7727-670 | 1 gélule à libération prolongée, 1 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg | G | 0,9542 | 0,9542 | 0,0000 | 0,0000 |
| DAILIPOINT 2 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | |
| A-29 | 4133-971 | 100 gélules à libération prolongée, 2 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg | G | 187,56 | 187,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133-971 | | | | 161,18 | 161,18 | | |
| A-29 * | 7727-340 | 1 gélule à libération prolongée, 2 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg | G | 1,7796 | 1,7796 | | |
| A-29 ** | 7727-340 | 1 gélule à libération prolongée, 2 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg | G | 1,7085 | 1,7085 | | |
| A-29 *** | 7727-340 | 1 gélule à libération prolongée, 2 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg | G | 1,8202 | 1,8202 | 0,0000 | 0,0000 |
| DAILIPOINT 3 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | |
| A-29 | 4133-955 | 100 gélules à libération prolongée, 3 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg | G | 274,07 | 274,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133-955 | | | | 240,10 | 240,10 | | |
| A-29 * | 7727-688 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | G | 2,6162 | 2,6162 | | |
| A-29 ** | 7727-688 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | G | 2,5451 | 2,5451 | | |
| A-29 *** | 7727-688 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | G | 2,6854 | 2,6854 | 0,0000 | 0,0000 |
| DAILIPOINT 5 mg | | SANDOZ | | ATC: L04AD02 | | | | |
| A-29 | 4133-948 | 100 gélules à libération prolongée, 5 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg | G | 437,77 | 437,77 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|--------------|--------|
| A-29 * | 4133-948 7727-696 | 1 gélule à libération prolongée, 5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg | G | 389,40 4,1987 | 389,40 4,1987 | | |
| A-29 ** | 7727-696 | 1 gélule à libération prolongée, 5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg | G | 4,1276 | 4,1276 | | |
| A-29 *** | 7727-696 | 1 gélule à libération prolongée, 5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg | G | 4,3224 | 4,3224 | 0,0000 | 0,0000 |
| DAKTACORT | | JOHNSON & JOHNSON CONSUMER | | | ATC: D01AC52 | | | |
| B-155 | 0103-184 | 1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g | 1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g | R | 9,19 | 9,19 | 0,74 | 1,23 |
| | 0103-184 | | | | 2,79 | 2,79 | | |
| B-155 * | 0703-934 | 1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g | 1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g | R | 0,1200 | 0,1200 | | |
| B-155 ** | 0703-934 | 1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g | 1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g | R | 0,0987 | 0,0987 | | |
| DAKTARIN | | JOHNSON & JOHNSON CONSUMER | | | ATC: A01AB09 | | | |
| B-134 | 0033-910 | 40 g gel oral, 20 mg/g | 40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g | | 8,82 | 8,82 | 0,66 | 1,10 |
| | 0033-910 | | | | 2,50 | 2,50 | | |
| B-134 * | 0703-959 | 1 g, 20 mg/g | 1 g, 20 mg/g | | 0,0808 | 0,0808 | | |
| B-134 ** | 0703-959 | 1 g, 20 mg/g | 1 g, 20 mg/g | | 0,0663 | 0,0663 | | |
| DALACIN C 150 mg | | Pfizer | | | ATC: J01FF01 | | | |
| C-37 | 0033-670 | 16 gélules, 150 mg | 16 capsules, hard, 150 mg | R | 9,15 | 9,15 | 2,44 | 2,44 |
| | 0033-670 | | | | 2,76 | 2,76 | | |
| C-37 * | 0704-015 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,2225 | 0,2225 | | |
| C-37 ** | 0704-015 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,1831 | 0,1831 | | |
| C-37 *** | 0704-015 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,2259 | 0,2259 | 0,1525 | 0,1525 |
| DALACIN C 300 mg | | Pfizer | | | ATC: J01FF01 | | | |
| C-37 | 0107-706 | 16 gélules, 300 mg | 16 capsules, hard, 300 mg | R | 11,35 | 11,35 | 3,92 | 3,92 |
| | 0107-706 | | | | 4,44 | 4,44 | | |
| C-37 * | 0704-023 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,3581 | 0,3581 | | |
| C-37 ** | 0704-023 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,2944 | 0,2944 | | |
| C-37 *** | 0704-023 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,3637 | 0,3637 | 0,2450 | 0,2450 |
| DALACIN C 300 mg | | Pfizer | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01FF01 | |
| | 0704-049 | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml | | 10,33 | 10,33 | | |
| B-119 ** | 0704-049 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | R | 2,1900 | 2,1900 | | |
| DALACIN C 600 mg | | Pfizer | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01FF01 | |
| | 0704-056 | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml | | 18,90 | 18,90 | | |
| B-119 ** | 0704-056 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | R | 4,0060 | 4,0060 | | |
| DALACIN C 900 mg | | Pfizer | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01FF01 | |
| | 0704-064 | 1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml | 1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml | | 5,21 | 5,21 | | |
| B-119 ** | 0704-064 | 1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | R | 5,5200 | 5,5200 | | |
| DAONIL | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: A10BB01 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-12 | 0033-316 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0033-316 | | | | 9,39 | 9,39 | | |
| A-12 * | 0704-106 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,1212 | 0,1212 | | |
| A-12 ** | 0704-106 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0995 | 0,0995 | | |
| A-12 *** | 0704-106 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,1231 | 0,1231 | 0,0000 | 0,0000 |
| DAPHNE | | CERES PHARMA NV | | | ATC: G03HB01 | | | |
| Cx-13 | 2232-973 | 126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg | 126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg | G | 21,14 | 21,14 | 16,84 | 16,84 |
| | 2232-973 | | | | 11,91 | 11,91 | | |
| Cx-13 | 2394-062 | 273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg | 273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg | G | 37,34 | 37,34 | 30,20 | 30,20 |
| | 2394-062 | | | | 25,81 | 25,81 | | |
| Cx-13 * | 0781-377 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg | G | 0,1220 | 0,1220 | | |
| Cx-13 ** | 0781-377 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg | G | 0,1002 | 0,1002 | | |
| Cx-13 *** | 0781-377 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg | G | 0,1165 | 0,1165 | 0,1106 | 0,1106 |
| DE ICOL | | VIATRIS | | | ATC: S01CA01 | | | |
| B-166 | 0034-058 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml | | 8,36 | 8,36 | 0,56 | 0,94 |
| | 0034-058 | | | | 2,13 | 2,13 | | |
| B-166 * | 0704-361 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL | | 2,7500 | 2,7500 | | |
| B-166 ** | 0704-361 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL | | 2,2600 | 2,2600 | | |
| DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg | | IPSEN | | | ATC: L02AE04 | | | |
| A-27 | 1428-143 | 1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml | 1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml | | 252,21 | 252,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 1428-143 | | | | 220,14 | 220,14 | | |
| A-27 * | 0749-887 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL | | 240,4600 | 240,4600 | | |
| A-27 ** | 0749-887 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL | | 233,3500 | 233,3500 | | |
| DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg | | IPSEN | | | ATC: L02AE04 | | | |
| A-27 | 2713-063 | 1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml | 1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml | | 454,29 | 454,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 2713-063 | | | | 404,48 | 404,48 | | |
| A-27 * | 0759-944 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL | | 435,8600 | 435,8600 | | |
| A-27 ** | 0759-944 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL | | 428,7500 | 428,7500 | | |
| DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg | | IPSEN | | | ATC: L02AE04 | | | |
| A-27 | 0676-882 | 1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml | 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml | | 93,70 | 93,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0676-882 | | | | 75,58 | 75,58 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-27 * | 0733-881 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL | | 87,2200 | 87,2200 | | |
| A-27 ** | 0733-881 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL | | 80,1100 | 80,1100 | | |
| DEFERASIROX AB 180 mg AUROBINDO NV ATC: V03AC03 | | | | | | | | |
| A-35 | 4430-930 4430-930 | 90 comprimés pelliculés, 180 mg | 90 filmomhulde tabletten, 180 mg | G | 408,58 362,78 | 408,58 362,78 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7733-942 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,3518 | 4,3518 | | |
| A-35 ** | 7733-942 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,2728 | 4,2728 | | |
| A-35 *** | 7733-942 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,4783 | 4,4783 | 0,0000 | 0,0000 |
| DEFERASIROX AB 360 mg AUROBINDO NV ATC: V03AC03 | | | | | | | | |
| A-35 | 4430-922 4430-922 | 90 comprimés pelliculés, 360 mg | 90 filmomhulde tabletten, 360 mg | G | 751,38 675,45 | 751,38 675,45 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7733-959 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | G | 8,0343 | 8,0343 | | |
| A-35 ** | 7733-959 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | G | 7,9553 | 7,9553 | | |
| A-35 *** | 7733-959 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | G | 8,2872 | 8,2872 | 0,0000 | 0,0000 |
| DEFERASIROX AB 90 mg AUROBINDO NV ATC: V03AC03 | | | | | | | | |
| A-35 | 4430-906 4430-906 | 90 comprimés pelliculés, 90 mg | 90 filmomhulde tabletten, 90 mg | G | 193,94 167,00 | 193,94 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7733-934 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0459 | 2,0459 | | |
| A-35 ** | 7733-934 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | G | 1,9669 | 1,9669 | | |
| A-35 *** | 7733-934 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0934 | 2,0934 | 0,0000 | 0,0000 |
| DEFERASIROX ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: V03AC03 | | | | | | | | |
| A-35 | 4486-064 4486-064 | 90 comprimés pelliculés, 180 mg | 90 filmomhulde tabletten, 180 mg | G | 408,58 362,78 | 408,58 362,78 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7733-850 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,3518 | 4,3518 | | |
| A-35 ** | 7733-850 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,2728 | 4,2728 | | |
| A-35 *** | 7733-850 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,4783 | 4,4783 | 0,0000 | 0,0000 |
| DEFERASIROX ACCORD 360 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: V03AC03 | | | | | | | | |
| A-35 | 4486-072 4486-072 | 90 comprimés pelliculés, 360 mg | 90 filmomhulde tabletten, 360 mg | G | 751,38 675,45 | 751,38 675,45 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7733-868 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | G | 8,0343 | 8,0343 | | |
| A-35 ** | 7733-868 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | G | 7,9553 | 7,9553 | | |
| A-35 *** | 7733-868 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | G | 8,2872 | 8,2872 | 0,0000 | 0,0000 |
| DEFERASIROX ACCORD 90 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: V03AC03 | | | | | | | | |
| A-35 | 4486-056 4486-056 | 90 comprimés pelliculés, 90 mg | 90 filmomhulde tabletten, 90 mg | G | 193,94 167,00 | 193,94 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7733-843 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0459 | 2,0459 | | |
| A-35 ** | 7733-843 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | G | 1,9669 | 1,9669 | | |
| A-35 *** | 7733-843 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0934 | 2,0934 | 0,0000 | 0,0000 |
| DELA MOXYLE 1 g LABORATOIRES DELBERT ATC: J01CA04 | | | | | | | | |
| B-107 * | 0703-132 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL | r | 22,22 2,8670 | 22,22 2,8670 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| B-107 ** | 0703-132 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL | r | 2,3550 | 2,3550 | | | |
| DELPHI | | BEPHARBEL | | ATC: D07AB09 | | | | | |
| B-158 | 0108-043 | 1 tube 30 g crème, 1 mg/g | 1 tube 30 g crème, 1 mg/g | | 11,56 | 11,56 | 1,22 | 2,03 | |
| | 0108-043 | | | | 4,60 | 4,60 | | | |
| B-158 * | 0704-387 | 1 g crème, 1 mg/g | 1 g crème, 1 mg/g | | 0,1980 | 0,1980 | | | |
| B-158 ** | 0704-387 | 1 g crème, 1 mg/g | 1 g crème, 1 mg/g | | 0,1627 | 0,1627 | | | |
| DEPAKINE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: N03AG01 | | | | | |
| A-5 | 0034-579 | 1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml | 1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml | R | 10,61 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0034-579 | | | | 3,87 | 3,87 | | | |
| A-5 * | 0704-429 | 1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL | R | 0,0832 | 0,0832 | | | |
| A-5 ** | 0704-429 | 1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL | R | 0,0683 | 0,0683 | | | |
| DEPAKINE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: N03AG01 | | | | | |
| A-5 | 0891-234 | 1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml | 1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml | R | 10,03 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0891-234 | | | | 3,43 | 3,43 | | | |
| A-5 * | 0704-437 | 5 mL sirop, 60 mg/mL | 5 mL stroop, 60 mg/mL | R | 0,0738 | 0,0738 | | | |
| A-5 ** | 0704-437 | 5 mL sirop, 60 mg/mL | 5 mL stroop, 60 mg/mL | R | 0,0607 | 0,0607 | | | |
| DEPAKINE Chrono 300 | | SANOFI BELGIUM | | ATC: N03AG01 | | | | | |
| A-5 | 1123-694 | 50 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | R | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1123-694 | | | | 3,22 | 3,22 | | | |
| A-5 * | 0742-445 | 1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg | 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg | R | 0,0832 | 0,0832 | | | |
| A-5 ** | 0742-445 | 1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg | 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg | R | 0,0682 | 0,0682 | | | |
| A-5 *** | 0742-445 | 1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg | 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg | R | 0,0844 | 0,0844 | 0,0000 | 0,0000 | |
| DEPAKINE Chrono 500 | | SANOFI BELGIUM | | ATC: N03AG01 | | | | | |
| A-5 | 1123-686 | 50 comprimés à libération prolongée, 500 mg | 50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg | R | 12,62 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1123-686 | | | | 5,41 | 5,41 | | | |
| A-5 * | 0742-452 | 1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg | 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg | R | 0,1396 | 0,1396 | | | |
| A-5 ** | 0742-452 | 1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg | 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg | R | 0,1146 | 0,1146 | | | |
| A-5 *** | 0742-452 | 1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg | 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg | R | 0,1418 | 0,1418 | 0,0000 | 0,0000 | |
| DEPAKINE Enteric 300 | | SANOFI BELGIUM | | ATC: N03AG01 | | | | | |
| A-5 | 0033-894 | 100 comprimés gastro-résistants, 300 mg | 100 maagsapresistente tabletten, 300 mg | R | 10,96 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0033-894 | | | | 4,14 | 4,14 | | | |
| A-5 * | 0704-452 | 1 comprimé gastro-résistant, 300 mg | 1 maagsapresistente tablet, 300 mg | R | 0,0534 | 0,0534 | | | |
| A-5 ** | 0704-452 | 1 comprimé gastro-résistant, 300 mg | 1 maagsapresistente tablet, 300 mg | R | 0,0439 | 0,0439 | | | |
| A-5 *** | 0704-452 | 1 comprimé gastro-résistant, 300 mg | 1 maagsapresistente tablet, 300 mg | R | 0,0543 | 0,0543 | 0,0000 | 0,0000 | |
| DEPAKINE Enteric 500 | | SANOFI BELGIUM | | ATC: N03AG01 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-5 | 0135-806 | 100 comprimés gastro-résistants, 500 mg | 100 maagsapresistente tabletten, 500 mg | R | 15,03 | 15,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0135-806 | | | | 7,25 | 7,25 | | |
| A-5 * | 0704-460 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | R | 0,0936 | 0,0936 | | |
| A-5 ** | 0704-460 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | R | 0,0769 | 0,0769 | | |
| A-5 *** | 0704-460 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | R | 0,0950 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 |
| DEPAKINE I.V. | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: N03AG01 | | | |
| A-5 | 1085-380 | 1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml | r | 11,41 | 11,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 1085-380 | | | | 4,48 | 4,48 | | |
| A-5 * | 0743-864 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | r | 5,7800 | 5,7800 | | |
| A-5 ** | 0743-864 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | r | 4,7500 | 4,7500 | | |
| DEPO-ELIGARD 22,5 mg | | RECORDATI | | | ATC: L02AE02 | | | |
| A-27 | 2224-657 | 1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg | 1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg | r | 232,83 | 232,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 2224-657 | | | | 202,48 | 202,48 | | |
| A-27 * | 0784-082 | 1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg | 1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg | r | 221,7400 | 221,7400 | | |
| A-27 ** | 0784-082 | 1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg | 1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg | r | 214,6300 | 214,6300 | | |
| DEPO-ELIGARD 45 mg | | RECORDATI | | | ATC: L02AE02 | | | |
| A-27 | 2544-880 | 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg | 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg | r | 455,47 | 455,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 2544-880 | | | | 405,55 | 405,55 | | |
| A-27 * | 0790-311 | 1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg | 1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg | r | 436,9900 | 436,9900 | | |
| A-27 ** | 0790-311 | 1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg | 1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg | r | 429,8800 | 429,8800 | | |
| DEPO-ELIGARD 7,5 mg | | RECORDATI | | | ATC: L02AE02 | | | |
| A-27 | 2224-665 | 1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg | 1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg | r | 88,89 | 88,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 2224-665 | | | | 71,18 | 71,18 | | |
| A-27 * | 0784-074 | 1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg | 1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg | r | 82,5600 | 82,5600 | | |
| A-27 ** | 0784-074 | 1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg | 1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg | r | 75,4500 | 75,4500 | | |
| DEPO-MEDROL + LIDOCAINE | | Pfizer | | | ATC: H02AB04 | | | |
| B-83 | 0108-555 | 1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml | | 10,72 | 10,72 | 1,05 | 1,75 |
| | 0108-555 | | | | 3,96 | 3,96 | | |
| B-83 | 0108-670 | 3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml | 3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml | | 19,46 | 19,46 | 2,82 | 4,70 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|------------------------|------------------------|------|------|
| B-83 * | 0108-670 0704-577 | 1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | | 10,63 4,5733 | 10,63 4,5733 | | |
| B-83 ** | 0704-577 | 1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | | 3,7567 | 3,7567 | | |
| DEPO-MEDROL + LIDOCAINE Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0108-571 | 1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml | | 15,39 | 15,39 | 1,99 | 3,32 |
| | 0108-571 | | | | 7,52 | 7,52 | | |
| B-83 * | 0704-585 | 1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | | 9,7000 | 9,7000 | | |
| B-83 ** | 0704-585 | 1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL | | 7,9700 | 7,9700 | | |
| DEPO-MEDROL 200 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0150-573 | 1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 19,49 | 19,49 | 2,82 | 4,71 |
| | 0150-573 | | | | 10,65 | 10,65 | | |
| B-83 * | 0728-139 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 13,7400 | 13,7400 | | |
| B-83 ** | 0728-139 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 11,2900 | 11,2900 | | |
| DEPO-MEDROL 40 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0108-399 | 1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 9,22 | 9,22 | 0,75 | 1,24 |
| | 0108-399 | | | | 2,81 | 2,81 | | |
| B-83 | 0033-597 | 3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 15,42 | 15,42 | 2,00 | 3,34 |
| | 0033-597 | | | | 7,55 | 7,55 | | |
| B-83 * | 0704-551 | 1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 3,2467 | 3,2467 | | |
| B-83 ** | 0704-551 | 1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 2,6667 | 2,6667 | | |
| DEPO-MEDROL 40 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0033-746 | 1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 9,22 | 9,22 | 0,75 | 1,24 |
| | 0033-746 | | | | 2,81 | 2,81 | | |
| B-83 | 0036-863 | 3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 15,42 | 15,42 | 2,00 | 3,34 |
| | 0036-863 | | | | 7,55 | 7,55 | | |
| B-83 * | 0704-536 | 1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 3,2467 | 3,2467 | | |
| B-83 ** | 0704-536 | 1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 2,6667 | 2,6667 | | |
| DEPO-MEDROL 80 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0033-753 | 1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 12,52 | 12,52 | 1,41 | 2,36 |
| | 0033-753 | | | | 5,33 | 5,33 | | |
| B-83 * | 0704-544 | 1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 6,8800 | 6,8800 | | |
| B-83 ** | 0704-544 | 1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 5,6500 | 5,6500 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--|------|------|--|
| DEPO-MEDROL 80 mg | | Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | |
| B-83 | 0033-688 | 1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml | r | 12,52 | 12,52 | 1,41 | 2,36 | |
| | 0033-688 | | | | 5,33 | 5,33 | | | |
| B-83 * | 0704-569 | 1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 6,8800 | 6,8800 | | | |
| B-83 ** | 0704-569 | 1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL | r | 5,6500 | 5,6500 | | | |
| DEPO-PROVERA 150 | | Pfizer | | | | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AC06 | | | |
| B-90 | 0108-423 | 1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml | r | 10,32 | 10,32 | 0,97 | 1,62 | |
| | 0108-423 | | | | 3,66 | 3,66 | | | |
| B-90 * | 0704-593 | 1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL | r | 4,7200 | 4,7200 | | | |
| B-90 ** | 0704-593 | 1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL | r | 3,8800 | 3,8800 | | | |
| DEPO-PROVERA 500 | | Pfizer | | | | ATC: L02AB02 | | | |
| A-27 | 0107-722 | 1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml | 1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml | r | 13,11 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0107-722 | | | | 5,78 | 5,78 | | | |
| A-27 * | 0704-627 | 1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL | 1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL | r | 7,4600 | 7,4600 | | | |
| A-27 ** | 0704-627 | 1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL | 1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL | r | 6,1300 | 6,1300 | | | |
| DERMOVATE | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: D07AD01 | | | |
| B-156 | 0133-603 | 1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 9,42 | 9,42 | 0,79 | 1,31 | |
| | 0133-603 | | | | 2,97 | 2,97 | | | |
| B-156 * | 0704-684 | 1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 0,1277 | 0,1277 | | | |
| B-156 ** | 0704-684 | 1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 0,1050 | 0,1050 | | | |
| DERMOVATE | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: D07AD01 | | | |
| B-156 | 0035-717 | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g | | 9,42 | 9,42 | 0,79 | 1,31 | |
| | 0035-717 | | | | 2,97 | 2,97 | | | |
| B-156 * | 0704-668 | 1 g crème, 0,5 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g | | 0,1277 | 0,1277 | | | |
| B-156 ** | 0704-668 | 1 g crème, 0,5 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g | | 0,1050 | 0,1050 | | | |
| DERMOVATE | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: D07AD01 | | | |
| B-156 | 0035-725 | 1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g | 1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g | | 9,42 | 9,42 | 0,79 | 1,31 | |
| | 0035-725 | | | | 2,97 | 2,97 | | | |
| B-156 * | 0704-676 | 1 g pommade, 0,5 mg/g | 1 g zalf, 0,5 mg/g | | 0,1277 | 0,1277 | | | |
| B-156 ** | 0704-676 | 1 g pommade, 0,5 mg/g | 1 g zalf, 0,5 mg/g | | 0,1050 | 0,1050 | | | |
| DESFERAL | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: V03AC01 | | | |
| A-35 | 0034-926 | 10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg | 10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | | 34,55 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0034-926 | | | | 23,38 | 23,38 | | | |
| A-35 * | 0704-734 | 1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | | 3,0170 | 3,0170 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| A-35 ** | 0704-734 | 1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | | 2,4780 | 2,4780 | | |
| DES Loratadine SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: R06AX27 | | | | |
| Cs-7 | 2953-024 2953-024 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,89 3,32 | 9,89 3,32 | 3,52 | 3,52 |
| Cs-7 | 2953-099 2953-099 | 50 comprimés pelliculés, 5 mg | 50 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 12,47 5,29 | 12,47 5,29 | 5,61 | 5,61 |
| Cs-7 | 2953-032 2953-032 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 16,30 8,22 | 16,30 8,22 | 8,72 | 8,72 |
| Cs-7 * | 7700-156 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1061 | 0,1061 | | |
| Cs-7 ** | 7700-156 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0871 | 0,0871 | | |
| Cs-7 *** | 7700-156 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1077 | 0,1077 | 0,0872 | 0,0872 |
| DES Loratadine AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: R06AX27 | | | | |
| Cs-7 | 3983-251 3983-251 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,76 3,23 | 9,76 3,23 | 3,43 | 3,43 |
| Cs-7 | 3983-269 3983-269 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 16,27 8,19 | 16,27 8,19 | 8,69 | 8,69 |
| Cs-7 * | 7726-102 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1057 | 0,1057 | | |
| Cs-7 ** | 7726-102 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0868 | 0,0868 | | |
| Cs-7 *** | 7726-102 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1074 | 0,1074 | 0,0869 | 0,0869 |
| DES Loratadine EG 0,5 mg/ml | | EG | | ATC: R06AX27 | | | | |
| Cs-7 | 2948-321 2948-321 | 1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml | 1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml | G | 7,88 1,70 | 7,88 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| Cs-7 * | 0750-570 | 5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL | 5 mL drank, 0,5 mg/mL | G | 0,0730 | 0,0730 | | |
| Cs-7 ** | 0750-570 | 5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL | 5 mL drank, 0,5 mg/mL | G | 0,0600 | 0,0600 | | |
| DES Loratadine EG 5 mg | | EG | | ATC: R06AX27 | | | | |
| Cs-7 | 2948-313 2948-313 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,89 3,32 | 9,89 3,32 | 3,52 | 3,52 |
| Cs-7 | 2948-305 2948-305 | 50 comprimés pelliculés, 5 mg | 50 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 12,48 5,30 | 12,48 5,30 | 5,62 | 5,62 |
| Cs-7 | 2948-297 2948-297 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 16,44 8,32 | 16,44 8,32 | 8,82 | 8,82 |
| Cs-7 * | 0750-562 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1074 | 0,1074 | | |
| Cs-7 ** | 0750-562 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0882 | 0,0882 | | |
| Cs-7 *** | 0750-562 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1091 | 0,1091 | 0,0882 | 0,0882 |
| DES Loratadine KRKA 5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: R06AX27 | | | | |
| Cs-7 | 3912-045 3912-045 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,84 3,29 | 9,84 3,29 | 3,49 | 3,49 |
| Cs-7 | 3912-052 3912-052 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 16,31 8,23 | 16,31 8,23 | 8,73 | 8,73 |
| Cs-7 * | 7724-370 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | | |
| Cs-7 ** | 7724-370 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | |
| Cs-7 *** | 7724-370 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1078 | 0,1078 | 0,0873 | 0,0873 |
| DES Loratadine TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R06AX27 | | | | |
| Cs-7 | 3029-626 | 30 comprimés orodispersibles, 5 | 30 orodispergeerbare tabletten, 5 | G | 9,89 | 9,89 | 3,52 | 3,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|-------------|--------|--|
| | | mg | mg | | | | | | |
| | 3029-626 | | | | | 3,32 | 3,32 | | |
| Cs-7 | 3029-634 | 100 comprimés orodispersibles, 5 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 16,31 | 16,31 | 8,73 | 8,73 | |
| | 3029-634 | | | | | 8,23 | 8,23 | | |
| Cs-7 * | 7704-083 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | | | |
| Cs-7 ** | 7704-083 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | | |
| Cs-7 *** | 7704-083 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,1078 | 0,1078 | 0,0873 | 0,0873 | |
| DES Loratadine TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27 | | | | | | | | | |
| Cs-7 | 2899-375 | 10 comprimés pelliculés, 5 mg | 10 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,27 | 7,27 | 1,24 | 1,24 | |
| | 2899-375 | | | | | 1,17 | 1,17 | | |
| Cs-7 | 2899-391 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,83 | 9,83 | 3,48 | 3,48 | |
| | 2899-391 | | | | | 3,28 | 3,28 | | |
| Cs-7 | 2899-409 | 50 comprimés pelliculés, 5 mg | 50 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 12,38 | 12,38 | 5,54 | 5,54 | |
| | 2899-409 | | | | | 5,22 | 5,22 | | |
| Cs-7 | 2899-417 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 16,31 | 16,31 | 8,73 | 8,73 | |
| | 2899-417 | | | | | 8,23 | 8,23 | | |
| Cs-7 * | 0751-099 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | | | |
| Cs-7 ** | 0751-099 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | | |
| Cs-7 *** | 0751-099 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1078 | 0,1078 | 0,0873 | 0,0873 | |
| DEXAGENTA-POS URSAPHARM BENELUX ATC: S01CA01 | | | | | | | | | |
| B-166 | 1515-170 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml | G | 8,17 | 8,17 | 0,52 | 0,87 | |
| | 1515-170 | | | | | 1,96 | 1,96 | | |
| B-166 * | 0762-443 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL | G | 2,5300 | 2,5300 | | | |
| B-166 ** | 0762-443 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL | G | 2,0800 | 2,0800 | | | |
| DEXDOR 100 µg/ml ORION CORPORATION ATC: N05CM18 | | | | | | | | | |
| | 7700-180 | 4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml | 4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml | | 46,85 | 46,85 | | | |
| A-30 ** | 7700-180 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | R | 12,4150 | 12,4150 | | | |
| DEXDOR 100 µg/ml ORION CORPORATION ATC: N05CM18 | | | | | | | | | |
| | 0750-273 | 5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml | 5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml | | 29,19 | 29,19 | | | |
| A-30 ** | 0750-273 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | R | 6,1880 | 6,1880 | | | |
| DEXDOR 100 µg/ml ORION CORPORATION ATC: N05CM18 | | | | | | | | | |
| | 7700-198 | 4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml | 4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml | | 117,13 | 117,13 | | | |
| A-30 ** | 7700-198 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | R | 31,0400 | 31,0400 | | | |
| DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CM18 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--|--|
| | 7728-678 | 4 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL | 4 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL | | 117,12 | 117,12 | | |
| A-30 * | 7728-678 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 32,8150 | 32,8150 | | |
| A-30 ** | 7728-678 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 31,0375 | 31,0375 | | |
| DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CM18 | | | | | | | | |
| | 7728-652 | 4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL | 4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL | | 46,85 | 46,85 | | |
| A-30 * | 7728-652 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 14,1925 | 14,1925 | | |
| A-30 ** | 7728-652 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 12,4150 | 12,4150 | | |
| DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CM18 | | | | | | | | |
| | 7728-660 | 5 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL | 5 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL | | 29,19 | 29,19 | | |
| A-30 * | 7728-660 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 7,5340 | 7,5340 | | |
| A-30 ** | 7728-660 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 6,1880 | 6,1880 | | |
| DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: N05CM18 | | | | | | | | |
| | 7731-706 | 10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL | 10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL | | 117,12 | 117,12 | | |
| A-30 * | 7731-706 | 1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 13,1260 | 13,1260 | | |
| A-30 ** | 7731-706 | 1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 12,4150 | 12,4150 | | |
| DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: N05CM18 | | | | | | | | |
| | 7731-714 | 10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL | 10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL | | 292,79 | 292,79 | | |
| A-30 * | 7731-714 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 31,7470 | 31,7470 | | |
| A-30 ** | 7731-714 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 31,0360 | 31,0360 | | |
| DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: N05CM18 | | | | | | | | |
| | 7731-698 | 10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL | 10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL | | 58,38 | 58,38 | | |
| A-30 * | 7731-698 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 6,8990 | 6,8990 | | |
| A-30 ** | 7731-698 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL | G | 6,1880 | 6,1880 | | |
| DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL FRESENIUS KABI ATC: N05CM18 | | | | | | | | |
| | 7734-338 | 10 flacons injectables 4 mL | 10 injectieflacons 4 mL | | 117,12 | 117,12 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-30 * | 7734-338 | <i>solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</i> 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | <i>concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</i> 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 13,1260 | 13,1260 | | |
| A-30 ** | 7734-338 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 12,4150 | 12,4150 | | |
| DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL | | FRESENIUS KABI | | ATC: N05CM18 | | | | |
| A-30 * | 7734-320 | 10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 292,79 | 292,79 | | |
| A-30 ** | 7734-320 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 31,7470 | 31,7470 | | |
| A-30 ** | 7734-320 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 31,0360 | 31,0360 | | |
| DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL | | FRESENIUS KABI | | ATC: N05CM18 | | | | |
| A-30 * | 7734-346 | 10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 58,38 | 58,38 | | |
| A-30 ** | 7734-346 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 6,8990 | 6,8990 | | |
| A-30 ** | 7734-346 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 100 µg/mL | G | 6,1880 | 6,1880 | | |
| DIAMOX | | AMDIPHARM | | ATC: S01EC01 | | | | |
| B-26 | 0035-469 | 1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg | | 14,89 | 14,89 | 1,89 | 3,16 |
| B-26 * | 0035-469 | | | | 7,14 | 7,14 | | |
| B-26 * | 0704-833 | 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | | 9,2100 | 9,2100 | | |
| B-26 ** | 0704-833 | 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | | 7,5700 | 7,5700 | | |
| DIAMOX 250 mg | | AMDIPHARM | | ATC: S01EC01 | | | | |
| B-26 | 0109-058 | 25 comprimés, 250 mg | 25 tabletten, 250 mg | | 9,43 | 9,43 | 0,79 | 1,32 |
| B-26 * | 0109-058 | | | | 2,98 | 2,98 | | |
| B-26 * | 0704-825 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1540 | 0,1540 | | |
| B-26 ** | 0704-825 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1264 | 0,1264 | | |
| B-26 *** | 0704-825 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1560 | 0,1560 | 0,0316 | 0,0528 |
| DICLOBAK 0,1% | | THEA PHARMA | | ATC: S01BC03 | | | | |
| B-198 | 2444-974 | 1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml | 1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml | G | 11,94 | 11,94 | 1,30 | 2,16 |
| B-198 * | 2444-974 | | | | 4,89 | 4,89 | | |
| B-198 * | 0787-531 | 1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL | G | 6,3100 | 6,3100 | | |
| B-198 ** | 0787-531 | 1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL | G | 5,1800 | 5,1800 | | |
| DICLOFENAC APOTEX 75 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 1694-777 | 60 comprimés à libération prolongée, 75 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg | G | 11,43 | 11,43 | 1,19 | 1,99 |
| B-60 * | 1694-777 | | | | 4,50 | 4,50 | | |
| B-60 * | 0771-667 | 1 comprimé à libération prolongée, | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 | G | 0,0968 | 0,0968 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-60 ** | 0771-667 | 75 mg 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | mg 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | G | 0,0795 | 0,0795 | | |
| B-60 *** | 0771-667 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | G | 0,0982 | 0,0982 | 0,0198 | 0,0332 |
| DICLOFENAC EG | | EG | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 1620-475 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 9,92 | 9,92 | 0,89 | 1,48 |
| | 1620-475 | | | | 3,35 | 3,35 | | |
| B-60 * | 0767-467 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1440 | 0,1440 | | |
| B-60 ** | 0767-467 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1183 | 0,1183 | | |
| B-60 *** | 0767-467 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1463 | 0,1463 | 0,0297 | 0,0493 |
| DICLOFENAC EG 75 mg | | EG | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 1620-483 | 60 comprimés à libération prolongée, 75 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg | G | 11,47 | 11,47 | 1,20 | 2,00 |
| | 1620-483 | | | | 4,53 | 4,53 | | |
| B-60 * | 0768-416 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | G | 0,0975 | 0,0975 | | |
| B-60 ** | 0768-416 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | G | 0,0800 | 0,0800 | | |
| B-60 *** | 0768-416 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | G | 0,0989 | 0,0989 | 0,0200 | 0,0333 |
| DICLOFENAC SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 1541-382 | 30 comprimés gastro-résistants, 50 mg | 30 maagsapresistente tabletten, 50 mg | G | 7,81 | 7,81 | 0,44 | 0,73 |
| | 1541-382 | | | | 1,65 | 1,65 | | |
| B-60 | 1541-390 | 50 comprimés gastro-résistants, 50 mg | 50 maagsapresistente tabletten, 50 mg | G | 9,14 | 9,14 | 0,73 | 1,22 |
| | 1541-390 | | | | 2,75 | 2,75 | | |
| B-60 * | 0764-274 | 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg | 1 maagsapresistente tablet, 50 mg | G | 0,0710 | 0,0710 | | |
| B-60 ** | 0764-274 | 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg | 1 maagsapresistente tablet, 50 mg | G | 0,0584 | 0,0584 | | |
| B-60 *** | 0764-274 | 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg | 1 maagsapresistente tablet, 50 mg | G | 0,0721 | 0,0721 | 0,0146 | 0,0244 |
| DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg | | SANDOZ | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 1541-374 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 9,76 | 9,76 | 0,86 | 1,43 |
| | 1541-374 | | | | 3,23 | 3,23 | | |
| B-60 * | 0764-191 | 1 comprimé à libération modifiée, 100 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 0,1390 | 0,1390 | | |
| B-60 ** | 0764-191 | 1 comprimé à libération modifiée, 100 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 0,1140 | 0,1140 | | |
| B-60 *** | 0764-191 | 1 comprimé à libération modifiée, 100 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 0,1410 | 0,1410 | 0,0287 | 0,0477 |
| DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg | | SANDOZ | | ATC: M01AB05 | | | | |
| B-60 | 1645-092 | 60 comprimés à libération prolongée, 75 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg | R | 11,44 | 11,44 | 1,20 | 1,99 |
| | 1645-092 | | | | 4,51 | 4,51 | | |
| B-60 * | 0769-059 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | R | 0,0970 | 0,0970 | | |
| B-60 ** | 0769-059 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | R | 0,0797 | 0,0797 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-60 *** | 0769-059 | 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg | R | 0,0984 | 0,0984 | 0,0200 | 0,0332 |
| DIFLUCAN | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 * | 0739-227 | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | R | 7,46 | 7,46 | | |
| | 0739-227 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) | R | 9,6300 | 9,6300 | | |
| B-134 ** | 0739-227 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) | R | 7,9100 | 7,9100 | | |
| DIFLUCAN 10 mg/ml | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 1509-355 | 1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml | 1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml | R | 13,03 | 13,03 | 1,52 | 2,53 |
| | 1509-355 | | | | 5,72 | 5,72 | | |
| B-134 * | 0764-555 | 5 mL suspension buvable, 10 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL | R | 1,0543 | 1,0543 | | |
| B-134 ** | 0764-555 | 5 mL suspension buvable, 10 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL | R | 0,8657 | 0,8657 | | |
| DIFLUCAN 150 mg | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 0476-341 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 7,58 | 7,58 | 0,38 | 0,64 |
| | 0476-341 | | | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-134 * | 0735-357 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 1,8600 | 1,8600 | | |
| B-134 ** | 0735-357 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 1,5300 | 1,5300 | | |
| B-134 *** | 0735-357 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 2,0458 | 2,0458 | 0,3800 | 0,6400 |
| DIFLUCAN 2 mg/ml | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 * | 7716-020 | 1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | R | 14,92 | 14,92 | | |
| | 7716-020 | 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | R | 19,2500 | 19,2500 | | |
| B-134 ** | 7716-020 | 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | R | 15,8200 | 15,8200 | | |
| DIFLUCAN 200 mg | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 0286-559 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | R | 29,54 | 29,54 | 4,54 | 7,64 |
| | 0286-559 | | | | 19,02 | 19,02 | | |
| B-134 | 1731-363 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | R | 64,56 | 64,56 | 8,30 | 12,50 |
| | 1731-363 | | | | 49,51 | 49,51 | | |
| B-134 * | 0741-736 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | R | 2,9795 | 2,9795 | | |
| B-134 ** | 0741-736 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | R | 2,6240 | 2,6240 | | |
| B-134 *** | 0741-736 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | R | 2,9516 | 2,9516 | 0,4150 | 0,6250 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|-----------------|--|---|--|--------------|--|
| DIFLUCAN 40 mg/ml | | | | | | | | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 1509-363 | 1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | R | 29,91 | 29,91 | 4,59 | 7,72 | | | | | | |
| | 1509-363 | | | | 19,34 | 19,34 | | | | | | | | |
| B-134 * | 0764-563 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | R | 3,5657 | 3,5657 | | | | | | | | |
| B-134 ** | 0764-563 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | R | 2,9286 | 2,9286 | | | | | | | | |
| DIFLUCAN 50 mg | | | | | | | | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 0486-225 | 10 gélules, 50 mg | 10 capsules, hard, 50 mg | R | 12,96 | 12,96 | 1,50 | 2,51 | | | | | | |
| | 0486-225 | | | | 5,67 | 5,67 | | | | | | | | |
| B-134 * | 0735-753 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,7320 | 0,7320 | | | | | | | | |
| B-134 ** | 0735-753 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,6010 | 0,6010 | | | | | | | | |
| B-134 *** | 0735-753 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,7431 | 0,7431 | 0,1500 | 0,2510 | | | | | | |
| DILTIAZEM RETARD EG 200 mg | | | | | | | | | EG | | | | ATC: C08DB01 | |
| B-20 | 3075-827 | 100 gélules à libération prolongée, 200 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 23,04 | 23,04 | 3,55 | 5,91 | | | | | | |
| | 3075-827 | | | | 13,37 | 13,37 | | | | | | | | |
| B-20 * | 7705-577 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,1725 | 0,1725 | | | | | | | | |
| B-20 ** | 7705-577 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,1417 | 0,1417 | | | | | | | | |
| B-20 *** | 7705-577 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,1751 | 0,1751 | 0,0355 | 0,0591 | | | | | | |
| DILTIAZEM RETARD EG 300 mg | | | | | | | | | EG | | | | ATC: C08DB01 | |
| B-20 | 3075-843 | 100 gélules à libération prolongée, 300 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg | G | 26,61 | 26,61 | 4,14 | 6,95 | | | | | | |
| | 3075-843 | | | | 16,47 | 16,47 | | | | | | | | |
| B-20 * | 7705-585 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | G | 0,2125 | 0,2125 | | | | | | | | |
| B-20 ** | 7705-585 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | G | 0,1746 | 0,1746 | | | | | | | | |
| B-20 *** | 7705-585 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | G | 0,2107 | 0,2107 | 0,0414 | 0,0695 | | | | | | |
| DIOVANE 160 | | | | | | | | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: C09CA03 | |
| B-224 | 1729-128 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg | R | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 | | | | | | |
| | 1729-128 | | | | 6,70 | 6,70 | | | | | | | | |
| B-224 | 1722-578 | 56 comprimés pelliculés, 160 mg | 56 filmomhulde tabletten, 160 mg | R | 21,22 | 21,22 | 3,17 | 5,29 | | | | | | |
| | 1722-578 | | | | 11,97 | 11,97 | | | | | | | | |
| B-224 | 1729-136 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg | R | 25,55 | 25,55 | 3,99 | 6,70 | | | | | | |
| | 1729-136 | | | | 15,55 | 15,55 | | | | | | | | |
| B-224 * | 0770-941 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | R | 0,2048 | 0,2048 | | | | | | | | |
| B-224 ** | 0770-941 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | R | 0,1682 | 0,1682 | | | | | | | | |
| B-224 *** | 0770-941 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | R | 0,2042 | 0,2042 | 0,0407 | 0,0684 | | | | | | |
| DIOVANE 320 mg | | | | | | | | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: C09CA03 | |
| B-224 | 2615-250 | 98 comprimés pelliculés, 320 mg | 98 filmomhulde tabletten, 320 mg | R | 27,51 | 27,51 | 4,26 | 7,16 | | | | | | |
| | 2615-250 | | | | 17,25 | 17,25 | | | | | | | | |
| B-224 * | 0795-393 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | R | 0,2271 | 0,2271 | | | | | | | | |
| B-224 ** | 0795-393 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | R | 0,1866 | 0,1866 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 *** | 0795-393 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | R | 0,2242 | 0,2242 | 0,0435 | 0,0731 |
| DIOVANE 80 | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09CA03 | | | | |
| B-224 | 1729-110 | 28 comprimés pelliculés, 80 mg | 28 filmomhulde tabletten, 80 mg | R | 13,00 | 13,00 | 1,51 | 2,52 |
| | 1729-110 | | | | 5,70 | 5,70 | | |
| B-224 | 1729-326 | 56 comprimés pelliculés, 80 mg | 56 filmomhulde tabletten, 80 mg | R | 17,50 | 17,50 | 2,42 | 4,04 |
| | 1729-326 | | | | 9,13 | 9,13 | | |
| B-224 * | 0770-933 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | R | 0,2104 | 0,2104 | | |
| B-224 ** | 0770-933 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | R | 0,1729 | 0,1729 | | |
| B-224 *** | 0770-933 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | R | 0,2137 | 0,2137 | 0,0432 | 0,0721 |
| DIPHANTOINE | | KELA PHARMA | | ATC: N03AB02 | | | | |
| A-5 | 3580-461 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | | 18,13 | 18,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 3580-461 | | | | 9,61 | 9,61 | | |
| A-5 * | 0705-335 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1240 | 0,1240 | | |
| A-5 ** | 0705-335 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1019 | 0,1019 | | |
| A-5 *** | 0705-335 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1259 | 0,1259 | 0,0000 | 0,0000 |
| DIPIDOLOR | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | ATC: N02AC03 | | | | |
| | 0705-350 | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | | 6,81 | 6,81 | | |
| B-56 * | 0705-350 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 1,7580 | 1,7580 | | |
| B-56 ** | 0705-350 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 1,4440 | 1,4440 | | |
| DIPIPERON | | EUMEDICA | | ATC: N05AD05 | | | | |
| B-71 | 0109-512 | 20 comprimés, 40 mg | 20 tabletten, 40 mg | | 7,45 | 7,45 | 0,35 | 0,59 |
| | 0109-512 | | | | 1,33 | 1,33 | | |
| B-71 | 0036-517 | 60 comprimés, 40 mg | 60 tabletten, 40 mg | | 9,76 | 9,76 | 0,86 | 1,43 |
| | 0036-517 | | | | 3,23 | 3,23 | | |
| B-71 * | 0705-368 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0695 | 0,0695 | | |
| B-71 ** | 0705-368 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0570 | 0,0570 | | |
| B-71 *** | 0705-368 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0705 | 0,0705 | 0,0143 | 0,0238 |
| DIPIPERON | | EUMEDICA | | ATC: N05AD05 | | | | |
| B-71 | 0036-566 | 1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml | 1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml | | 9,44 | 9,44 | 0,79 | 1,32 |
| | 0036-566 | | | | 2,99 | 2,99 | | |
| B-71 * | 0705-376 | 1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL | | 0,0643 | 0,0643 | | |
| B-71 ** | 0705-376 | 1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL | | 0,0528 | 0,0528 | | |
| DIPRIVAN 1 % | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0744-672 | 1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 15,01 | 15,01 | | |
| A-30 * | 0744-672 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 19,3700 | 19,3700 | | |
| A-30 ** | 0744-672 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 15,9100 | 15,9100 | | |
| DIPRIVAN 2 % | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0760-793 | 1 seringue préremplie 50 ml | 1 voorgevulde spuit 50 ml | | 15,70 | 15,70 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|------|------|
| A-30 * | 0760-793 | <i>émulsion pour perfusion, 20 mg/ml</i> 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | <i>emulsie voor infusie, 20 mg/ml</i> 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | R | 20,2600 | 20,2600 | | |
| A-30 ** | 0760-793 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | R | 16,6400 | 16,6400 | | |
| DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: H02AB01 | | | |
| B-38 | 3370-244 | 1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml | 1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml | | 10,87 | 10,87 | 1,08 | 1,80 |
| | 3370-244 | | | | 4,07 | 4,07 | | |
| B-38 * | 7715-741 | 1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | | 5,2500 | 5,2500 | | |
| B-38 ** | 7715-741 | 1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | | 4,3100 | 4,3100 | | |
| DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: H02AB01 | | | |
| B-38 | 2929-149 | 1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml | 1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml | | 8,95 | 8,95 | 0,69 | 1,15 |
| | 2929-149 | | | | 2,61 | 2,61 | | |
| B-38 * | 7715-733 | 1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | | 3,3700 | 3,3700 | | |
| B-38 ** | 7715-733 | 1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | | 2,7700 | 2,7700 | | |
| DIPROPHOS Disposable Syringe | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: H02AB01 | | | |
| B-83 | 0129-007 | 1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml | | 8,95 | 8,95 | 0,69 | 1,15 |
| | 0129-007 | | | | 2,61 | 2,61 | | |
| B-83 * | 0705-400 | 1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | | 3,3700 | 3,3700 | | |
| B-83 ** | 0705-400 | 1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL | | 2,7700 | 2,7700 | | |
| DIPROSONE | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: D07AC01 | | | |
| B-156 | 0036-707 | 1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 8,87 | 8,87 | 0,68 | 1,13 |
| | 0036-707 | | | | 2,55 | 2,55 | | |
| B-156 * | 0705-442 | 1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 0,1097 | 0,1097 | | |
| B-156 ** | 0705-442 | 1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g | 1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g | | 0,0900 | 0,0900 | | |
| DIPROSONE | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: D07AC01 | | | |
| B-156 | 0109-074 | 1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g | 1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g | | 8,87 | 8,87 | 0,68 | 1,13 |
| | 0109-074 | | | | 2,55 | 2,55 | | |
| B-156 * | 0705-434 | 1 g pommade, 0,5 mg/g | 1 g zalf, 0,5 mg/g | | 0,1097 | 0,1097 | | |
| B-156 ** | 0705-434 | 1 g pommade, 0,5 mg/g | 1 g zalf, 0,5 mg/g | | 0,0900 | 0,0900 | | |
| DIPROSONE | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: D07AC01 | | | |
| B-156 | 0108-977 | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g | | 8,87 | 8,87 | 0,68 | 1,13 |
| | 0108-977 | | | | 2,55 | 2,55 | | |
| B-156 * | 0705-426 | 1 g crème, 0,5 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g | | 0,1097 | 0,1097 | | |
| B-156 ** | 0705-426 | 1 g crème, 0,5 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g | | 0,0900 | 0,0900 | | |
| DOBUTREXVIATRIS | | VIATRIS | | | ATC: C01CA07 | | | |
| | 0732-255 | 10 flacons injectables 20 ml | 10 injectieflacons 20 ml | | 39,06 | 39,06 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|---|--------------|----------|----------|--|--|
| B-29 * | 0732-255 | solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL | concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL | R | 4,8510 | 4,8510 | | |
| B-29 ** | 0732-255 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL | R | 4,1400 | 4,1400 | | |
| DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01CD02 | | | | |
| A-28 * | 7742-901 | 1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 364,17 | 364,17 | | |
| A-28 ** | 7742-901 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 393,1300 | 393,1300 | | |
| A-28 * | 7742-901 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 386,0200 | 386,0200 | | |
| DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01CD02 | | | | |
| A-28 * | 7742-893 | 1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 182,08 | 182,08 | | |
| A-28 ** | 7742-893 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 200,1100 | 200,1100 | | |
| A-28 * | 7742-893 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 193,0000 | 193,0000 | | |
| DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01CD02 | | | | |
| A-28 * | 7742-885 | 1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 45,54 | 45,54 | | |
| A-28 ** | 7742-885 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 55,3800 | 55,3800 | | |
| A-28 * | 7742-885 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 48,2700 | 48,2700 | | |
| DOCETAXEL AB 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD02 | | | | |
| A-28 * | 0757-013 | 1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 45,54 | 45,54 | | |
| A-28 ** | 0757-013 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 55,3800 | 55,3800 | | |
| A-28 * | 0757-013 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 48,2700 | 48,2700 | | |
| DOCETAXEL AB 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD02 | | | | |
| A-28 * | 0757-005 | 1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 182,08 | 182,08 | | |
| A-28 ** | 0757-005 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 200,1100 | 200,1100 | | |
| A-28 * | 0757-005 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 193,0000 | 193,0000 | | |
| DOCETAXEL AB 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 0756-924 | 1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 318,65 | 318,65 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|
| A-28 * | 0756-924 | 1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 344,8800 | 344,8800 | | |
| A-28 ** | 0756-924 | 1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 337,7700 | 337,7700 | | |
| DOCETAXEL AB 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 7717-309 | 1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 364,17 | 364,17 | | |
| A-28 * | 7717-309 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 393,1300 | 393,1300 | | |
| A-28 ** | 7717-309 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 386,0200 | 386,0200 | | |
| DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 7702-319 | 1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg | 1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg | | 182,08 | 182,08 | | |
| A-28 * | 7702-319 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 200,1100 | 200,1100 | | |
| A-28 ** | 7702-319 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 193,0000 | 193,0000 | | |
| DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 7702-327 | 1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg | 1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg | | 364,17 | 364,17 | | |
| A-28 * | 7702-327 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 393,1300 | 393,1300 | | |
| A-28 ** | 7702-327 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 386,0200 | 386,0200 | | |
| DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 7702-301 | 1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg | 1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg | | 45,54 | 45,54 | | |
| A-28 * | 7702-301 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 55,3800 | 55,3800 | | |
| A-28 ** | 7702-301 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 48,2700 | 48,2700 | | |
| DOCETAXEL KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 7702-640 | 1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 364,17 | 364,17 | | |
| A-28 * | 7702-640 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 393,1300 | 393,1300 | | |
| A-28 ** | 7702-640 | 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 386,0200 | 386,0200 | | |
| DOCETAXEL KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD02 | | | | |
| | 7702-624 | 1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 45,54 | 45,54 | | |
| A-28 * | 7702-624 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 55,3800 | 55,3800 | | |
| A-28 ** | 7702-624 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 48,2700 | 48,2700 | | |
| DOCETAXEL KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 7702-632 | 1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 182,08 | 182,08 | | |
| A-28 * | 7702-632 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 200,1100 | 200,1100 | | |
| A-28 ** | 7702-632 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 193,0000 | 193,0000 | | |
| DOGMATIL | | NEURAXPHARM BELGIUM | | | ATC: N05AL01 | | | |
| B-72 | 0040-774 | 6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml | 6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | r | 7,61 | 7,61 | 0,39 | 0,65 |
| | 0040-774 | | | | 1,47 | 1,47 | | |
| B-72 * | 0705-582 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | r | 0,3167 | 0,3167 | | |
| B-72 ** | 0705-582 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | r | 0,2600 | 0,2600 | | |
| DOGMATIL | | NEURAXPHARM BELGIUM | | | ATC: N05AL01 | | | |
| B-72 | 0040-766 | 12 comprimés, 200 mg | 12 tabletten, 200 mg | R | 9,06 | 9,06 | 0,71 | 1,19 |
| | 0040-766 | | | | 2,69 | 2,69 | | |
| B-72 * | 0705-590 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,2892 | 0,2892 | | |
| B-72 ** | 0705-590 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,2375 | 0,2375 | | |
| B-72 *** | 0705-590 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,2942 | 0,2942 | 0,0592 | 0,0992 |
| DOMINAL FORTE 80 mg | | VIATRIS | | | ATC: N05AX07 | | | |
| B-70 | 2769-230 | 50 comprimés, 80 mg | 50 tabletten, 80 mg | | 11,78 | 11,78 | 1,26 | 2,11 |
| | 2769-230 | | | | 4,77 | 4,77 | | |
| B-70 * | 0705-699 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | | 0,1232 | 0,1232 | | |
| B-70 ** | 0705-699 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | | 0,1012 | 0,1012 | | |
| B-70 *** | 0705-699 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | | 0,1249 | 0,1249 | 0,0252 | 0,0422 |
| DOPORIO 12,5 mg/50 mg | | ORION CORPORATION | | | ATC: N04BA02 | | | |
| B-76 | 4871-356 | 100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg | 100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg | G | 17,23 | 17,23 | 2,37 | 3,94 |
| | 4871-356 | | | | 8,92 | 8,92 | | |
| B-76 * | 7741-796 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1151 | 0,1151 | | |
| B-76 ** | 7741-796 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,0946 | 0,0946 | | |
| B-76 *** | 7741-796 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1169 | 0,1169 | 0,0237 | 0,0394 |
| DOPORIO 25 mg/100 mg | | ORION CORPORATION | | | ATC: N04BA02 | | | |
| B-76 | 4871-372 | 100 comprimés, 100 mg/ 25 mg | 100 tabletten, 100 mg/ 25 mg | G | 20,41 | 20,41 | 3,01 | 5,02 |
| | 4871-372 | | | | 11,35 | 11,35 | | |
| B-76 * | 7741-788 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | |
| B-76 ** | 7741-788 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1203 | 0,1203 | | |
| B-76 *** | 7741-788 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | 0,0301 | 0,0502 |
| DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml | | EG | | | ATC: S01ED51 | | | |
| B-168 | 2948-339 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml | G | 9,88 | 9,88 | 0,88 | 1,46 |
| | 2948-339 | | | | 3,31 | 3,31 | | |
| B-168 | 2903-912 | 3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml | G | 18,54 | 18,54 | 2,63 | 4,38 |
| | 2903-912 | | | | 9,92 | 9,92 | | |
| B-168 * | 0752-873 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL | 1 container met druppelpipet 5 mL | G | 4,2667 | 4,2667 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|------|------|--|
| B-168 ** | 0752-873 | collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL | oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL | G | 3,5067 | 3,5067 | | | |
| DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g | | LEO PHARMA | | ATC: D05AX52 | | | | | |
| B-275 | 2733-665 2733-665 | 1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g | R | 25,04 15,10 | 25,04 15,10 | 3,92 | 6,58 | |
| B-275 * | 0755-314 | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | R | 0,3248 | 0,3248 | | | |
| B-275 ** | 0755-314 | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | R | 0,2668 | 0,2668 | | | |
| DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g | | LEO PHARMA | | ATC: D05AX52 | | | | | |
| B-275 | 1764-497 1764-497 | 1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g | R | 25,04 15,10 | 25,04 15,10 | 3,92 | 6,58 | |
| B-275 * | 0777-078 | 1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | R | 0,3248 | 0,3248 | | | |
| B-275 ** | 0777-078 | 1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | R | 0,2668 | 0,2668 | | | |
| DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| A-25 * | 7700-214 7700-214 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 6,15 7,9400 | 6,15 7,9400 | | | |
| A-25 ** | 7700-214 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 6,5200 | 6,5200 | | | |
| DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| A-25 * | 7712-763 7712-763 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 54,75 65,1500 | 54,75 65,1500 | | | |
| A-25 ** | 7712-763 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 58,0400 | 58,0400 | | | |
| DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| A-25 * | 7700-222 7700-222 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 27,38 35,3300 | 27,38 35,3300 | | | |
| A-25 ** | 7700-222 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 29,0200 | 29,0200 | | | |
| DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB01 | | | | | |
| A-25 * | 7700-230 7700-230 | 1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 97,93 110,9200 | 97,93 110,9200 | | | |
| A-25 ** | 7700-230 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 103,8100 | 103,8100 | | | |
| DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01DB01 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|--------|--------|
| | 0756-890 | 1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml | | 97,93 | 97,93 | | |
| A-25 * | 0756-890 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 110,9200 | 110,9200 | | |
| A-25 ** | 0756-890 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 103,8100 | 103,8100 | | |
| DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB01 | | | | | | | | |
| | 0756-908 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml | | 27,38 | 27,38 | | |
| A-25 * | 0756-908 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 35,3300 | 35,3300 | | |
| A-25 ** | 0756-908 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 29,0200 | 29,0200 | | |
| DOXYCYCLINE EG EG ATC: J01AA02 | | | | | | | | |
| C-37 | 1334-580 1334-580 | 10 comprimés, 100 mg | 10 tabletten, 100 mg | G | 7,80 1,64 | 7,80 1,64 | 1,45 | 1,45 |
| C-37 * | 0747-196 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,2120 | 0,2120 | | |
| C-37 ** | 0747-196 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1740 | 0,1740 | | |
| C-37 *** | 0747-196 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,2268 | 0,2268 | 0,1450 | 0,1450 |
| DOXYCYCLINE EG EG ATC: J01AA02 | | | | | | | | |
| C-37 | 1334-598 1334-598 | 10 comprimés, 200 mg | 10 tabletten, 200 mg | G | 9,40 2,95 | 9,40 2,95 | 2,61 | 2,61 |
| C-37 * | 0747-188 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,3810 | 0,3810 | | |
| C-37 ** | 0747-188 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,3130 | 0,3130 | | |
| C-37 *** | 0747-188 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,3869 | 0,3869 | 0,2610 | 0,2610 |
| DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J01AA02 | | | | | | | | |
| C-37 | 1597-129 1597-129 | 10 comprimés, 100 mg | 10 tabletten, 100 mg | G | 7,80 1,64 | 7,80 1,64 | 1,45 | 1,45 |
| C-37 * | 0766-501 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,2120 | 0,2120 | | |
| C-37 ** | 0766-501 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1740 | 0,1740 | | |
| C-37 *** | 0766-501 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,2268 | 0,2268 | 0,1450 | 0,1450 |
| DOXYLETS 100 LABORATOIRES SMB ATC: J01AA02 | | | | | | | | |
| C-37 | 0891-259 0891-259 | 10 gélules, 100 mg | 10 capsules, hard, 100 mg | R | 7,90 1,72 | 7,90 1,72 | 1,52 | 1,52 |
| C-37 * | 0728-147 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,2220 | 0,2220 | | |
| C-37 ** | 0728-147 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,1820 | 0,1820 | | |
| C-37 *** | 0728-147 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,2364 | 0,2364 | 0,1520 | 0,1520 |
| DOXYLETS 200 LABORATOIRES SMB ATC: J01AA02 | | | | | | | | |
| C-37 | 0891-267 0891-267 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | R | 9,47 3,00 | 9,47 3,00 | 2,65 | 2,65 |
| C-37 * | 0743-617 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | R | 0,3870 | 0,3870 | | |
| C-37 ** | 0743-617 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | R | 0,3180 | 0,3180 | | |
| C-37 *** | 0743-617 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | R | 0,3933 | 0,3933 | 0,2650 | 0,2650 |
| DOZURSO 500 mg MAYOLY BENELUX ATC: A05AA02 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-52 | 3494-630 3494-630 | 60 comprimés pelliculés, 500 mg | 60 filmomhulde tabletten, 500 mg | R | 31,85 21,03 | 31,85 21,03 | 4,86 | 8,18 |
| B-52 * | 7719-743 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,4523 | 0,4523 | | |
| B-52 ** | 7719-743 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,3715 | 0,3715 | | |
| B-52 *** | 7719-743 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,4387 | 0,4387 | 0,0810 | 0,1363 |
| DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg ZENTIVA k.s. ATC: R03AL05 | | | | | | | | |
| B-267 | 3337-839 3337-839 | 180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis | | 128,98 107,75 | 128,98 107,75 | 8,30 | 12,50 |
| B-267 * | 7715-030 | 1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose | 1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis | | 40,4433 | 40,4433 | | |
| B-267 ** | 7715-030 | 1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose | 1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis | | 38,0733 | 38,0733 | | |
| DULOXETIN AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3444-619 3444-619 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 13,83 6,33 | 13,83 6,33 | 1,68 | 2,80 |
| B-73 | 4133-682 4133-682 | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 27,57 17,31 | 27,57 17,31 | 4,27 | 7,17 |
| B-73 * | 7715-444 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2280 | 0,2280 | | |
| B-73 ** | 7715-444 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,1872 | 0,1872 | | |
| B-73 *** | 7715-444 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2249 | 0,2249 | 0,0436 | 0,0732 |
| DULOXETIN AB 60 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3444-627 3444-627 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 18,41 9,83 | 18,41 9,83 | 2,61 | 4,34 |
| B-73 | 3444-635 3444-635 | 98 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 35,93 24,59 | 35,93 24,59 | 5,43 | 9,14 |
| B-73 * | 7715-451 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3238 | 0,3238 | | |
| B-73 ** | 7715-451 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,2660 | 0,2660 | | |
| B-73 *** | 7715-451 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3102 | 0,3102 | 0,0554 | 0,0933 |
| DULOXETINE EG 30 mg EG ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3337-334 3337-334 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 14,13 6,56 | 14,13 6,56 | 1,74 | 2,90 |
| B-73 | 3484-284 3484-284 | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 28,68 18,27 | 28,68 18,27 | 4,42 | 7,43 |
| B-73 * | 7713-852 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2406 | 0,2406 | | |
| B-73 ** | 7713-852 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,1977 | 0,1977 | | |
| B-73 *** | 7713-852 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2362 | 0,2362 | 0,0451 | 0,0758 |
| DULOXETINE EG 60 mg EG ATC: N06AX21 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 | 3337-342 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 18,47 | 18,47 | 2,62 | 4,36 |
| | 3337-342 | | | | 9,87 | 9,87 | | |
| B-73 | 3337-359 | 98 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 37,29 | 37,29 | 5,62 | 9,46 |
| | 3337-359 | | | | 25,77 | 25,77 | | |
| B-73 * | 7713-860 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3394 | 0,3394 | | |
| B-73 ** | 7713-860 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,2788 | 0,2788 | | |
| B-73 *** | 7713-860 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3241 | 0,3241 | 0,0573 | 0,0965 |
| DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3315-371 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 13,64 | 13,64 | 1,64 | 2,74 |
| | 3315-371 | | | | 6,19 | 6,19 | | |
| B-73 * | 7713-514 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2854 | 0,2854 | | |
| B-73 ** | 7713-514 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2343 | 0,2343 | | |
| B-73 *** | 7713-514 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2896 | 0,2896 | 0,0586 | 0,0979 |
| DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3315-389 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 18,47 | 18,47 | 2,62 | 4,36 |
| | 3315-389 | | | | 9,87 | 9,87 | | |
| B-73 | 3315-405 | 100 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 36,73 | 36,73 | 5,54 | 9,32 |
| | 3315-405 | | | | 25,27 | 25,27 | | |
| B-73 * | 7713-522 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3261 | 0,3261 | | |
| B-73 ** | 7713-522 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,2679 | 0,2679 | | |
| B-73 *** | 7713-522 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3120 | 0,3120 | 0,0554 | 0,0932 |
| DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3426-525 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 14,13 | 14,13 | 1,74 | 2,90 |
| | 3426-525 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| B-73 | 3426-533 | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 27,57 | 27,57 | 4,27 | 7,17 |
| | 3426-533 | | | | 17,31 | 17,31 | | |
| B-73 * | 7715-584 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2280 | 0,2280 | | |
| B-73 ** | 7715-584 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,1872 | 0,1872 | | |
| B-73 *** | 7715-584 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,3070 | 0,3070 | 0,0621 | 0,1036 |
| DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21 | | | | | | | | |
| B-73 | 3426-541 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 18,44 | 18,44 | 2,61 | 4,35 |
| | 3426-541 | | | | 9,85 | 9,85 | | |
| B-73 | 3426-558 | 98 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 37,30 | 37,30 | 5,62 | 9,46 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 3426-558 | | | | | 25,78 | 25,78 | | |
| B-73 * | 7715-592 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3395 | 0,3395 | | | |
| B-73 ** | 7715-592 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,2789 | 0,2789 | | | |
| B-73 *** | 7715-592 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3242 | 0,3242 | 0,0573 | 0,0965 | |
| DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21 | | | | | | | | | |
| B-73 | 3343-951 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 14,13 | 14,13 | 1,74 | 2,90 | |
| | 3343-951 | | | | 6,56 | 6,56 | | | |
| B-73 | 4169-736 | 100 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 29,12 | 29,12 | 4,49 | 7,54 | |
| | 4169-736 | | | | 18,66 | 18,66 | | | |
| B-73 * | 7714-066 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2408 | 0,2408 | | | |
| B-73 ** | 7714-066 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,1978 | 0,1978 | | | |
| B-73 *** | 7714-066 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2359 | 0,2359 | 0,0449 | 0,0754 | |
| DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21 | | | | | | | | | |
| B-73 | 4169-744 | 100 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 36,45 | 36,45 | 5,51 | 9,26 | |
| | 4169-744 | | | | 25,04 | 25,04 | | | |
| B-73 * | 7714-058 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3231 | 0,3231 | | | |
| B-73 ** | 7714-058 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,2654 | 0,2654 | | | |
| B-73 *** | 7714-058 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3092 | 0,3092 | 0,0551 | 0,0926 | |
| DULOXETINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AX21 | | | | | | | | | |
| B-73 | 3298-973 | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 13,64 | 13,64 | 1,64 | 2,74 | |
| | 3298-973 | | | | 6,19 | 6,19 | | | |
| B-73 | 3298-981 | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 28,69 | 28,69 | 4,42 | 7,44 | |
| | 3298-981 | | | | 18,28 | 18,28 | | | |
| B-73 * | 7713-878 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2407 | 0,2407 | | | |
| B-73 ** | 7713-878 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,1978 | 0,1978 | | | |
| B-73 *** | 7713-878 | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | G | 0,2363 | 0,2363 | 0,0451 | 0,0759 | |
| DULOXETINE VIATRIS 60 mg VIATRIS ATC: N06AX21 | | | | | | | | | |
| B-73 | 3298-999 | 28 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 18,48 | 18,48 | 2,62 | 4,37 | |
| | 3298-999 | | | | 9,88 | 9,88 | | | |
| B-73 | 3299-005 | 98 gélules gastro-résistantes, 60 mg | 98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg | G | 37,30 | 37,30 | 5,62 | 9,46 | |
| | 3299-005 | | | | 25,78 | 25,78 | | | |
| B-73 * | 7713-886 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3395 | 0,3395 | | | |
| B-73 ** | 7713-886 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,2789 | 0,2789 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-73 *** | 7713-886 | 1 gélule gastro-résistante, 60 mg | 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg | G | 0,3242 | 0,3242 | 0,0573 | 0,0965 | |
| DUOTRAV | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: S01ED51 | | | | | |
| B-168 | 2321-990 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | 3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | R | 23,12 | 23,12 | 3,56 | 5,94 | |
| | 2321-990 | | | | 13,43 | 13,43 | | | |
| B-168 * | 0784-728 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | R | 5,7767 | 5,7767 | | | |
| B-168 ** | 0784-728 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | R | 4,7467 | 4,7467 | | | |
| DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: R03AL01 | | | | | |
| B-98 | 1281-286 | 20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml | 20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml | CR | 13,92 | 13,92 | 1,70 | 2,83 | |
| | 1281-286 | | | | 6,40 | 6,40 | | | |
| B-98 * | 0744-987 | 1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL | CR | 0,4130 | 0,4130 | | | |
| B-98 ** | 0744-987 | 1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL | CR | 0,3390 | 0,3390 | | | |
| DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: R03AL01 | | | | | |
| B-98 | 1677-863 | 200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose | 200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis | CR | 12,06 | 12,06 | 1,32 | 2,20 | |
| | 1677-863 | | | | 4,98 | 4,98 | | | |
| B-98 * | 0769-083 | 1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose | 1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis | CR | 6,4300 | 6,4300 | | | |
| B-98 ** | 0769-083 | 1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose | 1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis | CR | 5,2800 | 5,2800 | | | |
| DUPHASTON | | VIATRIS | | ATC: G03DB01 | | | | | |
| B-90 | 1350-453 | 42 comprimés, 10 mg | 42 tabletten, 10 mg | | 17,36 | 17,36 | 2,39 | 3,99 | |
| | 1350-453 | | | | 9,03 | 9,03 | | | |
| B-90 * | 0705-830 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,2774 | 0,2774 | | | |
| B-90 ** | 0705-830 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,2279 | 0,2279 | | | |
| B-90 *** | 0705-830 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,2817 | 0,2817 | 0,0569 | 0,0950 | |
| DURACEF 250 mg/5 ml | | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | | ATC: J01DB05 | | | | | |
| C-37 | 0838-276 | 1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml | R | 23,78 | 23,78 | 10,20 | 12,37 | |
| | 0838-276 | | | | 14,00 | 14,00 | | | |
| C-37 * | 0705-897 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 1,1294 | 1,1294 | | | |
| C-37 ** | 0705-897 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,9275 | 0,9275 | | | |
| DURACEF 500 mg/5 ml | | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | | ATC: J01DB05 | | | | | |
| C-37 | 1204-965 | 1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml | 1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml | R | 25,54 | 25,54 | 10,20 | 13,39 | |
| | 1204-965 | | | | 15,54 | 15,54 | | | |
| C-37 * | 0744-094 | 5 mL suspension buvable, 100 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL | R | 1,2531 | 1,2531 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| C-37 ** | 0744-094 | 5 mL suspension buvable, 100 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL | R | 1,0294 | 1,0294 | | |
| DUROGESIC 100 µg/h | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N02AB03 | | | | |
| B-56 | 2218-261 | 10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | R | 86,81 | 86,81 | 8,30 | 12,50 |
| | 2218-261 | | | | 69,29 | 69,29 | | |
| B-56 * | 0746-529 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | R | 8,0560 | 8,0560 | | |
| B-56 ** | 0746-529 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | R | 7,3450 | 7,3450 | | |
| DUROGESIC 12 µg/h | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N02AB03 | | | | |
| B-56 | 2265-627 | 5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | R | 15,97 | 15,97 | 2,11 | 3,52 |
| | 2265-627 | | | | 7,97 | 7,97 | | |
| B-56 | 2265-619 | 10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | R | 25,76 | 25,76 | 4,02 | 6,75 |
| | 2265-619 | | | | 15,73 | 15,73 | | |
| B-56 * | 0782-136 | 1 dispositif transdermique, 12 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | R | 2,0300 | 2,0300 | | |
| B-56 ** | 0782-136 | 1 dispositif transdermique, 12 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | R | 1,6670 | 1,6670 | | |
| DUROGESIC 25 µg/h | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N02AB03 | | | | |
| B-56 | 1278-332 | 5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | R | 19,74 | 19,74 | 2,87 | 4,79 |
| | 1278-332 | | | | 10,84 | 10,84 | | |
| B-56 | 2218-279 | 10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | R | 30,48 | 30,48 | 4,67 | 7,86 |
| | 2218-279 | | | | 19,84 | 19,84 | | |
| B-56 * | 0746-495 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | R | 2,5600 | 2,5600 | | |
| B-56 ** | 0746-495 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | R | 2,1030 | 2,1030 | | |
| DUROGESIC 50 µg/h | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N02AB03 | | | | |
| B-56 | 1278-308 | 5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | R | 31,74 | 31,74 | 4,85 | 8,15 |
| | 1278-308 | | | | 20,94 | 20,94 | | |
| B-56 | 2218-253 | 10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | R | 54,46 | 54,46 | 8,01 | 12,50 |
| | 2218-253 | | | | 40,71 | 40,71 | | |
| B-56 * | 0746-503 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | R | 5,0260 | 5,0260 | | |
| B-56 ** | 0746-503 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | R | 4,3150 | 4,3150 | | |
| DUROGESIC 75 µg/h | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N02AB03 | | | | |
| B-56 | 2218-246 | 10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | R | 72,56 | 72,56 | 8,30 | 12,50 |
| | 2218-246 | | | | 56,46 | 56,46 | | |
| B-56 * | 0746-511 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | R | 6,6960 | 6,6960 | | |
| B-56 ** | 0746-511 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | R | 5,9850 | 5,9850 | | |
| DUSPATALIN | | VIATRIS | | ATC: A03AA04 | | | | |
| Cx-10 | 0014-845 | 40 comprimés enrobés, 135 mg | 40 omhulde tabletten, 135 mg | R | 8,48 | 8,48 | 3,15 | 3,15 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| Cx-10 | 0014-845 1082-346 | 120 comprimés enrobés, 135 mg | 120 omhulde tabletten, 135 mg | R | 2,23 11,66 | 2,23 11,66 | 6,60 | 6,60 |
| | 1082-346 | | | | 4,67 | 4,67 | | |
| Cx-10 * | 0705-913 | 1 comprimé enrobé, 135 mg | 1 omhulde tablet, 135 mg | R | 0,0503 | 0,0503 | | |
| Cx-10 ** | 0705-913 | 1 comprimé enrobé, 135 mg | 1 omhulde tablet, 135 mg | R | 0,0413 | 0,0413 | | |
| Cx-10 *** | 0705-913 | 1 comprimé enrobé, 135 mg | 1 omhulde tablet, 135 mg | R | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 |
| EBASTINE SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: R06AX22 | | | | |
| Cs-7 | 3121-191 | 40 comprimés orodispersibles, 10 mg | 40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 11,08 | 11,08 | 4,49 | 4,49 |
| | 3121-191 | | | | 4,23 | 4,23 | | |
| Cs-7 | 3121-209 | 100 comprimés orodispersibles, 10 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 16,62 | 16,62 | 8,97 | 8,97 |
| | 3121-209 | | | | 8,46 | 8,46 | | |
| Cs-7 * | 7708-100 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,1092 | 0,1092 | | |
| Cs-7 ** | 7708-100 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,0897 | 0,0897 | | |
| Cs-7 *** | 7708-100 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,1109 | 0,1109 | 0,0897 | 0,0897 |
| EBASTINE SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: R06AX22 | | | | |
| Cs-7 | 3121-241 | 100 comprimés orodispersibles, 20 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | G | 20,03 | 20,03 | 11,74 | 11,74 |
| | 3121-241 | | | | 11,07 | 11,07 | | |
| Cs-7 * | 7708-118 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1429 | 0,1429 | | |
| Cs-7 ** | 7708-118 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1173 | 0,1173 | | |
| Cs-7 *** | 7708-118 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1450 | 0,1450 | 0,1174 | 0,1174 |
| EBASTINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R06AX22 | | | | |
| Cs-7 | 2929-255 | 50 comprimés orodispersibles, 10 mg | 50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 12,47 | 12,47 | 5,61 | 5,61 |
| | 2929-255 | | | | 5,29 | 5,29 | | |
| Cs-7 | 2929-263 | 100 comprimés orodispersibles, 10 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 16,63 | 16,63 | 8,98 | 8,98 |
| | 2929-263 | | | | 8,47 | 8,47 | | |
| Cs-7 * | 0750-158 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,1093 | 0,1093 | | |
| Cs-7 ** | 0750-158 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,0898 | 0,0898 | | |
| Cs-7 *** | 0750-158 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,1110 | 0,1110 | 0,0898 | 0,0898 |
| EBASTINE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R06AX22 | | | | |
| Cs-7 | 2929-222 | 30 comprimés orodispersibles, 20 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | G | 10,98 | 10,98 | 4,41 | 4,41 |
| | 2929-222 | | | | 4,16 | 4,16 | | |
| Cs-7 | 2929-230 | 50 comprimés orodispersibles, 20 mg | 50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | G | 14,60 | 14,60 | 7,34 | 7,34 |
| | 2929-230 | | | | 6,92 | 6,92 | | |
| Cs-7 | 2929-248 | 100 comprimés orodispersibles, 20 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | G | 20,03 | 20,03 | 11,74 | 11,74 |
| | 2929-248 | | | | 11,07 | 11,07 | | |
| Cs-7 * | 0750-141 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1429 | 0,1429 | | |
| Cs-7 ** | 0750-141 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1173 | 0,1173 | | |
| Cs-7 *** | 0750-141 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1450 | 0,1450 | 0,1174 | 0,1174 |
| EBRANTIL 50 | | EUROCEPT | | ATC: C02CA06 | | | | |
| | 0734-780 | 5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml | 5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 18,22 | 18,22 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-19 * | 0734-780 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | | 4,7020 | 4,7020 | | |
| B-19 ** | 0734-780 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | | 3,8620 | 3,8620 | | |
| ECANSYA 150 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: L01BC06 | | | |
| A-28 | 4696-175 4696-175 | 60 comprimés pelliculés, 150 mg | 60 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 32,30 21,42 | 32,30 21,42 | 0,00 | 0,00 |
| A-28 * | 7737-752 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,4607 | 0,4607 | | |
| A-28 ** | 7737-752 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,3785 | 0,3785 | | |
| A-28 *** | 7737-752 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,4461 | 0,4461 | 0,0000 | 0,0000 |
| ECANSYA 500 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: L01BC06 | | | |
| A-28 | 4684-023 4684-023 | 120 comprimés pelliculés, 500 mg | 120 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 156,90 133,22 | 156,90 133,22 | 0,00 | 0,00 |
| A-28 * | 7738-040 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2360 | 1,2360 | | |
| A-28 ** | 7738-040 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,1768 | 1,1768 | | |
| A-28 *** | 7738-040 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2614 | 1,2614 | 0,0000 | 0,0000 |
| EDRONAX 4 mg | | Pfizer | | | ATC: N06AX18 | | | |
| B-73 | 1374-032 1374-032 | 60 comprimés, 4 mg | 60 tabletten, 4 mg | | 31,05 20,33 | 31,05 20,33 | 4,75 | 7,99 |
| B-73 * | 0760-215 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,4373 | 0,4373 | | |
| B-73 ** | 0760-215 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,3592 | 0,3592 | | |
| B-73 *** | 0760-215 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,4252 | 0,4252 | 0,0792 | 0,1332 |
| EFEXOR EXEL 150 mg | | VIATRIS | | | ATC: N06AX16 | | | |
| B-73 | 2066-942 2066-942 | 28 gélules à libération prolongée, 150 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 18,00 9,51 | 18,00 9,51 | 2,52 | 4,20 |
| B-73 | 2525-491 2525-491 | 56 gélules à libération prolongée, 150 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 24,62 14,75 | 24,62 14,75 | 3,86 | 6,48 |
| B-73 | 2525-467 2525-467 | 98 gélules à libération prolongée, 150 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 47,02 34,24 | 47,02 34,24 | 6,98 | 11,74 |
| B-73 * | 0774-786 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 0,4429 | 0,4429 | | |
| B-73 ** | 0774-786 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 0,3703 | 0,3703 | | |
| B-73 *** | 0774-786 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 0,4234 | 0,4234 | 0,0712 | 0,1198 |
| EFEXOR EXEL 75 mg | | VIATRIS | | | ATC: N06AX16 | | | |
| B-73 | 1451-830 1451-830 | 28 gélules à libération prolongée, 75 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | R | 10,85 4,06 | 10,85 4,06 | 1,08 | 1,79 |
| B-73 | 2525-442 | 56 gélules à libération prolongée, 75 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | R | 19,83 | 19,83 | 2,89 | 4,82 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-73 | 2525-442 2525-384 | 98 gélules à libération prolongée, 75 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | R | 10,91 25,47 | 10,91 25,47 | 3,98 | 6,68 |
| B-73 * | 2525-384 0763-235 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | R | 15,48 0,2039 | 15,48 0,2039 | | |
| B-73 ** | 0763-235 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | R | 0,1674 | 0,1674 | | |
| B-73 *** | 0763-235 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | R | 0,2035 | 0,2035 | 0,0406 | 0,0682 |
| EFEXOR-EXEL 37,5mg VIATRIS ATC: N06AX16 | | | | | | | | |
| B-73 | 3976-883 | 60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | R | 17,07 | 17,07 | 2,33 | 3,89 |
| B-73 * | 3976-883 7726-649 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg | R | 8,80 0,1893 | 8,80 0,1893 | | |
| B-73 ** | 7726-649 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg | R | 0,1555 | 0,1555 | | |
| B-73 *** | 7726-649 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg | R | 0,1922 | 0,1922 | 0,0388 | 0,0648 |
| EFIENT 10 mg SUBSTIPHARM ATC: B01AC22 | | | | | | | | |
| B-243 | 2630-861 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | | 28,69 | 28,69 | 4,42 | 7,44 |
| B-243 | 2630-861 2630-887 | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | | 18,28 70,88 | 18,28 70,88 | 10,20 | 15,50 |
| B-243 * | 2630-887 0797-407 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 55,00 0,7787 | 55,00 0,7787 | | |
| B-243 ** | 0797-407 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,6940 | 0,6940 | | |
| B-243 *** | 0797-407 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,7780 | 0,7780 | 0,1214 | 0,1845 |
| EFIENT 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC22 | | | | | | | | |
| B-243 | 4367-819 | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | | 70,88 | 70,88 | 10,20 | 15,50 |
| B-243 * | 4367-819 7733-173 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 55,00 0,7787 | 55,00 0,7787 | | |
| B-243 ** | 7733-173 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,6940 | 0,6940 | | |
| B-243 *** | 7733-173 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | | 0,7780 | 0,7780 | 0,1214 | 0,1845 |
| EFIENT 5 mg SUBSTIPHARM ATC: B01AC22 | | | | | | | | |
| B-243 | 2630-846 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | | 28,69 | 28,69 | 4,42 | 7,44 |
| B-243 * | 2630-846 0797-399 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | | 18,28 0,8425 | 18,28 0,8425 | | |
| B-243 ** | 0797-399 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | | 0,6921 | 0,6921 | | |
| B-243 *** | 0797-399 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | | 0,8272 | 0,8272 | 0,1579 | 0,2657 |
| EFUDIX VIATRIS ATC: L01BC02 | | | | | | | | |
| A-36 | 0038-521 | 1 tube 20 g pommade, 50 mg/g | 1 tube 20 g zalf, 50 mg/g | R | 29,67 | 29,67 | 0,00 | 0,00 |
| A-36 * | 0038-521 0706-044 | 1 g pommade, 50 mg/g | 1 g zalf, 50 mg/g | R | 19,13 1,2345 | 19,13 1,2345 | | |
| A-36 ** | 0706-044 | 1 g pommade, 50 mg/g | 1 g zalf, 50 mg/g | R | 1,0140 | 1,0140 | | |
| ELISAVIATRIS 35 VIATRIS ATC: G03HB01 | | | | | | | | |
| Cx-13 | 2095-404 | 63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg | 63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg | G | 13,97 | 13,97 | 9,11 | 9,11 |
| | 2095-404 | | | | 6,44 | 6,44 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| Cx-13 | 2216-208 | 126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg | 126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg | G | 20,36 | 20,36 | 16,01 | 16,01 |
| | 2216-208 | | | | 11,32 | 11,32 | | |
| Cx-13 * | 0782-458 | 21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg | 21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg | G | 2,4350 | 2,4350 | | |
| Cx-13 ** | 0782-458 | 21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg | 21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg | G | 2,0000 | 2,0000 | | |
| Cx-13 *** | 0782-458 | 1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg | G | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 |
| ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13 | | | | | | | | |
| B-157 | 2936-771 | 1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml | 1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml | R | 17,80 | 17,80 | 2,48 | 4,14 |
| | 2936-771 | | | | 9,36 | 9,36 | | |
| B-157 * | 0741-900 | 1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL | 1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL | R | 0,1208 | 0,1208 | | |
| B-157 ** | 0741-900 | 1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL | 1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL | R | 0,0992 | 0,0992 | | |
| ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13 | | | | | | | | |
| B-157 | 1071-190 | 1 tube 20 g crème, 1 mg/g | 1 tube 20 g crème, 1 mg/g | R | 8,60 | 8,60 | 0,62 | 1,03 |
| | 1071-190 | | | | 2,34 | 2,34 | | |
| B-157 | 2936-763 | 1 tube 100 g crème, 1 mg/g | 1 tube 100 g crème, 1 mg/g | R | 17,80 | 17,80 | 2,48 | 4,14 |
| | 2936-763 | | | | 9,36 | 9,36 | | |
| B-157 * | 0741-884 | 1 g crème, 1 mg/g | 1 g crème, 1 mg/g | R | 0,1208 | 0,1208 | | |
| B-157 ** | 0741-884 | 1 g crème, 1 mg/g | 1 g crème, 1 mg/g | R | 0,0992 | 0,0992 | | |
| ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13 | | | | | | | | |
| B-157 | 1029-842 | 1 tube 20 g pommade, 1 mg/g | 1 tube 20 g zalf, 1 mg/g | R | 8,60 | 8,60 | 0,62 | 1,03 |
| | 1029-842 | | | | 2,34 | 2,34 | | |
| B-157 * | 0741-892 | 1 g pommade, 1 mg/g | 1 g zalf, 1 mg/g | R | 0,1510 | 0,1510 | | |
| B-157 ** | 0741-892 | 1 g pommade, 1 mg/g | 1 g zalf, 1 mg/g | R | 0,1240 | 0,1240 | | |
| ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03 | | | | | | | | |
| | 0784-264 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 34,90 | 34,90 | | |
| A-23 * | 0784-264 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | R | 44,1000 | 44,1000 | | |
| A-23 ** | 0784-264 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | R | 36,9900 | 36,9900 | | |
| ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03 | | | | | | | | |
| | 0784-272 | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 69,80 | 69,80 | | |
| A-23 * | 0784-272 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | R | 81,1000 | 81,1000 | | |
| A-23 ** | 0784-272 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | R | 73,9900 | 73,9900 | | |
| EMCORETIC MERCK ATC: C07BB07 | | | | | | | | |
| B-15 | 1151-380 | 56 comprimés, 10 mg / 25 mg | 56 tabletten, 10 mg / 25 mg | R | 13,13 | 13,13 | 1,54 | 2,56 |
| | 1151-380 | | | | 5,80 | 5,80 | | |
| B-15 * | 0742-957 | 1 comprimé, 10 mg/ 25 mg | 1 tablet, 10 mg/ 25 mg | R | 0,1336 | 0,1336 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-15 ** | 0742-957 | 1 comprimé, 10 mg/ 25 mg | 1 tablet, 10 mg/ 25 mg | R | 0,1098 | 0,1098 | | |
| B-15 *** | 0742-957 | 1 comprimé, 10 mg/ 25 mg | 1 tablet, 10 mg/ 25 mg | R | 0,1357 | 0,1357 | 0,0275 | 0,0457 |
| EMCORETIC MITIS | | MERCK | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 1151-968 | 56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg | 56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg | R | 9,82 | 9,82 | 0,87 | 1,45 |
| | 1151-968 | | | | 3,27 | 3,27 | | |
| B-15 * | 0742-965 | 1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,0754 | 0,0754 | | |
| B-15 ** | 0742-965 | 1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,0620 | 0,0620 | | |
| B-15 *** | 0742-965 | 1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,0765 | 0,0765 | 0,0155 | 0,0259 |
| EMTHEXATE | | AREGA PHARMA | | ATC: L01BA01 | | | | |
| | 0729-079 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 34,39 | 34,39 | | |
| A-24 * | 0729-079 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 43,5600 | 43,5600 | | |
| A-24 ** | 0729-079 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 36,4500 | 36,4500 | | |
| EMTHEXATE | | AREGA PHARMA | | ATC: L01BA01 | | | | |
| | 0729-087 | 1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 62,55 | 62,55 | | |
| A-24 * | 0729-087 | 1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 73,4100 | 73,4100 | | |
| A-24 ** | 0729-087 | 1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 66,3000 | 66,3000 | | |
| EMTHEXATE | | AREGA PHARMA | | ATC: L01BA01 | | | | |
| | 0729-053 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 9,22 | 9,22 | | |
| A-24 * | 0729-053 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 11,9000 | 11,9000 | | |
| A-24 ** | 0729-053 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 9,7700 | 9,7700 | | |
| EMTHEXATE | | AREGA PHARMA | | ATC: L01BA01 | | | | |
| | 0729-095 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | | 270,87 | 270,87 | | |
| A-24 * | 0729-095 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | R | 294,2300 | 294,2300 | | |
| A-24 ** | 0729-095 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | R | 287,1200 | 287,1200 | | |
| EMTHEXATE | | AREGA PHARMA | | ATC: L01BA01 | | | | |
| A-24 | 1156-199 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml | R | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 1156-199 | | | | 5,43 | 5,43 | | |
| A-24 * | 0742-676 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | R | 7,0100 | 7,0100 | | |
| A-24 ** | 0742-676 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | R | 5,7600 | 5,7600 | | |
| ENALAPRIL EG 20 mg | | EG | | ATC: C09AA02 | | | | |
| B-21 | 1753-011 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 15,54 | 15,54 | 2,02 | 3,37 |
| | 1753-011 | | | | 7,63 | 7,63 | | |
| B-21 * | 0768-713 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1005 | 0,1005 | | |
| B-21 ** | 0768-713 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0826 | 0,0826 | | |
| B-21 *** | 0768-713 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1021 | 0,1021 | 0,0206 | 0,0344 |
| ENALAPRIL EG 5 mg | | EG | | ATC: C09AA02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-21 | 1670-777 1670-777 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 7,29 1,19 | 7,29 1,19 | 0,32 | 0,53 |
| B-21 * | 0768-697 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0550 | 0,0550 | | |
| B-21 ** | 0768-697 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0450 | 0,0450 | | |
| B-21 *** | 0768-697 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0628 | 0,0628 | 0,0114 | 0,0189 |
| ENALAPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA02 | | | | | | | | |
| B-21 | 1576-883 1576-883 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | G | 11,85 4,82 | 11,85 4,82 | 1,28 | 2,13 |
| B-21 | 1645-068 1645-068 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 15,54 7,63 | 15,54 7,63 | 2,02 | 3,37 |
| B-21 * | 0766-303 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1005 | 0,1005 | | |
| B-21 ** | 0766-303 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0826 | 0,0826 | | |
| B-21 *** | 0766-303 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1021 | 0,1021 | 0,0206 | 0,0344 |
| ENALAPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA02 | | | | | | | | |
| B-21 | 1576-867 1576-867 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 7,23 1,14 | 7,23 1,14 | 0,30 | 0,50 |
| B-21 * | 0766-311 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0525 | 0,0525 | | |
| B-21 ** | 0766-311 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0432 | 0,0432 | | |
| B-21 *** | 0766-311 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0606 | 0,0606 | 0,0107 | 0,0179 |
| ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB02 | | | | | | | | |
| B-288 | 3566-965 3566-965 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 14,18 6,60 | 14,18 6,60 | 1,75 | 2,92 |
| B-288 * | 7719-495 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,0869 | 0,0869 | | |
| B-288 ** | 7719-495 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,0714 | 0,0714 | | |
| B-288 *** | 7719-495 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,0883 | 0,0883 | 0,0179 | 0,0298 |
| ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB02 | | | | | | | | |
| B-288 | 3566-981 3566-981 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | G | 10,54 3,82 | 10,54 3,82 | 1,01 | 1,69 |
| B-288 | 3566-999 3566-999 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | G | 16,46 8,34 | 16,46 8,34 | 2,21 | 3,69 |
| B-288 * | 7719-503 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,1098 | 0,1098 | | |
| B-288 ** | 7719-503 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,0902 | 0,0902 | | |
| B-288 *** | 7719-503 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,1115 | 0,1115 | 0,0226 | 0,0377 |
| ENDOXAN BAXTER ATC: L01AA01 | | | | | | | | |
| A-23 | 0110-882 0110-882 | 50 comprimés, 50 mg | 50 tabletten, 50 mg | | 18,48 9,88 | 18,48 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| A-23 * | 0706-242 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,2550 | 0,2550 | | |
| A-23 ** | 0706-242 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,2094 | 0,2094 | | |
| A-23 *** | 0706-242 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,2589 | 0,2589 | 0,0000 | 0,0000 |
| ENDOXAN 1 g BAXTER ATC: L01AA01 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|---------------|---------------|-------|-------|
| A-23 | 0246-942 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | | 18,72 | 18,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 0246-942 | | | | 10,06 | 10,06 | | |
| A-23 * | 0736-769 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg | | 12,9800 | 12,9800 | | |
| A-23 ** | 0736-769 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg | | 10,6600 | 10,6600 | | |
| ENDOXAN 500 mg | | BAXTER | | ATC: L01AA01 | | | | |
| A-23 | 0039-123 | 5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg | 5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg | | 37,42 | 37,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0039-123 | | | | 25,88 | 25,88 | | |
| A-23 * | 0706-234 | 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | | 6,6800 | 6,6800 | | |
| A-23 ** | 0706-234 | 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | | 5,4860 | 5,4860 | | |
| ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03AL12 | | | | |
| B-346 | 4242-426 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis | CR | 163,79 | 163,79 | 10,20 | 15,50 |
| | 4242-426 | | | | 139,50 | 139,50 | | |
| B-346 * | 7730-518 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis | CR | 1,7220 | 1,7220 | | |
| B-346 ** | 7730-518 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis | CR | 1,6430 | 1,6430 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 10000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4234-167 | 10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 56,58 | 56,58 | 8,30 | 12,50 |
| | 4234-167 | | | | 42,55 | 42,55 | | |
| B-33 * | 7727-894 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 5,2210 | 5,2210 | | |
| B-33 ** | 7727-894 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 4,5100 | 4,5100 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 12000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4234-175 | 10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 77,08 | 77,08 | 8,30 | 12,50 |
| | 4234-175 | | | | 60,42 | 60,42 | | |
| B-33 * | 7727-902 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 7,1160 | 7,1160 | | |
| B-33 ** | 7727-902 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 6,4050 | 6,4050 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 15000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4234-183 | 10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 80,21 | 80,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 4234-183 | | | | 63,27 | 63,27 | | |
| B-33 * | 7727-910 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 7,4180 | 7,4180 | | |
| B-33 ** | 7727-910 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 6,7070 | 6,7070 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 2000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-33 | 4234-407 | 10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 23,82 | 23,82 | 3,72 | 6,21 |
| | 4234-407 | | | | 14,04 | 14,04 | | |
| B-33 * | 7727-852 | 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 1,8120 | 1,8120 | | |
| B-33 ** | 7727-852 | 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 1,4880 | 1,4880 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 4000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4234-415 | 10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 38,56 | 38,56 | 5,80 | 9,76 |
| | 4234-415 | | | | 26,88 | 26,88 | | |
| B-33 * | 7727-860 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 3,4690 | 3,4690 | | |
| B-33 ** | 7727-860 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 2,8490 | 2,8490 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 6000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4234-423 | 10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 44,56 | 44,56 | 6,64 | 11,17 |
| | 4234-423 | | | | 32,10 | 32,10 | | |
| B-33 * | 7727-878 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 4,1140 | 4,1140 | | |
| B-33 ** | 7727-878 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 3,4030 | 3,4030 | | |
| ENOXAPARINE BECAT 8000 IU | | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4234-159 | 10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 50,56 | 50,56 | 7,47 | 12,50 |
| | 4234-159 | | | | 37,31 | 37,31 | | |
| B-33 * | 7727-886 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 4,6660 | 4,6660 | | |
| B-33 ** | 7727-886 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 3,9550 | 3,9550 | | |
| ENTOCORT | | TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS | | ATC: A07EA06 | | | | |
| B-55 | 1344-365 | 100 gélules à libération prolongée, 3 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 61,80 | 61,80 | 9,04 | 15,22 |
| | 1344-365 | | | | 47,10 | 47,10 | | |
| B-55 * | 0762-831 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 0,5704 | 0,5704 | | |
| B-55 ** | 0762-831 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 0,4993 | 0,4993 | | |
| B-55 *** | 0762-831 | 1 gélule à libération prolongée, 3 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg | R | 0,5626 | 0,5626 | 0,0904 | 0,1522 |
| EPIPEN 0,15 mg | | VIATRIS | | ATC: C01CA24 | | | | |
| B-317 | 1453-257 | 1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | G | 46,87 | 46,87 | 6,96 | 11,71 |
| | 1453-257 | | | | 34,11 | 34,11 | | |
| B-317 * | 0752-766 | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G | 43,2700 | 43,2700 | | |
| B-317 ** | 0752-766 | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G | 36,1600 | 36,1600 | | |
| EPIPEN 0,3 mg | | VIATRIS | | ATC: C01CA24 | | | | |
| B-317 | 1466-499 | 1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml | 1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | G | 46,87 | 46,87 | 6,96 | 11,71 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--|--|
| | 1466-499 | | | | 34,11 | 34,11 | | |
| B-317 * | 0752-758 | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 43,2700 | 43,2700 | | |
| B-317 ** | 0752-758 | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 36,1600 | 36,1600 | | |
| EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0791-640 | 1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 30,48 | 30,48 | | |
| A-25 * | 0791-640 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 39,3300 | 39,3300 | | |
| A-25 ** | 0791-640 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 32,3100 | 32,3100 | | |
| EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0791-657 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 121,50 | 121,50 | | |
| A-25 * | 0791-657 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 135,9000 | 135,9000 | | |
| A-25 ** | 0791-657 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 128,7900 | 128,7900 | | |
| EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0752-188 | 1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 6,26 | 6,26 | | |
| A-25 * | 0752-188 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 8,0800 | 8,0800 | | |
| A-25 ** | 0752-188 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 6,6400 | 6,6400 | | |
| EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0752-162 | 1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 31,41 | 31,41 | | |
| A-25 * | 0752-162 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 40,4000 | 40,4000 | | |
| A-25 ** | 0752-162 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 33,2900 | 33,2900 | | |
| EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0752-154 | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 125,26 | 125,26 | | |
| A-25 * | 0752-154 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 139,8900 | 139,8900 | | |
| A-25 ** | 0752-154 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 132,7800 | 132,7800 | | |
| EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0794-594 | 1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 30,47 | 30,47 | | |
| A-25 * | 0794-594 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 39,3200 | 39,3200 | | |
| A-25 ** | 0794-594 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 32,3000 | 32,3000 | | |

| EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01DB03 | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|------|------|
| | 0794-578 | 1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 6,07 | 6,07 | | |
| A-25 * | 0794-578 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 7,8300 | 7,8300 | | |
| A-25 ** | 0794-578 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 6,4300 | 6,4300 | | |
| EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0794-602 | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 121,49 | 121,49 | | |
| A-25 * | 0794-602 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 135,8900 | 135,8900 | | |
| A-25 ** | 0794-602 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 128,7800 | 128,7800 | | |
| EPOSIN | | AREGA PHARMA | | ATC: L01CB01 | | | | |
| | 0744-441 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 10,94 | 10,94 | | |
| A-28 * | 0744-441 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | 14,1200 | 14,1200 | | |
| A-28 ** | 0744-441 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | 11,6000 | 11,6000 | | |
| EPOSIN 20 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01CB01 | | | | |
| | 0791-020 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 28,82 | 28,82 | | |
| A-28 * | 0791-020 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | 37,1900 | 37,1900 | | |
| A-28 ** | 0791-020 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | R | 30,5500 | 30,5500 | | |
| ERYTHROCINE | | AMDIPHARM | | ATC: J01FA01 | | | | |
| C-37 | 0842-112 | 1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml | | 10,61 | 10,61 | 3,42 | 3,42 |
| | 0842-112 | | | | 3,87 | 3,87 | | |
| C-37 * | 0727-917 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | | 0,3119 | 0,3119 | | |
| C-37 ** | 0727-917 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | | 0,2563 | 0,2563 | | |
| ERYTHROCINE I.V. | | AMDIPHARM | | ATC: J01FA01 | | | | |
| B-119 | 0039-834 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | | 14,24 | 14,24 | 1,76 | 2,93 |
| | 0039-834 | | | | 6,64 | 6,64 | | |
| B-119 * | 0706-507 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg | | 8,5700 | 8,5700 | | |
| B-119 ** | 0706-507 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg | | 7,0400 | 7,0400 | | |
| ESCIDIVULE 10 mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: N06AB10 | | | | |
| B-73 | 3164-522 | 30 comprimés enrobés, 10 mg | 30 omhulde tabletten, 10 mg | G | 12,26 | 12,26 | 1,36 | 2,27 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-73 | 3164-522 3167-327 | 100 comprimés enrobés, 10 mg | 100 omhulde tabletten, 10 mg | G | 5,14 24,00 | 5,14 24,00 | 3,77 | 6,28 |
| B-73 * | 3167-327 7709-033 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 14,20 0,1833 | 14,20 0,1833 | | |
| B-73 ** | 7709-033 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,1505 | 0,1505 | | |
| B-73 *** | 7709-033 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,1847 | 0,1847 | 0,0377 | 0,0628 |
| ESCIDIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10 | | | | | | | | |
| B-73 | 3164-514 | 30 comprimés enrobés, 20 mg | 30 omhulde tabletten, 20 mg | G | 12,26 | 12,26 | 1,36 | 2,27 |
| B-73 | 3164-514 3167-319 | 100 comprimés enrobés, 20 mg | 100 omhulde tabletten, 20 mg | G | 5,14 24,00 | 5,14 24,00 | 3,77 | 6,28 |
| B-73 * | 3167-319 7709-041 | 1 comprimé enrobé, 20 mg | 1 omhulde tablet, 20 mg | G | 14,20 0,1833 | 14,20 0,1833 | | |
| B-73 ** | 7709-041 | 1 comprimé enrobé, 20 mg | 1 omhulde tablet, 20 mg | G | 0,1505 | 0,1505 | | |
| B-73 *** | 7709-041 | 1 comprimé enrobé, 20 mg | 1 omhulde tablet, 20 mg | G | 0,1847 | 0,1847 | 0,0377 | 0,0628 |
| ESCITALOPRAM AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10 | | | | | | | | |
| B-73 | 3138-328 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 11,58 | 11,58 | 1,22 | 2,04 |
| B-73 | 3138-328 3138-336 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 4,61 23,26 | 4,61 23,26 | 3,59 | 5,99 |
| B-73 * | 3138-336 7707-102 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 13,55 0,1785 | 13,55 0,1785 | | |
| B-73 ** | 7707-102 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | |
| B-73 *** | 7707-102 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 |
| ESCITALOPRAM AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10 | | | | | | | | |
| B-73 | 3138-351 | 98 comprimés orodispersibles, 20 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | G | 23,26 | 23,26 | 3,59 | 5,99 |
| B-73 * | 3138-351 7707-110 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 13,55 0,1785 | 13,55 0,1785 | | |
| B-73 ** | 7707-110 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | |
| B-73 *** | 7707-110 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 |
| ESCITALOPRAM EG 10 mg EG ATC: N06AB10 | | | | | | | | |
| B-73 | 2890-895 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,87 | 11,87 | 1,28 | 2,14 |
| B-73 | 2890-895 3110-731 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 4,84 13,32 | 4,84 13,32 | 1,58 | 2,63 |
| B-73 | 3110-731 2890-887 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 5,95 23,26 | 5,95 23,26 | 3,59 | 5,99 |
| B-73 * | 2890-887 0756-296 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 13,55 0,1785 | 13,55 0,1785 | | |
| B-73 ** | 0756-296 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | |
| B-73 *** | 0756-296 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 |
| ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10 | | | | | | | | |
| B-73 | 3815-669 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,87 | 11,87 | 1,28 | 2,14 |
| B-73 | 3815-669 3767-597 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 4,84 13,32 | 4,84 13,32 | 1,58 | 2,63 |
| B-73 | 3767-597 3767-621 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 5,95 23,26 | 5,95 23,26 | 3,59 | 5,99 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 3767-621 | | | | | 13,55 | 13,55 | | |
| B-73 * | 7723-505 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | | |
| B-73 ** | 7723-505 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |
| B-73 *** | 7723-505 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 | |
| ESCITALOPRAM EG 20 mg | | EG | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 3095-510 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,87 | 11,87 | 1,28 | 2,14 | |
| | 3095-510 | | | | 4,84 | 4,84 | | | |
| B-73 | 3110-723 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,26 | 23,26 | 3,59 | 5,99 | |
| | 3110-723 | | | | 13,55 | 13,55 | | | |
| B-73 * | 7706-245 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | | |
| B-73 ** | 7706-245 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |
| B-73 *** | 7706-245 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 | |
| ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 3815-677 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,87 | 11,87 | 1,28 | 2,14 | |
| | 3815-677 | | | | 4,84 | 4,84 | | | |
| B-73 | 3767-647 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,26 | 23,26 | 3,59 | 5,99 | |
| | 3767-647 | | | | 13,55 | 13,55 | | | |
| B-73 * | 7723-497 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | | |
| B-73 ** | 7723-497 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |
| B-73 *** | 7723-497 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 | |
| ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 4896-064 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 23,26 | 23,26 | 3,59 | 5,99 | |
| | 4896-064 | | | | 13,55 | 13,55 | | | |
| B-73 * | 7742-737 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | | |
| B-73 ** | 7742-737 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |
| B-73 *** | 7742-737 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 | |
| ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 4896-072 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,17 | 23,17 | 3,57 | 5,96 | |
| | 4896-072 | | | | 13,48 | 13,48 | | | |
| B-73 * | 7742-729 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1776 | 0,1776 | | | |
| B-73 ** | 7742-729 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1458 | 0,1458 | | | |
| B-73 *** | 7742-729 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1800 | 0,1800 | 0,0364 | 0,0608 | |
| ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 4906-988 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 19,71 | 19,71 | 2,87 | 4,78 | |
| | 4906-988 | | | | 10,82 | 10,82 | | | |
| B-73 * | 7742-786 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1424 | 0,1424 | | | |
| B-73 ** | 7742-786 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1170 | 0,1170 | | | |
| B-73 *** | 7742-786 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1446 | 0,1446 | 0,0293 | 0,0488 | |
| ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 2983-088 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,83 | 11,83 | 1,27 | 2,12 | |
| | 2983-088 | | | | 4,80 | 4,80 | | | |
| B-73 | 2983-096 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 13,73 | 13,73 | 1,66 | 2,77 | |
| | 2983-096 | | | | 6,26 | 6,26 | | | |
| B-73 | 2983-047 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 23,17 | 23,17 | 3,57 | 5,96 | |
| | 2983-047 | | | | 13,48 | 13,48 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 * | 7703-663 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1776 | 0,1776 | | |
| B-73 ** | 7703-663 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1458 | 0,1458 | | |
| B-73 *** | 7703-663 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1800 | 0,1800 | 0,0364 | 0,0608 |
| ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB10 | | | | |
| B-73 | 2983-054 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 13,73 | 13,73 | 1,66 | 2,77 |
| | 2983-054 | | | | 6,26 | 6,26 | | |
| B-73 | 2983-062 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,17 | 23,17 | 3,57 | 5,96 |
| | 2983-062 | | | | 13,48 | 13,48 | | |
| B-73 * | 7703-671 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1776 | 0,1776 | | |
| B-73 ** | 7703-671 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1458 | 0,1458 | | |
| B-73 *** | 7703-671 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1800 | 0,1800 | 0,0364 | 0,0608 |
| ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB10 | | | | |
| B-73 | 3046-141 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 10,61 | 10,61 | 1,03 | 1,71 |
| | 3046-141 | | | | 3,87 | 3,87 | | |
| B-73 | 3046-158 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 13,65 | 13,65 | 1,64 | 2,74 |
| | 3046-158 | | | | 6,20 | 6,20 | | |
| B-73 | 3046-174 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 19,72 | 19,72 | 2,87 | 4,79 |
| | 3046-174 | | | | 10,83 | 10,83 | | |
| B-73 * | 7706-112 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1427 | 0,1427 | | |
| B-73 ** | 7706-112 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1171 | 0,1171 | | |
| B-73 *** | 7706-112 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1447 | 0,1447 | 0,0293 | 0,0489 |
| ESCITALOPRAM TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N06AB10 | | | | |
| B-73 | 3093-077 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,59 | 11,59 | 1,23 | 2,04 |
| | 3093-077 | | | | 4,62 | 4,62 | | |
| B-73 | 3093-085 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 12,96 | 12,96 | 1,50 | 2,51 |
| | 3093-085 | | | | 5,67 | 5,67 | | |
| B-73 | 3093-093 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,44 | 22,44 | 3,42 | 5,70 |
| | 3093-093 | | | | 12,90 | 12,90 | | |
| B-73 * | 7706-310 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1699 | 0,1699 | | |
| B-73 ** | 7706-310 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1395 | 0,1395 | | |
| B-73 *** | 7706-310 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1725 | 0,1725 | 0,0349 | 0,0582 |
| ESCITALOPRAM TEVA 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: N06AB10 | | | | |
| B-73 | 4799-680 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,44 | 22,44 | 3,42 | 5,70 |
| | 4799-680 | | | | 12,90 | 12,90 | | |
| B-73 * | 7740-053 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1699 | 0,1699 | | |
| B-73 ** | 7740-053 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1395 | 0,1395 | | |
| B-73 *** | 7740-053 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1725 | 0,1725 | 0,0349 | 0,0582 |
| ESCITALOPRAM TEVA 15 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N06AB10 | | | | |
| B-73 | 3093-135 | 28 comprimés pelliculés, 15 mg | 28 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 11,59 | 11,59 | 1,23 | 2,04 |
| | 3093-135 | | | | 4,62 | 4,62 | | |
| B-73 | 3093-143 | 98 comprimés pelliculés, 15 mg | 98 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 22,44 | 22,44 | 3,42 | 5,70 |
| | 3093-143 | | | | 12,90 | 12,90 | | |
| B-73 * | 7706-773 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,1699 | 0,1699 | | |
| B-73 ** | 7706-773 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,1395 | 0,1395 | | |
| B-73 *** | 7706-773 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,1725 | 0,1725 | 0,0349 | 0,0582 |

| ESCITALOPRAM TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N06AB10 | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-73 | 3093-150 3093-150 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,59 4,62 | 11,59 4,62 | 1,23 | 2,04 | |
| B-73 | 3093-168 3093-168 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 22,44 12,90 | 22,44 12,90 | 3,42 | 5,70 | |
| B-73 * | 7706-328 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1699 | 0,1699 | | | |
| B-73 ** | 7706-328 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1395 | 0,1395 | | | |
| B-73 *** | 7706-328 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1725 | 0,1725 | 0,0349 | 0,0582 | |
| ESCITALOPRAM TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 3093-119 3093-119 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 10,56 3,84 | 10,56 3,84 | 1,02 | 1,70 | |
| B-73 | 3093-127 3093-127 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 19,71 10,82 | 19,71 10,82 | 2,87 | 4,78 | |
| B-73 * | 7706-765 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1424 | 0,1424 | | | |
| B-73 ** | 7706-765 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1170 | 0,1170 | | | |
| B-73 *** | 7706-765 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1446 | 0,1446 | 0,0293 | 0,0488 | |
| ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 3705-753 3705-753 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 12,34 5,19 | 12,34 5,19 | 1,38 | 2,29 | |
| B-73 | 3705-761 3705-761 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 23,56 13,82 | 23,56 13,82 | 3,66 | 6,11 | |
| B-73 * | 7706-856 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1783 | 0,1783 | | | |
| B-73 ** | 7706-856 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |
| B-73 *** | 7706-856 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1803 | 0,1803 | 0,0366 | 0,0611 | |
| ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | ATC: N06AB10 | | | | | |
| B-73 | 3705-779 3705-779 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 12,34 5,19 | 12,34 5,19 | 1,38 | 2,29 | |
| B-73 | 3705-787 3705-787 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,56 13,82 | 23,56 13,82 | 3,66 | 6,11 | |
| B-73 * | 7723-083 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1783 | 0,1783 | | | |
| B-73 ** | 7723-083 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |
| B-73 *** | 7723-083 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1803 | 0,1803 | 0,0366 | 0,0611 | |
| ESMERON 50 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: M03AC09 | | | | | |
| | 0746-677 | 10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml | 10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | | 28,30 | 28,30 | | | |
| B-140 * | 0746-677 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 3,6520 | 3,6520 | | | |
| B-140 ** | 0746-677 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 3,0000 | 3,0000 | | | |
| ESTIVAN 10 mg | | ALMIRALL | | ATC: R06AX22 | | | | | |
| Cs-7 | 1768-571 1768-571 | 40 comprimés pelliculés, 10 mg | 40 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 11,71 4,72 | 11,71 4,72 | 5,01 | 5,01 | |
| Cs-7 * | 0748-731 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1523 | 0,1523 | | | |
| Cs-7 ** | 0748-731 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1250 | 0,1250 | | | |
| Cs-7 *** | 0748-731 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1545 | 0,1545 | 0,1252 | 0,1252 | |
| ESTIVAN 20 mg | | ALMIRALL | | ATC: R06AX22 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| Cs-7 | 2077-204 2077-204 | 20 comprimés pelliculés, 20 mg | 20 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 11,86 4,83 | 11,86 4,83 | 5,12 | 5,12 |
| Cs-7 * | 0775-171 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,3115 | 0,3115 | | |
| Cs-7 ** | 0775-171 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2560 | 0,2560 | | |
| Cs-7 *** | 0775-171 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,3164 | 0,3164 | 0,2560 | 0,2560 |
| ESTIVAN Lyo 20 mg | | ALMIRALL | | ATC: R06AX22 | | | | |
| Cs-7 | 2578-177 2578-177 | 30 doses lyophilisats oraux, 20 mg | 30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg | R | 11,49 4,54 | 11,49 4,54 | 4,82 | 4,82 |
| Cs-7 * | 0781-393 | 1 lyophilisat oral, 20 mg | 1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg | R | 0,1953 | 0,1953 | | |
| Cs-7 ** | 0781-393 | 1 lyophilisat oral, 20 mg | 1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg | R | 0,1603 | 0,1603 | | |
| Cs-7 *** | 0781-393 | 1 lyophilisat oral, 20 mg | 1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg | R | 0,1986 | 0,1986 | 0,1607 | 0,1607 |
| ETOMIDATE- LIPURO | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N01AX07 | | | | |
| | 0769-091 | 10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml | 10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml | | 29,99 | 29,99 | | |
| A-30 * | 0769-091 | 1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL | | 3,8700 | 3,8700 | | |
| A-30 ** | 0769-091 | 1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL | | 3,1790 | 3,1790 | | |
| ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01CB01 | | | | |
| | 0788-695 | 5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 27,36 | 27,36 | | |
| A-28 * | 0788-695 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 7,0620 | 7,0620 | | |
| A-28 ** | 0788-695 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 5,8000 | 5,8000 | | |
| ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01CB01 | | | | |
| | 0788-703 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 10,94 | 10,94 | | |
| A-28 * | 0788-703 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 14,1200 | 14,1200 | | |
| A-28 ** | 0788-703 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 11,6000 | 11,6000 | | |
| ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01CB01 | | | | |
| | 0788-711 | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 21,88 | 21,88 | | |
| A-28 * | 0788-711 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 28,2400 | 28,2400 | | |
| A-28 ** | 0788-711 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 23,1900 | 23,1900 | | |
| ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01CB01 | | | | |
| | 0788-729 | 1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml | | 57,82 | 57,82 | | |
| A-28 * | 0788-729 | 1 flacon injectable 50 mL solution | 1 injectieflacon 50 mL oplossing | G | 68,4000 | 68,4000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|------------------|------------------|--------|--------------|--|
| A-28 ** | 0788-729 | pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 61,2900 | 61,2900 | | | |
| ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CB01 | | | | | |
| A-28 * | 7712-490 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 5,47 7,0600 | 5,47 7,0600 | | | |
| A-28 ** | 7712-490 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 5,8000 | 5,8000 | | | |
| ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CB01 | | | | | |
| A-28 * | 7712-508 | 1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 13,63 17,5900 | 13,63 17,5900 | | | |
| A-28 ** | 7712-508 | 1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 14,4500 | 14,4500 | | | |
| ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CB01 | | | | | |
| A-28 * | 7715-022 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 28,82 37,1900 | 28,82 37,1900 | | | |
| A-28 ** | 7715-022 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 30,5500 | 30,5500 | | | |
| ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CB01 | | | | | |
| A-28 * | 7739-279 | 1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 57,64 68,2100 | 57,64 68,2100 | | | |
| A-28 ** | 7739-279 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 61,1000 | 61,1000 | | | |
| ETUMINE | | JUVISE PHARMACEUTICALS | | ATC: N05AH06 | | | | | |
| B-72 | 0040-428 | 30 comprimés, 40 mg | 30 tabletten, 40 mg | | 9,12 | 9,12 | 0,73 | 1,21 | |
| | 0040-428 | | | | 2,74 | 2,74 | | | |
| B-72 * | 0706-705 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,1180 | 0,1180 | | | |
| B-72 ** | 0706-705 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0967 | 0,0967 | | | |
| B-72 *** | 0706-705 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,1194 | 0,1194 | 0,0243 | 0,0403 | |
| EUSAPRIM | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01EE01 | |
| B-131 * | 0706-846 | 10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL | 10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL | r | 27,55 3,5550 | 27,55 3,5550 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-131 ** | 0706-846 | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) | r | 2,9200 | 2,9200 | | |
| EUSAPRIM FORTE | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: J01EE01 | | | | |
| C-37 | 0040-659 0040-659 | 10 comprimés, 800 mg / 160 mg | 10 tabletten, 800 mg / 160 mg | R | 8,42 2,18 | 8,42 2,18 | 1,93 | 1,93 |
| C-37 * | 0706-853 | 1 comprimé, 800 mg/ 160 mg | 1 tablet, 800 mg/ 160 mg | R | 0,2810 | 0,2810 | | |
| C-37 ** | 0706-853 | 1 comprimé, 800 mg/ 160 mg | 1 tablet, 800 mg/ 160 mg | R | 0,2310 | 0,2310 | | |
| C-37 *** | 0706-853 | 1 comprimé, 800 mg/ 160 mg | 1 tablet, 800 mg/ 160 mg | R | 0,2883 | 0,2883 | 0,1930 | 0,1930 |
| EUTHYROX 100 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-667 3816-667 | 84 comprimés, 100 µg | 84 tabletten, 100 µg | | 8,76 2,46 | 8,76 2,46 | 0,65 | 1,09 |
| B-86 * | 7725-161 | 1 comprimé, 100 µg | 1 tablet, 100 µg | | 0,0377 | 0,0377 | | |
| B-86 ** | 7725-161 | 1 comprimé, 100 µg | 1 tablet, 100 µg | | 0,0311 | 0,0311 | | |
| B-86 *** | 7725-161 | 1 comprimé, 100 µg | 1 tablet, 100 µg | | 0,0384 | 0,0384 | 0,0077 | 0,0130 |
| EUTHYROX 125 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-642 3816-642 | 84 comprimés, 125 µg | 84 tabletten, 125 µg | | 9,49 3,02 | 9,49 3,02 | 0,80 | 1,33 |
| B-86 * | 7725-179 | 1 comprimé, 125 µg | 1 tablet, 125 µg | | 0,0464 | 0,0464 | | |
| B-86 ** | 7725-179 | 1 comprimé, 125 µg | 1 tablet, 125 µg | | 0,0381 | 0,0381 | | |
| B-86 *** | 7725-179 | 1 comprimé, 125 µg | 1 tablet, 125 µg | | 0,0471 | 0,0471 | 0,0095 | 0,0158 |
| EUTHYROX 150 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-634 3816-634 | 84 comprimés, 150 µg | 84 tabletten, 150 µg | | 9,85 3,30 | 9,85 3,30 | 0,88 | 1,46 |
| B-86 * | 7725-187 | 1 comprimé, 150 µg | 1 tablet, 150 µg | | 0,0507 | 0,0507 | | |
| B-86 ** | 7725-187 | 1 comprimé, 150 µg | 1 tablet, 150 µg | | 0,0417 | 0,0417 | | |
| B-86 *** | 7725-187 | 1 comprimé, 150 µg | 1 tablet, 150 µg | | 0,0514 | 0,0514 | 0,0105 | 0,0174 |
| EUTHYROX 175 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-626 3816-626 | 84 comprimés, 175 µg | 84 tabletten, 175 µg | | 10,44 3,74 | 10,44 3,74 | 0,99 | 1,65 |
| B-86 * | 7725-195 | 1 comprimé, 175 µg | 1 tablet, 175 µg | | 0,0575 | 0,0575 | | |
| B-86 ** | 7725-195 | 1 comprimé, 175 µg | 1 tablet, 175 µg | | 0,0471 | 0,0471 | | |
| B-86 *** | 7725-195 | 1 comprimé, 175 µg | 1 tablet, 175 µg | | 0,0584 | 0,0584 | 0,0118 | 0,0196 |
| EUTHYROX 200 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-618 3816-618 | 84 comprimés, 200 µg | 84 tabletten, 200 µg | | 10,79 4,01 | 10,79 4,01 | 1,06 | 1,77 |
| B-86 * | 7725-203 | 1 comprimé, 200 µg | 1 tablet, 200 µg | | 0,0615 | 0,0615 | | |
| B-86 ** | 7725-203 | 1 comprimé, 200 µg | 1 tablet, 200 µg | | 0,0506 | 0,0506 | | |
| B-86 *** | 7725-203 | 1 comprimé, 200 µg | 1 tablet, 200 µg | | 0,0626 | 0,0626 | 0,0126 | 0,0211 |
| EUTHYROX 25 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-86 | 3816-758 3816-758 | 84 comprimés, 25 µg | 84 tabletten, 25 µg | | 7,21 1,12 | 7,21 1,12 | 0,30 | 0,49 |
| B-86 * | 7725-138 | 1 comprimé, 25 µg | 1 tablet, 25 µg | | 0,0173 | 0,0173 | | |
| B-86 ** | 7725-138 | 1 comprimé, 25 µg | 1 tablet, 25 µg | | 0,0142 | 0,0142 | | |
| B-86 *** | 7725-138 | 1 comprimé, 25 µg | 1 tablet, 25 µg | | 0,0199 | 0,0199 | 0,0036 | 0,0058 |
| EUTHYROX 50 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-741 3816-741 | 84 comprimés, 50 µg | 84 tabletten, 50 µg | | 7,69 1,54 | 7,69 1,54 | 0,41 | 0,68 |
| B-86 * | 7725-146 | 1 comprimé, 50 µg | 1 tablet, 50 µg | | 0,0237 | 0,0237 | | |
| B-86 ** | 7725-146 | 1 comprimé, 50 µg | 1 tablet, 50 µg | | 0,0194 | 0,0194 | | |
| B-86 *** | 7725-146 | 1 comprimé, 50 µg | 1 tablet, 50 µg | | 0,0256 | 0,0256 | 0,0049 | 0,0081 |
| EUTHYROX 75 µg | | MERCK | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3816-733 3816-733 | 84 comprimés, 75 µg | 84 tabletten, 75 µg | | 8,27 2,05 | 8,27 2,05 | 0,54 | 0,91 |
| B-86 * | 7725-153 | 1 comprimé, 75 µg | 1 tablet, 75 µg | | 0,0315 | 0,0315 | | |
| B-86 ** | 7725-153 | 1 comprimé, 75 µg | 1 tablet, 75 µg | | 0,0258 | 0,0258 | | |
| B-86 *** | 7725-153 | 1 comprimé, 75 µg | 1 tablet, 75 µg | | 0,0326 | 0,0326 | 0,0064 | 0,0108 |
| EXACYL | | EUROCEPT | | ATC: B02AA02 | | | | |
| B-37 | 0808-840 0808-840 | 100 comprimés, 250 mg | 100 tabletten, 250 mg | | 20,65 11,53 | 20,65 11,53 | 3,06 | 5,10 |
| B-37 * | 0706-903 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1488 | 0,1488 | | |
| B-37 ** | 0706-903 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1222 | 0,1222 | | |
| B-37 *** | 0706-903 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1512 | 0,1512 | 0,0306 | 0,0510 |
| EXACYL | | EUROCEPT | | ATC: B02AA02 | | | | |
| B-37 | 0086-470 0086-470 | 10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml | 10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml | | 14,35 6,73 | 14,35 6,73 | 1,78 | 2,97 |
| B-37 * | 0727-024 | 1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL | 1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL | | 0,8690 | 0,8690 | | |
| B-37 ** | 0727-024 | 1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL | 1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL | | 0,7130 | 0,7130 | | |
| EXACYL | | EUROCEPT | | ATC: B02AA02 | | | | |
| B-37 | 0398-610 0398-610 | 20 comprimés, 500 mg | 20 tabletten, 500 mg | | 13,85 6,35 | 13,85 6,35 | 1,68 | 2,81 |
| B-37 * | 0739-029 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,4095 | 0,4095 | | |
| B-37 ** | 0739-029 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,3365 | 0,3365 | | |
| B-37 *** | 0739-029 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,4161 | 0,4161 | 0,0840 | 0,1405 |
| EXACYL 100 mg/ml | | EUROCEPT | | ATC: B02AA02 | | | | |
| B-37 | 3070-406 3070-406 | 6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml | 6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | | 12,97 5,68 | 12,97 5,68 | 1,51 | 2,51 |
| B-37 * | 0706-895 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 1,2217 | 1,2217 | | |
| B-37 ** | 0706-895 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 1,0033 | 1,0033 | | |
| EXEMESTAN SANDOZ 25 mg | | SANDOZ | | ATC: L02BG06 | | | | |
| A-27 | 2745-024 2745-024 | 30 comprimés pelliculés, 25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 39,87 28,01 | 39,87 28,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-27 | 2745-016 2745-016 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 92,74 74,70 | 92,74 74,70 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0759-282 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,8629 | 0,8629 | | |
| A-27 ** | 0759-282 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,7918 | 0,7918 | | |
| A-27 *** | 0759-282 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 1,1444 | 1,1444 | 0,0000 | 0,0000 |
| EXFORGE 10 mg/160 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DB01 | | | | |
| B-224 | 2388-577 2388-577 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg | R | 48,40 35,43 | 48,40 35,43 | 7,17 | 12,07 |
| B-224 * | 0786-558 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,4558 | 0,4558 | | |
| B-224 ** | 0786-558 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,3833 | 0,3833 | | |
| B-224 *** | 0786-558 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 |
| EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: C09DB01 | | | | |
| B-224 | 4165-551 4165-551 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg | R | 48,40 35,43 | 48,40 35,43 | 7,17 | 12,07 |
| B-224 * | 7727-985 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,4558 | 0,4558 | | |
| B-224 ** | 7727-985 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,3833 | 0,3833 | | |
| B-224 *** | 7727-985 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 |
| EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09DB01 | | | | |
| B-224 | 3466-133 3466-133 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg | R | 48,40 35,43 | 48,40 35,43 | 7,17 | 12,07 |
| B-224 * | 7718-083 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,4558 | 0,4558 | | |
| B-224 ** | 7718-083 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,3833 | 0,3833 | | |
| B-224 *** | 7718-083 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg | R | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 |
| EXFORGE 5 mg/160 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DB01 | | | | |
| B-224 | 2388-593 2388-593 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg | R | 44,48 32,02 | 44,48 32,02 | 6,62 | 11,15 |
| B-224 * | 0786-541 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 0786-541 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 0786-541 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: C09DB01 | | | | |
| B-224 | 4165-650 4165-650 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg | R | 44,48 32,02 | 44,48 32,02 | 6,62 | 11,15 |
| B-224 * | 7727-977 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 7727-977 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-224 *** | 7727-977 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 | |
| EXFORGE 5 mg/80 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DB01 | | | | | |
| B-224 | 2388-551 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg | R | 34,44 | 34,44 | 5,22 | 8,79 | |
| | 2388-551 | | | | 23,28 | 23,28 | | | |
| B-224 * | 0786-533 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg / 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 5 mg | R | 0,3065 | 0,3065 | | | |
| B-224 ** | 0786-533 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg / 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 5 mg | R | 0,2518 | 0,2518 | | | |
| B-224 *** | 0786-533 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg / 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 5 mg | R | 0,2950 | 0,2950 | 0,0533 | 0,0897 | |
| EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09DB01 | | | | | |
| B-224 | 3560-901 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg | R | 44,48 | 44,48 | 6,62 | 11,15 | |
| | 3560-901 | | | | 32,02 | 32,02 | | | |
| B-224 * | 7718-406 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 160 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | | |
| B-224 ** | 7718-406 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 160 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | | |
| B-224 *** | 7718-406 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg / 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg / 160 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 | |
| EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DX01 | | | | | |
| B-224 | 2682-474 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 | |
| | 2682-474 | | | | 35,43 | 35,43 | | | |
| B-224 * | 0797-795 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 12,5 mg | R | 0,4558 | 0,4558 | | | |
| B-224 ** | 0797-795 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 12,5 mg | R | 0,3833 | 0,3833 | | | |
| B-224 *** | 0797-795 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 12,5 mg | R | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 | |
| EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DX01 | | | | | |
| B-224 | 2682-425 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 | |
| | 2682-425 | | | | 35,43 | 35,43 | | | |
| B-224 * | 0797-803 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 25 mg | R | 0,4558 | 0,4558 | | | |
| B-224 ** | 0797-803 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 25 mg | R | 0,3833 | 0,3833 | | | |
| B-224 *** | 0797-803 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 25 mg | R | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 | |
| EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09DX01 | | | | | |
| B-224 | 3466-174 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 48,40 | 48,40 | 7,17 | 12,07 | |
| | 3466-174 | | | | 35,43 | 35,43 | | | |
| B-224 * | 7718-125 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 25 mg | R | 0,4558 | 0,4558 | | | |
| B-224 ** | 7718-125 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 25 mg | R | 0,3833 | 0,3833 | | | |
| B-224 *** | 7718-125 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 160 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 160 mg / 25 mg | R | 0,4374 | 0,4374 | 0,0732 | 0,1232 | |
| EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: C09DX01 | | | | | |
| B-224 | 2682-490 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 49,45 | 49,45 | 7,31 | 12,31 | |
| | 2682-490 | | | | 36,34 | 36,34 | | | |
| B-224 * | 0797-811 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 320 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 320 mg / 25 mg | R | 0,4656 | 0,4656 | | | |
| B-224 ** | 0797-811 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg / 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg / 320 mg | R | 0,3931 | 0,3931 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-224 *** | 0797-811 | mg/ 25 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | mg/ 25 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | R | 0,4481 | 0,4481 | 0,0746 | 0,1256 |
| EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA | | | | ATC: C09DX01 | | | | |
| B-224 | 3466-182 3466-182 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 49,45 36,34 | 49,45 36,34 | 7,31 | 12,31 |
| B-224 * | 7718-133 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | R | 0,4656 | 0,4656 | | |
| B-224 ** | 7718-133 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | R | 0,3931 | 0,3931 | | |
| B-224 *** | 7718-133 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg | R | 0,4481 | 0,4481 | 0,0746 | 0,1256 |
| EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: C09DX01 | | | | |
| B-224 | 2682-359 2682-359 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 44,48 32,02 | 44,48 32,02 | 6,62 | 11,15 |
| B-224 * | 0797-779 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 0797-779 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 0797-779 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA | | | | ATC: C09DX01 | | | | |
| B-224 | 3466-141 3466-141 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 44,48 32,02 | 44,48 32,02 | 6,62 | 11,15 |
| B-224 * | 7718-091 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 7718-091 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 7718-091 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: C09DX01 | | | | |
| B-224 | 2684-264 2684-264 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 44,48 32,02 | 44,48 32,02 | 6,62 | 11,15 |
| B-224 * | 0797-787 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 0797-787 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 0797-787 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA | | | | ATC: C09DX01 | | | | |
| B-224 | 3466-158 3466-158 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 44,48 32,02 | 44,48 32,02 | 6,62 | 11,15 |
| B-224 * | 7718-109 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | R | 0,4189 | 0,4189 | | |
| B-224 ** | 7718-109 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | R | 0,3463 | 0,3463 | | |
| B-224 *** | 7718-109 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg | R | 0,3974 | 0,3974 | 0,0676 | 0,1138 |
| EXJADE 180 mg NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: V03AC03 | | | | |
| A-35 | 3540-101 3540-101 | 90 comprimés pelliculés, 180 mg | 90 filmomhulde tabletten, 180 mg | R | 408,58 362,78 | 408,58 362,78 | 0,00 | 0,00 |
| A-35 * | 7720-253 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | R | 4,3518 | 4,3518 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-35 ** | 7720-253 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | R | 4,2728 | 4,2728 | | |
| A-35 *** | 7720-253 | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | R | 4,4783 | 4,4783 | 0,0000 | 0,0000 |
| EXJADE 360 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: V03AC03 | | | |
| A-35 | 3540-119 | 90 comprimés pelliculés, 360 mg | 90 filmomhulde tabletten, 360 mg | R | 751,38 | 751,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 3540-119 | | | | 675,45 | 675,45 | | |
| A-35 * | 7720-246 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | R | 8,0343 | 8,0343 | | |
| A-35 ** | 7720-246 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | R | 7,9553 | 7,9553 | | |
| A-35 *** | 7720-246 | 1 comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet, 360 mg | R | 8,2872 | 8,2872 | 0,0000 | 0,0000 |
| EXJADE 90 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: V03AC03 | | | |
| A-35 | 3540-093 | 90 comprimés pelliculés, 90 mg | 90 filmomhulde tabletten, 90 mg | R | 193,94 | 193,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 3540-093 | | | | 167,00 | 167,00 | | |
| A-35 * | 7720-261 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | R | 2,0459 | 2,0459 | | |
| A-35 ** | 7720-261 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | R | 1,9669 | 1,9669 | | |
| A-35 *** | 7720-261 | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | R | 2,0934 | 2,0934 | 0,0000 | 0,0000 |
| EXTENCIN | | LABORATOIRES DELBERT | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01CE08 | | |
| C-36 | 1527-050 | 1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU | 1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU | | 20,91 | 20,91 | 10,20 | 10,38 |
| | 1527-050 | | | | 11,74 | 11,74 | | |
| C-36 * | 7721-707 | 1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU | 1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU | | 15,1500 | 15,1500 | | |
| C-36 ** | 7721-707 | 1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU | 1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU | | 12,4400 | 12,4400 | | |
| EZETIMIB AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |
| B-268 | 4219-853 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 19,20 | 19,20 | 2,77 | 4,61 |
| | 4219-853 | | | | 10,43 | 10,43 | | |
| B-268 | 4219-861 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 39,53 | 39,53 | 5,93 | 9,98 |
| | 4219-861 | | | | 27,71 | 27,71 | | |
| B-268 * | 7728-306 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3649 | 0,3649 | | |
| B-268 ** | 7728-306 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2997 | 0,2997 | | |
| B-268 *** | 7728-306 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3469 | 0,3469 | 0,0605 | 0,1018 |
| EZETIMIBE EG 10 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |
| B-268 | 3651-999 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 40,50 | 40,50 | 6,07 | 10,21 |
| | 3651-999 | | | | 28,56 | 28,56 | | |
| B-268 * | 7720-519 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3686 | 0,3686 | | |
| B-268 ** | 7720-519 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3027 | 0,3027 | | |
| B-268 *** | 7720-519 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3497 | 0,3497 | 0,0607 | 0,1021 |
| EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |
| B-268 | 4851-861 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 40,50 | 40,50 | 6,07 | 10,21 |
| | 4851-861 | | | | 28,56 | 28,56 | | |
| B-268 * | 7740-954 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3686 | 0,3686 | | |
| B-268 ** | 7740-954 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3027 | 0,3027 | | |
| B-268 *** | 7740-954 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3497 | 0,3497 | 0,0607 | 0,1021 |
| EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-268 | 4731-311 4731-311 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 40,50 28,56 | 40,50 28,56 | 6,07 | 10,21 |
| B-268 * | 7738-503 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3686 | 0,3686 | | |
| B-268 ** | 7738-503 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3027 | 0,3027 | | |
| B-268 *** | 7738-503 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3497 | 0,3497 | 0,0607 | 0,1021 |
| EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09 | | | | | | | | |
| B-268 | 3689-320 3689-320 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 19,24 10,46 | 19,24 10,46 | 2,77 | 4,62 |
| B-268 | 3689-346 3689-346 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 39,52 27,70 | 39,52 27,70 | 5,93 | 9,98 |
| B-268 * | 7721-590 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3648 | 0,3648 | | |
| B-268 ** | 7721-590 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2996 | 0,2996 | | |
| B-268 *** | 7721-590 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3468 | 0,3468 | 0,0605 | 0,1018 |
| EZETIMIBE MYLAN 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09 | | | | | | | | |
| B-268 | 4715-231 4715-231 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 41,57 29,49 | 41,57 29,49 | 6,22 | 10,46 |
| B-268 * | 7738-511 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-268 ** | 7738-511 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-268 *** | 7738-511 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3604 | 0,3604 | 0,0622 | 0,1046 |
| EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09 | | | | | | | | |
| B-268 | 3577-038 3577-038 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 19,24 10,46 | 19,24 10,46 | 2,77 | 4,62 |
| B-268 | 3577-053 3577-053 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 40,88 28,90 | 40,88 28,90 | 6,12 | 10,30 |
| B-268 * | 7720-949 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-268 ** | 7720-949 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-268 *** | 7720-949 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09 | | | | | | | | |
| B-268 | 4662-086 4662-086 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 40,88 28,90 | 40,88 28,90 | 6,12 | 10,30 |
| B-268 | 4738-704 4738-704 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 40,88 28,90 | 40,88 28,90 | 6,12 | 10,30 |
| B-268 * | 7738-529 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3730 | 0,3730 | | |
| B-268 ** | 7738-529 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3063 | 0,3063 | | |
| B-268 *** | 7738-529 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3535 | 0,3535 | 0,0612 | 0,1030 |
| EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09 | | | | | | | | |
| B-268 | 4394-292 4394-292 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 20,20 11,20 | 20,20 11,20 | 2,97 | 4,95 |
| B-268 | 4394-300 4394-300 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 41,47 29,40 | 41,47 29,40 | 6,20 | 10,44 |
| B-268 * | 7732-258 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3794 | 0,3794 | | |
| B-268 ** | 7732-258 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3116 | 0,3116 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-268 *** | 7732-258 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3593 | 0,3593 | 0,0620 | 0,1044 |
| EZETIMIBE VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AX09 | |
| B-268 | 3645-140 3645-140 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 41,57 29,49 | 41,57 29,49 | 6,22 | 10,46 |
| B-268 * | 7721-871 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-268 ** | 7721-871 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-268 *** | 7721-871 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3604 | 0,3604 | 0,0622 | 0,1046 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4484-788 4484-788 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 48,45 35,48 | 48,45 35,48 | 7,18 | 12,08 |
| B-289 * | 7735-368 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4472 | 0,4472 | | |
| B-289 ** | 7735-368 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,3761 | 0,3761 | | |
| B-289 *** | 7735-368 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4292 | 0,4292 | 0,0718 | 0,1208 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4484-796 4484-796 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg | R | 58,49 44,22 | 58,49 44,22 | 8,58 | 14,44 |
| B-289 * | 7735-376 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,5398 | 0,5398 | | |
| B-289 ** | 7735-376 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,4687 | 0,4687 | | |
| B-289 *** | 7735-376 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,5296 | 0,5296 | 0,0858 | 0,1444 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4484-804 4484-804 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg | R | 58,49 44,22 | 58,49 44,22 | 8,58 | 14,44 |
| B-289 * | 7735-384 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,5398 | 0,5398 | | |
| B-289 ** | 7735-384 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,4687 | 0,4687 | | |
| B-289 *** | 7735-384 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,5296 | 0,5296 | 0,0858 | 0,1444 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4484-812 4484-812 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg | R | 58,47 44,20 | 58,47 44,20 | 8,57 | 14,43 |
| B-289 * | 7735-392 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,5396 | 0,5396 | | |
| B-289 ** | 7735-392 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,4685 | 0,4685 | | |
| B-289 *** | 7735-392 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,5294 | 0,5294 | 0,0857 | 0,1443 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4851-655 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ | G | 48,43 | 48,43 | 7,17 | 12,07 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 4851-655 | 10 mg | 10 mg | | | 35,46 | 35,46 | | |
| B-289 * | 7740-848 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4470 | 0,4470 | | | |
| B-289 ** | 7740-848 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,3759 | 0,3759 | | | |
| B-289 *** | 7740-848 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4290 | 0,4290 | 0,0717 | 0,1207 | |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg | | EG | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | | | |
| B-289 | 4851-663 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg | G | 58,47 | 58,47 | 8,57 | 14,43 | |
| | 4851-663 | | | | 44,20 | 44,20 | | | |
| B-289 * | 7740-855 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | G | 0,5396 | 0,5396 | | | |
| B-289 ** | 7740-855 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | G | 0,4685 | 0,4685 | | | |
| B-289 *** | 7740-855 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | G | 0,5294 | 0,5294 | 0,0857 | 0,1443 | |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg | | EG | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | | | |
| B-289 | 4851-671 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg | G | 58,47 | 58,47 | 8,57 | 14,43 | |
| | 4851-671 | | | | 44,20 | 44,20 | | | |
| B-289 * | 7740-863 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | G | 0,5396 | 0,5396 | | | |
| B-289 ** | 7740-863 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | G | 0,4685 | 0,4685 | | | |
| B-289 *** | 7740-863 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | G | 0,5294 | 0,5294 | 0,0857 | 0,1443 | |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg | | EG | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | | | |
| B-289 | 4851-689 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg | G | 58,47 | 58,47 | 8,57 | 14,43 | |
| | 4851-689 | | | | 44,20 | 44,20 | | | |
| B-289 * | 7740-871 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | G | 0,5396 | 0,5396 | | | |
| B-289 ** | 7740-871 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | G | 0,4685 | 0,4685 | | | |
| B-289 *** | 7740-871 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | G | 0,5294 | 0,5294 | 0,0857 | 0,1443 | |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg | | AREGA PHARMA | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | | | |
| B-289 | 4502-456 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 48,45 | 48,45 | 7,18 | 12,08 | |
| | 4502-456 | | | | 35,48 | 35,48 | | | |
| B-289 * | 7736-333 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4472 | 0,4472 | | | |
| B-289 ** | 7736-333 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,3761 | 0,3761 | | | |
| B-289 *** | 7736-333 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4292 | 0,4292 | 0,0718 | 0,1208 | |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg | | AREGA PHARMA | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | | | |
| B-289 | 4502-449 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg | R | 58,49 | 58,49 | 8,58 | 14,44 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-289 * | 4502-449 7736-341 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 44,22 0,5398 | 44,22 0,5398 | | |
| B-289 ** | 7736-341 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,4687 | 0,4687 | | |
| B-289 *** | 7736-341 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | R | 0,5296 | 0,5296 | 0,0858 | 0,1444 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05 | | | | | | | | |
| B-289 | 4502-464 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg | R | 58,49 | 58,49 | 8,58 | 14,44 |
| | 4502-464 | | | | 44,22 | 44,22 | | |
| B-289 * | 7736-358 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,5398 | 0,5398 | | |
| B-289 ** | 7736-358 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,4687 | 0,4687 | | |
| B-289 *** | 7736-358 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | R | 0,5296 | 0,5296 | 0,0858 | 0,1444 |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05 | | | | | | | | |
| B-289 | 4502-472 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg | R | 58,47 | 58,47 | 8,57 | 14,43 |
| | 4502-472 | | | | 44,20 | 44,20 | | |
| B-289 * | 7736-366 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,5396 | 0,5396 | | |
| B-289 ** | 7736-366 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,4685 | 0,4685 | | |
| B-289 *** | 7736-366 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | R | 0,5294 | 0,5294 | 0,0857 | 0,1443 |
| EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4616-405 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4616-405 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7737-463 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7737-463 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7737-463 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4616-413 | 90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4616-413 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7737-471 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7737-471 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7737-471 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4616-421 | 90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4616-421 | | | | 40,90 | 40,90 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-289 * | 7737-489 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7737-489 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7737-489 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4138-244 | 100 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 59,89 | 59,89 | 8,77 | 14,77 |
| | 4138-244 | | | | 45,44 | 45,44 | | |
| B-289 * | 7728-520 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5528 | 0,5528 | | |
| B-289 ** | 7728-520 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7728-520 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5436 | 0,5436 | 0,0877 | 0,1477 |
| EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4138-251 | 100 comprimés, 20 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 59,89 | 59,89 | 8,77 | 14,77 |
| | 4138-251 | | | | 45,44 | 45,44 | | |
| B-289 * | 7728-538 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5528 | 0,5528 | | |
| B-289 ** | 7728-538 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7728-538 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5436 | 0,5436 | 0,0877 | 0,1477 |
| EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4138-210 | 30 comprimés, 5 mg/ 10 mg | 30 tabletten, 5 mg/ 10 mg | R | 24,37 | 24,37 | 3,82 | 6,42 |
| | 4138-210 | | | | 14,52 | 14,52 | | |
| B-289 | 4138-228 | 100 comprimés, 5 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 5 mg/ 10 mg | R | 47,88 | 47,88 | 7,10 | 11,94 |
| | 4138-228 | | | | 34,98 | 34,98 | | |
| B-289 * | 7728-512 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,4419 | 0,4419 | | |
| B-289 ** | 7728-512 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3708 | 0,3708 | | |
| B-289 *** | 7728-512 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | R | 0,4235 | 0,4235 | 0,0710 | 0,1194 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02 | | | | | | | | |
| B-289 | 4486-114 | 100 comprimés, 20 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 20 mg/ 10 mg | G | 41,57 | 41,57 | 6,22 | 10,46 |
| | 4486-114 | | | | 29,49 | 29,49 | | |
| B-289 * | 7720-139 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 7720-139 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 7720-139 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3604 | 0,3604 | 0,0622 | 0,1046 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02 | | | | | | | | |
| B-289 | 4486-122 | 100 comprimés, 40 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 41,57 | 41,57 | 6,22 | 10,46 |
| | 4486-122 | | | | 29,49 | 29,49 | | |
| B-289 * | 7720-147 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 7720-147 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 7720-147 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3604 | 0,3604 | 0,0622 | 0,1046 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02 | | | | | | | | |
| B-289 | 4486-130 | 100 comprimés, 80 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 80 mg/ 10 mg | G | 57,60 | 57,60 | 8,45 | 14,23 |
| | 4486-130 | | | | 43,44 | 43,44 | | |
| B-289 * | 7720-154 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | G | 0,5316 | 0,5316 | | |
| B-289 ** | 7720-154 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | G | 0,4605 | 0,4605 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-289 *** | 7720-154 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | G | 0,5207 | 0,5207 | 0,0845 | 0,1423 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 3961-562 3961-562 | 98 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 48,05 35,13 | 48,05 35,13 | 7,12 | 11,99 |
| B-289 * | 7725-443 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4526 | 0,4526 | | |
| B-289 ** | 7725-443 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,3800 | 0,3800 | | |
| B-289 *** | 7725-443 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4338 | 0,4338 | 0,0727 | 0,1223 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 3961-570 3961-570 | 98 comprimés, 20 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 20 mg/ 10 mg | G | 40,46 28,52 | 40,46 28,52 | 6,06 | 10,20 |
| B-289 * | 7724-446 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3756 | 0,3756 | | |
| B-289 ** | 7724-446 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3085 | 0,3085 | | |
| B-289 *** | 7724-446 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3564 | 0,3564 | 0,0618 | 0,1041 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 3961-588 3961-588 | 98 comprimés, 40 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 40,46 28,52 | 40,46 28,52 | 6,06 | 10,20 |
| B-289 * | 7724-453 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3756 | 0,3756 | | |
| B-289 ** | 7724-453 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3085 | 0,3085 | | |
| B-289 *** | 7724-453 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3564 | 0,3564 | 0,0618 | 0,1041 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 4279-915 4279-915 | 100 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 47,62 34,75 | 47,62 34,75 | 7,06 | 11,88 |
| B-289 * | 7722-093 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4395 | 0,4395 | | |
| B-289 ** | 7722-093 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,3684 | 0,3684 | | |
| B-289 *** | 7722-093 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4208 | 0,4208 | 0,0706 | 0,1188 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 4279-923 4279-923 | 100 comprimés, 20 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 20 mg/ 10 mg | G | 41,57 29,49 | 41,57 29,49 | 6,22 | 10,46 |
| B-289 * | 7730-302 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 7730-302 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 7730-302 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3604 | 0,3604 | 0,0622 | 0,1046 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 4279-931 4279-931 | 100 comprimés, 40 mg/ 10 mg | 100 tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 41,57 29,49 | 41,57 29,49 | 6,22 | 10,46 |
| B-289 * | 7730-310 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 7730-310 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 7730-310 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3604 | 0,3604 | 0,0622 | 0,1046 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 3733-250 3733-250 | 98 comprimés, 20 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 20 mg/ 10 mg | G | 40,88 28,90 | 40,88 28,90 | 6,12 | 10,30 |
| B-289 * | 7722-747 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-289 ** | 7722-747 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 7722-747 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | G | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 3733-243 | 98 comprimés, 40 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 40,88 | 40,88 | 6,12 | 10,30 |
| | 3733-243 | | | | 28,90 | 28,90 | | |
| B-289 * | 7722-754 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 7722-754 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 7722-754 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | | |
| B-289 | 3733-235 | 98 comprimés, 80 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 80 mg/ 10 mg | G | 56,59 | 56,59 | 8,31 | 13,99 |
| | 3733-235 | | | | 42,56 | 42,56 | | |
| B-289 * | 7722-762 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | G | 0,5329 | 0,5329 | | |
| B-289 ** | 7722-762 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | G | 0,4603 | 0,4603 | | |
| B-289 *** | 7722-762 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | G | 0,5210 | 0,5210 | 0,0848 | 0,1428 |
| EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |
| B-268 | 2042-042 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | R | 40,88 | 40,88 | 6,12 | 10,30 |
| | 2042-042 | | | | 28,90 | 28,90 | | |
| B-268 * | 0775-809 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-268 ** | 0775-809 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-268 *** | 0775-809 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |
| B-268 | 4686-267 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | R | 40,88 | 40,88 | 6,12 | 10,30 |
| | 4686-267 | | | | 28,90 | 28,90 | | |
| B-268 * | 7738-750 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-268 ** | 7738-750 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-268 *** | 7738-750 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AX09 | | |
| B-268 | 3586-542 | 98 comprimés enrobés, 10 mg | 98 omhulde tabletten, 10 mg | G | 40,88 | 40,88 | 6,12 | 10,30 |
| | 3586-542 | | | | 28,90 | 28,90 | | |
| B-268 * | 7720-469 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-268 ** | 7720-469 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-268 *** | 7720-469 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | G | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| FARMORUBICINE 10 mg Cytovial Pfizer | | | | | | ATC: L01DB03 | | |
| | 0749-747 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 6,28 | 6,28 | | |
| A-25 * | 0749-747 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 8,1000 | 8,1000 | | |
| A-25 ** | 0749-747 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 6,6600 | 6,6600 | | |
| FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial Pfizer | | | | | | ATC: L01DB03 | | |
| | 0780-882 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 125,65 | 125,65 | | |
| A-25 * | 0780-882 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 140,3000 | 140,3000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-25 ** | 0780-882 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 133,1900 | 133,1900 | | |
| FARMORUBICINE 50 mg Cytovial | | Pfizer | | ATC: L01DB03 | | | | |
| | 0749-754 | 1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 31,41 | 31,41 | | |
| A-25 * | 0749-754 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 40,4000 | 40,4000 | | |
| A-25 ** | 0749-754 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 33,2900 | 33,2900 | | |
| FELODIPINE EG Retard 10 mg | | EG | | ATC: C08CA02 | | | | |
| B-20 | 3907-938 | 100 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 24,24 | 24,24 | 3,81 | 6,39 |
| | 3907-938 | | | | 14,41 | 14,41 | | |
| B-20 * | 0774-570 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1860 | 0,1860 | | |
| B-20 ** | 0774-570 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1527 | 0,1527 | | |
| B-20 *** | 0774-570 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1871 | 0,1871 | 0,0381 | 0,0639 |
| FELODIPINE EG Retard 5 mg | | EG | | ATC: C08CA02 | | | | |
| B-20 | 3907-920 | 100 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 17,33 | 17,33 | 2,39 | 3,98 |
| | 3907-920 | | | | 9,00 | 9,00 | | |
| B-20 * | 0774-562 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,1161 | 0,1161 | | |
| B-20 ** | 0774-562 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0954 | 0,0954 | | |
| B-20 *** | 0774-562 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,1180 | 0,1180 | 0,0239 | 0,0398 |
| FELODIPINE SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: C08CA02 | | | | |
| B-20 | 1790-906 | 30 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 11,85 | 11,85 | 1,28 | 2,13 |
| | 1790-906 | | | | 4,82 | 4,82 | | |
| B-20 | 2159-739 | 100 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 24,23 | 24,23 | 3,80 | 6,39 |
| | 2159-739 | | | | 14,40 | 14,40 | | |
| B-20 * | 0774-372 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1858 | 0,1858 | | |
| B-20 ** | 0774-372 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1526 | 0,1526 | | |
| B-20 *** | 0774-372 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1870 | 0,1870 | 0,0380 | 0,0639 |
| FELODIPINE SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: C08CA02 | | | | |
| B-20 | 1796-986 | 30 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 8,69 | 8,69 | 0,64 | 1,07 |
| | 1796-986 | | | | 2,41 | 2,41 | | |
| B-20 | 2159-721 | 100 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 17,29 | 17,29 | 2,38 | 3,96 |
| | 2159-721 | | | | 8,97 | 8,97 | | |
| B-20 * | 0774-364 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,1158 | 0,1158 | | |
| B-20 ** | 0774-364 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0951 | 0,0951 | | |
| B-20 *** | 0774-364 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,1176 | 0,1176 | 0,0238 | 0,0396 |

| FEMARA 2,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: L02BG04 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| A-27 | 1295-393 1295-393 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | R | 33,33 22,31 | 33,33 22,31 | 0,00 | 0,00 | |
| A-27 | 2463-669 2463-669 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | R | 76,97 60,31 | 76,97 60,31 | 0,00 | 0,00 | |
| A-27 * | 0749-945 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | R | 0,7104 | 0,7104 | | | |
| A-27 ** | 0749-945 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | R | 0,6393 | 0,6393 | | | |
| A-27 *** | 0749-945 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | R | 0,7143 | 0,7143 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FENTANYL JANSSEN | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | | | ATC: N01AH01 | | | |
| A-30 * | 0707-042 0707-042 | 30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml 1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL | 30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL | R | 3,96 0,1703 | 3,96 0,1703 | | | |
| A-30 ** | 0707-042 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL | R | 0,1400 | 0,1400 | | | |
| FENTANYL JANSSEN | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | | | ATC: N01AH01 | | | |
| A-30 * | 0707-059 0707-059 | 50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml 1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL | 50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL | R | 26,05 0,6724 | 26,05 0,6724 | | | |
| A-30 ** | 0707-059 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL | R | 0,5522 | 0,5522 | | | |
| FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h | | EG | | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2658-490 2658-490 | 10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 86,80 69,28 | 86,80 69,28 | 8,30 | 12,50 | |
| B-56 * | 0796-144 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 8,0550 | 8,0550 | | | |
| B-56 ** | 0796-144 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 7,3440 | 7,3440 | | | |
| FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h | | EG | | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2658-359 2658-359 | 10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 25,75 15,72 | 25,75 15,72 | 4,02 | 6,74 | |
| B-56 * | 0796-102 | 1 dispositif transdermique, 12 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 2,0290 | 2,0290 | | | |
| B-56 ** | 0796-102 | 1 dispositif transdermique, 12 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 1,6660 | 1,6660 | | | |
| FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h | | EG | | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2658-383 2658-383 | 10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 29,40 18,91 | 29,40 18,91 | 4,53 | 7,61 | |
| B-56 * | 0796-110 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 2,4400 | 2,4400 | | | |
| B-56 ** | 0796-110 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 2,0040 | 2,0040 | | | |
| FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h | | EG | | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2658-417 2658-417 | 10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 54,45 40,70 | 54,45 40,70 | 8,01 | 12,50 | |
| B-56 * | 0796-128 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 5,0250 | 5,0250 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--|--------|---------------|---------------|------|-------|
| B-56 ** | 0796-128 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 4,3140 | 4,3140 | | |
| FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h | | | | EG | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2658-458 | 10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 72,55 | 72,55 | 8,30 | 12,50 |
| | 2658-458 | | | | 56,45 | 56,45 | | |
| B-56 * | 0796-136 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 6,6950 | 6,6950 | | |
| B-56 ** | 0796-136 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 5,9840 | 5,9840 | | |
| FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h | | | | SANDOZ | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2445-435 | 10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 90,64 | 90,64 | 8,30 | 12,50 |
| | 2445-435 | | | | 72,78 | 72,78 | | |
| B-56 * | 0786-947 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 8,4260 | 8,4260 | | |
| B-56 ** | 0786-947 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 7,7150 | 7,7150 | | |
| FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h | | | | SANDOZ | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2994-374 | 10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h | G | 25,28 | 25,28 | 3,95 | 6,63 |
| | 2994-374 | | | | 15,31 | 15,31 | | |
| B-56 * | 0786-905 | 1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h | G | 1,9760 | 1,9760 | | |
| B-56 ** | 0786-905 | 1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h | G | 1,6230 | 1,6230 | | |
| FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h | | | | SANDOZ | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2445-377 | 10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 29,40 | 29,40 | 4,53 | 7,61 |
| | 2445-377 | | | | 18,91 | 18,91 | | |
| B-56 * | 0786-913 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 2,4400 | 2,4400 | | |
| B-56 ** | 0786-913 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 2,0040 | 2,0040 | | |
| FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h | | | | SANDOZ | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2445-393 | 10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 56,79 | 56,79 | 8,30 | 12,50 |
| | 2445-393 | | | | 42,74 | 42,74 | | |
| B-56 * | 0786-921 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 5,2410 | 5,2410 | | |
| B-56 ** | 0786-921 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 4,5300 | 4,5300 | | |
| FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h | | | | SANDOZ | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2445-419 | 10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 75,86 | 75,86 | 8,30 | 12,50 |
| | 2445-419 | | | | 59,34 | 59,34 | | |
| B-56 * | 0786-939 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 7,0010 | 7,0010 | | |
| B-56 ** | 0786-939 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 6,2900 | 6,2900 | | |
| FERUPANTIL 180 mg | | | | SANDOZ | ATC: V03AC03 | | | |
| A-35 | 4392-981 | 9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg | 9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg | G | 408,58 | 408,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4392-981 | | | | 362,78 | 362,78 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-35 * | 7731-896 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,3518 | 4,3518 | | |
| A-35 ** | 7731-896 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,2728 | 4,2728 | | |
| A-35 *** | 7731-896 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg | G | 4,4783 | 4,4783 | 0,0000 | 0,0000 |
| FERUPANTIL 360 mg | | SANDOZ | | ATC: V03AC03 | | | | |
| A-35 | 4392-999 | 9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg | 9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg | G | 751,36 | 751,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4392-999 | | | | 675,43 | 675,43 | | |
| A-35 * | 7731-904 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg | G | 8,0341 | 8,0341 | | |
| A-35 ** | 7731-904 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg | G | 7,9551 | 7,9551 | | |
| A-35 *** | 7731-904 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg | G | 8,2870 | 8,2870 | 0,0000 | 0,0000 |
| FERUPANTIL 90 mg | | SANDOZ | | ATC: V03AC03 | | | | |
| A-35 | 4392-973 | 9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg | 9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg | G | 193,94 | 193,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 4392-973 | | | | 167,00 | 167,00 | | |
| A-35 * | 7731-888 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0459 | 2,0459 | | |
| A-35 * | 7731-888 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0459 | 2,0459 | | |
| A-35 ** | 7731-888 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg | G | 1,9669 | 1,9669 | | |
| A-35 ** | 7731-888 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg | G | 1,9669 | 1,9669 | | |
| A-35 *** | 7731-888 | 1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg | 1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg | G | 2,0934 | 2,0934 | 0,0000 | 0,0000 |
| FLAGYL 500 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: G01AF01 | | | | |
| B-175 | 0111-708 | 10 ovules, 500 mg | 10 ovules, 500 mg | R | 7,25 | 7,25 | 0,30 | 0,51 |
| | 0111-708 | | | | 1,15 | 1,15 | | |
| B-175 * | 0707-208 | 1 ovule, 500 mg | 1 ovule, 500 mg | R | 0,1480 | 0,1480 | | |
| B-175 ** | 0707-208 | 1 ovule, 500 mg | 1 ovule, 500 mg | R | 0,1220 | 0,1220 | | |
| FLAGYL 500 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: P01AB01 | | | | |
| B-132 | 0103-275 | 20 comprimés, 500 mg | 20 tabletten, 500 mg | R | 7,98 | 7,98 | 0,48 | 0,80 |
| | 0103-275 | | | | 1,80 | 1,80 | | |
| B-132 * | 0707-190 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,1160 | 0,1160 | | |
| B-132 ** | 0707-190 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,0955 | 0,0955 | | |
| B-132 *** | 0707-190 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,1224 | 0,1224 | 0,0240 | 0,0400 |
| FLAMMACERIUM | | BIOCODEX | | ATC: D06BA51 | | | | |
| | 0727-750 | 1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g | 1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g | | 17,82 | 17,82 | | |
| B-153 * | 0727-750 | 5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | | 0,2300 | 0,2300 | | |
| B-153 ** | 0727-750 | 5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | | 0,1889 | 0,1889 | | |

| FLAMMAZINE | | BIOCODEX | | ATC: D06BA01 | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| B-153 * | 0707-216 | 1 pot 500 g crème, 10 mg/g 5 g crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 1 pot 500 g crème, 10 mg/g 5 g crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | | 15,51 0,2002 | 15,51 0,2002 | | |
| B-153 ** | 0707-216 | 5 g crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 5 g crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | | 0,1644 | 0,1644 | | |
| FLECAINIDE RETARD EG 100 mg | | EG | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3120-763 | 100 gélules à libération prolongée, 100 mg 3120-763 | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 28,43 18,05 | 28,43 18,05 | 4,39 | 7,37 |
| B-8 * | 7707-417 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,2329 | 0,2329 | | |
| B-8 ** | 7707-417 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,1913 | 0,1913 | | |
| B-8 *** | 7707-417 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,2290 | 0,2290 | 0,0439 | 0,0737 |
| FLECAINIDE RETARD EG 150 mg | | EG | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3120-789 | 100 gélules à libération prolongée, 150 mg 3120-789 | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 38,76 27,05 | 38,76 27,05 | 5,83 | 9,80 |
| B-8 * | 7707-425 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3491 | 0,3491 | | |
| B-8 ** | 7707-425 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,2867 | 0,2867 | | |
| B-8 *** | 7707-425 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3323 | 0,3323 | 0,0583 | 0,0980 |
| FLECAINIDE RETARD EG 200 mg | | EG | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3120-805 | 100 gélules à libération prolongée, 200 mg 3120-805 | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 47,99 35,08 | 47,99 35,08 | 7,11 | 11,97 |
| B-8 * | 7707-433 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,4429 | 0,4429 | | |
| B-8 ** | 7707-433 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,3718 | 0,3718 | | |
| B-8 *** | 7707-433 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,4245 | 0,4245 | 0,0711 | 0,1197 |
| FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3148-459 | 100 gélules à libération prolongée, 100 mg 3148-459 | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 25,92 15,87 | 25,92 15,87 | 4,04 | 6,78 |
| B-8 * | 7708-464 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,2048 | 0,2048 | | |
| B-8 ** | 7708-464 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,1682 | 0,1682 | | |
| B-8 *** | 7708-464 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,2038 | 0,2038 | 0,0404 | 0,0678 |
| FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3148-475 | 100 gélules à libération prolongée, 150 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 35,93 | 35,93 | 5,43 | 9,14 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 3148-475 | | | | 24,59 | 24,59 | | |
| B-8 * | 7708-472 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3173 | 0,3173 | | |
| B-8 ** | 7708-472 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,2607 | 0,2607 | | |
| B-8 *** | 7708-472 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3040 | 0,3040 | 0,0543 | 0,0914 |
| FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3148-491 | 100 gélules à libération prolongée, 200 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 44,83 | 44,83 | 6,67 | 11,23 |
| | 3148-491 | | | | 32,32 | 32,32 | | |
| B-8 * | 7708-480 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,4137 | 0,4137 | | |
| B-8 ** | 7708-480 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,3426 | 0,3426 | | |
| B-8 *** | 7708-480 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,3929 | 0,3929 | 0,0667 | 0,1123 |
| FLECAINIDE SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 2401-669 | 60 comprimés, 100 mg | 60 tabletten, 100 mg | G | 21,85 | 21,85 | 3,30 | 5,50 |
| | 2401-669 | | | | 12,45 | 12,45 | | |
| B-8 | 2401-651 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | G | 23,79 | 23,79 | 3,72 | 6,19 |
| | 2401-651 | | | | 14,01 | 14,01 | | |
| B-8 * | 0786-525 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | | |
| B-8 ** | 0786-525 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1485 | 0,1485 | | |
| B-8 *** | 0786-525 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1825 | 0,1825 | 0,0372 | 0,0619 |
| FLECAITEVA RETARD 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3017-530 | 100 gélules à libération modifiée, 100 mg | 100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg | G | 27,39 | 27,39 | 4,24 | 7,13 |
| | 3017-530 | | | | 17,15 | 17,15 | | |
| B-8 * | 7702-210 | 1 gélule à libération modifiée, 100 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,2213 | 0,2213 | | |
| B-8 ** | 7702-210 | 1 gélule à libération modifiée, 100 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,1818 | 0,1818 | | |
| B-8 *** | 7702-210 | 1 gélule à libération modifiée, 100 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,2186 | 0,2186 | 0,0424 | 0,0713 |
| FLECAITEVA RETARD 150 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3017-589 | 100 gélules à libération modifiée, 150 mg | 100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg | G | 37,41 | 37,41 | 5,64 | 9,48 |
| | 3017-589 | | | | 25,87 | 25,87 | | |
| B-8 * | 7702-228 | 1 gélule à libération modifiée, 150 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3339 | 0,3339 | | |
| B-8 ** | 7702-228 | 1 gélule à libération modifiée, 150 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,2742 | 0,2742 | | |
| B-8 *** | 7702-228 | 1 gélule à libération modifiée, 150 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3187 | 0,3187 | 0,0564 | 0,0948 |
| FLECAITEVA RETARD 200 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 3017-621 | 100 gélules à libération modifiée, 200 mg | 100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg | G | 46,19 | 46,19 | 6,86 | 11,55 |
| | 3017-621 | | | | 33,51 | 33,51 | | |
| B-8 * | 7702-236 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,4263 | 0,4263 | | |
| B-8 ** | 7702-236 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,3552 | 0,3552 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-8 *** | 7702-236 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,4066 | 0,4066 | 0,0686 | 0,1155 |
| FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: J01CA04 | | | | |
| C-37 | 2650-638 | 24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg | 24 oplosbare tabletten, 1000 mg | R | 14,13 | 14,13 | 5,80 | 5,80 |
| | 2650-638 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| C-37 * | 0794-925 | 1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg | 1 oplosbare tablet, 1000 mg | R | 0,3529 | 0,3529 | | |
| C-37 ** | 0794-925 | 1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg | 1 oplosbare tablet, 1000 mg | R | 0,2896 | 0,2896 | | |
| C-37 *** | 0794-925 | 1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg | 1 oplosbare tablet, 1000 mg | R | 0,3582 | 0,3582 | 0,2417 | 0,2417 |
| FLIXOTIDE 250 µg/dosis | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | |
| B-99 | 1086-636 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis | R | 30,48 | 30,48 | 4,67 | 7,86 |
| | 1086-636 | | | | 19,84 | 19,84 | | |
| B-99 * | 0743-625 | 1 nébulisateur, 250 µg/dose | 1 vernevelaar, 250 µg/dosis | R | 25,6000 | 25,6000 | | |
| B-99 ** | 0743-625 | 1 nébulisateur, 250 µg/dose | 1 vernevelaar, 250 µg/dosis | R | 21,0300 | 21,0300 | | |
| FLIXOTIDE 50 µg/dosis | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | |
| B-99 | 1547-470 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis | R | 12,67 | 12,67 | 1,45 | 2,41 |
| | 1547-470 | | | | 5,45 | 5,45 | | |
| B-99 * | 0769-737 | 1 cartouche, 50 µg/dose | 1 patroon, 50 µg/dosis | R | 7,0300 | 7,0300 | | |
| B-99 ** | 0769-737 | 1 cartouche, 50 µg/dose | 1 patroon, 50 µg/dosis | R | 5,7800 | 5,7800 | | |
| FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | |
| B-99 | 1221-522 | 60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis | R | 12,84 | 12,84 | 1,48 | 2,47 |
| | 1221-522 | | | | 5,58 | 5,58 | | |
| B-99 * | 0762-997 | 1 dose, 100 µg/dose | 1 dosis, 100 µg/dosis | R | 0,1200 | 0,1200 | | |
| B-99 ** | 0762-997 | 1 dose, 100 µg/dose | 1 dosis, 100 µg/dosis | R | 0,0985 | 0,0985 | | |
| FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | |
| B-99 | 1221-530 | 60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis | R | 21,38 | 21,38 | 3,21 | 5,34 |
| | 1221-530 | | | | 12,09 | 12,09 | | |
| B-99 * | 0763-003 | 1 dose, 250 µg/dose | 1 dosis, 250 µg/dosis | R | 0,2600 | 0,2600 | | |
| B-99 ** | 0763-003 | 1 dose, 250 µg/dose | 1 dosis, 250 µg/dosis | R | 0,2137 | 0,2137 | | |
| FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | |
| B-99 | 1221-548 | 60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis | R | 30,48 | 30,48 | 4,67 | 7,86 |
| | 1221-548 | | | | 19,84 | 19,84 | | |
| B-99 * | 0763-011 | 1 dose, 500 µg/dose | 1 dosis, 500 µg/dosis | R | 0,4267 | 0,4267 | | |
| B-99 ** | 0763-011 | 1 dose, 500 µg/dose | 1 dosis, 500 µg/dosis | R | 0,3505 | 0,3505 | | |
| FLOXAPEN 1 g | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CF05 | |
| | 7716-244 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | | 14,31 | 14,31 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-106 * | 7716-244 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | R | 1,8470 | 1,8470 | | |
| B-106 ** | 7716-244 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | R | 1,5170 | 1,5170 | | |
| FLOXAPEN 2 g | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CF05 | |
| | 7725-211 | 10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et injection, 2 g | 10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g | | 28,62 | 28,62 | | |
| B-106 * | 7725-211 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | R | 3,6930 | 3,6930 | | |
| B-106 ** | 7725-211 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g | R | 3,0340 | 3,0340 | | |
| FLOXAPEN 250 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CF05 | |
| | 0707-349 | 10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg | 10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg | | 3,58 | 3,58 | | |
| B-106 * | 0707-349 | 1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg | 1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg | R | 0,4620 | 0,4620 | | |
| B-106 ** | 0707-349 | 1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg | 1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg | R | 0,3790 | 0,3790 | | |
| FLOXAPEN 500 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CF05 | |
| C-37 | 0042-119 | 16 gélules, 500 mg | 16 capsules, hard, 500 mg | R | 14,56 | 14,56 | 6,09 | 6,09 |
| | 0042-119 | | | | 6,89 | 6,89 | | |
| C-37 | 4436-929 | 32 gélules, 500 mg | 32 capsules, hard, 500 mg | R | 23,51 | 23,51 | 10,20 | 12,18 |
| | 4436-929 | | | | 13,78 | 13,78 | | |
| C-37 * | 0707-380 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | R | 0,5556 | 0,5556 | | |
| C-37 ** | 0707-380 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | R | 0,4566 | 0,4566 | | |
| C-37 *** | 0707-380 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | R | 0,5618 | 0,5618 | 0,3187 | 0,3806 |
| FLOXAPEN 500 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CF05 | |
| | 0707-356 | 10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg | 10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg | | 7,15 | 7,15 | | |
| B-106 * | 0707-356 | 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | R | 0,9230 | 0,9230 | | |
| B-106 ** | 0707-356 | 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg | R | 0,7580 | 0,7580 | | |
| FLOXYFRAL | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N06AB08 | |
| B-73 | 1466-317 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 14,39 | 14,39 | 1,79 | 2,99 |
| | 1466-317 | | | | 6,76 | 6,76 | | |
| B-73 * | 0733-329 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2907 | 0,2907 | | |
| B-73 ** | 0733-329 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2390 | 0,2390 | | |
| B-73 *** | 0733-329 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2954 | 0,2954 | 0,0597 | 0,0997 |
| FLUANXOL | | LUNDBECK | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N05AF01 | |
| B-70 | 0041-772 | 50 comprimés, 1 mg | 50 tabletten, 1 mg | | 8,50 | 8,50 | 0,60 | 0,99 |
| | 0041-772 | | | | 2,25 | 2,25 | | |
| B-70 * | 0707-406 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0580 | 0,0580 | | |
| B-70 ** | 0707-406 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0478 | 0,0478 | | |
| B-70 *** | 0707-406 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0594 | 0,0594 | 0,0120 | 0,0198 |
| FLUANXOL DEPOT | | LUNDBECK | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N05AF01 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-70 | 0014-654 | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml | | 8,26 | 8,26 | 0,54 | 0,90 |
| | 0014-654 | | | | 2,04 | 2,04 | | |
| B-70 * | 0707-448 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL | | 2,6300 | 2,6300 | | |
| B-70 ** | 0707-448 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL | | 2,1600 | 2,1600 | | |
| FLUANXOL DEPOT LUNDBECK ATC: N05AF01 | | | | | | | | |
| B-70 | 0041-350 | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | | 14,27 | 14,27 | 1,77 | 2,95 |
| | 0041-350 | | | | 6,67 | 6,67 | | |
| B-70 * | 0707-463 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 8,6100 | 8,6100 | | |
| B-70 ** | 0707-463 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 7,0700 | 7,0700 | | |
| FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CF05 | | | | | | | | |
| | 7732-092 | 10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg | 10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | | 14,31 | 14,31 | | |
| B-106 * | 7732-092 | 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 1,8470 | 1,8470 | | |
| B-106 ** | 7732-092 | 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 1,5170 | 1,5170 | | |
| FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CF05 | | | | | | | | |
| | 7732-100 | 10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg | 10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg | | 28,62 | 28,62 | | |
| B-106 * | 7732-100 | 1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg | 1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg | G | 3,6930 | 3,6930 | | |
| B-106 ** | 7732-100 | 1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg | 1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg | G | 3,0340 | 3,0340 | | |
| FLUCONAZOL AB 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| B-134 | 4212-031 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 7,49 | 7,49 | 0,36 | 0,61 |
| | 4212-031 | | | | 1,37 | 1,37 | | |
| B-134 * | 7729-130 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,7700 | 1,7700 | | |
| B-134 ** | 7729-130 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,4500 | 1,4500 | | |
| B-134 *** | 7729-130 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,9610 | 1,9610 | 0,3600 | 0,6100 |
| FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| B-134 | 4232-674 | 30 gélules, 200 mg | 30 capsules, hard, 200 mg | G | 95,04 | 95,04 | 8,30 | 12,50 |
| | 4232-674 | | | | 76,80 | 76,80 | | |
| B-134 | 4232-708 | 60 gélules, 200 mg | 60 capsules, hard, 200 mg | G | 145,55 | 145,55 | 8,30 | 12,50 |
| | 4232-708 | | | | 122,87 | 122,87 | | |
| B-134 | 4232-716 | 100 gélules, 200 mg | 100 capsules, hard, 200 mg | G | 235,37 | 235,37 | 10,20 | 15,50 |
| | 4232-716 | | | | 204,79 | 204,79 | | |
| B-134 * | 7729-502 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,2419 | 2,2419 | | |
| B-134 ** | 7729-502 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,1708 | 2,1708 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-134 *** | 7729-502 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,2984 | 2,2984 | 0,1020 | 0,1550 |
| FLUCONAZOL AB 200 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 4212-049 4212-049 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | G | 29,52 19,00 | 29,52 19,00 | 4,54 | 7,63 |
| B-134 | 4212-056 4212-056 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 64,55 49,50 | 64,55 49,50 | 8,30 | 12,50 |
| B-134 * | 7729-148 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9790 | 2,9790 | | |
| B-134 ** | 7729-148 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,6235 | 2,6235 | | |
| B-134 *** | 7729-148 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9510 | 2,9510 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOL AB 50 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 4212-023 4212-023 | 10 gélules, 50 mg | 10 capsules, hard, 50 mg | G | 12,83 5,57 | 12,83 5,57 | 1,48 | 2,46 |
| B-134 * | 7729-122 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7190 | 0,7190 | | |
| B-134 ** | 7729-122 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,5900 | 0,5900 | | |
| B-134 *** | 7729-122 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7293 | 0,7293 | 0,1480 | 0,2460 |
| FLUCONAZOL EG 150 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2124-618 2124-618 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 7,52 1,39 | 7,52 1,39 | 0,37 | 0,61 |
| B-134 * | 0777-987 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,7900 | 1,7900 | | |
| B-134 ** | 0777-987 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,4700 | 1,4700 | | |
| B-134 *** | 0777-987 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,9822 | 1,9822 | 0,3700 | 0,6100 |
| FLUCONAZOL EG 200 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2124-626 2124-626 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | G | 29,54 19,02 | 29,54 19,02 | 4,54 | 7,64 |
| B-134 | 2124-634 2124-634 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 64,56 49,51 | 64,56 49,51 | 8,30 | 12,50 |
| B-134 * | 0777-995 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9795 | 2,9795 | | |
| B-134 ** | 0777-995 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,6240 | 2,6240 | | |
| B-134 *** | 0777-995 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9516 | 2,9516 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOL EG 50 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2124-600 2124-600 | 10 gélules, 50 mg | 10 capsules, hard, 50 mg | G | 12,86 5,59 | 12,86 5,59 | 1,48 | 2,47 |
| B-134 * | 0778-092 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7210 | 0,7210 | | |
| B-134 ** | 0778-092 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,5930 | 0,5930 | | |
| B-134 *** | 0778-092 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7325 | 0,7325 | 0,1480 | 0,2470 |
| FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| | 0799-650 | 10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | | 74,60 | 74,60 | | |
| B-134 * | 0799-650 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 8,6190 | 8,6190 | | |
| B-134 ** | 0799-650 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 7,9080 | 7,9080 | | |
| FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |

| hoofdstuk: IV) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 0799-643 | 1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 3,72 | 3,72 | | |
| B-134 * | 0799-643 | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 4,8000 | 4,8000 | | |
| B-134 ** | 0799-643 | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 3,9400 | 3,9400 | | |
| FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| | 0799-668 | 10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | | 149,20 | 149,20 | | |
| B-134 * | 0799-668 | 1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 16,5260 | 16,5260 | | |
| B-134 ** | 0799-668 | 1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 15,8150 | 15,8150 | | |
| FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| | 0753-723 | 10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 74,62 | 74,62 | | |
| B-134 * | 0753-723 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) | G | 8,6210 | 8,6210 | | |
| B-134 ** | 0753-723 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) | G | 7,9100 | 7,9100 | | |
| FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| | 0753-715 | 10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml | 10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml | | 149,24 | 149,24 | | |
| B-134 * | 0753-715 | 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 16,5300 | 16,5300 | | |
| B-134 ** | 0753-715 | 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 15,8190 | 15,8190 | | |
| FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| B-134 | 4744-066 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 64,56 | 64,56 | 8,30 | 12,50 |
| | 4744-066 | | | | 49,51 | 49,51 | | |
| B-134 * | 7738-636 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9795 | 2,9795 | | |
| B-134 ** | 7738-636 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,6240 | 2,6240 | | |
| B-134 *** | 7738-636 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9516 | 2,9516 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01 | | | | | | | | |
| B-134 | 1791-078 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 7,58 | 7,58 | 0,38 | 0,64 |
| | 1791-078 | | | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-134 * | 0775-304 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,8600 | 1,8600 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-134 ** | 0775-304 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,5300 | 1,5300 | | |
| B-134 *** | 0775-304 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 2,0458 | 2,0458 | 0,3800 | 0,6400 |
| FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 1791-128 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | G | 29,54 | 29,54 | 4,54 | 7,64 |
| | 1791-128 | | | | 19,02 | 19,02 | | |
| B-134 | 2064-566 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 64,56 | 64,56 | 8,30 | 12,50 |
| | 2064-566 | | | | 49,51 | 49,51 | | |
| B-134 * | 0775-312 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9795 | 2,9795 | | |
| B-134 ** | 0775-312 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,6240 | 2,6240 | | |
| B-134 *** | 0775-312 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9516 | 2,9516 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 3361-607 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | G | 29,54 | 29,54 | 4,54 | 7,64 |
| | 3361-607 | | | | 19,02 | 19,02 | | |
| B-134 | 3328-473 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 64,56 | 64,56 | 8,30 | 12,50 |
| | 3328-473 | | | | 49,51 | 49,51 | | |
| B-134 * | 7715-469 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9795 | 2,9795 | | |
| B-134 ** | 7715-469 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,6240 | 2,6240 | | |
| B-134 *** | 7715-469 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9516 | 2,9516 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 1790-963 | 10 gélules, 50 mg | 10 capsules, hard, 50 mg | G | 12,96 | 12,96 | 1,50 | 2,51 |
| | 1790-963 | | | | 5,67 | 5,67 | | |
| B-134 * | 0775-288 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7320 | 0,7320 | | |
| B-134 ** | 0775-288 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,6010 | 0,6010 | | |
| B-134 *** | 0775-288 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7431 | 0,7431 | 0,1500 | 0,2510 |
| FLUCONAZOLE TEVA 150 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2082-824 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 7,58 | 7,58 | 0,38 | 0,64 |
| | 2082-824 | | | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-134 * | 0775-601 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,8600 | 1,8600 | | |
| B-134 ** | 0775-601 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,5300 | 1,5300 | | |
| B-134 *** | 0775-601 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 2,0458 | 2,0458 | 0,3800 | 0,6400 |
| FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2082-790 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | G | 29,54 | 29,54 | 4,54 | 7,64 |
| | 2082-790 | | | | 19,02 | 19,02 | | |
| B-134 | 2082-808 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 64,56 | 64,56 | 8,30 | 12,50 |
| | 2082-808 | | | | 49,51 | 49,51 | | |
| B-134 * | 0775-619 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9795 | 2,9795 | | |
| B-134 ** | 0775-619 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,6240 | 2,6240 | | |
| B-134 *** | 0775-619 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,9516 | 2,9516 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2082-816 | 10 gélules, 50 mg | 10 capsules, hard, 50 mg | G | 12,96 | 12,96 | 1,50 | 2,51 |
| | 2082-816 | | | | 5,67 | 5,67 | | |
| B-134 * | 0775-593 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7320 | 0,7320 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-134 ** | 0775-593 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,6010 | 0,6010 | | |
| B-134 *** | 0775-593 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7431 | 0,7431 | 0,1500 | 0,2510 |
| FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg | | VIATRIS | | ATC: J02AC01 | | | | |
| B-134 | 2120-038 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 7,58 | 7,58 | 0,38 | 0,64 |
| | 2120-038 | | | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-134 * | 0777-011 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,8600 | 1,8600 | | |
| B-134 ** | 0777-011 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 1,5300 | 1,5300 | | |
| B-134 *** | 0777-011 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 2,0458 | 2,0458 | 0,3800 | 0,6400 |
| FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2120-020 | 10 gélules, 200 mg | 10 capsules, hard, 200 mg | G | 30,63 | 30,63 | 4,70 | 7,89 |
| | 2120-020 | | | | 19,97 | 19,97 | | |
| B-134 | 2120-012 | 20 gélules, 200 mg | 20 capsules, hard, 200 mg | G | 67,42 | 67,42 | 8,30 | 12,50 |
| | 2120-012 | | | | 51,98 | 51,98 | | |
| B-134 * | 0777-029 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 3,1105 | 3,1105 | | |
| B-134 ** | 0777-029 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 2,7550 | 2,7550 | | |
| B-134 *** | 0777-029 | 1 gélule, 200 mg | 1 capsule, hard, 200 mg | G | 3,0941 | 3,0941 | 0,4150 | 0,6250 |
| FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J02AC01 | |
| B-134 | 2120-046 | 10 gélules, 50 mg | 10 capsules, hard, 50 mg | G | 13,21 | 13,21 | 1,55 | 2,59 |
| | 2120-046 | | | | 5,86 | 5,86 | | |
| B-134 * | 0777-003 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7560 | 0,7560 | | |
| B-134 ** | 0777-003 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,6210 | 0,6210 | | |
| B-134 *** | 0777-003 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,7674 | 0,7674 | 0,1550 | 0,2590 |
| FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01BB05 | | | | |
| A-24 * | 0794-628 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml | | 23,97 | 23,97 | | |
| | 0794-628 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL | G | 30,9300 | 30,9300 | | |
| A-24 ** | 0794-628 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL | G | 25,4100 | 25,4100 | | |
| FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01BB05 | | | | |
| A-24 * | 0789-065 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml | | 20,12 | 20,12 | | |
| | 0789-065 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL | G | 25,9600 | 25,9600 | | |
| A-24 ** | 0789-065 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL | G | 21,3300 | 21,3300 | | |
| FLUDEX | | SERVIER BENELUX | | ATC: C03BA11 | | | | |
| B-23 | 0041-368 | 20 comprimés enrobés, 2,5 mg | 20 omhulde tabletten, 2,5 mg | R | 7,73 | 7,73 | 0,42 | 0,69 |
| | 0041-368 | | | | 1,57 | 1,57 | | |
| B-23 | 0041-442 | 60 comprimés enrobés, 2,5 mg | 60 omhulde tabletten, 2,5 mg | R | 10,46 | 10,46 | 1,00 | 1,66 |
| | 0041-442 | | | | 3,76 | 3,76 | | |
| B-23 * | 0707-489 | 1 comprimé enrobé, 2,5 mg | 1 omhulde tablet, 2,5 mg | R | 0,0808 | 0,0808 | | |
| B-23 ** | 0707-489 | 1 comprimé enrobé, 2,5 mg | 1 omhulde tablet, 2,5 mg | R | 0,0665 | 0,0665 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-23 *** | 0707-489 | 1 comprimé enrobé, 2,5 mg | 1 omhulde tablet, 2,5 mg | R | 0,0822 | 0,0822 | 0,0167 | 0,0277 |
| FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01BC02 | | | | |
| | 0753-343 | 1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml | | 2,87 | 2,87 | | |
| A-24 * | 0753-343 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 3,7000 | 3,7000 | | |
| A-24 ** | 0753-343 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 3,0400 | 3,0400 | | |
| FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01BC02 | | | | |
| | 0753-335 | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml | | 14,69 | 14,69 | | |
| A-24 * | 0753-335 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 18,9600 | 18,9600 | | |
| A-24 ** | 0753-335 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 15,5700 | 15,5700 | | |
| FLUOXETIN AB 20 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: N06AB03 | | | | |
| B-73 | 4391-801 | 28 gélules, 20 mg | 28 capsules, hard, 20 mg | G | 9,62 | 9,62 | 0,83 | 1,38 |
| | 4391-801 | | | | 3,12 | 3,12 | | |
| B-73 | 4391-835 | 98 gélules, 20 mg | 98 capsules, hard, 20 mg | G | 20,02 | 20,02 | 2,93 | 4,89 |
| | 4391-835 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-73 * | 7731-078 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1456 | 0,1456 | | |
| B-73 ** | 7731-078 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1196 | 0,1196 | | |
| B-73 *** | 7731-078 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1479 | 0,1479 | 0,0299 | 0,0499 |
| FLUOXETINE EG 20 mg EG | | | | ATC: N06AB03 | | | | |
| B-73 | 1531-375 | 28 gélules, 20 mg | 28 capsules, hard, 20 mg | G | 10,01 | 10,01 | 0,91 | 1,51 |
| | 1531-375 | | | | 3,42 | 3,42 | | |
| B-73 | 2655-017 | 98 gélules, 20 mg | 98 capsules, hard, 20 mg | G | 20,02 | 20,02 | 2,93 | 4,89 |
| | 2655-017 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-73 * | 0762-716 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1456 | 0,1456 | | |
| B-73 ** | 0762-716 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1196 | 0,1196 | | |
| B-73 *** | 0762-716 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1479 | 0,1479 | 0,0299 | 0,0499 |
| FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA | | | | ATC: N06AB03 | | | | |
| B-73 | 2600-310 | 56 gélules, 20 mg | 56 capsules, hard, 20 mg | G | 24,40 | 24,40 | 3,83 | 6,43 |
| | 2600-310 | | | | 14,55 | 14,55 | | |
| B-73 | 3421-492 | 98 gélules, 20 mg | 98 capsules, hard, 20 mg | G | 20,02 | 20,02 | 2,93 | 4,89 |
| | 3421-492 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-73 * | 0792-416 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1456 | 0,1456 | | |
| B-73 ** | 0792-416 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1196 | 0,1196 | | |
| B-73 *** | 0792-416 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1479 | 0,1479 | 0,0299 | 0,0499 |
| FLUOXETINE MYLAN 20 mg VIATRIS | | | | ATC: N06AB03 | | | | |
| B-73 | 1560-903 | 28 gélules, 20 mg | 28 capsules, hard, 20 mg | G | 9,69 | 9,69 | 0,84 | 1,40 |
| | 1560-903 | | | | 3,17 | 3,17 | | |
| B-73 | 2845-675 | 60 gélules, 20 mg | 60 capsules, hard, 20 mg | G | 14,29 | 14,29 | 1,77 | 2,95 |
| | 2845-675 | | | | 6,68 | 6,68 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|----|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73 | 4698-783 4698-783 | 100 gélules, 20 mg | 100 capsules, hard, 20 mg | G | 20,33 11,29 | 20,33 11,29 | 2,99 | 4,99 |
| B-73 * | 0766-428 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1457 | 0,1457 | | |
| B-73 ** | 0766-428 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1197 | 0,1197 | | |
| B-73 *** | 0766-428 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,1459 | 0,1459 | 0,0295 | 0,0492 |
| FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03 | | | | | | | | |
| B-73 | 1770-734 1770-734 | 30 comprimés enrobés, 20 mg | 30 omhulde tabletten, 20 mg | G | 10,44 3,74 | 10,44 3,74 | 0,99 | 1,65 |
| B-73 | 1770-742 1770-742 | 100 comprimés enrobés, 20 mg | 100 omhulde tabletten, 20 mg | G | 20,33 11,29 | 20,33 11,29 | 2,99 | 4,99 |
| B-73 * | 0772-806 | 1 comprimé enrobé, 20 mg | 1 omhulde tablet, 20 mg | G | 0,1457 | 0,1457 | | |
| B-73 ** | 0772-806 | 1 comprimé enrobé, 20 mg | 1 omhulde tablet, 20 mg | G | 0,1197 | 0,1197 | | |
| B-73 *** | 0772-806 | 1 comprimé enrobé, 20 mg | 1 omhulde tablet, 20 mg | G | 0,1480 | 0,1480 | 0,0299 | 0,0499 |
| FLURACEDYL 5000 mg/100 mL AREGA PHARMA ATC: L01BC02 | | | | | | | | |
| A-24 | 1458-710 1458-710 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | R | 40,83 28,85 | 40,83 28,85 | 0,00 | 0,00 |
| A-24 * | 0762-476 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 37,2300 | 37,2300 | | |
| A-24 ** | 0762-476 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 30,5800 | 30,5800 | | |
| FLUTIFORM 125 µg / 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11 | | | | | | | | |
| B-245 | 3023-371 3023-371 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg | 120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg | CR | 43,24 30,94 | 43,24 30,94 | 6,45 | 10,85 |
| B-245 * | 7703-127 | 1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg | 1 aérosol, 125 µg/ 5 µg | CR | 39,9100 | 39,9100 | | |
| B-245 ** | 7703-127 | 1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg | 1 aérosol, 125 µg/ 5 µg | CR | 32,8000 | 32,8000 | | |
| FLUTIFORM 250 µg / 10 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11 | | | | | | | | |
| B-245 | 3023-389 3023-389 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg | 120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg | CR | 59,55 45,14 | 59,55 45,14 | 8,30 | 12,50 |
| B-245 * | 7703-135 | 1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg | 1 aérosol, 250 µg/ 10 µg | CR | 54,9600 | 54,9600 | | |
| B-245 ** | 7703-135 | 1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg | 1 aérosol, 250 µg/ 10 µg | CR | 47,8500 | 47,8500 | | |
| FLUTIFORM 50 µg / 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11 | | | | | | | | |
| B-245 | 3023-363 3023-363 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg | 120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg | CR | 34,75 23,55 | 34,75 23,55 | 5,27 | 8,86 |
| B-245 * | 7703-119 | 1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg | 1 aérosol, 50 µg/ 5 µg | CR | 30,3900 | 30,3900 | | |
| B-245 ** | 7703-119 | 1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg | 1 aérosol, 50 µg/ 5 µg | CR | 24,9600 | 24,9600 | | |
| FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg EG ATC: R03AK06 | | | | | | | | |
| B-245 | 3979-390 3979-390 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis | G | 25,18 15,22 | 25,18 15,22 | 3,94 | 6,61 |
| B-245 * | 7725-708 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis | G | 19,6400 | 19,6400 | | |
| B-245 ** | 7725-708 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis | G | 16,1300 | 16,1300 | | |

| FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg | | EG | | ATC: R03AK06 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-245 | 3979-408 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 31,41 | 31,41 | 4,80 | 8,08 | |
| | 3979-408 | | | | 20,65 | 20,65 | | | |
| B-245 * | 7725-716 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 26,6500 | 26,6500 | | | |
| B-245 ** | 7725-716 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 21,8900 | 21,8900 | | | |
| FLUTISACOMBO 25µg/50 µg | | EG | | ATC: R03AK06 | | | | | |
| B-245 | 3979-382 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis | G | 20,61 | 20,61 | 3,05 | 5,09 | |
| | 3979-382 | | | | 11,51 | 11,51 | | | |
| B-245 * | 7725-690 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis | G | 14,8500 | 14,8500 | | | |
| B-245 ** | 7725-690 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis | G | 12,2000 | 12,2000 | | | |
| FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose | | ORION PHARMA | | ATC: R03AK06 | | | | | |
| B-245 | 4148-839 | 60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 26,92 | 26,92 | 4,18 | 7,02 | |
| | 4148-839 | | | | 16,75 | 16,75 | | | |
| B-245 | 3927-019 | 120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 42,70 | 42,70 | 6,38 | 10,73 | |
| | 3927-019 | | | | 30,47 | 30,47 | | | |
| B-245 | 4896-643 | 180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 62,78 | 62,78 | 8,30 | 12,50 | |
| | 4896-643 | | | | 47,95 | 47,95 | | | |
| B-245 * | 7724-602 | 1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 19,3133 | 19,3133 | | | |
| B-245 ** | 7724-602 | 1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | G | 16,9433 | 16,9433 | | | |
| FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose | | ORION PHARMA | | ATC: R03AK06 | | | | | |
| B-245 | 4148-847 | 60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 33,75 | 33,75 | 5,13 | 8,63 | |
| | 4148-847 | | | | 22,69 | 22,69 | | | |
| B-245 | 3927-027 | 120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 55,08 | 55,08 | 8,10 | 12,50 | |
| | 3927-027 | | | | 41,25 | 41,25 | | | |
| B-245 | 4896-650 | 180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 82,11 | 82,11 | 8,30 | 12,50 | |
| | 4896-650 | | | | 65,00 | 65,00 | | | |
| B-245 * | 7724-610 | 1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 25,3367 | 25,3367 | | | |
| B-245 ** | 7724-610 | 1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | G | 22,9667 | 22,9667 | | | |
| FLUVOXAMINE EG 100 mg | | EG | | ATC: N06AB08 | | | | | |
| B-73 | 3111-424 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 28,96 | 28,96 | 4,46 | 7,50 | |
| | 3111-424 | | | | 18,52 | 18,52 | | | |
| B-73 * | 0768-481 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2390 | 0,2390 | | | |
| B-73 ** | 0768-481 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1963 | 0,1963 | | | |
| B-73 *** | 0768-481 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2343 | 0,2343 | 0,0446 | 0,0750 | |
| FOLINATE EG 200 mg/20 ml | | EG | | ATC: V03AF03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|------|------|
| | 0777-946 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 23,41 | 23,41 | | |
| A-33 * | 0777-946 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 30,2100 | 30,2100 | | |
| A-33 ** | 0777-946 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 24,8100 | 24,8100 | | |
| FOLINATE EG 500 mg/50 ml | | EG | | ATC: V03AF03 | | | | |
| | 0777-953 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 58,52 | 58,52 | | |
| A-33 * | 0777-953 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 69,1400 | 69,1400 | | |
| A-33 ** | 0777-953 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 62,0300 | 62,0300 | | |
| FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: V03AF03 | | | | |
| | 7742-497 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 23,41 | 23,41 | | |
| A-33 * | 7742-497 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 30,2100 | 30,2100 | | |
| A-33 ** | 7742-497 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 24,8100 | 24,8100 | | |
| FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: V03AF03 | | | | |
| | 7742-489 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 58,52 | 58,52 | | |
| A-33 * | 7742-489 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 69,1400 | 69,1400 | | |
| A-33 ** | 7742-489 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | G | 62,0300 | 62,0300 | | |
| FOMEPIZOLE 5 mg/ml | | SERB SA | | ATC: V03AB34 | | | | |
| | 7736-036 | 5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL | 5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL | | 865,80 | 865,80 | | |
| A-148 * | 7736-036 | 1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL | | 184,9720 | 184,9720 | | |
| A-148 ** | 7736-036 | 1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL | | 183,5500 | 183,5500 | | |
| FORADIL 12 µg | | SANDOZ | | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 1295-385 | 60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | 60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg | | 24,51 | 24,51 | 3,84 | 6,45 |
| | 1295-385 | | | | 14,64 | 14,64 | | |
| B-216 * | 0749-671 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis | | 0,3148 | 0,3148 | | |
| B-216 ** | 0749-671 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis | | 0,2587 | 0,2587 | | |
| FORADIL 12 µg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 4313-565 | 60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis | | 24,51 | 24,51 | 3,84 | 6,45 |
| | 4313-565 | | | | 14,64 | 14,64 | | |
| B-216 * | 0799-221 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis | | 0,3148 | 0,3148 | | |
| B-216 ** | 0799-221 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis | | 0,2587 | 0,2587 | | |
| FORMAGAL 12 µg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 2716-173 | 60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | | 23,14 | 23,14 | 3,57 | 5,94 |
| | 2716-173 | | | | 13,45 | 13,45 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-216 | 2990-083 | 180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | 180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | | 44,76 | 44,76 | 6,66 | 11,21 |
| | 2990-083 | | | | 32,27 | 32,27 | | |
| B-216 * | 0759-829 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis | | 0,2296 | 0,2296 | | |
| B-216 ** | 0759-829 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis | | 0,1901 | 0,1901 | | |
| FORMOAIR 12 µg/dosis CHIESI ATC: R03AC13 | | | | | | | | |
| B-216 | 2804-458 | 100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose | 100 doses aërosol, oplossing, 12 µg/dosis | | 43,04 | 43,04 | 6,42 | 10,81 |
| | 2804-458 | | | | 30,77 | 30,77 | | |
| B-216 * | 0757-971 | 1 nébulisateur, 12 µg/dose | 1 vernevelaar, 12 µg/dosis | | 39,7100 | 39,7100 | | |
| B-216 ** | 0757-971 | 1 nébulisateur, 12 µg/dose | 1 vernevelaar, 12 µg/dosis | | 32,6200 | 32,6200 | | |
| FORZATEN 20 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 2591-097 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg | R | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 2591-097 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 2591-089 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg | R | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 2591-089 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 0792-135 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0792-135 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0792-135 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 4860-631 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg | R | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 4860-631 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 7742-372 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 7742-372 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7742-372 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| FORZATEN 40 mg/10 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 2591-113 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg | R | 19,19 | 19,19 | 2,76 | 4,61 |
| | 2591-113 | | | | 10,42 | 10,42 | | |
| B-224 | 2591-105 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg | R | 50,07 | 50,07 | 7,40 | 12,46 |
| | 2591-105 | | | | 36,89 | 36,89 | | |
| B-224 * | 0792-150 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 0792-150 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 0792-150 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| FORZATEN 40 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 2591-071 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg | R | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 2591-071 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 2591-063 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg | R | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 2591-063 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 0792-143 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 0792-143 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0792-143 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg | | | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09DX03 | | |
| B-224 | 2837-300 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 2837-300 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 2837-318 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 2837-318 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 0753-400 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0753-400 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0753-400 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg | | | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09DX03 | | |
| B-224 | 2837-334 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,19 | 19,19 | 2,76 | 4,61 |
| | 2837-334 | | | | 10,42 | 10,42 | | |
| B-224 | 2837-367 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 50,07 | 50,07 | 7,40 | 12,46 |
| | 2837-367 | | | | 36,89 | 36,89 | | |
| B-224 * | 0753-376 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | R | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 0753-376 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | R | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 0753-376 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | R | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg | | | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09DX03 | | |
| B-224 | 2837-284 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,19 | 19,19 | 2,76 | 4,61 |
| | 2837-284 | | | | 10,42 | 10,42 | | |
| B-224 | 2837-292 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 50,07 | 50,07 | 7,40 | 12,46 |
| | 2837-292 | | | | 36,89 | 36,89 | | |
| B-224 * | 0753-368 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | R | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 0753-368 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | R | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 0753-368 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | R | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg | | | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09DX03 | | |
| B-224 | 2837-342 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 2837-342 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 2837-326 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 2837-326 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 0753-392 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0753-392 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0753-392 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg | | | | MENARINI BENELUX | | ATC: C09DX03 | | |
| B-224 | 2837-359 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 2837-359 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 2837-375 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2837-375 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 0753-384 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0753-384 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0753-384 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: M05BA04 | | | | |
| B-230 | 1683-705 | 12 comprimés, 70 mg | 12 tabletten, 70 mg | R | 24,26 | 24,26 | 3,81 | 6,40 |
| | 1683-705 | | | | 14,43 | 14,43 | | |
| B-230 * | 0769-141 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | R | 1,5517 | 1,5517 | | |
| B-230 ** | 0769-141 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | R | 1,2750 | 1,2750 | | |
| B-230 *** | 0769-141 | 1 comprimé, 70 mg | 1 tablet, 70 mg | R | 1,5609 | 1,5609 | 0,3175 | 0,5333 |
| FOSAVANCE 70 mg/2800 UI | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: M05BB03 | | | | |
| B-230 | 2249-654 | 12 comprimés, 70 mg / 70 µg | 12 tabletten, 70 mg / 70 µg | R | 24,97 | 24,97 | 3,91 | 6,56 |
| | 2249-654 | | | | 15,04 | 15,04 | | |
| B-230 * | 0782-904 | 1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU | 1 tablet, 70 mg/ 2800 IU | R | 1,6175 | 1,6175 | | |
| B-230 ** | 0782-904 | 1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU | 1 tablet, 70 mg/ 2800 IU | R | 1,3283 | 1,3283 | | |
| B-230 *** | 0782-904 | 1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU | 1 tablet, 70 mg/ 2800 IU | R | 1,6200 | 1,6200 | 0,3258 | 0,5467 |
| FOSAVANCE 70 mg/5600 UI | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: M05BB03 | | | | |
| B-230 | 2485-514 | 12 comprimés, 70 mg / 140 µg | 12 tabletten, 70 mg / 140 µg | R | 24,97 | 24,97 | 3,91 | 6,56 |
| | 2485-514 | | | | 15,04 | 15,04 | | |
| B-230 * | 0789-966 | 1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU | 1 tablet, 70 mg/ 5600 IU | R | 1,6175 | 1,6175 | | |
| B-230 ** | 0789-966 | 1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU | 1 tablet, 70 mg/ 5600 IU | R | 1,3283 | 1,3283 | | |
| B-230 *** | 0789-966 | 1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU | 1 tablet, 70 mg/ 5600 IU | R | 1,6200 | 1,6200 | 0,3258 | 0,5467 |
| FOSINIL | | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | | ATC: C09AA09 | | | | |
| B-21 | 1004-324 | 28 comprimés sécables, 20 mg | 28 deelbare tabletten, 20 mg | | 22,65 | 22,65 | 3,46 | 5,77 |
| | 1004-324 | | | | 13,06 | 13,06 | | |
| B-21 * | 0739-953 | 1 comprimé sécable, 20 mg | 1 deelbare tablet, 20 mg | | 0,6018 | 0,6018 | | |
| B-21 ** | 0739-953 | 1 comprimé sécable, 20 mg | 1 deelbare tablet, 20 mg | | 0,4943 | 0,4943 | | |
| B-21 *** | 0739-953 | 1 comprimé sécable, 20 mg | 1 deelbare tablet, 20 mg | | 0,6114 | 0,6114 | 0,1236 | 0,2061 |
| FRAXIPARINE | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 0321-596 | 10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml | | 34,62 | 34,62 | 5,25 | 8,83 |
| | 0321-596 | | | | 23,44 | 23,44 | | |
| B-33 * | 0739-714 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 3,0250 | 3,0250 | | |
| B-33 ** | 0739-714 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 2,4850 | 2,4850 | | |
| FRAXIPARINE | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 0669-705 | 10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml | | 28,17 | 28,17 | 4,35 | 7,32 |
| | 0669-705 | | | | 17,84 | 17,84 | | |
| B-33 * | 0730-390 | 1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 2,3020 | 2,3020 | | |
| B-33 ** | 0730-390 | 1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 1,8910 | 1,8910 | | |
| FRAXIPARINE | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| B-33 | 0321-604 | 10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml | 10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml | | 56,29 | 56,29 | 8,27 | 12,50 |
| | 0321-604 | | | | 42,30 | 42,30 | | |
| B-33 * | 0739-722 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 5,1950 | 5,1950 | | |
| B-33 ** | 0739-722 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 4,4840 | 4,4840 | | |
| FRAXIPARINE | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 0468-264 | 10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml | 10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml | | 68,48 | 68,48 | 8,30 | 12,50 |
| | 0468-264 | | | | 52,90 | 52,90 | | |
| B-33 * | 0735-761 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 6,3180 | 6,3180 | | |
| B-33 ** | 0735-761 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 5,6070 | 5,6070 | | |
| FRAXIPARINE | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 0431-569 | 10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml | 10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml | | 44,18 | 44,18 | 6,58 | 11,08 |
| | 0431-569 | | | | 31,76 | 31,76 | | |
| B-33 * | 0734-012 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 4,0780 | 4,0780 | | |
| B-33 ** | 0734-012 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL | | 3,3670 | 3,3670 | | |
| FRAXODI | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 1586-411 | 10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml | 10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | | 78,16 | 78,16 | 8,30 | 12,50 |
| | 1586-411 | | | | 61,40 | 61,40 | | |
| B-33 * | 0768-499 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL | | 7,2190 | 7,2190 | | |
| B-33 ** | 0768-499 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL | | 6,5080 | 6,5080 | | |
| FRAXODI | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 1586-403 | 10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml | 10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | | 100,62 | 100,62 | 8,30 | 12,50 |
| | 1586-403 | | | | 81,88 | 81,88 | | |
| B-33 * | 0768-507 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL | | 9,3900 | 9,3900 | | |
| B-33 ** | 0768-507 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL | | 8,6790 | 8,6790 | | |
| FRAXODI | | VIATRIS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 1586-395 | 10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml | 10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | | 123,04 | 123,04 | 8,30 | 12,50 |
| | 1586-395 | | | | 102,34 | 102,34 | | |
| B-33 * | 0768-515 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL | | 11,5590 | 11,5590 | | |
| B-33 ** | 0768-515 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL | | 10,8480 | 10,8480 | | |
| FRUSAMIL | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C03EB01 | | | | |
| B-28 | 0664-466 | 56 comprimés, 5 mg / 40 mg | 56 tabletten, 5 mg / 40 mg | R | 8,73 | 8,73 | 0,65 | 1,08 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|-------------|--------|--|
| | 0664-466 | | | | | 2,44 | 2,44 | | |
| B-28 * | 0732-297 | 1 comprimé, 5 mg/ 40 mg | 1 tablet, 5 mg/ 40 mg | R | 0,0563 | 0,0563 | | | |
| B-28 ** | 0732-297 | 1 comprimé, 5 mg/ 40 mg | 1 tablet, 5 mg/ 40 mg | R | 0,0463 | 0,0463 | | | |
| B-28 *** | 0732-297 | 1 comprimé, 5 mg/ 40 mg | 1 tablet, 5 mg/ 40 mg | R | 0,0572 | 0,0572 | 0,0116 | 0,0193 | |
| FURADANTINE M.C. AMDIPHARM ATC: J01XE01 | | | | | | | | | |
| C-37 | 0113-381 | 50 gélules, 50 mg | 50 capsules, hard, 50 mg | | 8,69 | 8,69 | 2,13 | 2,13 | |
| | 0113-381 | | | | 2,41 | 2,41 | | | |
| C-37 * | 0707-778 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | | 0,0622 | 0,0622 | | | |
| C-37 ** | 0707-778 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | | 0,0510 | 0,0510 | | | |
| C-37 *** | 0707-778 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | | 0,0632 | 0,0632 | 0,0426 | 0,0426 | |
| FURADANTINE M.C. AMDIPHARM ATC: J01XE01 | | | | | | | | | |
| C-37 | 0113-399 | 50 gélules, 100 mg | 50 capsules, hard, 100 mg | | 10,95 | 10,95 | 3,65 | 3,65 | |
| | 0113-399 | | | | 4,13 | 4,13 | | | |
| C-37 * | 0707-786 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | | 0,1066 | 0,1066 | | | |
| C-37 ** | 0707-786 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | | 0,0876 | 0,0876 | | | |
| C-37 *** | 0707-786 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | | 0,1083 | 0,1083 | 0,0730 | 0,0730 | |
| FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01 | | | | | | | | | |
| B-25 * | 7716-434 | 10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml | 10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | | 2,58 | 2,58 | | | |
| | 7716-434 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | G | 0,3330 | 0,3330 | | | |
| B-25 ** | 7716-434 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | G | 0,2730 | 0,2730 | | | |
| FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01 | | | | | | | | | |
| B-25 * | 7716-442 | 10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml | 10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml | | 14,95 | 14,95 | | | |
| | 7716-442 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | G | 1,9290 | 1,9290 | | | |
| B-25 ** | 7716-442 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | G | 1,5850 | 1,5850 | | | |
| FUROSEMIDE EG 40 mg EG ATC: C03CA01 | | | | | | | | | |
| B-25 | 0017-301 | 50 comprimés, 40 mg | 50 tabletten, 40 mg | G | 7,99 | 7,99 | 0,48 | 0,80 | |
| | 0017-301 | | | | 1,81 | 1,81 | | | |
| B-25 | 2566-735 | 100 comprimés, 40 mg | 100 tabletten, 40 mg | G | 9,55 | 9,55 | 0,81 | 1,35 | |
| | 2566-735 | | | | 3,06 | 3,06 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-25 * | 0729-301 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,0395 | 0,0395 | | |
| B-25 ** | 0729-301 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,0324 | 0,0324 | | |
| B-25 *** | 0729-301 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,0402 | 0,0402 | 0,0081 | 0,0135 |
| GABAPENTINE EG 100 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 2209-401 2209-401 | 90 gélules, 100 mg | 90 capsules, hard, 100 mg | G | 12,01 4,94 | 12,01 4,94 | 1,31 | 2,18 |
| B-262 * | 0780-254 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,0709 | 0,0709 | | |
| B-262 ** | 0780-254 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,0582 | 0,0582 | | |
| B-262 *** | 0780-254 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,0720 | 0,0720 | 0,0146 | 0,0242 |
| GABAPENTINE EG 300 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 2209-393 2209-393 | 90 gélules, 300 mg | 90 capsules, hard, 300 mg | G | 20,32 11,28 | 20,32 11,28 | 2,99 | 4,99 |
| B-262 | 2559-433 2559-433 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 36,51 25,08 | 36,51 25,08 | 5,51 | 9,27 |
| B-262 * | 0780-221 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1619 | 0,1619 | | |
| B-262 ** | 0780-221 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1329 | 0,1329 | | |
| B-262 *** | 0780-221 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1643 | 0,1643 | 0,0332 | 0,0554 |
| GABAPENTINE EG 400 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 2209-385 2209-385 | 90 gélules, 400 mg | 90 capsules, hard, 400 mg | G | 24,94 15,02 | 24,94 15,02 | 3,90 | 6,56 |
| B-262 | 2559-425 2559-425 | 200 gélules, 400 mg | 200 capsules, hard, 400 mg | G | 46,05 33,38 | 46,05 33,38 | 6,84 | 11,51 |
| B-262 * | 0780-239 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | G | 0,2125 | 0,2125 | | |
| B-262 ** | 0780-239 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | G | 0,1769 | 0,1769 | | |
| B-262 *** | 0780-239 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | G | 0,2026 | 0,2026 | 0,0342 | 0,0575 |
| GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 4283-602 4283-602 | 90 gélules, 300 mg | 90 capsules, hard, 300 mg | G | 20,32 11,28 | 20,32 11,28 | 2,99 | 4,99 |
| B-262 | 4284-782 4284-782 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 36,51 25,08 | 36,51 25,08 | 5,51 | 9,27 |
| B-262 * | 7732-365 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1619 | 0,1619 | | |
| B-262 ** | 7732-365 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1329 | 0,1329 | | |
| B-262 *** | 7732-365 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1643 | 0,1643 | 0,0332 | 0,0554 |
| GABAPENTINE SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 2215-671 2215-671 | 100 gélules, 100 mg | 100 capsules, hard, 100 mg | G | 10,87 4,07 | 10,87 4,07 | 1,08 | 1,80 |
| B-262 * | 0779-710 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,0525 | 0,0525 | | |
| B-262 ** | 0779-710 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,0431 | 0,0431 | | |
| B-262 *** | 0779-710 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,0533 | 0,0533 | 0,0108 | 0,0180 |
| GABAPENTINE SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 2215-689 2215-689 | 100 gélules, 300 mg | 100 capsules, hard, 300 mg | G | 19,27 10,48 | 19,27 10,48 | 2,78 | 4,63 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-262 | 2215-697 2215-697 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 36,47 25,06 | 36,47 25,06 | 5,51 | 9,27 |
| B-262 * | 0779-728 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1617 | 0,1617 | | |
| B-262 ** | 0779-728 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1328 | 0,1328 | | |
| B-262 *** | 0779-728 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,1547 | 0,1547 | 0,0275 | 0,0463 |
| GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01 | | | | | | | | |
| B-262 | 2215-705 2215-705 | 100 gélules, 400 mg | 100 capsules, hard, 400 mg | G | 23,38 13,67 | 23,38 13,67 | 3,63 | 6,04 |
| B-262 | 2215-713 2215-713 | 200 gélules, 400 mg | 200 capsules, hard, 400 mg | G | 46,03 33,36 | 46,03 33,36 | 6,84 | 11,51 |
| B-262 * | 0779-736 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | G | 0,2124 | 0,2124 | | |
| B-262 ** | 0779-736 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | G | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-262 *** | 0779-736 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | G | 0,2025 | 0,2025 | 0,0342 | 0,0575 |
| GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01 | | | | | | | | |
| B-262 | 2430-296 2430-296 | 100 comprimés pelliculés, 600 mg | 100 filmomhulde tabletten, 600 mg | G | 32,81 21,87 | 32,81 21,87 | 5,00 | 8,40 |
| B-262 * | 0787-150 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,2822 | 0,2822 | | |
| B-262 ** | 0787-150 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,2318 | 0,2318 | | |
| B-262 *** | 0787-150 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,2727 | 0,2727 | 0,0500 | 0,0840 |
| GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01 | | | | | | | | |
| B-262 | 2430-288 2430-288 | 100 comprimés pelliculés, 800 mg | 100 filmomhulde tabletten, 800 mg | G | 42,15 29,99 | 42,15 29,99 | 6,30 | 10,60 |
| B-262 * | 0787-168 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | G | 0,3870 | 0,3870 | | |
| B-262 ** | 0787-168 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | G | 0,3179 | 0,3179 | | |
| B-262 *** | 0787-168 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | G | 0,3661 | 0,3661 | 0,0630 | 0,1060 |
| GABBRORAL 250 mg Pfizer ATC: A07AA06 | | | | | | | | |
| B-116 | 0043-265 0043-265 | 16 comprimés, 250 mg | 16 tabletten, 250 mg | | 11,27 4,38 | 11,27 4,38 | 1,16 | 1,94 |
| B-116 * | 0707-810 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,3531 | 0,3531 | | |
| B-116 ** | 0707-810 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,2900 | 0,2900 | | |
| B-116 *** | 0707-810 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,3584 | 0,3584 | 0,0725 | 0,1212 |
| GAMBARAN 500 mg VIATRIS ATC: M01AX01 | | | | | | | | |
| B-291 | 2349-918 2349-918 | 60 comprimés pelliculés, 500 mg | 60 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 12,32 5,18 | 12,32 5,18 | 1,37 | 2,29 |
| B-291 * | 0786-806 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,1113 | 0,1113 | | |
| B-291 ** | 0786-806 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,0915 | 0,0915 | | |
| B-291 *** | 0786-806 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,1131 | 0,1131 | 0,0228 | 0,0382 |
| GELTIM 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01ED01 | | | | | | | | |
| B-168 | 2529-618 2529-618 | 90 doses gel opthalmique, 1 mg/ml | 90 doses ooggel, 1 mg/ml | R | 21,69 12,33 | 21,69 12,33 | 3,27 | 5,45 |
| B-168 * | 0792-218 | 1 récipient unidose, 1 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL | R | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-168 ** | 0792-218 | 1 récipient unidose, 1 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL | R | 0,1452 | 0,1452 | | |

| GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01BC05 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 0756-635 | 5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 32,68 | 32,68 | | |
| A-24 * | 0756-635 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 8,3500 | 8,3500 | | |
| A-24 ** | 0756-635 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 6,9280 | 6,9280 | | |
| GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 0756-627 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 30,32 | 30,32 | | |
| A-24 * | 0756-627 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 39,1300 | 39,1300 | | |
| A-24 ** | 0756-627 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 32,1400 | 32,1400 | | |
| GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 0756-619 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 60,62 | 60,62 | | |
| A-24 * | 0756-619 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 71,3700 | 71,3700 | | |
| A-24 ** | 0756-619 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 64,2600 | 64,2600 | | |
| GEMCITABINE AB 40 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7717-812 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 30,32 | 30,32 | | |
| A-24 * | 7717-812 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 39,1300 | 39,1300 | | |
| A-24 ** | 7717-812 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 32,1400 | 32,1400 | | |
| GEMCITABINE AB 40 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7717-804 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 6,54 | 6,54 | | |
| A-24 * | 7717-804 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-24 ** | 7717-804 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 6,9300 | 6,9300 | | |
| GEMCITABINE AB 40 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7717-820 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 60,62 | 60,62 | | |
| A-24 * | 7717-820 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 71,3700 | 71,3700 | | |
| A-24 ** | 7717-820 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 64,2600 | 64,2600 | | |

| GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC05 | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 7702-434 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | 6,54 | 6,54 | | |
| A-24 * | 7702-434 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-24 ** | 7702-434 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 6,9300 | 6,9300 | | |
| GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7702-442 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | 30,32 | 30,32 | | |
| A-24 * | 7702-442 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 39,1300 | 39,1300 | | |
| A-24 ** | 7702-442 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 32,1400 | 32,1400 | | |
| GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7702-459 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | 45,48 | 45,48 | | |
| A-24 * | 7702-459 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 55,3200 | 55,3200 | | |
| A-24 ** | 7702-459 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 48,2100 | 48,2100 | | |
| GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7702-467 | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | | 60,62 | 60,62 | | |
| A-24 * | 7702-467 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 71,3700 | 71,3700 | | |
| A-24 ** | 7702-467 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL | G | 64,2600 | 64,2600 | | |
| GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7716-756 | 1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml | 1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml | | 60,62 | 60,62 | | |
| A-24 * | 7716-756 | 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL | 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL | G | 71,3700 | 71,3700 | | |
| A-24 ** | 7716-756 | 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL | 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL | G | 64,2600 | 64,2600 | | |
| GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7716-731 | 1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml | 1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml | | 6,54 | 6,54 | | |
| A-24 * | 7716-731 | 1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL | 1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL | G | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-24 ** | 7716-731 | 1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL | 1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL | G | 6,9300 | 6,9300 | | |
| GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7716-749 | 1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml | 1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml | | 30,32 | 30,32 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| A-24 * | 7716-749 | 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL | 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL | G | 39,1300 | 39,1300 | | |
| A-24 ** | 7716-749 | 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL | 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL | G | 32,1400 | 32,1400 | | |
| GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7705-601 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 6,54 | 6,54 | | |
| A-24 * | 7705-601 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-24 ** | 7705-601 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 6,9300 | 6,9300 | | |
| GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7705-619 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 30,32 | 30,32 | | |
| A-24 * | 7705-619 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 39,1300 | 39,1300 | | |
| A-24 ** | 7705-619 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 32,1400 | 32,1400 | | |
| GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 7705-627 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml | | 60,62 | 60,62 | | |
| A-24 * | 7705-627 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 71,3700 | 71,3700 | | |
| A-24 ** | 7705-627 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL | G | 64,2600 | 64,2600 | | |
| GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 0753-590 | 1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml | 1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml | | 30,32 | 30,32 | | |
| A-24 * | 0753-590 | 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL | 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL | G | 39,1300 | 39,1300 | | |
| A-24 ** | 0753-590 | 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL | 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL | G | 32,1400 | 32,1400 | | |
| GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 0753-608 | 1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml | 1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml | | 6,54 | 6,54 | | |
| A-24 * | 0753-608 | 1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL | 1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL | G | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-24 ** | 0753-608 | 1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL | 1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL | G | 6,9300 | 6,9300 | | |
| GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01BC05 | | | | |
| | 0753-582 | 1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml | 1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml | | 60,62 | 60,62 | | |
| A-24 * | 0753-582 | 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL | 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL | G | 71,3700 | 71,3700 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| A-24 ** | 0753-582 | 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL | 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL | G | 64,2600 | 64,2600 | | |
| GENCEBOK 10 mg/mL | | GENNISIUUM PHARMA SAS | | ATC: N06BC01 | | | | |
| Fb-14 ** | 7738-214 7738-214 | 50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL 1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL 1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL | | 373,84 7,9254 | 186,92 3,9628 | | |
| GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01GB03 | |
| B-116 ** | 0755-058 0755-058 | 10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 14,04 1,4880 | 14,04 1,4880 | | |
| GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01GB03 | |
| B-116 ** | 0755-041 0755-041 | 10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL | 10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL | G | 42,10 4,4630 | 42,10 4,4630 | | |
| GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-903 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 46,97 | 46,97 | 6,97 | 11,73 |
| B-33 * | 4182-903 7728-967 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 34,19 4,3350 | 34,19 4,3350 | | |
| B-33 ** | 7728-967 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 3,6240 | 3,6240 | | |
| GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-895 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 63,80 | 63,80 | 8,30 | 12,50 |
| B-33 * | 4182-895 7728-975 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 48,84 5,8880 | 48,84 5,8880 | | |
| B-33 ** | 7728-975 | 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 5,1770 | 5,1770 | | |
| GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-887 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 66,60 | 66,60 | 8,30 | 12,50 |
| B-33 * | 4182-887 7728-983 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 51,28 6,1470 | 51,28 6,1470 | | |
| B-33 ** | 7728-983 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL | BioS | 5,4360 | 5,4360 | | |
| GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-960 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL | BioS | 20,33 | 20,33 | 2,99 | 4,99 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|------|--------------|--------------|------|-------|--|
| | | 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | | | | | |
| | 4182-960 | | | | 11,29 | 11,29 | | | |
| B-33 | 4182-879 | 20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 33,00 | 33,00 | 5,02 | 8,45 | |
| | 4182-879 | | | | 22,03 | 22,03 | | | |
| B-33 * | 7728-926 | 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 1,4215 | 1,4215 | | | |
| B-33 ** | 7728-926 | 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 1,1675 | 1,1675 | | | |
| GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-952 | 6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 22,10 | 22,10 | 3,35 | 5,59 | |
| | 4182-952 | | | | 12,64 | 12,64 | | | |
| B-33 | 4182-945 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 32,50 | 32,50 | 4,96 | 8,33 | |
| | 4182-945 | | | | 21,60 | 21,60 | | | |
| B-33 | 4182-861 | 20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 56,13 | 56,13 | 8,25 | 12,50 | |
| | 4182-861 | | | | 42,16 | 42,16 | | | |
| B-33 * | 7728-934 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 2,5900 | 2,5900 | | | |
| B-33 ** | 7728-934 | 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 2,2345 | 2,2345 | | | |
| GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-937 | 6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 25,05 | 25,05 | 3,92 | 6,58 | |
| | 4182-937 | | | | 15,11 | 15,11 | | | |
| B-33 | 4182-929 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 36,75 | 36,75 | 5,55 | 9,33 | |
| | 4182-929 | | | | 25,29 | 25,29 | | | |
| B-33 | 4182-820 | 20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 65,54 | 65,54 | 8,30 | 12,50 | |
| | 4182-820 | | | | 50,35 | 50,35 | | | |
| B-33 * | 7728-942 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 3,0240 | 3,0240 | | | |
| B-33 ** | 7728-942 | 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 2,6685 | 2,6685 | | | |
| GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald) | | EFFIK BENELUX | | | ATC: B01AB05 | | | | |
| B-33 | 4182-911 | 10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 42,12 | 42,12 | 6,30 | 10,59 | |
| | 4182-911 | | | | 29,98 | 29,98 | | | |
| B-33 * | 7728-959 | 1 seringue préremplie 0,8 mL | 1 voorgevulde spuit 0,8 mL | BioS | 3,8690 | 3,8690 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-33 ** | 7728-959 | solution injectable, 100 mg/mL 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL | oplossing voor injectie, 100 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | BioS | 3,1780 | 3,1780 | | |
| GHRH FERRING | | FERRING | | ATC: V04CD05 | | | | |
| | 0744-995 | 1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml | 1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml | | 84,78 | 84,78 | | |
| B-180 * | 0744-995 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | | 96,9800 | 96,9800 | | |
| B-180 ** | 0744-995 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | | 89,8700 | 89,8700 | | |
| GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DD02 | |
| | 0743-328 | 1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg | | 3,64 | 3,64 | | |
| B-112 ** | 0743-328 | 1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg | R | 3,8600 | 3,8600 | | |
| GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DD02 | |
| | 0743-336 | 1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg | 1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg | | 7,21 | 7,21 | | |
| B-112 ** | 0743-336 | 1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg | 1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg | R | 7,6400 | 7,6400 | | |
| GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BB09 | | | | |
| A-12 | 2775-195 | 60 comprimés à libération modifiée, 30 mg | 60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2775-195 | | | | 2,95 | 2,95 | | |
| A-12 | 2775-187 | 180 comprimés à libération modifiée, 30 mg | 180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 15,22 | 15,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 2775-187 | | | | 7,39 | 7,39 | | |
| A-12 * | 0758-235 | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 0,0530 | 0,0530 | | |
| A-12 ** | 0758-235 | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 0,0435 | 0,0435 | | |
| A-12 *** | 0758-235 | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 0,0538 | 0,0538 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BB09 | | | | |
| A-12 | 3412-061 | 90 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 15,02 | 15,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 3412-061 | | | | 7,24 | 7,24 | | |
| A-12 | 3412-079 | 180 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 24,32 | 24,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 3412-079 | | | | 14,48 | 14,48 | | |
| A-12 * | 7715-428 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 0,1038 | 0,1038 | | |
| A-12 ** | 7715-428 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 0,0853 | 0,0853 | | |
| A-12 *** | 7715-428 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 0,1044 | 0,1044 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE EG 2 mg | | EG | | ATC: A10BB12 | | | | |
| A-12 | 2449-619 | 90 comprimés, 2 mg | 90 tabletten, 2 mg | G | 14,11 | 14,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 2449-619 | | | | 6,54 | 6,54 | | |
| A-12 * | 0786-871 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0938 | 0,0938 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-12 ** | 0786-871 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0770 | 0,0770 | | |
| A-12 *** | 0786-871 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0953 | 0,0953 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE EG 3 mg | | EG | | ATC: A10BB12 | | | | |
| A-12 | 2449-601 | 90 comprimés, 3 mg | 90 tabletten, 3 mg | G | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 2449-601 | | | | 9,63 | 9,63 | | |
| A-12 * | 0786-889 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | G | 0,1381 | 0,1381 | | |
| A-12 ** | 0786-889 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | G | 0,1134 | 0,1134 | | |
| A-12 *** | 0786-889 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | G | 0,1402 | 0,1402 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE EG 4 mg | | EG | | ATC: A10BB12 | | | | |
| A-12 | 2449-627 | 90 comprimés, 4 mg | 90 tabletten, 4 mg | G | 22,38 | 22,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 2449-627 | | | | 12,86 | 12,86 | | |
| A-12 * | 0786-897 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1844 | 0,1844 | | |
| A-12 ** | 0786-897 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1514 | 0,1514 | | |
| A-12 *** | 0786-897 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1871 | 0,1871 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BB12 | | | | |
| A-12 | 2953-214 | 120 comprimés, 2 mg | 120 tabletten, 2 mg | G | 15,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 2953-214 | | | | 7,42 | 7,42 | | |
| A-12 * | 0784-736 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0798 | 0,0798 | | |
| A-12 ** | 0784-736 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0656 | 0,0656 | | |
| A-12 *** | 0784-736 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0810 | 0,0810 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BB12 | | | | |
| A-12 | 2953-248 | 120 comprimés, 3 mg | 120 tabletten, 3 mg | G | 20,09 | 20,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 2953-248 | | | | 11,11 | 11,11 | | |
| A-12 * | 0784-744 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | G | 0,1195 | 0,1195 | | |
| A-12 ** | 0784-744 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | G | 0,0982 | 0,0982 | | |
| A-12 *** | 0784-744 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | G | 0,1213 | 0,1213 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BB12 | | | | |
| A-12 | 2953-164 | 120 comprimés, 4 mg | 120 tabletten, 4 mg | G | 24,68 | 24,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 2953-164 | | | | 14,79 | 14,79 | | |
| A-12 * | 0784-751 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1591 | 0,1591 | | |
| A-12 ** | 0784-751 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1307 | 0,1307 | | |
| A-12 *** | 0784-751 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1595 | 0,1595 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLUCAGEN HYPOKIT | | NOVO NORDISK PHARMA | | ATC: H04AA01 | | | | |
| B-95 | 1274-000 | 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 25,55 | 25,55 | 3,99 | 6,70 |
| | 1274-000 | | | | 15,55 | 15,55 | | |
| B-95 * | 0747-071 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL | | 20,0700 | 20,0700 | | |
| B-95 ** | 0747-071 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL | | 16,4800 | 16,4800 | | |
| GLURENORM | | MENARINI BENELUX | | ATC: A10BB08 | | | | |
| A-12 | 0835-017 | 100 comprimés, 30 mg | 100 tabletten, 30 mg | | 10,19 | 10,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0835-017 | | | | 3,55 | 3,55 | | |
| A-12 * | 0730-069 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,0458 | 0,0458 | | |
| A-12 ** | 0730-069 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,0376 | 0,0376 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-12 *** | 0730-069 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | | 0,0465 | 0,0465 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLYPRESSIN | | FERRING | | ATC: H01BA04 | | | | |
| | 0735-837 | 5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL | 5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL | | 64,92 | 64,92 | | |
| B-199 * | 0735-837 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL | R | 15,1860 | 15,1860 | | |
| B-199 ** | 0735-837 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL | R | 13,7640 | 13,7640 | | |
| GRAFALON | | NEOVII BIOTECH | | ATC: L04AA04 | | | | |
| | 0730-325 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml | | 263,93 | 263,93 | | |
| A-29 * | 0730-325 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL | | 286,8800 | 286,8800 | | |
| A-29 ** | 0730-325 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL | | 279,7700 | 279,7700 | | |
| GYNO-DAKTARIN | | JOHNSON & JOHNSON CONSUMER | | ATC: G01AF04 | | | | |
| B-174 | 0113-969 | 78 g crème vaginale, 20 mg/g | 78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g | | 12,05 | 12,05 | 1,32 | 2,20 |
| | 0113-969 | | | | 4,97 | 4,97 | | |
| B-174 * | 0708-164 | 5 g, 20 mg/g | 5 g, 20 mg/g | | 0,4006 | 0,4006 | | |
| B-174 ** | 0708-164 | 5 g, 20 mg/g | 5 g, 20 mg/g | | 0,3294 | 0,3294 | | |
| GYNOMYK | | WILL-PHARMA | | ATC: G01AF15 | | | | |
| B-174 | 1143-411 | 20 g crème vaginale, 20 mg/g | 20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g | | 9,62 | 9,62 | 0,83 | 1,38 |
| | 1143-411 | | | | 3,12 | 3,12 | | |
| B-174 * | 0741-967 | 5 g, 20 mg/g | 5 g, 20 mg/g | | 1,0075 | 1,0075 | | |
| B-174 ** | 0741-967 | 5 g, 20 mg/g | 5 g, 20 mg/g | | 0,8275 | 0,8275 | | |
| GYNOMYK | | WILL-PHARMA | | ATC: G01AF15 | | | | |
| B-174 | 1143-403 | 3 ovules, 100 mg | 3 ovules, 100 mg | | 9,37 | 9,37 | 0,78 | 1,29 |
| | 1143-403 | | | | 2,93 | 2,93 | | |
| B-174 * | 0741-975 | 1 ovule, 100 mg | 1 ovule, 100 mg | | 1,2600 | 1,2600 | | |
| B-174 ** | 0741-975 | 1 ovule, 100 mg | 1 ovule, 100 mg | | 1,0367 | 1,0367 | | |
| GYNOXIN 2% | | RECORDATI | | ATC: G01AF12 | | | | |
| B-174 | 2322-683 | 35 g crème vaginale, 0,02 g/g | 35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g | | 8,90 | 8,90 | 0,68 | 1,14 |
| | 2322-683 | | | | 2,57 | 2,57 | | |
| B-174 * | 0784-991 | 5 g, 0,02 g/g | 5 g, 0,02 g/g | | 0,4743 | 0,4743 | | |
| B-174 ** | 0784-991 | 5 g, 0,02 g/g | 5 g, 0,02 g/g | | 0,3886 | 0,3886 | | |
| GYNOXIN 200 mg | | RECORDATI | | ATC: G01AF12 | | | | |
| B-174 | 2322-691 | 3 ovules, 200 mg | 3 ovules, 200 mg | | 8,75 | 8,75 | 0,65 | 1,08 |
| | 2322-691 | | | | 2,45 | 2,45 | | |
| B-174 * | 0785-006 | 1 ovule, 200 mg | 1 ovule, 200 mg | | 1,0533 | 1,0533 | | |
| B-174 ** | 0785-006 | 1 ovule, 200 mg | 1 ovule, 200 mg | | 0,8667 | 0,8667 | | |
| GYNOXIN 600 mg | | RECORDATI | | ATC: G01AF12 | | | | |
| B-174 | 2322-675 | 1 ovule, 600 mg | 1 ovule, 600 mg | | 8,77 | 8,77 | 0,65 | 1,09 |
| | 2322-675 | | | | 2,47 | 2,47 | | |
| B-174 * | 0785-014 | 1 ovule, 600 mg | 1 ovule, 600 mg | | 3,1900 | 3,1900 | | |
| B-174 ** | 0785-014 | 1 ovule, 600 mg | 1 ovule, 600 mg | | 2,6200 | 2,6200 | | |

| HALDOL | | ESSENTIAL PHARMA | | | | ATC: N05AD01 | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-71 | 0046-128 | 5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml | 5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 8,76 | 8,76 | 0,65 | 1,09 | |
| | 0046-128 | | | | 2,46 | 2,46 | | | |
| B-71 * | 0708-289 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 0,6340 | 0,6340 | | | |
| B-71 ** | 0708-289 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 0,5220 | 0,5220 | | | |
| HALDOL | | ESSENTIAL PHARMA | | | | ATC: N05AD01 | | | |
| B-71 | 0046-177 | 25 comprimés, 5 mg | 25 tabletten, 5 mg | | 11,76 | 11,76 | 1,26 | 2,10 | |
| | 0046-177 | | | | 4,75 | 4,75 | | | |
| B-71 * | 0708-305 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,2452 | 0,2452 | | | |
| B-71 ** | 0708-305 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,2016 | 0,2016 | | | |
| B-71 *** | 0708-305 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,2489 | 0,2489 | 0,0504 | 0,0840 | |
| HALDOL | | ESSENTIAL PHARMA | | | | ATC: N05AD01 | | | |
| B-71 | 0114-595 | 1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml | 1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml | | 8,38 | 8,38 | 0,57 | 0,95 | |
| | 0114-595 | | | | 2,15 | 2,15 | | | |
| B-71 * | 0708-313 | 1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL | | 0,0923 | 0,0923 | | | |
| B-71 ** | 0708-313 | 1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL | | 0,0760 | 0,0760 | | | |
| HALDOL DECANOAS | | ESSENTIAL PHARMA | | | | ATC: N05AD01 | | | |
| B-71 | 0047-779 | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | | 12,36 | 12,36 | 1,38 | 2,30 | |
| | 0047-779 | | | | 5,21 | 5,21 | | | |
| B-71 * | 0708-321 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 6,7200 | 6,7200 | | | |
| B-71 ** | 0708-321 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 5,5200 | 5,5200 | | | |
| HALDOL DECANOAS | | ESSENTIAL PHARMA | | | | ATC: N05AD01 | | | |
| B-71 | 0047-787 | 1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml | 1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | | 21,93 | 21,93 | 3,32 | 5,53 | |
| | 0047-787 | | | | 12,51 | 12,51 | | | |
| B-71 * | 0708-347 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 16,1400 | 16,1400 | | | |
| B-71 ** | 0708-347 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 13,2600 | 13,2600 | | | |
| HALDOL DECANOAS | | ESSENTIAL PHARMA | | | | ATC: N05AD01 | | | |
| B-71 | 0822-999 | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | | 16,47 | 16,47 | 2,21 | 3,69 | |
| | 0822-999 | | | | 8,35 | 8,35 | | | |
| B-71 * | 0708-339 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 10,7800 | 10,7800 | | | |
| B-71 ** | 0708-339 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 8,8500 | 8,8500 | | | |
| HELICLAR | | VIATRIS | | | | ATC: J01FA09 | | | |
| C-37 | 1244-524 | 21 comprimés enrobés, 500 mg | 21 omhulde tabletten, 500 mg | R | 22,38 | 22,38 | 10,20 | 11,37 | |
| | 1244-524 | | | | 12,86 | 12,86 | | | |
| C-37 * | 0745-752 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,7905 | 0,7905 | | | |
| C-37 ** | 0745-752 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,6490 | 0,6490 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| C-37 *** | 0745-752 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,8021 | 0,8021 | 0,4857 | 0,5414 | |
| HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B01AB01 | | | | | |
| B-32 * | 0730-424 0730-424 | 10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml 1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000) | 10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml 1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000) | | 50,00 0,2404 | 50,00 0,2404 | | | |
| B-32 ** | 0730-424 | 1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000) | 1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000) | | 0,2120 | 0,2120 | | | |
| HEPARINE LEO | | LEO PHARMA | | ATC: B01AB01 | | | | | |
| B-32 * | 0708-404 0708-404 | 50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml 1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000) | 50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml 1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000) | | 200,64 0,1758 | 200,64 0,1758 | | | |
| B-32 ** | 0708-404 | 1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000) | 1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000) | | 0,1701 | 0,1701 | | | |
| HOLOXAN | | BAXTER | | ATC: L01AA06 | | | | | |
| A-23 * | 0729-533 0729-533 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg | | 24,98 32,2400 | 24,98 32,2400 | | | |
| A-23 ** | 0729-533 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg | | 26,4800 | 26,4800 | | | |
| HUMULINE 30/70 CARTRIDGE | | ELI LILLY BENELUX | | ATC: A10AD01 | | | | | |
| A-11 | 1390-459 1390-459 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 34,17 23,05 | 34,17 23,05 | 0,00 | 0,00 | |
| A-11 * | 0748-764 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 5,9500 | 5,9500 | | | |
| A-11 ** | 0748-764 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 4,8860 | 4,8860 | | | |
| HUMULINE NPH CARTRIDGE | | ELI LILLY BENELUX | | ATC: A10AC01 | | | | | |
| A-11 | 1390-442 1390-442 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 34,09 22,98 | 34,09 22,98 | 0,00 | 0,00 | |
| A-11 * | 0748-780 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 5,9320 | 5,9320 | | | |
| A-11 ** | 0748-780 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 4,8720 | 4,8720 | | | |
| HUMULINE REGULAR CARTRIDGE | | ELI LILLY BENELUX | | ATC: A10AB01 | | | | | |
| A-11 | 1390-434 | 5 cartouches 3 ml solution | 5 patronen 3 ml oplossing voor | M | 34,07 | 34,07 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 1390-434 | injectable, 100 IU/ml | injectie, 100 IU/ml | | 22,97 | 22,97 | | |
| A-11 * | 0748-798 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 5,9280 | 5,9280 | | |
| A-11 ** | 0748-798 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 4,8700 | 4,8700 | | |
| HYCANTIN 0,25 mg SANDOZ ATC: L01CE01 | | | | | | | | |
| | 0790-527 | 10 gélules, 0,25 mg | 10 capsules, hard, 0,25 mg | | 56,04 | 56,04 | | |
| A-28 * | 0790-527 | 1 gélule, 0,25 mg | 1 capsule, hard, 0,25 mg | R | 6,6510 | 6,6510 | | |
| A-28 ** | 0790-527 | 1 gélule, 0,25 mg | 1 capsule, hard, 0,25 mg | R | 5,9400 | 5,9400 | | |
| HYCANTIN 1 mg SANDOZ ATC: L01CE01 | | | | | | | | |
| | 0790-535 | 10 gélules, 1 mg | 10 capsules, hard, 1 mg | | 224,18 | 224,18 | | |
| A-28 * | 0790-535 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | R | 24,4740 | 24,4740 | | |
| A-28 ** | 0790-535 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | R | 23,7630 | 23,7630 | | |
| HYCANTIN 1 mg SANDOZ ATC: L01CE01 | | | | | | | | |
| | 0788-380 | 5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg | 5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg | | 111,74 | 111,74 | | |
| A-28 * | 0788-380 | 1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg | 1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg | R | 25,1100 | 25,1100 | | |
| A-28 ** | 0788-380 | 1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg | 1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg | R | 23,6880 | 23,6880 | | |
| HYDREA 500 mg EUROCEPT ATC: L01XX05 | | | | | | | | |
| A-24 | 0048-256 | 20 gélules, 500 mg | 20 capsules, hard, 500 mg | | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0048-256 | | | | 3,56 | 3,56 | | |
| A-24 * | 0708-701 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | 0,2295 | 0,2295 | | |
| A-24 ** | 0708-701 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | 0,1885 | 0,1885 | | |
| A-24 *** | 0708-701 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | 0,2332 | 0,2332 | 0,0000 | 0,0000 |
| HYDROCORTISONE BePB BEPHARBEL ATC: H02AB09 | | | | | | | | |
| B-83 | 0048-363 | 20 comprimés, 20 mg | 20 tabletten, 20 mg | R | 11,42 | 11,42 | 1,19 | 1,98 |
| | 0048-363 | | | | 4,49 | 4,49 | | |
| B-83 * | 0708-776 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2895 | 0,2895 | | |
| B-83 ** | 0708-776 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2380 | 0,2380 | | |
| B-83 *** | 0708-776 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2942 | 0,2942 | 0,0595 | 0,0990 |
| HYGROTON 50 AMDIPHARM ATC: C03BA04 | | | | | | | | |
| B-24 | 0892-224 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | R | 7,18 | 7,18 | 0,29 | 0,48 |
| | 0892-224 | | | | 1,09 | 1,09 | | |
| B-24 * | 0708-867 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,0470 | 0,0470 | | |
| B-24 ** | 0708-867 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,0387 | 0,0387 | | |
| B-24 *** | 0708-867 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,0548 | 0,0548 | 0,0097 | 0,0160 |
| HYPNOMIDATE PIRAMAL CRITICAL CARE ATC: N01AX07 | | | | | | | | |
| | 0708-883 | 50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml | 50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 66,01 | 66,01 | | |
| A-30 * | 0708-883 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 1,5416 | 1,5416 | | |
| A-30 ** | 0708-883 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 1,3994 | 1,3994 | | |
| IBANDRONATE EG 1 mg/ml EG ATC: M05BA06 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-230 | 3006-053 | 1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | G | 30,77 | 30,77 | 4,71 | 7,92 |
| | 3006-053 | | | | 20,09 | 20,09 | | |
| B-230 * | 7701-691 | 1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 25,9300 | 25,9300 | | |
| B-230 ** | 7701-691 | 1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 21,3000 | 21,3000 | | |
| IBANDRONATE EG 150 mg | | EG | | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-230 | 2993-392 | 3 comprimés pelliculés, 150 mg | 3 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 26,67 | 26,67 | 4,14 | 6,96 |
| | 2993-392 | | | | 16,52 | 16,52 | | |
| B-230 * | 7701-683 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 7,1067 | 7,1067 | | |
| B-230 ** | 7701-683 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 5,8367 | 5,8367 | | |
| B-230 *** | 7701-683 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 7,0455 | 7,0455 | 1,3800 | 2,3200 |
| IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-230 | 2775-856 | 3 comprimés pelliculés, 150 mg | 3 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 26,67 | 26,67 | 4,14 | 6,96 |
| | 2775-856 | | | | 16,52 | 16,52 | | |
| B-230 * | 0758-094 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 7,1067 | 7,1067 | | |
| B-230 ** | 0758-094 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 5,8367 | 5,8367 | | |
| B-230 *** | 0758-094 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 7,0455 | 7,0455 | 1,3800 | 2,3200 |
| IBUPROFEN AB 400 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 4423-166 | 100 comprimés pelliculés, 400 mg | 100 filmomhulde tabletten, 400 mg | G | 8,99 | 8,99 | 0,70 | 1,16 |
| | 4423-166 | | | | 2,63 | 2,63 | | |
| B-60 * | 7732-910 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 0,0339 | 0,0339 | | |
| B-60 ** | 7732-910 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 0,0279 | 0,0279 | | |
| B-60 *** | 7732-910 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 0,0346 | 0,0346 | 0,0070 | 0,0116 |
| IBUPROFEN AB 600 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 4388-039 | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | G | 7,63 | 7,63 | 0,40 | 0,66 |
| | 4388-039 | | | | 1,49 | 1,49 | | |
| B-60 | 4388-047 | 60 comprimés pelliculés, 600 mg | 60 filmomhulde tabletten, 600 mg | G | 8,69 | 8,69 | 0,64 | 1,07 |
| | 4388-047 | | | | 2,41 | 2,41 | | |
| B-60 * | 7704-158 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,0518 | 0,0518 | | |
| B-60 ** | 7704-158 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,0425 | 0,0425 | | |
| B-60 *** | 7704-158 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,0526 | 0,0526 | 0,0107 | 0,0178 |
| IBUPROFEN AB 800 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 4388-054 | 30 comprimés pelliculés, 800 mg | 30 filmomhulde tabletten, 800 mg | G | 8,58 | 8,58 | 0,62 | 1,03 |
| | 4388-054 | | | | 2,32 | 2,32 | | |
| B-60 | 4388-062 | 60 comprimés pelliculés, 800 mg | 60 filmomhulde tabletten, 800 mg | G | 11,08 | 11,08 | 1,12 | 1,87 |
| | 4388-062 | | | | 4,23 | 4,23 | | |
| B-60 | 4388-070 | 100 comprimés pelliculés, 800 mg | 100 filmomhulde tabletten, 800 mg | G | 14,52 | 14,52 | 1,82 | 3,03 |
| | 4388-070 | | | | 6,86 | 6,86 | | |
| B-60 * | 7732-266 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | G | 0,0885 | 0,0885 | | |
| B-60 ** | 7732-266 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | G | 0,0727 | 0,0727 | | |
| B-60 *** | 7732-266 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | G | 0,0899 | 0,0899 | 0,0182 | 0,0303 |
| IBUPROFEN EG 400 mg | | EG | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 0092-502 | 100 comprimés enrobés, 400 mg | 100 omhulde tabletten, 400 mg | G | 9,00 | 9,00 | 0,70 | 1,17 |
| | 0092-502 | | | | 2,64 | 2,64 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-60 * | 0729-541 | 1 comprimé enrobé, 400 mg | 1 omhulde tablet, 400 mg | G | 0,0341 | 0,0341 | | |
| B-60 ** | 0729-541 | 1 comprimé enrobé, 400 mg | 1 omhulde tablet, 400 mg | G | 0,0280 | 0,0280 | | |
| B-60 *** | 0729-541 | 1 comprimé enrobé, 400 mg | 1 omhulde tablet, 400 mg | G | 0,0347 | 0,0347 | 0,0070 | 0,0117 |
| IBUPROFEN EG 600 mg | | EG | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 1414-333 | 30 comprimés enrobés, 600 mg | 30 omhulde tabletten, 600 mg | G | 7,65 | 7,65 | 0,40 | 0,67 |
| | 1414-333 | | | | 1,51 | 1,51 | | |
| B-60 | 1430-636 | 50 comprimés enrobés, 600 mg | 50 omhulde tabletten, 600 mg | G | 8,38 | 8,38 | 0,57 | 0,95 |
| | 1430-636 | | | | 2,15 | 2,15 | | |
| B-60 * | 0748-814 | 1 comprimé enrobé, 600 mg | 1 omhulde tablet, 600 mg | G | 0,0554 | 0,0554 | | |
| B-60 ** | 0748-814 | 1 comprimé enrobé, 600 mg | 1 omhulde tablet, 600 mg | G | 0,0456 | 0,0456 | | |
| B-60 *** | 0748-814 | 1 comprimé enrobé, 600 mg | 1 omhulde tablet, 600 mg | G | 0,0570 | 0,0570 | 0,0114 | 0,0190 |
| IBUPROFEN RETARD EG 800 mg | | EG | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 3276-904 | 60 comprimés à libération prolongée, 800 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg | G | 11,08 | 11,08 | 1,12 | 1,87 |
| | 3276-904 | | | | 4,23 | 4,23 | | |
| B-60 * | 0732-198 | 1 comprimé à libération prolongée, 800 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg | G | 0,0910 | 0,0910 | | |
| B-60 ** | 0732-198 | 1 comprimé à libération prolongée, 800 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg | G | 0,0747 | 0,0747 | | |
| B-60 *** | 0732-198 | 1 comprimé à libération prolongée, 800 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg | G | 0,0924 | 0,0924 | 0,0187 | 0,0312 |
| IBUPROFEN SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 2568-210 | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | G | 7,05 | 7,05 | 0,26 | 0,43 |
| | 2568-210 | | | | 0,98 | 0,98 | | |
| B-60 | 2568-228 | 100 comprimés pelliculés, 400 mg | 100 filmomhulde tabletten, 400 mg | G | 9,14 | 9,14 | 0,73 | 1,22 |
| | 2568-228 | | | | 2,75 | 2,75 | | |
| B-60 * | 0791-616 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 0,0355 | 0,0355 | | |
| B-60 ** | 0791-616 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 0,0292 | 0,0292 | | |
| B-60 *** | 0791-616 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 0,0360 | 0,0360 | 0,0073 | 0,0122 |
| IBUPROFEN SANDOZ 600 mg | | SANDOZ | | ATC: M01AE01 | | | | |
| B-60 | 1541-564 | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | G | 7,64 | 7,64 | 0,40 | 0,66 |
| | 1541-564 | | | | 1,50 | 1,50 | | |
| B-60 | 2674-034 | 50 comprimés pelliculés, 600 mg | 50 filmomhulde tabletten, 600 mg | G | 8,30 | 8,30 | 0,55 | 0,92 |
| | 2674-034 | | | | 2,08 | 2,08 | | |
| B-60 * | 0764-308 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,0536 | 0,0536 | | |
| B-60 ** | 0764-308 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,0440 | 0,0440 | | |
| B-60 *** | 0764-308 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | G | 0,0553 | 0,0553 | 0,0110 | 0,0184 |
| IMPROMEN | | EUMEDICA | | ATC: N05AD06 | | | | |
| B-71 | 0048-017 | 1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml | 1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml | | 9,74 | 9,74 | 0,85 | 1,42 |
| | 0048-017 | | | | 3,21 | 3,21 | | |
| B-71 * | 0709-139 | 1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL | | 0,1380 | 0,1380 | | |
| B-71 ** | 0709-139 | 1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL | | 0,1133 | 0,1133 | | |
| IMURAN 50 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: L04AX01 | | | | |
| A-29 | 0014-399 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 22,77 | 22,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0014-399 | | | | 13,15 | 13,15 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|--------------|--------------|--------|
| A-29 * | 0709-154 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1697 | 0,1697 | | |
| A-29 ** | 0709-154 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1394 | 0,1394 | | |
| A-29 *** | 0709-154 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1724 | 0,1724 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMURAN MITIS 25 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | | ATC: L04AX01 | | | |
| A-29 | 0376-871 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | R | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0376-871 | | | | 7,45 | 7,45 | | |
| A-29 * | 0741-751 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | R | 0,0961 | 0,0961 | | |
| A-29 ** | 0741-751 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | R | 0,0790 | 0,0790 | | |
| A-29 *** | 0741-751 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | R | 0,0976 | 0,0976 | 0,0000 | 0,0000 |
| INCRUSE ELLIPTA 55 µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | ATC: R03BB07 | | | |
| B-267 | 3270-402 | 30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis | | 42,99 | 42,99 | 6,42 | 10,80 |
| | 3270-402 | | | | 30,73 | 30,73 | | |
| B-267 | 3270-410 | 90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose | 90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis | | 101,79 | 101,79 | 8,30 | 12,50 |
| | 3270-410 | | | | 82,96 | 82,96 | | |
| B-267 * | 7712-862 | 1 nébulisateur, 55 µg/dose | 1 vernevelaar, 55 µg/dosis | | 31,6833 | 31,6833 | | |
| B-267 ** | 7712-862 | 1 nébulisateur, 55 µg/dose | 1 vernevelaar, 55 µg/dosis | | 29,3133 | 29,3133 | | |
| INDAPAMIDE EG | | EG | | | ATC: C03BA11 | | | |
| B-23 | 1111-426 | 60 comprimés enrobés, 2,5 mg | 60 omhulde tabletten, 2,5 mg | G | 9,65 | 9,65 | 0,83 | 1,39 |
| | 1111-426 | | | | 3,14 | 3,14 | | |
| B-23 * | 0741-744 | 1 comprimé enrobé, 2,5 mg | 1 omhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0675 | 0,0675 | | |
| B-23 ** | 0741-744 | 1 comprimé enrobé, 2,5 mg | 1 omhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0555 | 0,0555 | | |
| B-23 *** | 0741-744 | 1 comprimé enrobé, 2,5 mg | 1 omhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0685 | 0,0685 | 0,0138 | 0,0232 |
| INDERAL | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C07AA05 | | | |
| B-9 | 0115-808 | 50 comprimés, 10 mg | 50 tabletten, 10 mg | R | 6,66 | 6,66 | 0,17 | 0,28 |
| | 0115-808 | | | | 0,63 | 0,63 | | |
| B-9 * | 0709-188 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,0162 | 0,0162 | | |
| B-9 ** | 0709-188 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,0134 | 0,0134 | | |
| B-9 *** | 0709-188 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,0225 | 0,0225 | 0,0034 | 0,0056 |
| INDERAL | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C07AA05 | | | |
| B-9 | 0048-942 | 100 comprimés, 40 mg | 100 tabletten, 40 mg | R | 8,55 | 8,55 | 0,61 | 1,02 |
| | 0048-942 | | | | 2,30 | 2,30 | | |
| B-9 * | 0709-196 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,0297 | 0,0297 | | |
| B-9 ** | 0709-196 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,0244 | 0,0244 | | |
| B-9 *** | 0709-196 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,0302 | 0,0302 | 0,0061 | 0,0102 |
| INDOCOLLYRE | | BAUSCH & LOMB PHARMA | | | ATC: S01BC01 | | | |
| B-198 | 0435-552 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml | | 9,55 | 9,55 | 0,81 | 1,35 |
| | 0435-552 | | | | 3,06 | 3,06 | | |
| B-198 * | 0735-845 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL | | 3,9500 | 3,9500 | | |
| B-198 ** | 0735-845 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL | | 3,2400 | 3,2400 | | |
| INEGY 10 mg/20 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA02 | |
| B-289 | 2372-936 | 98 comprimés, 20 mg / 10 mg | 98 tabletten, 20 mg / 10 mg | R | 40,88 | 40,88 | 6,12 | 10,30 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 2372-936 | | | | 28,90 | 28,90 | | |
| B-289 * | 0785-816 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 0785-816 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 0785-816 | 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg | 1 tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02 | | | | | | | | |
| B-289 | 2372-944 | 98 comprimés, 40 mg / 10 mg | 98 tabletten, 40 mg / 10 mg | R | 40,88 | 40,88 | 6,12 | 10,30 |
| | 2372-944 | | | | 28,90 | 28,90 | | |
| B-289 * | 0785-824 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,3806 | 0,3806 | | |
| B-289 ** | 0785-824 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,3126 | 0,3126 | | |
| B-289 *** | 0785-824 | 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg | 1 tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,3607 | 0,3607 | 0,0624 | 0,1051 |
| INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02 | | | | | | | | |
| B-289 | 2372-951 | 98 comprimés, 80 mg / 10 mg | 98 tabletten, 80 mg / 10 mg | R | 56,59 | 56,59 | 8,31 | 13,99 |
| | 2372-951 | | | | 42,56 | 42,56 | | |
| B-289 * | 0785-832 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,5329 | 0,5329 | | |
| B-289 ** | 0785-832 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,4603 | 0,4603 | | |
| B-289 *** | 0785-832 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,5210 | 0,5210 | 0,0848 | 0,1428 |
| INHIBACE 5 mg EUROCEPT ATC: C09AA08 | | | | | | | | |
| B-21 | 0287-961 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | | 18,33 | 18,33 | 2,59 | 4,32 |
| | 0287-961 | | | | 9,77 | 9,77 | | |
| B-21 * | 0739-136 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | | 0,4504 | 0,4504 | | |
| B-21 ** | 0739-136 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | | 0,3700 | 0,3700 | | |
| B-21 *** | 0739-136 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | | 0,4569 | 0,4569 | 0,0925 | 0,1543 |
| INNOHEP 10.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10 | | | | | | | | |
| B-33 | 1414-523 | 10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml | | 76,04 | 76,04 | 8,30 | 12,50 |
| | 1414-523 | | | | 59,50 | 59,50 | | |
| B-33 * | 0749-200 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL | | 7,0180 | 7,0180 | | |
| B-33 ** | 0749-200 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL | | 6,3070 | 6,3070 | | |
| INNOHEP 14.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10 | | | | | | | | |
| B-33 | 1414-531 | 10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml | | 102,14 | 102,14 | 8,30 | 12,50 |
| | 1414-531 | | | | 83,27 | 83,27 | | |
| B-33 * | 0748-855 | 1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL | | 9,5380 | 9,5380 | | |
| B-33 ** | 0748-855 | 1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL | | 8,8270 | 8,8270 | | |
| INNOHEP 18.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10 | | | | | | | | |
| B-33 | 1414-549 | 10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml | | 121,93 | 121,93 | 8,30 | 12,50 |
| | 1414-549 | | | | 101,33 | 101,33 | | |
| B-33 * | 0748-863 | 1 seringue préremplie 0,9 mL | 1 voorgevulde spuit 0,9 mL | | 11,4520 | 11,4520 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| B-33 ** | 0748-863 | solution injectable, 20000 IU/mL 1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL | oplossing voor injectie, 20000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL | | 10,7410 | 10,7410 | | |
| INNOHEP 3.500 | | LEO PHARMA | | ATC: B01AB10 | | | | |
| B-33 | 1414-507 | 10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml | | 30,55 | 30,55 | 4,68 | 7,87 |
| | 1414-507 | | | | 19,90 | 19,90 | | |
| B-33 * | 0748-830 | 1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL | | 2,5680 | 2,5680 | | |
| B-33 ** | 0748-830 | 1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL | | 2,1090 | 2,1090 | | |
| INNOHEP 4.500 | | LEO PHARMA | | ATC: B01AB10 | | | | |
| B-33 | 1414-515 | 10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml | 10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml | | 38,84 | 38,84 | 5,84 | 9,82 |
| | 1414-515 | | | | 27,11 | 27,11 | | |
| B-33 * | 0748-848 | 1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL | | 3,4990 | 3,4990 | | |
| B-33 ** | 0748-848 | 1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL | 1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL | | 2,8740 | 2,8740 | | |
| INSULATARD | | NOVO NORDISK PHARMA | | ATC: A10AC01 | | | | |
| A-11 | 0245-415 | 1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 17,09 | 17,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0245-415 | | | | 8,82 | 8,82 | | |
| A-11 * | 0736-983 | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 1,1380 | 1,1380 | | |
| A-11 ** | 0736-983 | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 0,9350 | 0,9350 | | |
| INSULATARD PENFILL | | NOVO NORDISK PHARMA | | ATC: A10AC01 | | | | |
| A-11 | 1077-718 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 29,35 | 29,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 1077-718 | | | | 18,86 | 18,86 | | |
| A-11 * | 0740-464 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 4,8680 | 4,8680 | | |
| A-11 ** | 0740-464 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL | | 3,9980 | 3,9980 | | |
| INUVAIR 100/6 µg/dosis | | CHIESI | | ATC: R03AK08 | | | | |
| B-245 | 2433-092 | 120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose | 120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis | CR | 42,95 | 42,95 | 6,41 | 10,79 |
| | 2433-092 | | | | 30,69 | 30,69 | | |
| B-245 * | 0788-927 | 1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose | 1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis | CR | 39,6100 | 39,6100 | | |
| B-245 ** | 0788-927 | 1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose | 1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis | CR | 32,5300 | 32,5300 | | |
| INUVAIR 200/6 µg/dosis | | CHIESI | | ATC: R03AK08 | | | | |
| B-245 | 3417-805 | 120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose | 120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis | CR | 39,43 | 39,43 | 5,92 | 9,96 |
| | 3417-805 | | | | 27,63 | 27,63 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-245 * | 7715-956 | 1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose | 1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis | CR | 35,6600 | 35,6600 | | |
| B-245 ** | 7715-956 | 1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose | 1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis | CR | 29,2900 | 29,2900 | | |
| INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose CHIESI | | | | ATC: R03AK08 | | | | |
| B-245 | 3049-905 | 120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis | CR | 42,95 | 42,95 | 6,41 | 10,79 |
| | 3049-905 | | | | 30,69 | 30,69 | | |
| B-245 | 3478-997 | 360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose | 360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis | CR | 93,07 | 93,07 | 8,30 | 12,50 |
| | 3478-997 | | | | 75,00 | 75,00 | | |
| B-245 * | 7703-788 | 1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose | 1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis | CR | 28,8700 | 28,8700 | | |
| B-245 ** | 7703-788 | 1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose | 1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis | CR | 26,5000 | 26,5000 | | |
| INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose CHIESI | | | | ATC: R03AK08 | | | | |
| B-245 | 3417-797 | 120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis | CR | 39,52 | 39,52 | 5,93 | 9,98 |
| | 3417-797 | | | | 27,70 | 27,70 | | |
| B-245 * | 7716-525 | 1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose | 1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis | CR | 35,7500 | 35,7500 | | |
| B-245 ** | 7716-525 | 1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose | 1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis | CR | 29,3600 | 29,3600 | | |
| INVEGA 3 mg JANSSEN-CILAG | | | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 2487-791 | 28 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | R | 47,11 | 47,11 | 6,99 | 11,76 |
| | 2487-791 | | | | 34,30 | 34,30 | | |
| B-220 | 2487-825 | 56 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | R | 86,06 | 86,06 | 8,30 | 12,50 |
| | 2487-825 | | | | 68,61 | 68,61 | | |
| B-220 * | 0791-343 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | R | 1,4257 | 1,4257 | | |
| B-220 ** | 0791-343 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | R | 1,2988 | 1,2988 | | |
| B-220 *** | 0791-343 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | R | 1,4380 | 1,4380 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 3 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA | | | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 3833-209 | 56 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | R | 86,06 | 86,06 | 8,30 | 12,50 |
| | 3833-209 | | | | 68,61 | 68,61 | | |
| B-220 * | 7724-982 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | R | 1,4257 | 1,4257 | | |
| B-220 ** | 7724-982 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | R | 1,2988 | 1,2988 | | |
| B-220 *** | 7724-982 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | R | 1,4380 | 1,4380 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 6 mg JANSSEN-CILAG | | | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 2487-809 | 28 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | R | 50,31 | 50,31 | 7,44 | 12,50 |
| | 2487-809 | | | | 37,10 | 37,10 | | |
| B-220 | 2487-833 | 56 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | R | 92,20 | 92,20 | 8,30 | 12,50 |
| | 2487-833 | | | | 74,20 | 74,20 | | |
| B-220 * | 0791-350 | 1 comprimé à libération prolongée, | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,5314 | 1,5314 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-220 ** | 0791-350 | 6 mg 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,4045 | 1,4045 | | |
| B-220 *** | 0791-350 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,5476 | 1,5476 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 6 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: N05AX13 | | | |
| B-220 | 3763-778 | 56 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | R | 92,20 | 92,20 | 8,30 | 12,50 |
| | 3763-778 | | | | 74,20 | 74,20 | | |
| B-220 * | 7722-770 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,5314 | 1,5314 | | |
| B-220 ** | 7722-770 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,4045 | 1,4045 | | |
| B-220 *** | 7722-770 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,5476 | 1,5476 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 6 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AX13 | | | |
| B-220 | 3833-217 | 56 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | R | 92,20 | 92,20 | 8,30 | 12,50 |
| | 3833-217 | | | | 74,20 | 74,20 | | |
| B-220 * | 7724-990 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,5314 | 1,5314 | | |
| B-220 ** | 7724-990 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,4045 | 1,4045 | | |
| B-220 *** | 7724-990 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | R | 1,5476 | 1,5476 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 9 mg | | JANSSEN-CILAG | | | ATC: N05AX13 | | | |
| B-220 | 2487-817 | 28 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | R | 50,31 | 50,31 | 7,44 | 12,50 |
| | 2487-817 | | | | 37,10 | 37,10 | | |
| B-220 | 2487-841 | 56 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | R | 92,20 | 92,20 | 8,30 | 12,50 |
| | 2487-841 | | | | 74,20 | 74,20 | | |
| B-220 * | 0791-368 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,5314 | 1,5314 | | |
| B-220 ** | 0791-368 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,4045 | 1,4045 | | |
| B-220 *** | 0791-368 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,5476 | 1,5476 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 9 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: N05AX13 | | | |
| B-220 | 3763-786 | 56 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | R | 92,20 | 92,20 | 8,30 | 12,50 |
| | 3763-786 | | | | 74,20 | 74,20 | | |
| B-220 * | 7722-788 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,5314 | 1,5314 | | |
| B-220 ** | 7722-788 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,4045 | 1,4045 | | |
| B-220 *** | 7722-788 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,5476 | 1,5476 | 0,1482 | 0,2232 |
| INVEGA 9 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AX13 | | | |
| B-220 | 3833-225 | 56 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | R | 92,20 | 92,20 | 8,30 | 12,50 |
| | 3833-225 | | | | 74,20 | 74,20 | | |
| B-220 * | 7725-005 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,5314 | 1,5314 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-220 ** | 7725-005 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,4045 | 1,4045 | | |
| B-220 *** | 7725-005 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | R | 1,5476 | 1,5476 | 0,1482 | 0,2232 |
| IOMERON 250 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-229 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml | | 33,08 | 33,08 | 5,04 | 8,47 |
| | 1177-229 | | | | 22,10 | 22,10 | | |
| B-178 * | 0746-289 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL | | 28,5200 | 28,5200 | | |
| B-178 ** | 0746-289 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL | | 23,4300 | 23,4300 | | |
| IOMERON 300 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| | 0796-342 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml | | 148,58 | 148,58 | | |
| B-178 * | 0796-342 | 10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,2920 | 3,2920 | | |
| B-178 ** | 0796-342 | 10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,1498 | 3,1498 | | |
| IOMERON 300 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| | 0792-002 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml | | 52,18 | 52,18 | | |
| B-178 * | 0792-002 | 10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | 10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | 3,1210 | 3,1210 | | |
| B-178 ** | 0792-002 | 10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | 10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | 2,7655 | 2,7655 | | |
| IOMERON 300 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-252 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml | | 38,41 | 38,41 | 5,78 | 9,72 |
| | 1177-252 | | | | 26,75 | 26,75 | | |
| B-178 * | 0746-412 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL | | 34,5200 | 34,5200 | | |
| B-178 ** | 0746-412 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL | | 28,3600 | 28,3600 | | |
| IOMERON 300 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-237 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml | | 22,63 | 22,63 | 3,46 | 5,77 |
| | 1177-237 | | | | 13,05 | 13,05 | | |
| B-178 * | 0746-404 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL | | 16,8400 | 16,8400 | | |
| B-178 ** | 0746-404 | 1 flacon injectable 50 mL solution | 1 injectieflacon 50 mL oplossing | | 13,8300 | 13,8300 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|--|--|---------------|---------------|------|-------|--|
| | | injectable, 612,4 mg/mL | voor injectie, 612,4 mg/mL | | | | | | |
| IOMERON 350 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 * | 0796-359 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml | | 167,33 | 167,33 | | | |
| | 0796-359 | 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,6896 | 3,6896 | | | |
| B-178 ** | 0796-359 | 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,5474 | 3,5474 | | | |
| IOMERON 350 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 * | 0792-010 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml | | 58,24 | 58,24 | | | |
| | 0792-010 | 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | 3,4420 | 3,4420 | | | |
| B-178 ** | 0792-010 | 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | 3,0865 | 3,0865 | | | |
| IOMERON 350 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-278 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml | | 42,30 | 42,30 | 6,32 | 10,64 | |
| | 1177-278 | | | | 30,13 | 30,13 | | | |
| B-178 * | 0746-446 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL | | 38,8800 | 38,8800 | | | |
| B-178 ** | 0746-446 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL | | 31,9400 | 31,9400 | | | |
| IOMERON 350 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 2177-624 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml | | 58,45 | 58,45 | 8,30 | 12,50 | |
| | 2177-624 | | | | 44,18 | 44,18 | | | |
| B-178 * | 0781-286 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL | | 53,9400 | 53,9400 | | | |
| B-178 ** | 0781-286 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL | | 46,8300 | 46,8300 | | | |
| IOMERON 350 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-260 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml | | 25,01 | 25,01 | 3,91 | 6,57 | |
| | 1177-260 | | | | 15,07 | 15,07 | | | |
| B-178 * | 0746-438 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL | | 19,4500 | 19,4500 | | | |
| B-178 ** | 0746-438 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL | | 15,9700 | 15,9700 | | | |
| IOMERON 400 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | | ATC: V08AB10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 0792-028 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml | | 66,55 | 66,55 | | |
| B-178 * | 0792-028 | 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 3,8825 | 3,8825 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | | | | |
| B-178 ** | 0792-028 | 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 3,5270 | 3,5270 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | | | | |
| IOMERON 400 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| | 7722-341 | 1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 172,06 | 172,06 | | |
| B-178 * | 7722-341 | 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 3,7898 | 3,7898 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | |
| B-178 ** | 7722-341 | 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 3,6476 | 3,6476 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | |
| IOMERON 400 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-328 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml | | 47,27 | 47,27 | 7,01 | 11,80 |
| | 1177-328 | | | | 34,44 | 34,44 | | |
| B-178 * | 0746-479 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 43,6200 | 43,6200 | | |
| B-178 ** | 0746-479 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 36,5100 | 36,5100 | | |
| IOMERON 400 | | BRACCO IMAGING EUROPE | | | ATC: V08AB10 | | | |
| B-178 | 1177-336 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml | | 27,46 | 27,46 | 4,25 | 7,15 |
| | 1177-336 | | | | 17,21 | 17,21 | | |
| B-178 * | 0746-461 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 22,2100 | 22,2100 | | |
| B-178 ** | 0746-461 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL | | 18,2400 | 18,2400 | | |
| IRBESARTAN EG 150 mg | | EG | | | ATC: C09CA04 | | | |
| B-224 | 2909-265 | 28 comprimés pelliculés, 150 mg | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 13,23 | 13,23 | 1,56 | 2,59 |
| | 2909-265 | | | | 5,87 | 5,87 | | |
| B-224 | 2909-281 | 98 comprimés pelliculés, 150 mg | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 26,28 | 26,28 | 4,09 | 6,87 |
| | 2909-281 | | | | 16,18 | 16,18 | | |
| B-224 * | 0752-345 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,2131 | 0,2131 | | |
| B-224 ** | 0752-345 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1750 | 0,1750 | | |
| B-224 *** | 0752-345 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,2117 | 0,2117 | 0,0417 | 0,0701 |
| IRBESARTAN EG 300 mg | | EG | | | ATC: C09CA04 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-224 | 2909-299 2909-299 | 28 comprimés pelliculés, 300 mg | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 13,23 5,87 | 13,23 5,87 | 1,56 | 2,59 |
| B-224 | 2909-315 2909-315 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 21,90 12,49 | 21,90 12,49 | 3,31 | 5,52 |
| B-224 * | 0752-337 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1645 | 0,1645 | | |
| B-224 ** | 0752-337 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1351 | 0,1351 | | |
| B-224 *** | 0752-337 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1670 | 0,1670 | 0,0338 | 0,0563 |
| IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg EG | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 2990-349 2990-349 | 98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg | G | 31,74 20,94 | 31,74 20,94 | 4,85 | 8,15 |
| B-224 * | 7701-832 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg | G | 0,2757 | 0,2757 | | |
| B-224 ** | 7701-832 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg | G | 0,2265 | 0,2265 | | |
| B-224 *** | 7701-832 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg | G | 0,2674 | 0,2674 | 0,0495 | 0,0832 |
| IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg EG | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 2990-364 2990-364 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg | G | 24,46 14,61 | 24,46 14,61 | 3,84 | 6,44 |
| B-224 * | 7701-840 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg | G | 0,1923 | 0,1923 | | |
| B-224 ** | 7701-840 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg | G | 0,1581 | 0,1581 | | |
| B-224 *** | 7701-840 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg | G | 0,1932 | 0,1932 | 0,0392 | 0,0657 |
| IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg EG | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 2990-307 2990-307 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg | G | 24,46 14,61 | 24,46 14,61 | 3,84 | 6,44 |
| B-224 * | 7701-857 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg | G | 0,1923 | 0,1923 | | |
| B-224 ** | 7701-857 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg | G | 0,1581 | 0,1581 | | |
| B-224 *** | 7701-857 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg | G | 0,1932 | 0,1932 | 0,0392 | 0,0657 |
| IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ | | | | ATC: C09CA04 | | | | |
| B-224 | 2895-241 2895-241 | 28 comprimés pelliculés, 150 mg | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 13,72 6,25 | 13,72 6,25 | 1,66 | 2,76 |
| B-224 | 2895-266 2895-266 | 98 comprimés pelliculés, 150 mg | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 25,07 15,13 | 25,07 15,13 | 3,92 | 6,59 |
| B-224 * | 0751-818 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1993 | 0,1993 | | |
| B-224 ** | 0751-818 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1637 | 0,1637 | | |
| B-224 *** | 0751-818 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1993 | 0,1993 | 0,0400 | 0,0672 |
| IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ | | | | ATC: C09CA04 | | | | |
| B-224 | 2895-290 2895-290 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 23,11 13,42 | 23,11 13,42 | 3,56 | 5,93 |
| B-224 * | 0751-800 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | | |
| B-224 ** | 0751-800 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-224 *** | 0751-800 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 | 0,0605 | |
| IRBESARTAN SANDOZ 75 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA04 | | | | | |
| B-224 | 2895-217 | 28 comprimés pelliculés, 75 mg | 28 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 13,72 | 13,72 | 1,66 | 2,76 | |
| | 2895-217 | | | | 6,25 | 6,25 | | | |
| B-224 | 2895-233 | 98 comprimés pelliculés, 75 mg | 98 filmomhulde tabletten, 75 mg | G | 26,54 | 26,54 | 4,13 | 6,93 | |
| | 2895-233 | | | | 16,41 | 16,41 | | | |
| B-224 * | 0751-826 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,2161 | 0,2161 | | | |
| B-224 ** | 0751-826 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,1774 | 0,1774 | | | |
| B-224 *** | 0751-826 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | G | 0,2144 | 0,2144 | 0,0421 | 0,0707 | |
| IRBESARTAN TEVA 150 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA04 | | | | | |
| B-224 | 2920-171 | 98 comprimés pelliculés, 150 mg | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 23,74 | 23,74 | 3,70 | 6,17 | |
| | 2920-171 | | | | 13,97 | 13,97 | | | |
| B-224 * | 0752-105 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1840 | 0,1840 | | | |
| B-224 ** | 0752-105 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1511 | 0,1511 | | | |
| B-224 *** | 0752-105 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1858 | 0,1858 | 0,0378 | 0,0630 | |
| IRBESARTAN TEVA 300 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA04 | | | | | |
| B-224 | 2920-197 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 23,11 | 23,11 | 3,56 | 5,93 | |
| | 2920-197 | | | | 13,42 | 13,42 | | | |
| B-224 * | 0752-097 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | | | |
| B-224 ** | 0752-097 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | | |
| B-224 *** | 0752-097 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 | 0,0605 | |
| IRBESARTAN VIATRIS 300 mg | | VIATRIS | | ATC: C09CA04 | | | | | |
| B-224 | 2938-322 | 98 comprimés, 300 mg | 98 tabletten, 300 mg | G | 23,11 | 23,11 | 3,56 | 5,93 | |
| | 2938-322 | | | | 13,42 | 13,42 | | | |
| B-224 * | 0751-156 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | | | |
| B-224 ** | 0751-156 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | | |
| B-224 *** | 0751-156 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | G | 0,1793 | 0,1793 | 0,0363 | 0,0605 | |
| IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09DA04 | | | | | |
| B-224 | 2906-345 | 28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg | G | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 | |
| | 2906-345 | | | | 6,70 | 6,70 | | | |
| B-224 | 2906-337 | 98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg | G | 31,69 | 31,69 | 4,84 | 8,14 | |
| | 2906-337 | | | | 20,90 | 20,90 | | | |
| B-224 * | 0752-048 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg | G | 0,2752 | 0,2752 | | | |
| B-224 ** | 0752-048 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg | G | 0,2260 | 0,2260 | | | |
| B-224 *** | 0752-048 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg | G | 0,2669 | 0,2669 | 0,0494 | 0,0831 | |
| IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09DA04 | | | | | |
| B-224 | 2906-378 | 56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg | 56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg | G | 21,22 | 21,22 | 3,17 | 5,29 | |
| | 2906-378 | | | | 11,97 | 11,97 | | | |
| B-224 | 2906-386 | 98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg | 98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg | G | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 | |
| | 2906-386 | | | | 14,60 | 14,60 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 * | 0752-030 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg | G | 0,1922 | 0,1922 | | |
| B-224 ** | 0752-030 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg | G | 0,1580 | 0,1580 | | |
| B-224 *** | 0752-030 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg | G | 0,1931 | 0,1931 | 0,0392 | 0,0657 |
| IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 2906-410 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg | G | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 |
| | 2906-410 | | | | 14,60 | 14,60 | | |
| B-224 * | 0752-022 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg | G | 0,1922 | 0,1922 | | |
| B-224 ** | 0752-022 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg | G | 0,1580 | 0,1580 | | |
| B-224 *** | 0752-022 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg | G | 0,1931 | 0,1931 | 0,0392 | 0,0657 |
| IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 3029-485 | 98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg | G | 31,74 | 31,74 | 4,85 | 8,15 |
| | 3029-485 | | | | 20,94 | 20,94 | | |
| B-224 * | 7702-244 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg | G | 0,2757 | 0,2757 | | |
| B-224 ** | 7702-244 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg | G | 0,2265 | 0,2265 | | |
| B-224 *** | 7702-244 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg | G | 0,2674 | 0,2674 | 0,0495 | 0,0832 |
| IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 3029-501 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg | G | 25,45 | 25,45 | 3,97 | 6,67 |
| | 3029-501 | | | | 15,46 | 15,46 | | |
| B-224 * | 7702-251 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg | G | 0,2036 | 0,2036 | | |
| B-224 ** | 7702-251 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg | G | 0,1672 | 0,1672 | | |
| B-224 *** | 7702-251 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | 0,0405 | 0,0681 |
| IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA | | | | ATC: C09DA04 | | | | |
| B-224 | 3029-527 | 98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg | G | 25,45 | 25,45 | 3,97 | 6,67 |
| | 3029-527 | | | | 15,46 | 15,46 | | |
| B-224 * | 7702-269 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg | G | 0,2036 | 0,2036 | | |
| B-224 ** | 7702-269 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg | G | 0,1672 | 0,1672 | | |
| B-224 *** | 7702-269 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | 0,0405 | 0,0681 |
| IRINOTECAN ACCORD 20 mg / ml ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 7717-978 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 19,71 | 19,71 | | |
| A-28 * | 7717-978 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 25,4400 | 25,4400 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--|--|
| A-28 ** | 7717-978 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 20,8900 | 20,8900 | | |
| IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 7717-986 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 52,41 | 52,41 | | |
| A-28 * | 7717-986 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 62,6600 | 62,6600 | | |
| A-28 ** | 7717-986 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 55,5500 | 55,5500 | | |
| IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 7717-994 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 167,02 | 167,02 | | |
| A-28 * | 7717-994 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 184,1500 | 184,1500 | | |
| A-28 ** | 7717-994 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 177,0400 | 177,0400 | | |
| IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 7718-257 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 278,39 | 278,39 | | |
| A-28 * | 7718-257 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 302,2000 | 302,2000 | | |
| A-28 ** | 7718-257 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 295,0900 | 295,0900 | | |
| IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 7732-712 | 1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL | | 556,79 | 556,79 | | |
| A-28 * | 7732-712 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 597,3100 | 597,3100 | | |
| A-28 ** | 7732-712 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL | G | 590,2000 | 590,2000 | | |
| IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 0793-497 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 19,71 | 19,71 | | |
| A-28 * | 0793-497 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | G | 25,4400 | 25,4400 | | |
| A-28 ** | 0793-497 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | G | 20,8900 | 20,8900 | | |
| IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 0793-943 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 278,39 | 278,39 | | |
| A-28 * | 0793-943 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | G | 302,2000 | 302,2000 | | |
| A-28 ** | 0793-943 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 20 mg/mL | G | 295,0900 | 295,0900 | | |
| IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | | ATC: L01CE02 | | | |
| | 0793-505 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 52,41 | 52,41 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--|--|
| A-28 * | 0793-505 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 62,6600 | 62,6600 | | |
| A-28 ** | 0793-505 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 55,5500 | 55,5500 | | |
| IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0755-074 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 167,02 | 167,02 | | |
| A-28 * | 0755-074 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 184,1500 | 184,1500 | | |
| A-28 ** | 0755-074 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 177,0400 | 177,0400 | | |
| IRINOTECAN KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0799-478 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 19,71 | 19,71 | | |
| A-28 * | 0799-478 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 25,4400 | 25,4400 | | |
| A-28 ** | 0799-478 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 20,8900 | 20,8900 | | |
| IRINOTECAN KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0758-755 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 167,02 | 167,02 | | |
| A-28 * | 0758-755 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 184,1500 | 184,1500 | | |
| A-28 ** | 0758-755 | 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 177,0400 | 177,0400 | | |
| IRINOTECAN KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0759-803 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 52,41 | 52,41 | | |
| A-28 * | 0759-803 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 62,6600 | 62,6600 | | |
| A-28 ** | 0759-803 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 55,5500 | 55,5500 | | |
| IRINOTECAN KABI 20 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0756-726 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 278,39 | 278,39 | | |
| A-28 * | 0756-726 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 302,2000 | 302,2000 | | |
| A-28 ** | 0756-726 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 295,0900 | 295,0900 | | |
| IRINOTECAN VIATRIS 300 mg/15 ml | | VIATRIS | | ATC: L01CE02 | | | | |
| | 0795-435 | 1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | | 167,02 | 167,02 | | |
| A-28 * | 0795-435 | 1 flacon injectable 15 mL solution | 1 injectieflacon 15 mL oplossing | G | 184,1500 | 184,1500 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|--|
| A-28 ** | 0795-435 | pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 177,0400 | 177,0400 | | | |
| IRINOTECAN VIATRIS 500 mg/25 ml | | VIATRIS | | ATC: L01CE02 | | | | | |
| A-28 * | 0796-045 0796-045 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 278,39 302,2000 | 278,39 302,2000 | | | |
| A-28 ** | 0796-045 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | G | 295,0900 | 295,0900 | | | |
| ISOCURAL 10 mg | | PIERRE FABRE BENELUX | | ATC: D10BA01 | | | | | |
| B-160 | 2981-785 2981-785 | 60 capsules molles, 10 mg | 60 capsules, zacht, 10 mg | G | 22,44 12,90 | 22,44 12,90 | 3,42 | 5,70 | |
| B-160 * | 0784-629 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2775 | 0,2775 | | | |
| B-160 ** | 0784-629 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2278 | 0,2278 | | | |
| B-160 *** | 0784-629 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2818 | 0,2818 | 0,0570 | 0,0950 | |
| ISOCURAL 20 mg | | PIERRE FABRE BENELUX | | ATC: D10BA01 | | | | | |
| B-160 | 2655-025 2655-025 | 60 capsules molles, 20 mg | 60 capsules, zacht, 20 mg | G | 35,97 24,61 | 35,97 24,61 | 5,44 | 9,14 | |
| B-160 * | 0784-611 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,5293 | 0,5293 | | | |
| B-160 ** | 0784-611 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,4348 | 0,4348 | | | |
| B-160 *** | 0784-611 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,5072 | 0,5072 | 0,0907 | 0,1523 | |
| ISOPTINE 120 mg | | VIATRIS | | ATC: C08DA01 | | | | | |
| B-6 | 4247-334 4247-334 | 60 comprimés pelliculés, 120 mg | 60 filmomhulde tabletten, 120 mg | | 12,26 5,14 | 12,26 5,14 | 1,36 | 2,27 | |
| B-6 * | 0709-659 | 1 comprimé pelliculé, 120 mg | 1 filmomhulde tablet, 120 mg | | 0,1105 | 0,1105 | | | |
| B-6 ** | 0709-659 | 1 comprimé pelliculé, 120 mg | 1 filmomhulde tablet, 120 mg | | 0,0908 | 0,0908 | | | |
| B-6 *** | 0709-659 | 1 comprimé pelliculé, 120 mg | 1 filmomhulde tablet, 120 mg | | 0,1122 | 0,1122 | 0,0227 | 0,0378 | |
| ISOPTINE 40 mg | | VIATRIS | | ATC: C08DA01 | | | | | |
| B-6 | 0475-111 0475-111 | 50 comprimés pelliculés, 40 mg | 50 filmomhulde tabletten, 40 mg | | 8,01 1,82 | 8,01 1,82 | 0,48 | 0,80 | |
| B-6 * | 0709-634 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0470 | 0,0470 | | | |
| B-6 ** | 0709-634 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0386 | 0,0386 | | | |
| B-6 *** | 0709-634 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,0496 | 0,0496 | 0,0096 | 0,0160 | |
| ISOPTINE 80 mg | | VIATRIS | | ATC: C08DA01 | | | | | |
| B-6 | 0050-583 0050-583 | 50 comprimés pelliculés, 80 mg | 50 filmomhulde tabletten, 80 mg | | 9,32 2,89 | 9,32 2,89 | 0,77 | 1,28 | |
| B-6 * | 0709-642 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | | 0,0746 | 0,0746 | | | |
| B-6 ** | 0709-642 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | | 0,0612 | 0,0612 | | | |
| B-6 *** | 0709-642 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | | 0,0757 | 0,0757 | 0,0154 | 0,0256 | |
| ISOSUPRA LIDOSE 16 mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: D10BA01 | | | | | |
| B-160 | 2198-604 2198-604 | 30 gélules, 16 mg | 30 capsules, hard, 16 mg | G | 22,16 12,69 | 22,16 12,69 | 3,37 | 5,61 | |
| B-160 | 2320-141 | 60 gélules, 16 mg | 60 capsules, hard, 16 mg | G | 36,84 | 36,84 | 5,56 | 9,35 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 2320-141 | | | | | 25,37 | 25,37 | | |
| B-160 * | 0779-637 | 1 gélule, 16 mg | 1 capsule, hard, 16 mg | G | 0,5457 | 0,5457 | | | |
| B-160 ** | 0779-637 | 1 gélule, 16 mg | 1 capsule, hard, 16 mg | G | 0,4482 | 0,4482 | | | |
| B-160 *** | 0779-637 | 1 gélule, 16 mg | 1 capsule, hard, 16 mg | G | 0,5217 | 0,5217 | 0,0927 | 0,1558 | |
| ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB ATC: D10BA01 | | | | | | | | | |
| B-160 | 2198-612 | 30 gélules, 8 mg | 30 capsules, hard, 8 mg | G | 15,11 | 15,11 | 1,94 | 3,23 | |
| | 2198-612 | | | | 7,31 | 7,31 | | | |
| B-160 | 2320-158 | 60 gélules, 8 mg | 60 capsules, hard, 8 mg | G | 24,51 | 24,51 | 3,84 | 6,45 | |
| | 2320-158 | | | | 14,64 | 14,64 | | | |
| B-160 * | 0779-629 | 1 gélule, 8 mg | 1 capsule, hard, 8 mg | G | 0,3148 | 0,3148 | | | |
| B-160 ** | 0779-629 | 1 gélule, 8 mg | 1 capsule, hard, 8 mg | G | 0,2587 | 0,2587 | | | |
| B-160 *** | 0779-629 | 1 gélule, 8 mg | 1 capsule, hard, 8 mg | G | 0,3162 | 0,3162 | 0,0640 | 0,1075 | |
| ISOTIORGA 10 mg LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX ATC: D10BA01 | | | | | | | | | |
| B-160 | 4616-066 | 30 capsules molles, 10 mg | 30 capsules, zacht, 10 mg | G | 15,64 | 15,64 | 2,04 | 3,41 | |
| | 4616-066 | | | | 7,71 | 7,71 | | | |
| B-160 | 4616-074 | 60 capsules molles, 10 mg | 60 capsules, zacht, 10 mg | G | 22,44 | 22,44 | 3,42 | 5,70 | |
| | 4616-074 | | | | 12,90 | 12,90 | | | |
| B-160 | 4616-082 | 100 capsules molles, 10 mg | 100 capsules, zacht, 10 mg | G | 32,39 | 32,39 | 4,94 | 8,30 | |
| | 4616-082 | | | | 21,50 | 21,50 | | | |
| B-160 * | 7736-614 | 1 capsule, molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2775 | 0,2775 | | | |
| B-160 ** | 7736-614 | 1 capsule, molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | | | |
| B-160 *** | 7736-614 | 1 capsule, molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2686 | 0,2686 | 0,0494 | 0,0830 | |
| ISOTIORGA 20 mg LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX ATC: D10BA01 | | | | | | | | | |
| B-160 | 4616-090 | 30 capsules molles, 20 mg | 30 capsules, zacht, 20 mg | G | 23,07 | 23,07 | 3,55 | 5,92 | |
| | 4616-090 | | | | 13,39 | 13,39 | | | |
| B-160 | 4616-116 | 60 capsules molles, 20 mg | 60 capsules, zacht, 20 mg | G | 35,97 | 35,97 | 5,44 | 9,14 | |
| | 4616-116 | | | | 24,61 | 24,61 | | | |
| B-160 | 4616-108 | 100 capsules molles, 20 mg | 100 capsules, zacht, 20 mg | G | 54,81 | 54,81 | 8,06 | 13,58 | |
| | 4616-108 | | | | 41,02 | 41,02 | | | |
| B-160 * | 7736-622 | 1 capsule, molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,5059 | 0,5059 | | | |
| B-160 ** | 7736-622 | 1 capsule, molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,4348 | 0,4348 | | | |
| B-160 *** | 7736-622 | 1 capsule, molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,4928 | 0,4928 | 0,0806 | 0,1358 | |
| ISOTRETINOINE EG 10 mg EG ATC: D10BA01 | | | | | | | | | |
| B-160 | 2200-228 | 30 capsules molles, 10 mg | 30 capsules, zacht, 10 mg | G | 15,64 | 15,64 | 2,04 | 3,41 | |
| | 2200-228 | | | | 7,71 | 7,71 | | | |
| B-160 | 2200-202 | 60 capsules molles, 10 mg | 60 capsules, zacht, 10 mg | G | 24,41 | 24,41 | 3,83 | 6,43 | |
| | 2200-202 | | | | 14,56 | 14,56 | | | |
| B-160 * | 0779-868 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,3132 | 0,3132 | | | |
| B-160 ** | 0779-868 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,2572 | 0,2572 | | | |
| B-160 *** | 0779-868 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | G | 0,3146 | 0,3146 | 0,0638 | 0,1072 | |
| ISOTRETINOINE EG 20 mg EG ATC: D10BA01 | | | | | | | | | |
| B-160 | 2200-210 | 30 capsules molles, 20 mg | 30 capsules, zacht, 20 mg | G | 23,07 | 23,07 | 3,55 | 5,92 | |
| | 2200-210 | | | | 13,39 | 13,39 | | | |
| B-160 | 2200-236 | 60 capsules molles, 20 mg | 60 capsules, zacht, 20 mg | G | 36,94 | 36,94 | 5,57 | 9,37 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|--|
| | 2200-236 | | | | | 25,46 | 25,46 | | |
| B-160 * | 0779-876 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,5477 | 0,5477 | | | |
| B-160 ** | 0779-876 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,4498 | 0,4498 | | | |
| B-160 *** | 0779-876 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | G | 0,5235 | 0,5235 | 0,0928 | 0,1562 | |
| ITRACONAZOL AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC02 | | | | | | | | | |
| B-134 | 2442-143 2442-143 | 4 gélules, 100 mg | 4 capsules, hard, 100 mg | G | 8,37 2,14 | 8,37 2,14 | 0,57 | 0,95 | |
| B-134 | 2442-150 2442-150 | 15 gélules, 100 mg | 15 capsules, hard, 100 mg | G | 15,29 7,44 | 15,29 7,44 | 1,97 | 3,29 | |
| B-134 | 2442-168 2442-168 | 28 gélules, 100 mg | 28 capsules, hard, 100 mg | G | 20,63 11,52 | 20,63 11,52 | 3,06 | 5,09 | |
| B-134 | 2442-176 2442-176 | 60 gélules, 100 mg | 60 capsules, hard, 100 mg | G | 40,36 28,44 | 40,36 28,44 | 6,05 | 10,18 | |
| B-134 * | 0786-087 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6117 | 0,6117 | | | |
| B-134 ** | 0786-087 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,5025 | 0,5025 | | | |
| B-134 *** | 0786-087 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,5805 | 0,5805 | 0,1008 | 0,1697 | |
| ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J02AC02 | | | | | | | | | |
| B-134 | 2601-615 2601-615 | 4 gélules, 100 mg | 4 capsules, hard, 100 mg | G | 8,49 2,24 | 8,49 2,24 | 0,59 | 0,99 | |
| B-134 | 2601-607 2601-607 | 15 gélules, 100 mg | 15 capsules, hard, 100 mg | G | 15,34 7,48 | 15,34 7,48 | 1,98 | 3,31 | |
| B-134 | 2601-581 2601-581 | 28 gélules, 100 mg | 28 capsules, hard, 100 mg | G | 20,63 11,52 | 20,63 11,52 | 3,06 | 5,09 | |
| B-134 | 2601-623 2601-623 | 60 gélules, 100 mg | 60 capsules, hard, 100 mg | G | 41,80 29,69 | 41,80 29,69 | 6,25 | 10,52 | |
| B-134 * | 0793-232 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6385 | 0,6385 | | | |
| B-134 ** | 0793-232 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,5245 | 0,5245 | | | |
| B-134 *** | 0793-232 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6044 | 0,6044 | 0,1042 | 0,1753 | |
| ITRACONAZOLE EG 100 mg EG ATC: J02AC02 | | | | | | | | | |
| B-134 | 2369-643 2369-643 | 15 gélules, 100 mg | 15 capsules, hard, 100 mg | G | 15,32 7,47 | 15,32 7,47 | 1,98 | 3,30 | |
| B-134 | 4183-281 4183-281 | 30 gélules, 100 mg | 30 capsules, hard, 100 mg | G | 21,71 12,34 | 21,71 12,34 | 3,27 | 5,45 | |
| B-134 | 2369-668 2369-668 | 60 gélules, 100 mg | 60 capsules, hard, 100 mg | G | 41,80 29,69 | 41,80 29,69 | 6,25 | 10,52 | |
| B-134 * | 0784-686 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6385 | 0,6385 | | | |
| B-134 ** | 0784-686 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,5245 | 0,5245 | | | |
| B-134 *** | 0784-686 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6044 | 0,6044 | 0,1042 | 0,1753 | |
| ITRACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC02 | | | | | | | | | |
| B-134 | 2747-954 2747-954 | 4 gélules, 100 mg | 4 capsules, hard, 100 mg | G | 8,49 2,24 | 8,49 2,24 | 0,59 | 0,99 | |
| B-134 | 2747-970 2747-970 | 15 gélules, 100 mg | 15 capsules, hard, 100 mg | G | 15,34 7,48 | 15,34 7,48 | 1,98 | 3,31 | |
| B-134 | 2747-996 2747-996 | 28 gélules, 100 mg | 28 capsules, hard, 100 mg | G | 20,63 11,52 | 20,63 11,52 | 3,06 | 5,09 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-134 | 2748-010 2748-010 | 60 gélules, 100 mg | 60 capsules, hard, 100 mg | G | 41,80 29,69 | 41,80 29,69 | 6,25 | 10,52 |
| B-134 * | 0799-916 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6385 | 0,6385 | | |
| B-134 ** | 0799-916 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,5245 | 0,5245 | | |
| B-134 *** | 0799-916 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,7394 | 0,7394 | 0,1475 | 0,2475 |
| ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg VIATRIS ATC: J02AC02 | | | | | | | | |
| B-134 | 2339-653 2339-653 | 60 gélules, 100 mg | 60 capsules, hard, 100 mg | G | 41,80 29,69 | 41,80 29,69 | 6,25 | 10,52 |
| B-134 * | 0784-694 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6385 | 0,6385 | | |
| B-134 ** | 0784-694 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,5245 | 0,5245 | | |
| B-134 *** | 0784-694 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 0,6044 | 0,6044 | 0,1042 | 0,1753 |
| JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BD07 | | | | | | | | |
| A-110 | 4165-718 4165-718 | 196 comprimés pelliculés, 50 mg/1000 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg/1000 mg | R | 43,21 30,92 | 43,21 30,92 | 0,00 | 0,00 |
| A-110 * | 7728-215 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/1000 mg | R | 0,2035 | 0,2035 | | |
| A-110 ** | 7728-215 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/1000 mg | R | 0,1672 | 0,1672 | | |
| A-110 *** | 7728-215 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/1000 mg | R | 0,1922 | 0,1922 | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BD07 | | | | | | | | |
| A-110 | 4245-577 4245-577 | 196 comprimés pelliculés, 50 mg/850 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg/850 mg | R | 47,90 35,00 | 47,90 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-110 * | 7730-153 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/850 mg | R | 0,2256 | 0,2256 | | |
| A-110 ** | 7730-153 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/850 mg | R | 0,1893 | 0,1893 | | |
| A-110 *** | 7730-153 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/850 mg | R | 0,2162 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BH01 | | | | | | | | |
| A-91 | 4679-122 4679-122 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 42,39 30,20 | 42,39 30,20 | 0,00 | 0,00 |
| A-91 * | 7739-048 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,3977 | 0,3977 | | |
| A-91 ** | 7739-048 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,3266 | 0,3266 | | |
| A-91 *** | 7739-048 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,3761 | 0,3761 | 0,0000 | 0,0000 |
| JEXT 150 µg ALK ABELLO BV ATC: C01CA24 | | | | | | | | |
| B-317 | 2906-501 2906-501 | 1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg | 1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg | R | 46,11 33,44 | 46,11 33,44 | 6,85 | 11,53 |
| B-317 * | 7703-002 | 1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 42,5600 | 42,5600 | | |
| B-317 ** | 7703-002 | 1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 35,4500 | 35,4500 | | |
| JEXT 300 µg ALK ABELLO BV ATC: C01CA24 | | | | | | | | |
| B-317 | 2906-519 2906-519 | 1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg | 1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg | R | 46,11 33,44 | 46,11 33,44 | 6,85 | 11,53 |
| B-317 * | 7703-705 | 1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 42,5600 | 42,5600 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-317 ** | 7703-705 | 1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 35,4500 | 35,4500 | | |
| KAYEXALATE CALCIUM | | SANOFI BELGIUM | | ATC: V03AE01 | | | | |
| A-34 | 0051-045 | 1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g | 1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g | | 23,02 | 23,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 0051-045 | | | | 13,35 | 13,35 | | |
| A-34 * | 0709-865 | 15 g 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g | 15 g 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g | | 0,8615 | 0,8615 | | |
| A-34 ** | 0709-865 | 15 g 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g | 15 g 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g | | 0,7075 | 0,7075 | | |
| KAYEXALATE SODIUM | | SANOFI BELGIUM | | ATC: V03AE01 | | | | |
| A-34 | 0052-514 | 1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g | 1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g | | 26,12 | 26,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0052-514 | | | | 16,04 | 16,04 | | |
| A-34 * | 0709-873 | 15 g 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g | 15 g 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g | | 0,6900 | 0,6900 | | |
| A-34 ** | 0709-873 | 15 g 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g | 15 g 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g | | 0,5667 | 0,5667 | | |
| KEFORAL 500 mg | | EUROCEPT | | ATC: J01DB01 | | | | |
| C-37 | 3962-818 | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 15,45 | 15,45 | 6,69 | 6,69 |
| | 3962-818 | | | | 7,57 | 7,57 | | |
| C-37 * | 0709-949 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,4885 | 0,4885 | | |
| C-37 ** | 0709-949 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,4010 | 0,4010 | | |
| C-37 *** | 0709-949 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,4961 | 0,4961 | 0,3345 | 0,3345 |
| KEFZOL 1 g | | EUROCEPT | | ATC: J01DB04 | | | | |
| B-110 | 3964-632 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | R | 25,09 | 25,09 | 3,92 | 6,59 |
| | 3964-632 | | | | 15,15 | 15,15 | | |
| B-110 * | 7726-292 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | R | 1,9550 | 1,9550 | | |
| B-110 ** | 7726-292 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | R | 1,6060 | 1,6060 | | |
| KEMADRIN | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: N04AA04 | | | | |
| B-78 | 0051-821 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | | 10,07 | 10,07 | 0,92 | 1,53 |
| | 0051-821 | | | | 3,46 | 3,46 | | |
| B-78 * | 0710-087 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0447 | 0,0447 | | |
| B-78 ** | 0710-087 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0367 | 0,0367 | | |
| B-78 *** | 0710-087 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0454 | 0,0454 | 0,0092 | 0,0153 |
| KENACORT-A 10 | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: H02AB08 | | | | |
| B-83 | 0117-093 | 1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml | | 10,32 | 10,32 | 0,97 | 1,62 |
| | 0117-093 | | | | 3,66 | 3,66 | | |
| B-83 * | 0710-103 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL | | 4,7200 | 4,7200 | | |
| B-83 ** | 0710-103 | 1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL | | 3,8800 | 3,8800 | | |
| KETALAR 50 mg/ml | | Pfizer | | ATC: N01AX03 | | | | |
| | 0710-178 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | | 8,41 | 8,41 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| A-30 * | 0710-178 | 1 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 1,0850 | 1,0850 | | |
| A-30 ** | 0710-178 | 1 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 0,8910 | 0,8910 | | |
| KLINOTAB | | TEOFARMA | | ATC: J01AA08 | | | | |
| C-37 | 1457-431 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 12,72 | 12,72 | 4,84 | 4,84 |
| | 1457-431 | | | | 5,48 | 5,48 | | |
| C-37 * | 0740-084 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2357 | 0,2357 | | |
| C-37 ** | 0740-084 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1937 | 0,1937 | | |
| C-37 *** | 0740-084 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2396 | 0,2396 | 0,1613 | 0,1613 |
| KREDEX 25 mg | | EUROCEPT | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 0482-554 | 56 comprimés, 25 mg | 56 tabletten, 25 mg | R | 17,07 | 17,07 | 2,33 | 3,89 |
| | 0482-554 | | | | 8,80 | 8,80 | | |
| B-16 * | 0736-074 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-16 ** | 0736-074 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,1666 | 0,1666 | | |
| B-16 *** | 0736-074 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,2059 | 0,2059 | 0,0416 | 0,0695 |
| KREDEX 6,25 mg | | EUROCEPT | | ATC: C07AG02 | | | | |
| B-16 | 1251-917 | 56 comprimés, 6,25 mg | 56 tabletten, 6,25 mg | R | 8,58 | 8,58 | 0,62 | 1,03 |
| | 1251-917 | | | | 2,32 | 2,32 | | |
| B-16 * | 0763-060 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | R | 0,0534 | 0,0534 | | |
| B-16 ** | 0763-060 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | R | 0,0439 | 0,0439 | | |
| B-16 *** | 0763-060 | 1 comprimé, 6,25 mg | 1 tablet, 6,25 mg | R | 0,0543 | 0,0543 | 0,0111 | 0,0184 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-773 | 112 comprimés, 100 µg | 112 tabletten, 100 µg | | 10,71 | 10,71 | 1,05 | 1,75 |
| | 3181-773 | | | | 3,95 | 3,95 | | |
| B-86 * | 0743-294 | 1 comprimé, 100 µg | 1 tablet, 100 µg | | 0,0455 | 0,0455 | | |
| B-86 ** | 0743-294 | 1 comprimé, 100 µg | 1 tablet, 100 µg | | 0,0374 | 0,0374 | | |
| B-86 *** | 0743-294 | 1 comprimé, 100 µg | 1 tablet, 100 µg | | 0,0462 | 0,0462 | 0,0094 | 0,0156 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-799 | 112 comprimés, 125 µg | 112 tabletten, 125 µg | | 10,72 | 10,72 | 1,05 | 1,75 |
| | 3181-799 | | | | 3,96 | 3,96 | | |
| B-86 * | 0748-871 | 1 comprimé, 125 µg | 1 tablet, 125 µg | | 0,0456 | 0,0456 | | |
| B-86 ** | 0748-871 | 1 comprimé, 125 µg | 1 tablet, 125 µg | | 0,0375 | 0,0375 | | |
| B-86 *** | 0748-871 | 1 comprimé, 125 µg | 1 tablet, 125 µg | | 0,0463 | 0,0463 | 0,0094 | 0,0156 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-815 | 112 comprimés, 150 µg | 112 tabletten, 150 µg | | 11,52 | 11,52 | 1,21 | 2,02 |
| | 3181-815 | | | | 4,57 | 4,57 | | |
| B-86 * | 0743-757 | 1 comprimé, 150 µg | 1 tablet, 150 µg | | 0,0527 | 0,0527 | | |
| B-86 ** | 0743-757 | 1 comprimé, 150 µg | 1 tablet, 150 µg | | 0,0432 | 0,0432 | | |
| B-86 *** | 0743-757 | 1 comprimé, 150 µg | 1 tablet, 150 µg | | 0,0535 | 0,0535 | 0,0108 | 0,0180 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-831 | 112 comprimés, 175 µg | 112 tabletten, 175 µg | | 12,46 | 12,46 | 1,40 | 2,33 |
| | 3181-831 | | | | 5,28 | 5,28 | | |
| B-86 * | 0776-195 | 1 comprimé, 175 µg | 1 tablet, 175 µg | | 0,0608 | 0,0608 | | |
| B-86 ** | 0776-195 | 1 comprimé, 175 µg | 1 tablet, 175 µg | | 0,0500 | 0,0500 | | |
| B-86 *** | 0776-195 | 1 comprimé, 175 µg | 1 tablet, 175 µg | | 0,0618 | 0,0618 | 0,0125 | 0,0208 |

| L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-86 | 3181-856 3181-856 | 112 comprimés, 200 µg | 112 tabletten, 200 µg | | 12,80 5,55 | 12,80 5,55 | 1,47 | 2,45 |
| B-86 * | 0743-310 | 1 comprimé, 200 µg | 1 tablet, 200 µg | | 0,0639 | 0,0639 | | |
| B-86 ** | 0743-310 | 1 comprimé, 200 µg | 1 tablet, 200 µg | | 0,0525 | 0,0525 | | |
| B-86 *** | 0743-310 | 1 comprimé, 200 µg | 1 tablet, 200 µg | | 0,0649 | 0,0649 | 0,0131 | 0,0219 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-716 3181-716 | 112 comprimés, 25 µg | 112 tabletten, 25 µg | | 8,46 2,22 | 8,46 2,22 | 0,59 | 0,98 |
| B-86 * | 0743-740 | 1 comprimé, 25 µg | 1 tablet, 25 µg | | 0,0255 | 0,0255 | | |
| B-86 ** | 0743-740 | 1 comprimé, 25 µg | 1 tablet, 25 µg | | 0,0210 | 0,0210 | | |
| B-86 *** | 0743-740 | 1 comprimé, 25 µg | 1 tablet, 25 µg | | 0,0261 | 0,0261 | 0,0053 | 0,0087 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-732 3181-732 | 112 comprimés, 50 µg | 112 tabletten, 50 µg | | 9,08 2,71 | 9,08 2,71 | 0,72 | 1,20 |
| B-86 * | 0743-732 | 1 comprimé, 50 µg | 1 tablet, 50 µg | | 0,0313 | 0,0313 | | |
| B-86 ** | 0743-732 | 1 comprimé, 50 µg | 1 tablet, 50 µg | | 0,0256 | 0,0256 | | |
| B-86 *** | 0743-732 | 1 comprimé, 50 µg | 1 tablet, 50 µg | | 0,0317 | 0,0317 | 0,0064 | 0,0107 |
| L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03AA01 | | | | |
| B-86 | 3181-757 3181-757 | 112 comprimés, 75 µg | 112 tabletten, 75 µg | | 9,96 3,38 | 9,96 3,38 | 0,90 | 1,49 |
| B-86 * | 0776-187 | 1 comprimé, 75 µg | 1 tablet, 75 µg | | 0,0389 | 0,0389 | | |
| B-86 ** | 0776-187 | 1 comprimé, 75 µg | 1 tablet, 75 µg | | 0,0320 | 0,0320 | | |
| B-86 *** | 0776-187 | 1 comprimé, 75 µg | 1 tablet, 75 µg | | 0,0396 | 0,0396 | 0,0080 | 0,0133 |
| LAMISIL | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: D01BA02 | | | | |
| B-134 | 0292-169 0292-169 | 14 comprimés, 250 mg | 14 tabletten, 250 mg | R | 20,26 11,24 | 20,26 11,24 | 2,98 | 4,97 |
| B-134 | 0292-177 0292-177 | 56 comprimés, 250 mg | 56 tabletten, 250 mg | R | 39,53 27,71 | 39,53 27,71 | 5,93 | 9,98 |
| B-134 * | 0740-563 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,6386 | 0,6386 | | |
| B-134 ** | 0740-563 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,5245 | 0,5245 | | |
| B-134 *** | 0740-563 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,6070 | 0,6070 | 0,1059 | 0,1782 |
| LANITOP | | RIEMSER PHARMA | | ATC: C01AA08 | | | | |
| B-1 | 0118-703 0118-703 | 50 comprimés, 0,1 mg | 50 tabletten, 0,1 mg | | 7,36 1,25 | 7,36 1,25 | 0,33 | 0,55 |
| B-1 * | 0710-244 | 1 comprimé, 0,1 mg | 1 tablet, 0,1 mg | | 0,0322 | 0,0322 | | |
| B-1 ** | 0710-244 | 1 comprimé, 0,1 mg | 1 tablet, 0,1 mg | | 0,0266 | 0,0266 | | |
| B-1 *** | 0710-244 | 1 comprimé, 0,1 mg | 1 tablet, 0,1 mg | | 0,0365 | 0,0365 | 0,0066 | 0,0110 |
| LANOXIN 0,125 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: C01AA05 | | | | |
| B-1 | 4524-237 4524-237 | 90 comprimés, 0,125 mg | 90 tabletten, 0,125 mg | | 8,14 1,94 | 8,14 1,94 | 0,51 | 0,86 |
| B-1 * | 0730-648 | 1 comprimé, 0,125 mg | 1 tablet, 0,125 mg | | 0,0278 | 0,0278 | | |
| B-1 ** | 0730-648 | 1 comprimé, 0,125 mg | 1 tablet, 0,125 mg | | 0,0229 | 0,0229 | | |
| B-1 *** | 0730-648 | 1 comprimé, 0,125 mg | 1 tablet, 0,125 mg | | 0,0290 | 0,0290 | 0,0057 | 0,0096 |
| LANOXIN 0,250 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: C01AA05 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-1 | 4524-245 4524-245 | 90 comprimés, 0,25 mg | 90 tabletten, 0,25 mg | | 7,79 1,63 | 7,79 1,63 | 0,43 | 0,72 |
| B-1 * | 0710-269 | 1 comprimé, 0,25 mg | 1 tablet, 0,25 mg | | 0,0233 | 0,0233 | | |
| B-1 ** | 0710-269 | 1 comprimé, 0,25 mg | 1 tablet, 0,25 mg | | 0,0192 | 0,0192 | | |
| B-1 *** | 0710-269 | 1 comprimé, 0,25 mg | 1 tablet, 0,25 mg | | 0,0251 | 0,0251 | 0,0048 | 0,0080 |
| LANTUS 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04 | | | | | | | | |
| A-69 | 2539-856 2539-856 | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | | 46,92 34,15 | 46,92 34,15 | 0,00 | 0,00 |
| A-69 * | 0790-303 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL | | 8,6620 | 8,6620 | | |
| A-69 ** | 0790-303 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL | | 7,2400 | 7,2400 | | |
| LANTUS 100 UI/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04 | | | | | | | | |
| A-69 | 1763-481 1763-481 | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml | | 46,92 34,15 | 46,92 34,15 | 0,00 | 0,00 |
| A-69 * | 0775-155 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL | | 8,6620 | 8,6620 | | |
| A-69 ** | 0775-155 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL | | 7,2400 | 7,2400 | | |
| LANVIS 40 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01BB03 | | | | | | | | |
| A-24 | 0055-145 0055-145 | 25 comprimés, 40 mg | 25 tabletten, 40 mg | | 103,51 84,52 | 103,51 84,52 | 0,00 | 0,00 |
| A-24 * | 0710-285 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 3,8680 | 3,8680 | | |
| A-24 ** | 0710-285 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 3,5836 | 3,5836 | | |
| A-24 *** | 0710-285 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 3,9190 | 3,9190 | 0,0000 | 0,0000 |
| LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01 | | | | | | | | |
| B-25 * | 0710-384 0710-384 | 20 comprimés, 500 mg 1 comprimé, 500 mg | 20 tabletten, 500 mg 1 tablet, 500 mg | R | 9,88 0,6375 | 9,88 0,6375 | | |
| B-25 ** | 0710-384 | 1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20) | 1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20) | R | 0,5235 | 0,5235 | | |
| LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01 | | | | | | | | |
| B-25 | 0117-572 0117-572 | 50 comprimés, 40 mg | 50 tabletten, 40 mg | R | 8,59 2,33 | 8,59 2,33 | 0,62 | 1,03 |
| B-25 * | 0710-376 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,0602 | 0,0602 | | |
| B-25 ** | 0710-376 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,0494 | 0,0494 | | |
| B-25 *** | 0710-376 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,0611 | 0,0611 | 0,0124 | 0,0206 |
| LASIX 10 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01 | | | | | | | | |
| B-25 | 3070-414 3070-414 | 6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml | 6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | R | 7,72 1,56 | 7,72 1,56 | 0,41 | 0,69 |
| B-25 * | 0710-350 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 0,3350 | 0,3350 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-25 ** | 0710-350 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 0,2750 | 0,2750 | | |
| LASIX 250 I.V. | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C03CA01 | | | | |
| | 0710-368 | 6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 8,97 | 8,97 | | |
| B-25 * | 0710-368 | 1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) | 1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) | R | 1,9300 | 1,9300 | | |
| B-25 ** | 0710-368 | 1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) | 1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) | R | 1,5850 | 1,5850 | | |
| LASIX 30 PROLONGATUM | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C03CA01 | | | | |
| B-25 | 0198-036 | 30 gélules, 30 mg | 30 capsules, hard, 30 mg | R | 7,72 | 7,72 | 0,41 | 0,69 |
| | 0198-036 | | | | 1,56 | 1,56 | | |
| B-25 * | 0710-392 | 1 gélule, 30 mg | 1 capsule, hard, 30 mg | R | 0,0670 | 0,0670 | | |
| B-25 ** | 0710-392 | 1 gélule, 30 mg | 1 capsule, hard, 30 mg | R | 0,0550 | 0,0550 | | |
| B-25 *** | 0710-392 | 1 gélule, 30 mg | 1 capsule, hard, 30 mg | R | 0,0728 | 0,0728 | 0,0137 | 0,0230 |
| LATANOPROST EG 50 microgram/ml | | EG | | ATC: S01EE01 | | | | |
| B-168 | 2804-631 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml | G | 10,84 | 10,84 | 1,07 | 1,79 |
| | 2804-631 | | | | 4,05 | 4,05 | | |
| B-168 | 2802-858 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml | G | 18,04 | 18,04 | 2,53 | 4,22 |
| | 2802-858 | | | | 9,54 | 9,54 | | |
| B-168 * | 0756-015 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL | G | 4,1033 | 4,1033 | | |
| B-168 ** | 0756-015 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL | G | 3,3700 | 3,3700 | | |
| LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% | | AUROBINDO NV | | ATC: S01ED51 | | | | |
| B-168 | 2969-954 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml | G | 17,55 | 17,55 | 2,43 | 4,05 |
| | 2969-954 | | | | 9,17 | 9,17 | | |
| B-168 * | 7700-313 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL | G | 3,9433 | 3,9433 | | |
| B-168 ** | 7700-313 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL | G | 3,2400 | 3,2400 | | |
| LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml | | EG | | ATC: S01ED51 | | | | |
| B-168 | 3258-324 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml | G | 18,13 | 18,13 | 2,55 | 4,25 |
| | 3258-324 | | | | 9,61 | 9,61 | | |
| B-168 * | 7714-082 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL | G | 4,1333 | 4,1333 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-168 ** | 7714-082 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL | G | 3,3967 | 3,3967 | | |
| LATANOTEARS 50 µg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: S01EE01 | | | | |
| B-168 | 2889-533 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml | G | 18,31 | 18,31 | 2,59 | 4,31 |
| | 2889-533 | | | | 9,75 | 9,75 | | |
| B-168 * | 0753-525 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL | G | 4,1933 | 4,1933 | | |
| B-168 ** | 0753-525 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL | G | 3,4467 | 3,4467 | | |
| LEDERTREXATE 2,5 mg | | Pfizer | | ATC: L04AX03 | | | | |
| A-24 | 1092-857 | 30 comprimés, 2,5 mg | 30 tabletten, 2,5 mg | R | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 1092-857 | | | | 3,09 | 3,09 | | |
| A-24 * | 0710-566 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | 0,1330 | 0,1330 | | |
| A-24 ** | 0710-566 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | 0,1093 | 0,1093 | | |
| A-24 *** | 0710-566 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | 0,1350 | 0,1350 | 0,0000 | 0,0000 |
| LEDERTREXATE 5 mg/2 ml | | Pfizer | | ATC: L01BA01 | | | | |
| A-24 | 4481-628 | 5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | R | 28,32 | 28,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4481-628 | | | | 17,96 | 17,96 | | |
| A-24 * | 0710-574 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | R | 4,6360 | 4,6360 | | |
| A-24 ** | 0710-574 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL | R | 3,8080 | 3,8080 | | |
| LEPONEX 100 mg | | VIATRIS | | ATC: N05AH02 | | | | |
| B-72 | 1152-446 | 30 comprimés, 100 mg | 30 tabletten, 100 mg | R | 15,38 | 15,38 | 1,99 | 3,32 |
| | 1152-446 | | | | 7,51 | 7,51 | | |
| B-72 | 3814-449 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | R | 30,61 | 30,61 | 4,69 | 7,89 |
| | 3814-449 | | | | 19,96 | 19,96 | | |
| B-72 * | 0746-123 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,2576 | 0,2576 | | |
| B-72 ** | 0746-123 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,2116 | 0,2116 | | |
| B-72 *** | 0746-123 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,2508 | 0,2508 | 0,0469 | 0,0789 |
| LEPONEX 25 mg | | VIATRIS | | ATC: N05AH02 | | | | |
| B-72 | 1152-438 | 30 comprimés, 25 mg | 30 tabletten, 25 mg | R | 8,13 | 8,13 | 0,51 | 0,85 |
| | 1152-438 | | | | 1,93 | 1,93 | | |
| B-72 * | 0746-115 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0830 | 0,0830 | | |
| B-72 ** | 0746-115 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0683 | 0,0683 | | |
| B-72 *** | 0746-115 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0866 | 0,0866 | 0,0170 | 0,0283 |
| LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: C08CA13 | | | | |
| B-20 | 2669-323 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,97 | 10,97 | 1,10 | 1,83 |
| | 2669-323 | | | | 4,15 | 4,15 | | |
| B-20 | 2669-331 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 15,70 | 15,70 | 2,06 | 3,43 |
| | 2669-331 | | | | 7,75 | 7,75 | | |
| B-20 | 2673-986 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 17,49 | 17,49 | 2,42 | 4,03 |
| | 2673-986 | | | | 9,12 | 9,12 | | |
| B-20 * | 0795-740 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1201 | 0,1201 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-20 ** | 0795-740 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0987 | 0,0987 | | |
| B-20 *** | 0795-740 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1220 | 0,1220 | 0,0247 | 0,0411 |
| LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: C08CA13 | | | | |
| B-20 | 2669-356 2669-356 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 20,85 11,69 | 20,85 11,69 | 3,10 | 5,17 |
| B-20 | 2673-994 2673-994 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 22,51 12,96 | 22,51 12,96 | 3,44 | 5,73 |
| B-20 * | 0795-757 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1706 | 0,1706 | | |
| B-20 ** | 0795-757 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1402 | 0,1402 | | |
| B-20 *** | 0795-757 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1733 | 0,1733 | 0,0351 | 0,0585 |
| LERCANIDIPINE EG 10 mg | | EG | | ATC: C08CA13 | | | | |
| B-20 | 2680-148 2680-148 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,97 4,15 | 10,97 4,15 | 1,10 | 1,83 |
| B-20 | 2680-353 2680-353 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 17,01 8,76 | 17,01 8,76 | 2,32 | 3,87 |
| B-20 * | 0797-175 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1153 | 0,1153 | | |
| B-20 ** | 0797-175 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,0948 | 0,0948 | | |
| B-20 *** | 0797-175 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1171 | 0,1171 | 0,0237 | 0,0395 |
| LERCANIDIPINE EG 20 mg | | EG | | ATC: C08CA13 | | | | |
| B-20 | 2680-130 2680-130 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 20,92 11,75 | 20,92 11,75 | 3,12 | 5,19 |
| B-20 * | 0797-183 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1547 | 0,1547 | | |
| B-20 ** | 0797-183 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1271 | 0,1271 | | |
| B-20 *** | 0797-183 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1571 | 0,1571 | 0,0318 | 0,0530 |
| LERIVON 10 | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: N06AX03 | | | | |
| B-73 | 0053-397 0053-397 | 90 comprimés, 10 mg | 90 tabletten, 10 mg | | 11,77 4,76 | 11,77 4,76 | 1,26 | 2,10 |
| B-73 * | 0710-640 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0682 | 0,0682 | | |
| B-73 ** | 0710-640 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0561 | 0,0561 | | |
| B-73 *** | 0710-640 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0693 | 0,0693 | 0,0140 | 0,0233 |
| LETROZOL SANDOZ 2,5 mg | | SANDOZ | | ATC: L02BG04 | | | | |
| A-27 | 2795-607 2795-607 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 33,33 22,31 | 33,33 22,31 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 | 2795-599 2795-599 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 76,97 60,31 | 76,97 60,31 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0756-858 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7104 | 0,7104 | | |
| A-27 ** | 0756-858 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,6393 | 0,6393 | | |
| A-27 *** | 0756-858 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7143 | 0,7143 | 0,0000 | 0,0000 |
| LETROZOLE EG 2,5 mg | | EG | | ATC: L02BG04 | | | | |
| A-27 | 2743-466 2743-466 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 33,33 22,31 | 33,33 22,31 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 | 2743-474 2743-474 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 76,97 60,31 | 76,97 60,31 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0799-486 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7104 | 0,7104 | | |
| A-27 ** | 0799-486 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,6393 | 0,6393 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| A-27 *** | 0799-486 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7143 | 0,7143 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L02BG04 | | | | | |
| A-27 | 4832-010 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 76,97 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4832-010 | | | | 60,31 | 60,31 | | | |
| A-27 * | 7740-376 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7104 | 0,7104 | | | |
| A-27 ** | 7740-376 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,6393 | 0,6393 | | | |
| A-27 *** | 7740-376 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7143 | 0,7143 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: L02BG04 | | | | | |
| A-27 | 4684-155 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4684-155 | | | | 22,31 | 22,31 | | | |
| A-27 | 4736-583 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 76,97 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4736-583 | | | | 60,31 | 60,31 | | | |
| A-27 * | 7738-537 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7104 | 0,7104 | | | |
| A-27 ** | 7738-537 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,6393 | 0,6393 | | | |
| A-27 *** | 7738-537 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7143 | 0,7143 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LETROZOLE TEVA 2,5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L02BG04 | | | | | |
| A-27 | 2787-935 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2787-935 | | | | 22,31 | 22,31 | | | |
| A-27 | 2787-950 | 100 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 76,97 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2787-950 | | | | 60,31 | 60,31 | | | |
| A-27 * | 0757-534 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7104 | 0,7104 | | | |
| A-27 ** | 0757-534 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,6393 | 0,6393 | | | |
| A-27 *** | 0757-534 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,7143 | 0,7143 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LEUKERAN 2 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: L01AA02 | | | | | |
| A-23 | 1599-570 | 50 comprimés, 2 mg | 50 tabletten, 2 mg | | 32,34 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1599-570 | | | | 21,46 | 21,46 | | | |
| A-23 * | 0771-139 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,5538 | 0,5538 | | | |
| A-23 ** | 0771-139 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,4550 | 0,4550 | | | |
| A-23 *** | 0771-139 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | 0,5361 | 0,5361 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LEVMENTIN | | LABORATOIRES DELBERT | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| | 0730-002 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis | | 26,29 | 26,29 | | | |
| B-107 * | 0730-002 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | R | 3,3930 | 3,3930 | | | |
| B-107 ** | 0730-002 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | R | 2,7870 | 2,7870 | | | |
| LEVMENTIN | | LABORATOIRES DELBERT | | ATC: J01CR02 | | | | | |
| | 0730-010 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | | 35,23 | 35,23 | | | |
| B-107 * | 0730-010 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | R | 4,4450 | 4,4450 | | | |
| B-107 ** | 0730-010 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis | R | 3,7340 | 3,7340 | | | |

| LEVMENTIN P | | LABORATOIRES DELBERT | | | | ATC: J01CR02 | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| | 0730-028 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis | | 11,76 | 11,76 | | | |
| B-107 * | 0730-028 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | R | 1,5180 | 1,5180 | | | |
| B-107 ** | 0730-028 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | R | 1,2470 | 1,2470 | | | |
| LEVOCETIRIZIN AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | | | ATC: R06AE09 | | | |
| Cs-7 | 4247-664 | 20 comprimés pelliculés, 5 mg | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,81 | 7,81 | 1,75 | 1,75 | |
| | 4247-664 | | | | 1,65 | 1,65 | | | |
| Cs-7 | 4247-672 | 40 comprimés pelliculés, 5 mg | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,66 | 9,66 | 3,34 | 3,34 | |
| | 4247-672 | | | | 3,15 | 3,15 | | | |
| Cs-7 | 4247-680 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 14,61 | 14,61 | 7,35 | 7,35 | |
| | 4247-680 | | | | 6,93 | 6,93 | | | |
| Cs-7 * | 7729-510 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0894 | 0,0894 | | | |
| Cs-7 ** | 7729-510 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0735 | 0,0735 | | | |
| Cs-7 *** | 7729-510 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0907 | 0,0907 | 0,0735 | 0,0735 | |
| LEVOCETIRIZINE EG 5 mg | | EG | | | | ATC: R06AE09 | | | |
| Cs-7 | 2661-007 | 20 comprimés pelliculés, 5 mg | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,82 | 7,82 | 1,76 | 1,76 | |
| | 2661-007 | | | | 1,66 | 1,66 | | | |
| Cs-7 | 2660-983 | 40 comprimés pelliculés, 5 mg | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,97 | 9,97 | 3,60 | 3,60 | |
| | 2660-983 | | | | 3,39 | 3,39 | | | |
| Cs-7 | 2660-884 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 15,35 | 15,35 | 7,94 | 7,94 | |
| | 2660-884 | | | | 7,49 | 7,49 | | | |
| Cs-7 * | 0797-324 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0967 | 0,0967 | | | |
| Cs-7 ** | 0797-324 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | | | |
| Cs-7 *** | 0797-324 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0982 | 0,0982 | 0,0794 | 0,0794 | |
| LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | | | ATC: R06AE09 | | | |
| Cs-7 | 2659-043 | 20 comprimés pelliculés, 5 mg | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,82 | 7,82 | 1,76 | 1,76 | |
| | 2659-043 | | | | 1,66 | 1,66 | | | |
| Cs-7 | 2659-050 | 40 comprimés pelliculés, 5 mg | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,66 | 9,66 | 3,34 | 3,34 | |
| | 2659-050 | | | | 3,15 | 3,15 | | | |
| Cs-7 | 2659-068 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 14,61 | 14,61 | 7,35 | 7,35 | |
| | 2659-068 | | | | 6,93 | 6,93 | | | |
| Cs-7 * | 0797-753 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0894 | 0,0894 | | | |
| Cs-7 ** | 0797-753 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0735 | 0,0735 | | | |
| Cs-7 *** | 0797-753 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0907 | 0,0907 | 0,0735 | 0,0735 | |
| LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: R06AE09 | | | |
| Cs-7 | 2657-583 | 20 comprimés pelliculés, 5 mg | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 7,82 | 7,82 | 1,76 | 1,76 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|-------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 2657-583 | | | | | 1,66 | 1,66 | | |
| Cs-7 | 2657-591 | 40 comprimés pelliculés, 5 mg | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,89 | 9,89 | 3,52 | 3,52 | |
| | 2657-591 | | | | 3,32 | 3,32 | | | |
| Cs-7 | 2657-609 | 60 comprimés pelliculés, 5 mg | 60 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 12,07 | 12,07 | 5,29 | 5,29 | |
| | 2657-609 | | | | 4,99 | 4,99 | | | |
| Cs-7 | 2686-434 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 15,15 | 15,15 | 7,79 | 7,79 | |
| | 2686-434 | | | | 7,34 | 7,34 | | | |
| Cs-7 * | 0795-849 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0947 | 0,0947 | | | |
| Cs-7 ** | 0795-849 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0778 | 0,0778 | | | |
| Cs-7 *** | 0795-849 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0961 | 0,0961 | 0,0779 | 0,0779 | |
| LEVOFLOXACINE EUGIA 5 mg/ml AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 | | | | | | | | | |
| | 7727-597 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | | | 12,34 | 12,34 | | |
| B-125 * | 7727-597 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 15,9200 | 15,9200 | | | |
| B-125 ** | 7727-597 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 13,0800 | 13,0800 | | | |
| LEVOFLOXACINE EG 500 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 | | | | | | | | | |
| | 0758-748 | 30 comprimés pelliculés, 500 mg | 30 filmomhulde tabletten, 500 mg | | | 34,61 | 34,61 | | |
| C-37 * | 0758-748 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4600 | 1,4600 | | | |
| C-37 ** | 0758-748 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2230 | 1,2230 | | | |
| LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 | | | | | | | | | |
| | 0757-872 | 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | | | 12,34 | 12,34 | | |
| B-125 * | 0757-872 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 15,9200 | 15,9200 | | | |
| B-125 ** | 0757-872 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 13,0800 | 13,0800 | | | |
| LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 | | | | | | | | | |
| | 0756-023 | 1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | | | 6,15 | 6,15 | | |
| B-125 * | 0756-023 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 7,9400 | 7,9400 | | | |
| B-125 ** | 0756-023 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 6,5200 | 6,5200 | | | |
| LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 (Freeflex) | | | | | | | | | |
| | 0753-954 | 10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | | | 61,54 | 61,54 | | |
| B-125 * | 0753-954 | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 7,2340 | 7,2340 | | | |
| B-125 ** | 0753-954 | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 6,5230 | 6,5230 | | | |
| LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 | | | | | | | | | |

| (Freeflex) | | hoofdstuk: IV) | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--|
| | 0753-947 | 10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | | 123,47 | 123,47 | |
| B-125 * | 0753-947 | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 13,7990 | 13,7990 | |
| B-125 ** | 0753-947 | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 13,0880 | 13,0880 | |
| LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA12 | |
| | 0758-177 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 6,03 | 6,03 | |
| C-37 * | 0758-177 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,7780 | 0,7780 | |
| C-37 ** | 0758-177 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6390 | 0,6390 | |
| LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA12 | |
| | 0758-169 | 30 comprimés pelliculés, 500 mg | 30 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 34,96 | 34,96 | |
| C-37 * | 0758-169 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4723 | 1,4723 | |
| C-37 ** | 0758-169 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,2353 | 1,2353 | |
| LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA12 | |
| | 0758-409 | 10 comprimés pelliculés, 250 mg | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 6,37 | 6,37 | |
| C-37 * | 0758-409 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,8220 | 0,8220 | |
| C-37 ** | 0758-409 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | G | 0,6750 | 0,6750 | |
| LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01MA12 | |
| | 0758-391 | 14 comprimés pelliculés, 500 mg | 14 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 19,32 | 19,32 | |
| C-37 * | 0758-391 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,7807 | 1,7807 | |
| C-37 ** | 0758-391 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 1,4629 | 1,4629 | |
| LEVOFOLIC 50 mg/ml | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | ATC: V03AF10 | |
| | 0792-077 | 1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml | | 10,03 | 10,03 | |
| A-33 * | 0792-077 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | R | 12,9400 | 12,9400 | |
| A-33 ** | 0792-077 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | R | 10,6300 | 10,6300 | |
| LEVOFOLIC 50 mg/ml | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | ATC: V03AF10 | |
| | 0792-085 | 1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml | | 40,11 | 40,11 | |
| A-33 * | 0792-085 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | R | 49,6300 | 49,6300 | |
| A-33 ** | 0792-085 | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | R | 42,5200 | 42,5200 | |
| LEVOFOLIC 50 mg/ml | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | ATC: V03AF10 | |
| | 0792-093 | 1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml | 1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml | | 90,27 | 90,27 | |
| A-33 * | 0792-093 | 1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | R | 102,8000 | 102,8000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|--|
| A-33 ** | 0792-093 | 1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | R | 95,6900 | 95,6900 | | | |
| LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: C01CX08 | | | | | |
| B-2 ** | 7734-635 7734-635 | 1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL | G | 279,79 296,5800 | 279,79 296,5800 | | | |
| LIBROXAR 2mg/0,5mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: N07BC51 | | | | | |
| B-148 | 4132-056 4132-056 | 7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg | 7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | G | 9,44 2,99 | 9,44 2,99 | | | |
| B-148 | 4132-064 4132-064 | 28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg | 28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | G | 21,17 11,93 | 21,17 11,93 | 3,16 | 5,27 | |
| B-148 * | 7727-159 | 1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | G | 0,5500 | 0,5500 | | | |
| B-148 ** | 7727-159 | 1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | G | 0,4518 | 0,4518 | | | |
| B-148 *** | 7727-159 | 1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | G | 0,5584 | 0,5584 | 0,1129 | 0,1882 | |
| LIBROXAR 8mg/2mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: N07BC51 | | | | | |
| B-148 | 4132-080 4132-080 | 7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg | 7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | G | 18,07 9,57 | 18,07 9,57 | 2,54 | 4,23 | |
| B-148 | 4132-072 4132-072 | 28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg | 28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | G | 51,70 38,31 | 51,70 38,31 | 7,63 | 12,50 | |
| B-148 * | 7727-167 | 1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | G | 1,7043 | 1,7043 | | | |
| B-148 ** | 7727-167 | 1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | G | 1,4504 | 1,4504 | | | |
| B-148 *** | 7727-167 | 1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | G | 1,6487 | 1,6487 | 0,2725 | 0,4464 | |
| LINCOCIN 500 mg | | Pfizer | | ATC: J01FF02 | | | | | |
| C-37 | 0118-273 0118-273 | 16 gélules, 500 mg | 16 capsules, hard, 500 mg | | 14,69 6,99 | 14,69 6,99 | 6,18 | 6,18 | |
| C-37 * | 0710-681 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | 0,5638 | 0,5638 | | | |
| C-37 ** | 0710-681 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | 0,4631 | 0,4631 | | | |
| C-37 *** | 0710-681 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | | 0,5724 | 0,5724 | 0,3862 | 0,3862 | |
| LINCOCIN 600 mg | | Pfizer | | ATC: J01FF02 | | | | | |
| B-119 | 0054-262 0054-262 | 6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml | 6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml | | 20,09 11,11 | 20,09 11,11 | 2,95 | 4,91 | |
| B-119 * | 0710-673 | 1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL | | 2,3900 | 2,3900 | | | |
| B-119 ** | 0710-673 | 1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL | | 1,9633 | 1,9633 | | | |
| LIORESAL | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: M03BX01 | | | | | |
| B-80 | 0063-362 0063-362 | 50 comprimés, 25 mg | 50 tabletten, 25 mg | R | 13,03 5,72 | 13,03 5,72 | 1,52 | 2,53 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-80 * | 0710-723 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,1476 | 0,1476 | | |
| B-80 ** | 0710-723 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,1212 | 0,1212 | | |
| B-80 *** | 0710-723 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,1499 | 0,1499 | 0,0304 | 0,0506 |
| LIORESAL | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M03BX01 | | | |
| B-80 | 0063-354 | 50 comprimés, 10 mg | 50 tabletten, 10 mg | R | 8,78 | 8,78 | 0,66 | 1,10 |
| | 0063-354 | | | | 2,48 | 2,48 | | |
| B-80 * | 0710-715 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,0640 | 0,0640 | | |
| B-80 ** | 0710-715 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,0526 | 0,0526 | | |
| B-80 *** | 0710-715 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,0649 | 0,0649 | 0,0132 | 0,0220 |
| LIORESAL INTRATHECAL | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M03BX01 | | | |
| | 0763-938 | 1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 35,00 | 35,00 | | |
| B-80 * | 0763-938 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 44,2100 | 44,2100 | | |
| B-80 ** | 0763-938 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 37,1000 | 37,1000 | | |
| LIORESAL INTRATHECAL | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M03BX01 | | | |
| | 0763-920 | 1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | | 35,00 | 35,00 | | |
| B-80 * | 0763-920 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | R | 44,2100 | 44,2100 | | |
| B-80 ** | 0763-920 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | R | 37,1000 | 37,1000 | | |
| LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C10BX11 | | | |
| B-21 | 3391-448 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg | R | 17,66 | 17,66 | 2,45 | 4,09 |
| | 3391-448 | | | | 9,25 | 9,25 | | |
| B-21 | 3391-455 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg | R | 39,58 | 39,58 | 5,94 | 10,00 |
| | 3391-455 | | | | 27,76 | 27,76 | | |
| B-21 * | 7716-350 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg | R | 0,3980 | 0,3980 | | |
| B-21 ** | 7716-350 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg | R | 0,3270 | 0,3270 | | |
| B-21 *** | 7716-350 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg | R | 0,3783 | 0,3783 | 0,0660 | 0,1111 |
| LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C10BX11 | | | |
| B-21 | 3391-489 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg | R | 30,78 | 30,78 | 4,72 | 7,93 |
| | 3391-489 | | | | 20,10 | 20,10 | | |
| B-21 | 3391-497 | 90 comprimés pelliculés | 90 filmomhulde tabletten | R | 76,95 | 76,95 | 10,20 | 15,50 |
| | 3391-497 | | | | 60,29 | 60,29 | | |
| B-21 * | 7716-384 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg | R | 0,7891 | 0,7891 | | |
| B-21 ** | 7716-384 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg | R | 0,7101 | 0,7101 | | |
| B-21 *** | 7716-384 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg | R | 0,7935 | 0,7935 | 0,1133 | 0,1722 |
| LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C10BX11 | | | |
| B-21 | 3391-398 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg | R | 27,66 | 27,66 | 4,28 | 7,19 |
| | 3391-398 | | | | 17,38 | 17,38 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 | 3391-406 | 90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg | R | 65,55 | 65,55 | 9,56 | 15,50 |
| | 3391-406 | | | | 50,36 | 50,36 | | |
| B-21 * | 7716-376 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg | R | 0,6721 | 0,6721 | | |
| B-21 ** | 7716-376 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg | R | 0,5931 | 0,5931 | | |
| B-21 *** | 7716-376 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg | R | 0,6669 | 0,6669 | 0,1062 | 0,1722 |
| LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C10BX11 | | | |
| B-21 | 3391-414 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg | R | 21,95 | 21,95 | 3,32 | 5,54 |
| | 3391-414 | | | | 12,53 | 12,53 | | |
| B-21 | 3391-430 | 90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg | R | 49,36 | 49,36 | 7,30 | 12,30 |
| | 3391-430 | | | | 36,28 | 36,28 | | |
| B-21 * | 7716-368 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg | R | 0,5063 | 0,5063 | | |
| B-21 ** | 7716-368 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg | R | 0,4273 | 0,4273 | | |
| B-21 *** | 7716-368 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg | R | 0,4870 | 0,4870 | 0,0811 | 0,1367 |
| LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C10BX11 | | | |
| B-21 | 3391-463 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg | R | 31,02 | 31,02 | 4,75 | 7,98 |
| | 3391-463 | | | | 20,30 | 20,30 | | |
| B-21 | 3391-471 | 90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg | R | 77,63 | 77,63 | 10,20 | 15,50 |
| | 3391-471 | | | | 60,92 | 60,92 | | |
| B-21 * | 7716-392 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg | R | 0,7966 | 0,7966 | | |
| B-21 ** | 7716-392 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg | R | 0,7176 | 0,7176 | | |
| B-21 *** | 7716-392 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg | R | 0,8011 | 0,8011 | 0,1133 | 0,1722 |
| LIPITOR 10 | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 1361-518 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 9,66 | 9,66 | 0,84 | 1,39 |
| | 1361-518 | | | | 3,15 | 3,15 | | |
| B-41 | 1361-526 | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 14,44 | 14,44 | 1,80 | 3,01 |
| | 1361-526 | | | | 6,80 | 6,80 | | |
| B-41 * | 0747-691 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1045 | 0,1045 | | |
| B-41 ** | 0747-691 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,0858 | 0,0858 | | |
| B-41 *** | 0747-691 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1060 | 0,1060 | 0,0214 | 0,0358 |
| LIPITOR 20 | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 1361-534 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 11,31 | 11,31 | 1,17 | 1,95 |
| | 1361-534 | | | | 4,41 | 4,41 | | |
| B-41 | 1361-542 | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 23,79 | 23,79 | 3,72 | 6,19 |
| | 1361-542 | | | | 14,01 | 14,01 | | |
| B-41 * | 0747-709 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2152 | 0,2152 | | |
| B-41 ** | 0747-709 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1768 | 0,1768 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-41 *** | 0747-709 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2173 | 0,2173 | 0,0443 | 0,0737 |
| LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 2941-078 2941-078 | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 23,79 14,01 | 23,79 14,01 | 3,72 | 6,19 |
| B-41 * | 0750-471 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2152 | 0,2152 | | |
| B-41 ** | 0750-471 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-41 *** | 0750-471 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2173 | 0,2173 | 0,0443 | 0,0737 |
| LIPITOR 40 | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 1641-018 1641-018 | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 23,79 14,01 | 23,79 14,01 | 3,72 | 6,19 |
| B-41 * | 0768-788 | 1 comprimé enrobé, 40 mg | 1 omhulde tablet, 40 mg | R | 0,2152 | 0,2152 | | |
| B-41 ** | 0768-788 | 1 comprimé enrobé, 40 mg | 1 omhulde tablet, 40 mg | R | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-41 *** | 0768-788 | 1 comprimé enrobé, 40 mg | 1 omhulde tablet, 40 mg | R | 0,2173 | 0,2173 | 0,0443 | 0,0737 |
| LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 2583-961 2583-961 | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 23,79 14,01 | 23,79 14,01 | 3,72 | 6,19 |
| B-41 * | 0791-426 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2152 | 0,2152 | | |
| B-41 ** | 0791-426 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-41 *** | 0791-426 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2173 | 0,2173 | 0,0443 | 0,0737 |
| LIPITOR 80 | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA05 | |
| B-41 | 1720-127 1720-127 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | R | 24,06 14,25 | 24,06 14,25 | 3,78 | 6,30 |
| B-41 * | 0771-675 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | R | 0,1877 | 0,1877 | | |
| B-41 ** | 0771-675 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | R | 0,1542 | 0,1542 | | |
| B-41 *** | 0771-675 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | R | 0,1891 | 0,1891 | 0,0386 | 0,0643 |
| LISINOPRIL EG 20 mg | | EG | | | | | ATC: C09AA03 | |
| B-21 | 1721-364 1721-364 | 28 comprimés, 20 mg | 28 tabletten, 20 mg | G | 11,26 4,37 | 11,26 4,37 | 1,16 | 1,93 |
| B-21 | 1721-372 1721-372 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | G | 16,05 8,02 | 16,05 8,02 | 2,13 | 3,54 |
| B-21 | 2093-383 2093-383 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 22,32 12,81 | 22,32 12,81 | 3,40 | 5,66 |
| B-21 * | 0771-105 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1687 | 0,1687 | | |
| B-21 ** | 0771-105 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1386 | 0,1386 | | |
| B-21 *** | 0771-105 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1713 | 0,1713 | 0,0347 | 0,0578 |
| LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | | ATC: C09AA03 | |
| B-21 | 3259-983 3259-983 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | G | 16,05 8,02 | 16,05 8,02 | 2,13 | 3,54 |
| B-21 | 2675-775 2675-775 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 22,32 12,81 | 22,32 12,81 | 3,40 | 5,66 |
| B-21 * | 0795-971 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1687 | 0,1687 | | |
| B-21 ** | 0795-971 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1386 | 0,1386 | | |
| B-21 *** | 0795-971 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1713 | 0,1713 | 0,0347 | 0,0578 |

| LISINOPRIL EG 5 mg | | EG | | ATC: C09AA03 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-21 | 1721-356 1721-356 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 6,65 0,62 | 6,65 0,62 | 0,16 | 0,27 | |
| B-21 | 2341-402 2341-402 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 8,53 2,28 | 8,53 2,28 | 0,60 | 1,01 | |
| B-21 * | 0771-097 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0525 | 0,0525 | | | |
| B-21 ** | 0771-097 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0432 | 0,0432 | | | |
| B-21 *** | 0771-097 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0536 | 0,0536 | 0,0107 | 0,0180 | |
| LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: C09AA03 | | | | | |
| B-21 | 4769-691 4769-691 | 84 comprimés, 20 mg | 84 tabletten, 20 mg | G | 18,93 10,22 | 18,93 10,22 | 2,71 | 4,52 | |
| B-21 * | 7740-442 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1570 | 0,1570 | | | |
| B-21 ** | 7740-442 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1289 | 0,1289 | | | |
| B-21 *** | 7740-442 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1595 | 0,1595 | 0,0323 | 0,0538 | |
| LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: C09AA03 | | | | | |
| B-21 | 4769-709 4769-709 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 8,28 2,06 | 8,28 2,06 | 0,55 | 0,91 | |
| B-21 * | 7740-434 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0475 | 0,0475 | | | |
| B-21 ** | 7740-434 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0389 | 0,0389 | | | |
| B-21 *** | 7740-434 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0490 | 0,0490 | 0,0098 | 0,0162 | |
| LISINOPRIL MYLAN 20 mg | | VIATRIS | | ATC: C09AA03 | | | | | |
| B-21 | 1670-504 1670-504 | 50 comprimés, 20 mg | 50 tabletten, 20 mg | G | 14,91 7,16 | 14,91 7,16 | 1,90 | 3,16 | |
| B-21 | 1670-454 1670-454 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 22,27 12,77 | 22,27 12,77 | 3,39 | 5,64 | |
| B-21 * | 0771-832 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1648 | 0,1648 | | | |
| B-21 ** | 0771-832 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1354 | 0,1354 | | | |
| B-21 *** | 0771-832 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1674 | 0,1674 | 0,0339 | 0,0564 | |
| LISINOPRIL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA03 | | | | | |
| B-21 | 1791-052 1791-052 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | G | 11,08 4,23 | 11,08 4,23 | 1,12 | 1,87 | |
| B-21 | 1645-217 1645-217 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | G | 15,56 7,65 | 15,56 7,65 | 2,03 | 3,38 | |
| B-21 | 1791-029 1791-029 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 21,48 12,17 | 21,48 12,17 | 3,23 | 5,38 | |
| B-21 * | 0774-638 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1571 | 0,1571 | | | |
| B-21 ** | 0774-638 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1290 | 0,1290 | | | |
| B-21 *** | 0774-638 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1594 | 0,1594 | 0,0323 | 0,0538 | |
| LISINOPRIL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA03 | | | | | |
| B-21 | 1705-540 1705-540 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 8,28 2,06 | 8,28 2,06 | 0,55 | 0,91 | |
| B-21 * | 0768-721 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0475 | 0,0475 | | | |
| B-21 ** | 0768-721 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0389 | 0,0389 | | | |
| B-21 *** | 0768-721 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0490 | 0,0490 | 0,0098 | 0,0162 | |
| LISINOPRIL TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09AA03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-21 | 2082-766 2082-766 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 21,48 12,17 | 21,48 12,17 | 3,23 | 5,38 |
| B-21 * | 0776-112 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1571 | 0,1571 | | |
| B-21 ** | 0776-112 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1290 | 0,1290 | | |
| B-21 *** | 0776-112 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1594 | 0,1594 | 0,0323 | 0,0538 |
| LISINOPRIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA03 | | | | | | | | |
| B-21 | 2082-774 2082-774 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 6,67 0,64 | 6,67 0,64 | 0,17 | 0,28 |
| B-21 * | 0776-104 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0277 | 0,0277 | | |
| B-21 ** | 0776-104 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0227 | 0,0227 | | |
| B-21 *** | 0776-104 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0378 | 0,0378 | 0,0057 | 0,0093 |
| LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05 | | | | | | | | |
| B-54 | 0818-724 0818-724 | 6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml | 6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 8,51 2,26 | 8,51 2,26 | 0,60 | 1,00 |
| B-54 * | 0726-885 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | | 0,4867 | 0,4867 | | |
| B-54 ** | 0726-885 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | | 0,4000 | 0,4000 | | |
| LOCACORTENE AMDIPHARM ATC: D07AB03 | | | | | | | | |
| B-158 | 0054-742 0054-742 | 1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g | 1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g | | 11,09 4,24 | 11,09 4,24 | 1,12 | 1,87 |
| B-158 * | 0710-772 | 1 g pommade, 0,2 mg/g | 1 g zalf, 0,2 mg/g | | 0,1823 | 0,1823 | | |
| B-158 ** | 0710-772 | 1 g pommade, 0,2 mg/g | 1 g zalf, 0,2 mg/g | | 0,1497 | 0,1497 | | |
| LOCOID CRELO EUROCEPT ATC: D07AB02 | | | | | | | | |
| B-157 | 1201-078 1201-078 | 100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g | 100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g | R | 10,72 3,96 | 10,72 3,96 | 1,05 | 1,75 |
| B-157 * | 0741-769 | 1 g, 1 mg/g | 1 g, 1 mg/g | R | 0,0511 | 0,0511 | | |
| B-157 ** | 0741-769 | 1 g, 1 mg/g | 1 g, 1 mg/g | R | 0,0420 | 0,0420 | | |
| LOCOID Lipocrème EUROCEPT ATC: D07AB02 | | | | | | | | |
| B-157 | 0894-899 0894-899 | 1 tube 30 g crème, 1 mg/g | 1 tube 30 g crème, 1 mg/g | R | 7,62 1,48 | 7,62 1,48 | 0,39 | 0,65 |
| B-157 * | 0710-822 | 1 g crème, 1 mg/g | 1 g crème, 1 mg/g | R | 0,0637 | 0,0637 | | |
| B-157 ** | 0710-822 | 1 g crème, 1 mg/g | 1 g crème, 1 mg/g | R | 0,0523 | 0,0523 | | |
| LODIXAL VIATRIS ATC: C08DA01 | | | | | | | | |
| B-6 | 0475-152 0475-152 | 30 comprimés à libération prolongée, 240 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg | | 12,65 5,43 | 12,65 5,43 | 1,44 | 2,40 |
| B-6 * | 0737-460 | 1 comprimé, 240 mg | 1 tablet, 240 mg | | 0,2337 | 0,2337 | | |
| B-6 ** | 0737-460 | 1 comprimé, 240 mg | 1 tablet, 240 mg | | 0,1920 | 0,1920 | | |
| B-6 *** | 0737-460 | 1 comprimé, 240 mg | 1 tablet, 240 mg | | 0,2371 | 0,2371 | 0,0480 | 0,0800 |
| LODOZ 10/6,25 MERCK ATC: C07BB07 | | | | | | | | |
| B-15 | 2639-730 2639-730 | 84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg | R | 13,30 5,93 | 13,30 5,93 | 1,57 | 2,62 |
| B-15 * | 0772-780 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg | R | 0,0911 | 0,0911 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-15 ** | 0772-780 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg | R | 0,0749 | 0,0749 | | |
| B-15 *** | 0772-780 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg | R | 0,0925 | 0,0925 | 0,0187 | 0,0312 |
| LODOZ 2,5/6,25 | | MERCK | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2639-748 | 84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg | 84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg | R | 13,30 | 13,30 | 1,57 | 2,62 |
| | 2639-748 | | | | 5,93 | 5,93 | | |
| B-15 * | 0772-764 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg | R | 0,0911 | 0,0911 | | |
| B-15 ** | 0772-764 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg | R | 0,0749 | 0,0749 | | |
| B-15 *** | 0772-764 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg | R | 0,0925 | 0,0925 | 0,0187 | 0,0312 |
| LODOZ 5/6,25 | | MERCK | | ATC: C07BB07 | | | | |
| B-15 | 2639-755 | 84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg | 84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg | R | 13,30 | 13,30 | 1,57 | 2,62 |
| | 2639-755 | | | | 5,93 | 5,93 | | |
| B-15 * | 0772-772 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg | R | 0,0911 | 0,0911 | | |
| B-15 ** | 0772-772 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg | R | 0,0749 | 0,0749 | | |
| B-15 *** | 0772-772 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg | R | 0,0925 | 0,0925 | 0,0187 | 0,0312 |
| LOGIMAT 10 | | RECORDATI | | ATC: C07FB02 | | | | |
| B-20 | 1281-294 | 28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg | R | 14,90 | 14,90 | 1,90 | 3,16 |
| | 1281-294 | | | | 7,15 | 7,15 | | |
| B-20 * | 0745-059 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg | R | 0,3296 | 0,3296 | | |
| B-20 ** | 0745-059 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg | R | 0,2707 | 0,2707 | | |
| B-20 *** | 0745-059 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg | R | 0,3347 | 0,3347 | 0,0679 | 0,1129 |
| LOGIMAT 5 | | RECORDATI | | ATC: C07FB02 | | | | |
| B-20 | 1170-786 | 28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg | R | 11,93 | 11,93 | 1,29 | 2,16 |
| | 1170-786 | | | | 4,88 | 4,88 | | |
| B-20 * | 0744-474 | 1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg | R | 0,2250 | 0,2250 | | |
| B-20 ** | 0744-474 | 1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg | R | 0,1846 | 0,1846 | | |
| B-20 *** | 0744-474 | 1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg | R | 0,2283 | 0,2283 | 0,0461 | 0,0771 |
| LOORTAN 100 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09CA01 | | | | |
| B-224 | 2116-473 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 22,75 | 22,75 | 3,48 | 5,81 |
| | 2116-473 | | | | 13,14 | 13,14 | | |
| B-224 * | 0776-344 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1731 | 0,1731 | | |
| B-224 ** | 0776-344 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1421 | 0,1421 | | |
| B-224 *** | 0776-344 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 |
| LOORTAN 50 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09CA01 | | | | |
| B-224 | 1415-959 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 22,75 | 22,75 | 3,48 | 5,81 |
| | 1415-959 | | | | 13,14 | 13,14 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 * | 0745-711 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1731 | 0,1731 | | |
| B-224 ** | 0745-711 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1421 | 0,1421 | | |
| B-224 *** | 0745-711 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 |
| LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09DA01 | | | | |
| B-224 | 2828-507 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg | R | 29,34 | 29,34 | 4,52 | 7,59 |
| | 2828-507 | | | | 18,85 | 18,85 | | |
| B-224 * | 0756-403 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg | R | 0,2483 | 0,2483 | | |
| B-224 ** | 0756-403 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg | R | 0,2039 | 0,2039 | | |
| B-224 *** | 0756-403 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg | R | 0,2429 | 0,2429 | 0,0461 | 0,0774 |
| LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09DA01 | | | | |
| B-224 | 1477-611 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | R | 23,83 | 23,83 | 3,73 | 6,21 |
| | 1477-611 | | | | 14,05 | 14,05 | | |
| B-224 * | 0760-751 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | R | 0,1850 | 0,1850 | | |
| B-224 ** | 0760-751 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | R | 0,1519 | 0,1519 | | |
| B-224 *** | 0760-751 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | R | 0,1867 | 0,1867 | 0,0381 | 0,0634 |
| LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09DA01 | | | | |
| B-224 | 2203-305 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg | R | 23,83 | 23,83 | 3,73 | 6,21 |
| | 2203-305 | | | | 14,05 | 14,05 | | |
| B-224 * | 0779-769 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1850 | 0,1850 | | |
| B-224 ** | 0779-769 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1519 | 0,1519 | | |
| B-224 *** | 0779-769 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1867 | 0,1867 | 0,0381 | 0,0634 |
| LORATADINE EG 10 mg | | EG | | ATC: R06AX13 | | | | |
| Cs-7 | 2275-873 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,54 | 10,54 | 4,05 | 4,05 |
| | 2275-873 | | | | 3,82 | 3,82 | | |
| Cs-7 | 3111-432 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 18,55 | 18,55 | 10,53 | 10,53 |
| | 3111-432 | | | | 9,93 | 9,93 | | |
| Cs-7 * | 0781-146 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1281 | 0,1281 | | |
| Cs-7 ** | 0781-146 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1053 | 0,1053 | | |
| Cs-7 *** | 0781-146 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1302 | 0,1302 | 0,1053 | 0,1053 |
| LORATADINE SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: R06AX13 | | | | |
| Cs-7 | 1791-151 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 9,62 | 9,62 | 3,31 | 3,31 |
| | 1791-151 | | | | 3,12 | 3,12 | | |
| Cs-7 | 2578-607 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 17,33 | 17,33 | 9,55 | 9,55 |
| | 2578-607 | | | | 9,00 | 9,00 | | |
| Cs-7 * | 0774-521 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1161 | 0,1161 | | |
| Cs-7 ** | 0774-521 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0954 | 0,0954 | | |
| Cs-7 *** | 0774-521 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1180 | 0,1180 | 0,0955 | 0,0955 |
| LORATADINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R06AX13 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| Cs-7 | 2086-403 2086-403 | 50 comprimés, 10 mg | 50 tabletten, 10 mg | G | 9,50 3,03 | 9,50 3,03 | 3,21 | 3,21 |
| Cs-7 * | 0775-965 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0782 | 0,0782 | | |
| Cs-7 ** | 0775-965 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0642 | 0,0642 | | |
| Cs-7 *** | 0775-965 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,0793 | 0,0793 | 0,0642 | 0,0642 |
| LOSARTAN AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 4393-245 4393-245 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 21,53 12,20 | 21,53 12,20 | 3,24 | 5,39 |
| B-224 * | 7732-290 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1606 | 0,1606 | | |
| B-224 ** | 7732-290 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1319 | 0,1319 | | |
| B-224 *** | 7732-290 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1632 | 0,1632 | 0,0331 | 0,0550 |
| LOSARTAN AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 4393-252 4393-252 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 21,53 12,20 | 21,53 12,20 | 3,24 | 5,39 |
| B-224 * | 7732-282 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1606 | 0,1606 | | |
| B-224 ** | 7732-282 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1319 | 0,1319 | | |
| B-224 *** | 7732-282 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1632 | 0,1632 | 0,0331 | 0,0550 |
| LOSARTAN EG 100 mg EG ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2573-160 2573-160 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 22,54 12,98 | 22,54 12,98 | 3,44 | 5,74 |
| B-224 * | 0792-556 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1709 | 0,1709 | | |
| B-224 ** | 0792-556 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1404 | 0,1404 | | |
| B-224 *** | 0792-556 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1735 | 0,1735 | 0,0351 | 0,0586 |
| LOSARTAN EG 50 mg EG ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2573-186 2573-186 | 28 comprimés pelliculés, 50 mg | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 13,73 6,26 | 13,73 6,26 | 1,66 | 2,77 |
| B-224 | 2573-202 2573-202 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 22,54 12,98 | 22,54 12,98 | 3,44 | 5,74 |
| B-224 * | 0792-549 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1709 | 0,1709 | | |
| B-224 ** | 0792-549 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1404 | 0,1404 | | |
| B-224 *** | 0792-549 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1735 | 0,1735 | 0,0351 | 0,0586 |
| LOSARTAN KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 3026-556 3026-556 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 21,53 12,20 | 21,53 12,20 | 3,24 | 5,39 |
| B-224 * | 7703-465 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1606 | 0,1606 | | |
| B-224 ** | 7703-465 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1319 | 0,1319 | | |
| B-224 *** | 7703-465 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1632 | 0,1632 | 0,0331 | 0,0550 |
| LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 3026-473 3026-473 | 28 comprimés pelliculés, 50 mg | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 13,73 6,26 | 13,73 6,26 | 1,66 | 2,77 |
| B-224 | 3026-507 3026-507 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 21,53 12,20 | 21,53 12,20 | 3,24 | 5,39 |
| B-224 * | 7703-457 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1606 | 0,1606 | | |
| B-224 ** | 7703-457 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1319 | 0,1319 | | |
| B-224 *** | 7703-457 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1632 | 0,1632 | 0,0331 | 0,0550 |

| LOSARTAN MYLAN 100 mg | | VIATRIS | | ATC: C09CA01 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-224 | 4216-834 4216-834 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 23,08 13,40 | 23,08 13,40 | 3,55 | 5,92 | |
| B-224 * | 0794-081 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1729 | 0,1729 | | | |
| B-224 ** | 0794-081 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1420 | 0,1420 | | | |
| B-224 *** | 0794-081 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1754 | 0,1754 | 0,0355 | 0,0592 | |
| LOSARTAN MYLAN 50 mg | | VIATRIS | | ATC: C09CA01 | | | | | |
| B-224 | 4216-826 4216-826 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 23,08 13,40 | 23,08 13,40 | 3,55 | 5,92 | |
| B-224 * | 0794-073 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1729 | 0,1729 | | | |
| B-224 ** | 0794-073 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1420 | 0,1420 | | | |
| B-224 *** | 0794-073 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1754 | 0,1754 | 0,0355 | 0,0592 | |
| LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg | | EG | | ATC: C09DA01 | | | | | |
| B-224 | 2926-780 2926-780 | 98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg | G | 25,10 15,16 | 25,10 15,16 | 3,93 | 6,59 | |
| B-224 * | 0751-610 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg | G | 0,1996 | 0,1996 | | | |
| B-224 ** | 0751-610 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg | G | 0,1640 | 0,1640 | | | |
| B-224 *** | 0751-610 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg | G | 0,1997 | 0,1997 | 0,0401 | 0,0672 | |
| LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg | | EG | | ATC: C09DA01 | | | | | |
| B-224 | 2659-183 2659-183 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg | G | 22,54 12,98 | 22,54 12,98 | 3,44 | 5,74 | |
| B-224 * | 0795-484 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1709 | 0,1709 | | | |
| B-224 ** | 0795-484 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1404 | 0,1404 | | | |
| B-224 *** | 0795-484 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg | G | 0,1735 | 0,1735 | 0,0351 | 0,0586 | |
| LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg | | EG | | ATC: C09DA01 | | | | | |
| B-224 | 2659-191 2659-191 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg | G | 22,54 12,98 | 22,54 12,98 | 3,44 | 5,74 | |
| B-224 * | 0795-492 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1709 | 0,1709 | | | |
| B-224 ** | 0795-492 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1404 | 0,1404 | | | |
| B-224 *** | 0795-492 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg | G | 0,1735 | 0,1735 | 0,0351 | 0,0586 | |
| LOSARTAN SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA01 | | | | | |
| B-224 | 2589-018 2589-018 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 22,75 13,14 | 22,75 13,14 | 3,48 | 5,81 | |
| B-224 * | 0793-521 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1731 | 0,1731 | | | |
| B-224 ** | 0793-521 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1421 | 0,1421 | | | |
| B-224 *** | 0793-521 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 | |
| LOSARTAN SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA01 | | | | | |
| B-224 | 2589-034 | 28 comprimés pelliculés, 50 mg | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 13,43 | 13,43 | 1,60 | 2,66 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-224 | 2589-034 2589-042 | 56 comprimés pelliculés, 50 mg | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 6,02 18,39 | 6,02 18,39 | 2,60 | 4,34 |
| B-224 | 2589-042 2589-059 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 9,81 22,75 | 9,81 22,75 | 3,48 | 5,81 |
| B-224 * | 2589-059 0793-513 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 13,14 0,1731 | 13,14 0,1731 | | |
| B-224 ** | 0793-513 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1421 | 0,1421 | | |
| B-224 *** | 0793-513 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1757 | 0,1757 | 0,0355 | 0,0593 |
| LOSARTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2601-656 2601-656 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 21,56 12,23 | 21,56 12,23 | 3,24 | 5,41 |
| B-224 * | 0793-372 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1610 | 0,1610 | | |
| B-224 ** | 0793-372 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1322 | 0,1322 | | |
| B-224 *** | 0793-372 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1635 | 0,1635 | 0,0331 | 0,0552 |
| LOSARTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01 | | | | | | | | |
| B-224 | 2601-649 2601-649 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 21,56 12,23 | 21,56 12,23 | 3,24 | 5,41 |
| B-224 * | 0793-364 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1610 | 0,1610 | | |
| B-224 ** | 0793-364 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1322 | 0,1322 | | |
| B-224 *** | 0793-364 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1635 | 0,1635 | 0,0331 | 0,0552 |
| LOTRIDERM ORGANON BELGIUM BV ATC: D01AC20 | | | | | | | | |
| B-155 | 0861-955 0861-955 | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g | | 9,69 3,17 | 9,69 3,17 | 0,84 | 1,40 |
| B-155 * | 0710-954 | 1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g | | 0,1363 | 0,1363 | | |
| B-155 ** | 0710-954 | 1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g | | 0,1120 | 0,1120 | | |
| LUTENYL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited ATC: G03DB04 | | | | | | | | |
| B-90 | 1559-665 1559-665 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | R | 13,05 5,73 | 13,05 5,73 | 1,52 | 2,53 |
| B-90 | 2678-498 2678-498 | 90 comprimés, 5 mg | 90 tabletten, 5 mg | R | 23,19 13,50 | 23,19 13,50 | 3,58 | 5,97 |
| B-90 * | 0763-946 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1936 | 0,1936 | | |
| B-90 ** | 0763-946 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1590 | 0,1590 | | |
| B-90 *** | 0763-946 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1962 | 0,1962 | 0,0398 | 0,0663 |
| LYRICA 150 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 2159-168 2159-168 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | R | 19,55 10,70 | 19,55 10,70 | 2,84 | 4,73 |
| B-262 | 2616-472 2616-472 | 200 gélules, 150 mg | 200 capsules, hard, 150 mg | R | 66,26 50,98 | 66,26 50,98 | 9,66 | 15,50 |
| B-262 * | 0781-815 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,3058 | 0,3058 | | |
| B-262 ** | 0781-815 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,2702 | 0,2702 | | |
| B-262 *** | 0781-815 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,3036 | 0,3036 | 0,0483 | 0,0775 |
| LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 3340-528 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | R | 18,77 | 18,77 | 2,68 | 4,46 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-262 | 3340-528 3398-781 | 200 gélules, 150 mg | 200 capsules, hard, 150 mg | R | 10,10 65,12 | 10,10 65,12 | 9,50 | 15,50 |
| | 3398-781 | | | | 49,98 | 49,98 | | |
| B-262 * | 7716-665 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,3005 | 0,3005 | | |
| B-262 ** | 7716-665 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,2649 | 0,2649 | | |
| B-262 *** | 7716-665 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | R | 0,2979 | 0,2979 | 0,0475 | 0,0775 |
| LYRICA 25 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3209-137 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | R | 14,03 | 14,03 | 1,72 | 2,87 |
| | 3209-137 | | | | 6,49 | 6,49 | | |
| B-262 * | 7713-704 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | R | 0,0838 | 0,0838 | | |
| B-262 ** | 7713-704 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | R | 0,0688 | 0,0688 | | |
| B-262 *** | 7713-704 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | R | 0,0850 | 0,0850 | 0,0172 | 0,0287 |
| LYRICA 300 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 2159-192 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | R | 35,27 | 35,27 | 5,34 | 8,98 |
| | 2159-192 | | | | 24,01 | 24,01 | | |
| B-262 | 2616-480 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | R | 95,24 | 95,24 | 10,20 | 15,50 |
| | 2616-480 | | | | 76,98 | 76,98 | | |
| B-262 * | 0781-823 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,4436 | 0,4436 | | |
| B-262 ** | 0781-823 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,4080 | 0,4080 | | |
| B-262 *** | 0781-823 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,4485 | 0,4485 | 0,0510 | 0,0775 |
| LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 2825-057 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | R | 35,27 | 35,27 | 5,34 | 8,98 |
| | 2825-057 | | | | 24,01 | 24,01 | | |
| B-262 | 3398-799 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | R | 93,58 | 93,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 3398-799 | | | | 75,46 | 75,46 | | |
| B-262 * | 0757-237 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,4355 | 0,4355 | | |
| B-262 ** | 0757-237 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,4000 | 0,4000 | | |
| B-262 *** | 0757-237 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,4402 | 0,4402 | 0,0510 | 0,0775 |
| LYRICA 75 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 2159-135 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | R | 15,23 | 15,23 | 1,96 | 3,27 |
| | 2159-135 | | | | 7,40 | 7,40 | | |
| B-262 | 2620-839 | 200 gélules, 75 mg | 200 capsules, hard, 75 mg | R | 40,50 | 40,50 | 6,07 | 10,21 |
| | 2620-839 | | | | 28,56 | 28,56 | | |
| B-262 * | 0781-807 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | R | 0,1843 | 0,1843 | | |
| B-262 ** | 0781-807 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | R | 0,1514 | 0,1514 | | |
| B-262 *** | 0781-807 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | R | 0,1748 | 0,1748 | 0,0303 | 0,0510 |
| LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3340-510 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | R | 14,30 | 14,30 | 1,77 | 2,96 |
| | 3340-510 | | | | 6,69 | 6,69 | | |
| B-262 * | 7716-657 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | R | 0,1541 | 0,1541 | | |
| B-262 ** | 7716-657 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | R | 0,1266 | 0,1266 | | |
| B-262 *** | 7716-657 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | R | 0,1565 | 0,1565 | 0,0316 | 0,0529 |

| LYSOMUCIL 600 | | ZAMBON | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: R05CB01 | |
|-------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|---------------|
| | 0734-814 | 60 comprimés effervescents, 600 mg | 60 bruistabletten, 600 mg | | 7,44 | 7,44 | |
| C-27 * | 0734-814 | 1 comprimé effervescent, 600 mg | 1 bruistablet, 600 mg | R | 0,1600 | 0,1600 | |
| C-27 ** | 0734-814 | 1 comprimé effervescent, 600 mg | 1 bruistablet, 600 mg | R | 0,1315 | 0,1315 | |
| LYSOMUCIL 600 | | ZAMBON | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: R05CB01 | |
| | 0762-153 | 60 sachet-doses 1 doses granuléés pour solution buvable, 600 mg | 60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg | | 7,44 | 7,44 | |
| C-27 * | 0762-153 | 1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg | 1 sachet 1 doses drank, 600 mg | R | 0,1600 | 0,1600 | |
| C-27 ** | 0762-153 | 1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg | 1 sachet 1 doses drank, 600 mg | R | 0,1315 | 0,1315 | |
| M-M-RVAXPRO | | MSD BELGIUM | | | | ATC: J07BD52 | |
| B-201 | 2324-911 | 1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose | 1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis | | 26,45 | 26,45 | 4,11 6,91 |
| | 2324-911 | | | | 16,33 | 16,33 | |
| B-201 * | 7728-124 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis | | 21,0700 | 21,0700 | |
| B-201 ** | 7728-124 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis | | 17,3100 | 17,3100 | |
| MACLAR | | VIATRIS | | | | ATC: J01FA09 | |
| C-37 | 1244-540 | 60 comprimés enrobés, 500 mg | 60 omhulde tabletten, 500 mg | R | 49,52 | 49,52 | 10,20 15,50 |
| | 1244-540 | | | | 36,41 | 36,41 | |
| C-37 * | 0745-372 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,7617 | 0,7617 | |
| C-37 ** | 0745-372 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,6432 | 0,6432 | |
| C-37 *** | 0745-372 | 1 comprimé enrobé, 500 mg | 1 omhulde tablet, 500 mg | R | 0,7332 | 0,7332 | 0,1700 0,2583 |
| MARCOUMAR | | VIATRIS | | | | ATC: B01AA04 | |
| B-34 | 0119-065 | 25 comprimés, 3 mg | 25 tabletten, 3 mg | | 7,90 | 7,90 | 0,46 0,76 |
| | 0119-065 | | | | 1,72 | 1,72 | |
| B-34 * | 0711-291 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | | 0,0888 | 0,0888 | |
| B-34 ** | 0711-291 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | | 0,0728 | 0,0728 | |
| B-34 *** | 0711-291 | 1 comprimé, 3 mg | 1 tablet, 3 mg | | 0,0946 | 0,0946 | 0,0184 0,0304 |
| MAREVAN | | THERABEL PHARMA | | | | ATC: B01AA03 | |
| B-34 | 4193-645 | 60 comprimés, 5 mg | 60 tabletten, 5 mg | | 14,84 | 14,84 | 1,88 3,14 |
| | 4193-645 | | | | 7,10 | 7,10 | |
| B-34 * | 0711-309 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,1527 | 0,1527 | |
| B-34 ** | 0711-309 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,1255 | 0,1255 | |
| B-34 *** | 0711-309 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,1551 | 0,1551 | 0,0313 0,0523 |
| MATRIFEN 100 µg/h | | ISTITUTO GENTILI | | | | ATC: N02AB03 | |
| B-56 | 2385-565 | 5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 53,94 | 53,94 | 7,94 12,50 |
| | 2385-565 | | | | 40,26 | 40,26 | |
| B-56 | 2385-573 | 10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 90,64 | 90,64 | 8,30 12,50 |
| | 2385-573 | | | | 72,78 | 72,78 | |
| B-56 * | 0786-277 | 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 8,4260 | 8,4260 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|------|-------|
| B-56 ** | 0786-277 | µg/h 1 dispositif transdermique, 100 µg/h | gebruik, 100 µg/h 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h | G | 7,7150 | 7,7150 | | |
| MATRIFEN 12 µg/h | | ISTITUTO GENTILI | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2524-163 | 2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h | 2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 9,95 | 9,95 | 0,89 | 1,49 |
| | 2524-163 | | | | 3,37 | 3,37 | | |
| B-56 | 2385-441 | 5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 16,50 | 16,50 | 2,22 | 3,70 |
| | 2385-441 | | | | 8,37 | 8,37 | | |
| B-56 | 2385-458 | 10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 26,66 | 26,66 | 4,14 | 6,96 |
| | 2385-458 | | | | 16,51 | 16,51 | | |
| B-56 * | 0786-228 | 1 dispositif transdermique, 12 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 2,1310 | 2,1310 | | |
| B-56 ** | 0786-228 | 1 dispositif transdermique, 12 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h | G | 1,7500 | 1,7500 | | |
| MATRIFEN 25 µg/h | | ISTITUTO GENTILI | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2524-189 | 2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 11,56 | 11,56 | 1,22 | 2,03 |
| | 2524-189 | | | | 4,60 | 4,60 | | |
| B-56 | 2385-474 | 5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 20,47 | 20,47 | 3,02 | 5,03 |
| | 2385-474 | | | | 11,39 | 11,39 | | |
| B-56 | 2385-482 | 10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 30,48 | 30,48 | 4,67 | 7,86 |
| | 2385-482 | | | | 19,84 | 19,84 | | |
| B-56 * | 0786-236 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 2,5600 | 2,5600 | | |
| B-56 ** | 0786-236 | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | G | 2,1030 | 2,1030 | | |
| MATRIFEN 50 µg/h | | ISTITUTO GENTILI | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2385-508 | 5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 32,93 | 32,93 | 5,02 | 8,43 |
| | 2385-508 | | | | 21,98 | 21,98 | | |
| B-56 | 2385-516 | 10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 56,79 | 56,79 | 8,30 | 12,50 |
| | 2385-516 | | | | 42,74 | 42,74 | | |
| B-56 * | 0786-244 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 5,2410 | 5,2410 | | |
| B-56 ** | 0786-244 | 1 dispositif transdermique, 50 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h | G | 4,5300 | 4,5300 | | |
| MATRIFEN 75 µg/h | | ISTITUTO GENTILI | | | ATC: N02AB03 | | | |
| B-56 | 2385-532 | 5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 44,11 | 44,11 | 6,57 | 11,06 |
| | 2385-532 | | | | 31,70 | 31,70 | | |
| B-56 | 2385-540 | 10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 75,86 | 75,86 | 8,30 | 12,50 |
| | 2385-540 | | | | 59,34 | 59,34 | | |
| B-56 * | 0786-251 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 7,0010 | 7,0010 | | |
| B-56 ** | 0786-251 | 1 dispositif transdermique, 75 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h | G | 6,2900 | 6,2900 | | |

| MAXIDEX | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01BA01 | | | |
|-------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-165 | 0119-172 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml | | 7,57 | 7,57 | 0,38 | 0,63 | |
| | 0119-172 | | | | 1,43 | 1,43 | | | |
| B-165 * | 0711-366 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL | | 1,8500 | 1,8500 | | | |
| B-165 ** | 0711-366 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL | | 1,5200 | 1,5200 | | | |
| MAXITROL | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01CA01 | | | |
| B-166 | 0119-180 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie | | 8,84 | 8,84 | 0,67 | 1,11 | |
| | 0119-180 | | | | 2,52 | 2,52 | | | |
| B-166 * | 0711-416 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL | | 3,2500 | 3,2500 | | | |
| B-166 ** | 0711-416 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL | | 2,6700 | 2,6700 | | | |
| MAXITROL | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01CA01 | | | |
| B-166 | 0119-198 | 3,5 g pommade ophtalmique | 3,5 g oogzalf | | 8,08 | 8,08 | 0,50 | 0,83 | |
| | 0119-198 | | | | 1,88 | 1,88 | | | |
| B-166 * | 0711-424 | 1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g | 1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g | | 2,4300 | 2,4300 | | | |
| B-166 ** | 0711-424 | 1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g | 1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g | | 1,9900 | 1,9900 | | | |
| MEDROL 32 mg | | Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | |
| A-27 | 0895-540 | 20 comprimés, 32 mg | 20 tabletten, 32 mg | R | 16,97 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0895-540 | | | | 8,73 | 8,73 | | | |
| A-27 * | 0725-887 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | R | 0,5635 | 0,5635 | | | |
| A-27 ** | 0725-887 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | R | 0,4625 | 0,4625 | | | |
| A-27 *** | 0725-887 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | R | 0,5719 | 0,5719 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MEDROL 32 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | | ATC: H02AB04 | | | |
| A-27 | 2976-413 | 20 comprimés, 32 mg | 20 tabletten, 32 mg | R | 16,97 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2976-413 | | | | 8,73 | 8,73 | | | |
| A-27 * | 7700-552 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | R | 0,5635 | 0,5635 | | | |
| A-27 ** | 7700-552 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | R | 0,4625 | 0,4625 | | | |
| A-27 *** | 7700-552 | 1 comprimé, 32 mg | 1 tablet, 32 mg | R | 0,5719 | 0,5719 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MEDROL 4 mg | | Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | |
| B-83 | 0056-028 | 30 comprimés, 4 mg | 30 tabletten, 4 mg | R | 8,36 | 8,36 | 0,56 | 0,94 | |
| | 0056-028 | | | | 2,13 | 2,13 | | | |
| B-83 * | 0711-473 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | R | 0,0917 | 0,0917 | | | |
| B-83 ** | 0711-473 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | R | 0,0753 | 0,0753 | | | |
| B-83 *** | 0711-473 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | R | 0,0943 | 0,0943 | 0,0187 | 0,0313 | |
| MEDROL A 16 mg | | Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | |
| B-83 | 0056-259 | 14 comprimés, 16 mg | 14 tabletten, 16 mg | R | 10,52 | 10,52 | 1,01 | 1,68 | |
| | 0056-259 | | | | 3,80 | 3,80 | | | |
| B-83 | 0055-996 | 50 comprimés, 16 mg | 50 tabletten, 16 mg | R | 19,72 | 19,72 | 2,87 | 4,79 | |
| | 0055-996 | | | | 10,83 | 10,83 | | | |
| B-83 * | 0711-481 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2796 | 0,2796 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-83 ** | 0711-481 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2296 | 0,2296 | | |
| B-83 *** | 0711-481 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2837 | 0,2837 | 0,0574 | 0,0958 |
| MEDROL A 16 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 2976-405 | 50 comprimés, 16 mg | 50 tabletten, 16 mg | R | 18,32 | 18,32 | 2,59 | 4,31 |
| | 2976-405 | | | | 9,76 | 9,76 | | |
| B-83 * | 7700-545 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2520 | 0,2520 | | |
| B-83 ** | 7700-545 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2070 | 0,2070 | | |
| B-83 *** | 7700-545 | 1 comprimé, 16 mg | 1 tablet, 16 mg | R | 0,2557 | 0,2557 | 0,0518 | 0,0862 |
| MEGACE 160 mg | | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | | ATC: L02AB01 | | | | |
| A-27 | 1182-591 | 30 comprimés, 160 mg | 30 tabletten, 160 mg | | 43,05 | 43,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 1182-591 | | | | 30,78 | 30,78 | | |
| A-27 * | 0743-252 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | | 1,3240 | 1,3240 | | |
| A-27 ** | 0743-252 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | | 1,0877 | 1,0877 | | |
| A-27 *** | 0743-252 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | | 1,2504 | 1,2504 | 0,0000 | 0,0000 |
| MELOXICAM EG 15 mg | | EG | | ATC: M01AC06 | | | | |
| B-63 | 2430-346 | 30 comprimés, 15 mg | 30 tabletten, 15 mg | G | 10,41 | 10,41 | 0,99 | 1,64 |
| | 2430-346 | | | | 3,72 | 3,72 | | |
| B-63 * | 0786-020 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1600 | 0,1600 | | |
| B-63 ** | 0786-020 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1313 | 0,1313 | | |
| B-63 *** | 0786-020 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1625 | 0,1625 | 0,0330 | 0,0547 |
| MELOXICAM TEVA 15 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: M01AC06 | | | | |
| B-63 | 2277-408 | 30 comprimés, 15 mg | 30 tabletten, 15 mg | G | 10,30 | 10,30 | 0,97 | 1,61 |
| | 2277-408 | | | | 3,64 | 3,64 | | |
| B-63 * | 0782-664 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1567 | 0,1567 | | |
| B-63 ** | 0782-664 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1287 | 0,1287 | | |
| B-63 *** | 0782-664 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1590 | 0,1590 | 0,0323 | 0,0537 |
| MELOXICAM TEVA 7,5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: M01AC06 | | | | |
| B-63 | 3016-748 | 30 comprimés, 7,5 mg | 30 tabletten, 7,5 mg | G | 8,27 | 8,27 | 0,54 | 0,91 |
| | 3016-748 | | | | 2,05 | 2,05 | | |
| B-63 | 3016-755 | 60 comprimés, 7,5 mg | 60 tabletten, 7,5 mg | G | 10,31 | 10,31 | 0,97 | 1,61 |
| | 3016-755 | | | | 3,65 | 3,65 | | |
| B-63 * | 7702-277 | 1 comprimé, 7,5 mg | 1 tablet, 7,5 mg | G | 0,0785 | 0,0785 | | |
| B-63 ** | 7702-277 | 1 comprimé, 7,5 mg | 1 tablet, 7,5 mg | G | 0,0645 | 0,0645 | | |
| B-63 *** | 7702-277 | 1 comprimé, 7,5 mg | 1 tablet, 7,5 mg | G | 0,0797 | 0,0797 | 0,0162 | 0,0268 |
| MELOXICAM VIATRIS 15 mg | | VIATRIS | | ATC: M01AC06 | | | | |
| B-63 | 2450-179 | 30 comprimés, 15 mg | 30 tabletten, 15 mg | G | 10,58 | 10,58 | 1,02 | 1,70 |
| | 2450-179 | | | | 3,85 | 3,85 | | |
| B-63 * | 0787-283 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1657 | 0,1657 | | |
| B-63 ** | 0787-283 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1360 | 0,1360 | | |
| B-63 *** | 0787-283 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | G | 0,1682 | 0,1682 | 0,0340 | 0,0567 |
| MERONEM I.V. | | Pfizer | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DH02 | |
| B-114 | 3727-443 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | R | 90,06 | 90,06 | 8,30 | 12,50 |
| | 3727-443 | | | | 72,25 | 72,25 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| B-114 * | 0745-414 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | R | 8,3700 | 8,3700 | | |
| B-114 ** | 0745-414 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | R | 7,6590 | 7,6590 | | |
| MEROPENEM EUGIA 1000 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DH02 | |
| B-114 | 4279-147 | 1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg | 1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 19,13 | 19,13 | 2,75 | 4,59 |
| | 4279-147 | | | | 10,38 | 10,38 | | |
| B-114 | 4279-154 | 10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg | 10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 124,69 | 124,69 | 8,30 | 12,50 |
| | 4279-154 | | | | 103,83 | 103,83 | | |
| B-114 * | 7729-403 | 1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg | 1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg | G | 11,7170 | 11,7170 | | |
| B-114 ** | 7729-403 | 1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg | 1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg | G | 11,0060 | 11,0060 | | |
| MEROPENEM EUGIA 500 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DH02 | |
| B-114 | 4279-139 | 10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg | 10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 73,87 | 73,87 | 8,30 | 12,50 |
| | 4279-139 | | | | 57,61 | 57,61 | | |
| B-114 | 4279-121 | 1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 13,08 | 13,08 | 1,53 | 2,55 |
| | 4279-121 | | | | 5,76 | 5,76 | | |
| B-114 * | 7729-395 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg | G | 6,8180 | 6,8180 | | |
| B-114 ** | 7729-395 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg | G | 6,1070 | 6,1070 | | |
| MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DH02 | |
| | 0757-708 | 1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g | 1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g | | 10,38 | 10,38 | | |
| B-114 * | 0757-708 | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g | 1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 13,4000 | 13,4000 | | |
| B-114 ** | 0757-708 | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g | 1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 11,0000 | 11,0000 | | |
| MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DH02 | |
| | 0757-716 | 1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g | | 10,38 | 10,38 | | |
| B-114 * | 0757-716 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 13,4000 | 13,4000 | | |
| B-114 ** | 0757-716 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 11,0000 | 11,0000 | | |
| MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DH02 | |
| | 0757-690 | 1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et | 1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en | | 10,38 | 10,38 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-114 * | 0757-690 | solution injectable, 1 g 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g | injectie, 1 g 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 13,4000 | 13,4000 | | |
| B-114 ** | 0757-690 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g | 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g | G | 11,0000 | 11,0000 | | |
| MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02 | | | | | | | | |
| | 0757-732 | 1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg | 1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | | 5,76 | 5,76 | | |
| B-114 * | 0757-732 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 7,4300 | 7,4300 | | |
| B-114 ** | 0757-732 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 6,1100 | 6,1100 | | |
| MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02 | | | | | | | | |
| | 0757-724 | 1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg | 1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | | 5,76 | 5,76 | | |
| B-114 * | 0757-724 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 7,4300 | 7,4300 | | |
| B-114 ** | 0757-724 | 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 6,1100 | 6,1100 | | |
| MEROPENEM KALCEKS 1 g GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02 | | | | | | | | |
| B-114 | 4770-491 | 10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg | 10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 90,06 | 90,06 | 8,30 | 12,50 |
| | 4770-491 | | | | 72,25 | 72,25 | | |
| B-114 * | 7740-004 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 8,3700 | 8,3700 | | |
| B-114 ** | 7740-004 | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G | 7,6590 | 7,6590 | | |
| MEROPENEM KALCEKS 500 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02 | | | | | | | | |
| B-114 | 4770-517 | 10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg | 10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 73,86 | 73,86 | 8,30 | 12,50 |
| | 4770-517 | | | | 57,60 | 57,60 | | |
| B-114 * | 7740-152 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 6,8170 | 6,8170 | | |
| B-114 ** | 7740-152 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G | 6,1060 | 6,1060 | | |
| MESTINON VIATRIS ATC: N07AA02 | | | | | | | | |
| B-81 | 0056-606 | 150 comprimés enrobés, 60 mg | 150 omhulde tabletten, 60 mg | | 36,47 | 36,47 | 5,51 | 9,27 |
| | 0056-606 | | | | 25,06 | 25,06 | | |
| B-81 * | 0711-721 | 1 gélule, 60 mg | 1 capsule, hard, 60 mg | | 0,2156 | 0,2156 | | |
| B-81 ** | 0711-721 | 1 gélule, 60 mg | 1 capsule, hard, 60 mg | | 0,1771 | 0,1771 | | |
| B-81 *** | 0711-721 | 1 gélule, 60 mg | 1 capsule, hard, 60 mg | | 0,2063 | 0,2063 | 0,0367 | 0,0618 |
| MESTINON VIATRIS ATC: N07AA02 | | | | | | | | |
| B-81 | 0056-622 | 50 comprimés, 10 mg | 50 tabletten, 10 mg | | 8,93 | 8,93 | 0,69 | 1,14 |
| | 0056-622 | | | | 2,59 | 2,59 | | |
| B-81 * | 0711-713 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0668 | 0,0668 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-------------|--------|--------|
| B-81 ** | 0711-713 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0550 | 0,0550 | | |
| B-81 *** | 0711-713 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0678 | 0,0678 | 0,0138 | 0,0228 |
| METFORMAX | | MENARINI BENELUX | | | ATC: A10BA02 | | | |
| A-13 | 1517-192 | 40 comprimés enrobés, 850 mg | 40 omhulde tabletten, 850 mg | R | 7,31 | 7,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 1517-192 | | | | 1,21 | 1,21 | | |
| A-13 | 1517-200 | 120 comprimés enrobés, 850 mg | 120 omhulde tabletten, 850 mg | R | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 1517-200 | | | | 2,88 | 2,88 | | |
| A-13 * | 0762-179 | 1 comprimé enrobé, 850 mg | 1 omhulde tablet, 850 mg | R | 0,0310 | 0,0310 | | |
| A-13 ** | 0762-179 | 1 comprimé enrobé, 850 mg | 1 omhulde tablet, 850 mg | R | 0,0254 | 0,0254 | | |
| A-13 *** | 0762-179 | 1 comprimé enrobé, 850 mg | 1 omhulde tablet, 850 mg | R | 0,0314 | 0,0314 | 0,0000 | 0,0000 |
| METFORMIN EG 500 mg | | EG | | | ATC: A10BA02 | | | |
| A-13 | 4782-074 | 60 comprimés pelliculés, 500 mg | 60 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 7,35 | 7,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 4782-074 | | | | 1,24 | 1,24 | | |
| A-13 * | 7739-444 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,0267 | 0,0267 | | |
| A-13 ** | 7739-444 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,0218 | 0,0218 | | |
| A-13 *** | 7739-444 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,0302 | 0,0302 | 0,0000 | 0,0000 |
| METFORMIN EG 850 mg | | EG | | | ATC: A10BA02 | | | |
| A-13 | 4782-116 | 40 comprimés pelliculés, 850 mg | 40 filmomhulde tabletten, 850 mg | G | 7,31 | 7,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 4782-116 | | | | 1,21 | 1,21 | | |
| A-13 | 4782-082 | 100 comprimés pelliculés, 850 mg | 100 filmomhulde tabletten, 850 mg | G | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4782-082 | | | | 2,40 | 2,40 | | |
| A-13 | 4782-090 | 100 comprimés pelliculés, 850 mg | 100 filmomhulde tabletten, 850 mg | G | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4782-090 | | | | 2,40 | 2,40 | | |
| A-13 | 4782-108 | 120 comprimés pelliculés, 850 mg | 120 filmomhulde tabletten, 850 mg | G | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 4782-108 | | | | 2,88 | 2,88 | | |
| A-13 * | 7739-451 | 1 comprimé pelliculé, 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 850 mg | G | 0,0310 | 0,0310 | | |
| A-13 ** | 7739-451 | 1 comprimé pelliculé, 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 850 mg | G | 0,0254 | 0,0254 | | |
| A-13 *** | 7739-451 | 1 comprimé pelliculé, 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 850 mg | G | 0,0314 | 0,0314 | 0,0000 | 0,0000 |
| METFORMINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | | ATC: A10BA02 | | | |
| A-13 | 2071-561 | 60 comprimés, 500 mg | 60 tabletten, 500 mg | G | 7,42 | 7,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 2071-561 | | | | 1,30 | 1,30 | | |
| A-13 * | 0763-201 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,0280 | 0,0280 | | |
| A-13 ** | 0763-201 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,0230 | 0,0230 | | |
| A-13 *** | 0763-201 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,0314 | 0,0314 | 0,0000 | 0,0000 |
| METFORMINE SANDOZ 850 mg | | SANDOZ | | | ATC: A10BA02 | | | |
| A-13 | 2071-579 | 100 comprimés, 850 mg | 100 tabletten, 850 mg | G | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 2071-579 | | | | 2,40 | 2,40 | | |
| A-13 * | 0763-219 | 1 comprimé, 850 mg | 1 tablet, 850 mg | G | 0,0310 | 0,0310 | | |
| A-13 ** | 0763-219 | 1 comprimé, 850 mg | 1 tablet, 850 mg | G | 0,0254 | 0,0254 | | |
| A-13 *** | 0763-219 | 1 comprimé, 850 mg | 1 tablet, 850 mg | G | 0,0315 | 0,0315 | 0,0000 | 0,0000 |
| METFORMINE VIATRIS 500 mg | | VIATRIS | | | ATC: A10BA02 | | | |
| A-13 | 1539-238 | 60 comprimés pelliculés, 500 mg | 60 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 1539-238 | | | | 1,15 | 1,15 | | |
| A-13 * | 0764-712 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,0247 | 0,0247 | | |
| A-13 ** | 0764-712 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,0203 | 0,0203 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| A-13 *** | 0764-712 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,0286 | 0,0286 | 0,0000 | 0,0000 | |
| METFORMINE VIATRIS 850 mg | | VIATRIS | | ATC: A10BA02 | | | | | |
| A-13 | 1539-246 | 100 comprimés pelliculés, 850 mg | 100 filmomhulde tabletten, 850 mg | G | 8,58 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1539-246 | | | | 2,32 | 2,32 | | | |
| A-13 * | 0763-573 | 1 comprimé pelliculé, 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 850 mg | G | 0,0299 | 0,0299 | | | |
| A-13 ** | 0763-573 | 1 comprimé pelliculé, 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 850 mg | G | 0,0246 | 0,0246 | | | |
| A-13 *** | 0763-573 | 1 comprimé pelliculé, 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 850 mg | G | 0,0304 | 0,0304 | 0,0000 | 0,0000 | |
| METHERGIN | | ESSENTIAL PHARMA | | ATC: G02AB01 | | | | | |
| B-93 | 0057-158 | 5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml | 5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml | | 7,45 | 7,45 | 0,35 | 0,59 | |
| | 0057-158 | | | | 1,33 | 1,33 | | | |
| B-93 * | 0711-747 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL | | 0,3440 | 0,3440 | | | |
| B-93 ** | 0711-747 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL | | 0,2820 | 0,2820 | | | |
| METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BA01 | | | | | |
| | 7705-098 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 31,27 | 31,27 | | | |
| A-24 * | 7705-098 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | G | 40,2600 | 40,2600 | | | |
| A-24 ** | 7705-098 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | G | 33,1500 | 33,1500 | | | |
| METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BA01 | | | | | |
| | 7705-080 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 5,49 | 5,49 | | | |
| A-24 * | 7705-080 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | G | 7,0800 | 7,0800 | | | |
| A-24 ** | 7705-080 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | G | 5,8200 | 5,8200 | | | |
| METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01BA01 | | | | | |
| | 7705-106 | 1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 62,55 | 62,55 | | | |
| A-24 * | 7705-106 | 1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | G | 73,4100 | 73,4100 | | | |
| A-24 ** | 7705-106 | 1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | G | 66,3000 | 66,3000 | | | |
| METOPROLOL EG 190 mg | | EG | | ATC: C07AB02 | | | | | |
| B-15 | 3922-044 | 100 comprimés à libération prolongée, 190 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg | G | 19,03 | 19,03 | 2,73 | 4,55 | |
| | 3922-044 | | | | 10,30 | 10,30 | | | |
| B-15 * | 7724-800 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1329 | 0,1329 | | | |
| B-15 ** | 7724-800 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1092 | 0,1092 | | | |
| B-15 *** | 7724-800 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1349 | 0,1349 | 0,0273 | 0,0455 | |
| METOPROLOL EG 95 mg | | EG | | ATC: C07AB02 | | | | | |
| B-15 | 3922-051 | 100 comprimés à libération prolongée, 95 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg | G | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 | |
| | 3922-051 | | | | 6,70 | 6,70 | | | |
| B-15 * | 7724-818 | 1 comprimé à libération prolongée, | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 | G | 0,0865 | 0,0865 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-15 ** | 7724-818 | 95 mg 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | mg 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0710 | 0,0710 | | |
| B-15 *** | 7724-818 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0879 | 0,0879 | 0,0178 | 0,0296 |
| METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 3136-868 | 100 comprimés à libération prolongée, 190 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg | G | 19,03 | 19,03 | 2,73 | 4,55 |
| | 3136-868 | | | | 10,30 | 10,30 | | |
| B-15 * | 7708-563 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1329 | 0,1329 | | |
| B-15 ** | 7708-563 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1092 | 0,1092 | | |
| B-15 *** | 7708-563 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1349 | 0,1349 | 0,0273 | 0,0455 |
| METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 3136-850 | 100 comprimés à libération prolongée, 95 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg | G | 13,47 | 13,47 | 1,61 | 2,68 |
| | 3136-850 | | | | 6,06 | 6,06 | | |
| B-15 * | 7708-555 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0782 | 0,0782 | | |
| B-15 ** | 7708-555 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0642 | 0,0642 | | |
| B-15 *** | 7708-555 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | 0,0161 | 0,0268 |
| METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg | | VIATRIS | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 2673-721 | 60 comprimés à libération prolongée, 190 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg | G | 12,67 | 12,67 | 1,45 | 2,41 |
| | 2673-721 | | | | 5,45 | 5,45 | | |
| B-15 | 2673-747 | 100 comprimés à libération prolongée, 190 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg | G | 19,03 | 19,03 | 2,73 | 4,55 |
| | 2673-747 | | | | 10,30 | 10,30 | | |
| B-15 * | 0797-472 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1329 | 0,1329 | | |
| B-15 ** | 0797-472 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1092 | 0,1092 | | |
| B-15 *** | 0797-472 | 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg | G | 0,1189 | 0,1189 | 0,0242 | 0,0402 |
| METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg | | VIATRIS | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 2673-754 | 100 comprimés à libération prolongée, 95 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg | G | 14,01 | 14,01 | 1,72 | 2,86 |
| | 2673-754 | | | | 6,47 | 6,47 | | |
| B-15 * | 0796-771 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0835 | 0,0835 | | |
| B-15 ** | 0796-771 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0686 | 0,0686 | | |
| B-15 *** | 0796-771 | 1 comprimé à libération prolongée, 95 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg | G | 0,0848 | 0,0848 | 0,0172 | 0,0286 |
| METOPROLOL TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 1517-184 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | G | 13,56 | 13,56 | 1,63 | 2,71 |
| | 1517-184 | | | | 6,13 | 6,13 | | |
| B-15 * | 0762-385 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0791 | 0,0791 | | |
| B-15 ** | 0762-385 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0650 | 0,0650 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-15 *** | 0762-385 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0802 | 0,0802 | 0,0163 | 0,0271 |
| METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: J01XD01 | | | | |
| | 0799-577 | 20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | | 46,77 | 46,77 | | |
| B-132 * | 0799-577 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 2,8345 | 2,8345 | | |
| B-132 ** | 0799-577 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 2,4790 | 2,4790 | | |
| MIACALCIC | | ESSENTIAL PHARMA | | ATC: H05BA01 | | | | |
| B-88 | 4679-833 | 5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL | 5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 27,28 | 27,28 | 4,23 | 7,10 |
| | 4679-833 | | | | 17,05 | 17,05 | | |
| B-88 * | 7737-190 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 4,4000 | 4,4000 | | |
| B-88 ** | 7737-190 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 3,6140 | 3,6140 | | |
| MICARDIS 40 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09CA07 | | | | |
| B-224 | 1478-932 | 28 comprimés, 40 mg | 28 tabletten, 40 mg | R | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 |
| | 1478-932 | | | | 6,70 | 6,70 | | |
| B-224 * | 0761-619 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,3089 | 0,3089 | | |
| B-224 ** | 0761-619 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,2536 | 0,2536 | | |
| B-224 *** | 0761-619 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,3138 | 0,3138 | 0,0636 | 0,1057 |
| MICARDIS 80 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09CA07 | | | | |
| B-224 | 1478-940 | 28 comprimés, 80 mg | 28 tabletten, 80 mg | R | 14,32 | 14,32 | 1,78 | 2,96 |
| | 1478-940 | | | | 6,70 | 6,70 | | |
| B-224 | 1522-960 | 98 comprimés, 80 mg | 98 tabletten, 80 mg | R | 31,34 | 31,34 | 4,79 | 8,06 |
| | 1522-960 | | | | 20,59 | 20,59 | | |
| B-224 * | 0761-601 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | R | 0,2711 | 0,2711 | | |
| B-224 ** | 0761-601 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | R | 0,2228 | 0,2228 | | |
| B-224 *** | 0761-601 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | R | 0,2634 | 0,2634 | 0,0489 | 0,0822 |
| MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09DA07 | | | | |
| B-224 | 1732-114 | 28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg | 28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg | R | 14,54 | 14,54 | 1,82 | 3,04 |
| | 1732-114 | | | | 6,88 | 6,88 | | |
| B-224 * | 0772-418 | 1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 40 mg / 12,5 mg | R | 0,3171 | 0,3171 | | |
| B-224 ** | 0772-418 | 1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 40 mg / 12,5 mg | R | 0,2604 | 0,2604 | | |
| B-224 *** | 0772-418 | 1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 40 mg / 12,5 mg | R | 0,3218 | 0,3218 | 0,0650 | 0,1086 |
| MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09DA07 | | | | |
| B-224 | 1732-130 | 98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg | R | 28,44 | 28,44 | 4,39 | 7,38 |
| | 1732-130 | | | | 18,06 | 18,06 | | |
| B-224 * | 0772-426 | 1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg / 12,5 mg | R | 0,2379 | 0,2379 | | |
| B-224 ** | 0772-426 | 1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg / 12,5 mg | R | 0,1953 | 0,1953 | | |
| B-224 *** | 0772-426 | 1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg / 12,5 mg | R | 0,2337 | 0,2337 | 0,0448 | 0,0753 |
| MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09DA07 | | | | |
| B-224 | 2920-239 | 98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg | 98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg | R | 28,02 | 28,02 | 4,33 | 7,28 |
| | 2920-239 | | | | 17,70 | 17,70 | | |
| B-224 * | 0751-750 | 1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg / 12,5 mg | R | 0,2331 | 0,2331 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 0751-750 | 1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg | R | 0,1914 | 0,1914 | | |
| B-224 *** | 0751-750 | 1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg | R | 0,2294 | 0,2294 | 0,0442 | 0,0743 |
| MICARDISPLUS 80 mg/25 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09DA07 | | | | |
| B-224 | 2572-618 | 98 comprimés, 80 mg / 25 mg | 98 tabletten, 80 mg / 25 mg | R | 28,44 | 28,44 | 4,39 | 7,38 |
| | 2572-618 | | | | 18,06 | 18,06 | | |
| B-224 * | 0790-808 | 1 comprimé, 80 mg/ 25 mg | 1 tablet, 80 mg/ 25 mg | R | 0,2379 | 0,2379 | | |
| B-224 ** | 0790-808 | 1 comprimé, 80 mg/ 25 mg | 1 tablet, 80 mg/ 25 mg | R | 0,1953 | 0,1953 | | |
| B-224 *** | 0790-808 | 1 comprimé, 80 mg/ 25 mg | 1 tablet, 80 mg/ 25 mg | R | 0,2337 | 0,2337 | 0,0448 | 0,0753 |
| MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 7701-345 | 10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml | 10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 2,90 | 2,90 | | |
| A-30 * | 7701-345 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,3740 | 0,3740 | | |
| A-30 ** | 7701-345 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,3070 | 0,3070 | | |
| MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 7701-360 | 10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml | 10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 21,43 | 21,43 | | |
| A-30 * | 7701-360 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 2,7660 | 2,7660 | | |
| A-30 ** | 7701-360 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 2,2720 | 2,2720 | | |
| MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 7701-352 | 10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml | 10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 6,84 | 6,84 | | |
| A-30 * | 7701-352 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 0,8830 | 0,8830 | | |
| A-30 ** | 7701-352 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 0,7250 | 0,7250 | | |
| MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 0787-465 | 20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml | 20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 9,23 | 9,23 | | |
| A-30 * | 0787-465 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,5955 | 0,5955 | | |
| A-30 ** | 0787-465 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,4890 | 0,4890 | | |
| MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 0787-473 | 10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml | 10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 10,89 | 10,89 | | |
| A-30 * | 0787-473 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 1,4050 | 1,4050 | | |
| A-30 ** | 0787-473 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 1,1540 | 1,1540 | | |
| MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 0787-481 | 20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml | 20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 68,53 | 68,53 | | |
| A-30 * | 0787-481 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 3,9875 | 3,9875 | | |
| A-30 ** | 0787-481 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 3,6320 | 3,6320 | | |
| MIDAZOLAM GRINDEKS 1mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 7741-275 | 10 ampoules 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | | 2,88 | 2,88 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| A-30 * | 7741-275 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,3720 | 0,3720 | | |
| A-30 ** | 7741-275 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,3050 | 0,3050 | | |
| MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 7741-291 | 10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 21,43 | 21,43 | | |
| A-30 * | 7741-291 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 2,7660 | 2,7660 | | |
| A-30 ** | 7741-291 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 2,2720 | 2,2720 | | |
| MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 7741-283 | 10 ampoules 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 6,81 | 6,81 | | |
| A-30 * | 7741-283 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 0,8790 | 0,8790 | | |
| A-30 ** | 7741-283 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 0,7220 | 0,7220 | | |
| MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 0795-005 | 10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml | 10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 2,88 | 2,88 | | |
| A-30 * | 0795-005 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,3720 | 0,3720 | | |
| A-30 ** | 0795-005 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 0,3050 | 0,3050 | | |
| MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 0795-013 | 10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml | 10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 6,81 | 6,81 | | |
| A-30 * | 0795-013 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 0,8790 | 0,8790 | | |
| A-30 ** | 0795-013 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 0,7220 | 0,7220 | | |
| MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: N05CD08 | | | | |
| | 0795-443 | 10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml | 10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 21,44 | 21,44 | | |
| A-30 * | 0795-443 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 2,7670 | 2,7670 | | |
| A-30 ** | 0795-443 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 2,2730 | 2,2730 | | |
| MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03BA02 | | | | |
| B-99 | 1625-938 | 120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose | 120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis | G | 12,72 | 12,72 | 1,45 | 2,42 |
| | 1625-938 | | | | 5,48 | 5,48 | | |
| B-99 * | 0768-143 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis | G | 0,0589 | 0,0589 | | |
| B-99 ** | 0768-143 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis | G | 0,0484 | 0,0484 | | |
| MINIRIN | | FERRING | | ATC: H01BA02 | | | | |
| A-9 | 0380-253 | 10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml | 10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml | r | 26,39 | 26,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 0380-253 | | | | 16,28 | 16,28 | | |
| A-9 * | 0729-574 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL | r | 2,1010 | 2,1010 | | |
| A-9 ** | 0729-574 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL | r | 1,7260 | 1,7260 | | |

| MINITRAN 10 | | VIATRIS | | ATC: C01DA02 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-3 | 1033-570 | 30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h | | 24,17 | 24,17 | 3,81 | 6,34 | |
| | 1033-570 | | | | 14,35 | 14,35 | | | |
| B-3 * | 0740-118 | 1 dispositif transdermique, 10 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h | | 0,6173 | 0,6173 | | | |
| B-3 ** | 0740-118 | 1 dispositif transdermique, 10 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h | | 0,5070 | 0,5070 | | | |
| MINITRAN 15 | | VIATRIS | | ATC: C01DA02 | | | | | |
| B-3 | 1033-596 | 30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h | | 31,92 | 31,92 | 4,87 | 8,19 | |
| | 1033-596 | | | | 21,09 | 21,09 | | | |
| B-3 * | 0740-126 | 1 dispositif transdermique, 15 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h | | 0,9073 | 0,9073 | | | |
| B-3 ** | 0740-126 | 1 dispositif transdermique, 15 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h | | 0,7453 | 0,7453 | | | |
| MINITRAN 5 | | VIATRIS | | ATC: C01DA02 | | | | | |
| B-3 | 1033-554 | 30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h | | 17,73 | 17,73 | 2,47 | 4,11 | |
| | 1033-554 | | | | 9,31 | 9,31 | | | |
| B-3 * | 0740-100 | 1 dispositif transdermique, 5 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h | | 0,4003 | 0,4003 | | | |
| B-3 ** | 0740-100 | 1 dispositif transdermique, 5 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h | | 0,3290 | 0,3290 | | | |
| MINO 50 | | TEOFARMA | | ATC: J01AA08 | | | | | |
| C-37 | 1074-087 | 42 comprimés pelliculés, 50 mg | 42 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 12,66 | 12,66 | 4,81 | 4,81 | |
| | 1074-087 | | | | 5,44 | 5,44 | | | |
| C-37 * | 0729-566 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1671 | 0,1671 | | | |
| C-37 ** | 0729-566 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1374 | 0,1374 | | | |
| C-37 *** | 0729-566 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1696 | 0,1696 | 0,1145 | 0,1145 | |
| MINOCYCLINE EG 100 mg | | EG | | ATC: J01AA08 | | | | | |
| C-37 | 3022-415 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 13,80 | 13,80 | 5,58 | 5,58 | |
| | 3022-415 | | | | 6,31 | 6,31 | | | |
| C-37 * | 7703-036 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2713 | 0,2713 | | | |
| C-37 ** | 7703-036 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2230 | 0,2230 | | | |
| C-37 *** | 7703-036 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2756 | 0,2756 | 0,1860 | 0,1860 | |
| MINOCYCLINE EG 50 mg | | EG | | ATC: J01AA08 | | | | | |
| C-37 | 3022-431 | 42 comprimés pelliculés, 50 mg | 42 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 12,90 | 12,90 | 4,97 | 4,97 | |
| | 3022-431 | | | | 5,62 | 5,62 | | | |
| C-37 * | 7703-028 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1726 | 0,1726 | | | |
| C-37 ** | 7703-028 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1419 | 0,1419 | | | |
| C-37 *** | 7703-028 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1754 | 0,1754 | 0,1183 | 0,1183 | |
| MINOTAB | | TEOFARMA | | ATC: J01AA08 | | | | | |
| C-37 | 1028-695 | 10 comprimés pelliculés, 100 mg | 10 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 8,61 | 8,61 | 2,08 | 2,08 | |
| | 1028-695 | | | | 2,35 | 2,35 | | | |
| C-37 * | 0740-092 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,3030 | 0,3030 | | | |
| C-37 ** | 0740-092 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2490 | 0,2490 | | | |
| C-37 *** | 0740-092 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,3074 | 0,3074 | 0,2080 | 0,2080 | |
| MIRTAZAPINE AB 15 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AX11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 | 2919-868 | 30 comprimés orodispersibles, 15 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 12,58 | 12,58 | 1,43 | 2,38 |
| | 2919-868 | | | | 5,38 | 5,38 | | |
| B-73 | 2896-116 | 90 comprimés orodispersibles, 15 mg | 90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 26,75 | 26,75 | 4,16 | 6,98 |
| | 2896-116 | | | | 16,60 | 16,60 | | |
| B-73 * | 0753-673 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2380 | 0,2380 | | |
| B-73 ** | 0753-673 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,1956 | 0,1956 | | |
| B-73 *** | 0753-673 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2358 | 0,2358 | 0,0462 | 0,0776 |
| MIRTAZAPINE AB 30 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N06AX11 | | | |
| B-73 | 2919-876 | 30 comprimés orodispersibles, 30 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 17,94 | 17,94 | 2,51 | 4,19 |
| | 2919-876 | | | | 9,47 | 9,47 | | |
| B-73 | 2896-124 | 90 comprimés orodispersibles, 30 mg | 90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 38,22 | 38,22 | 5,75 | 9,68 |
| | 2896-124 | | | | 26,58 | 26,58 | | |
| B-73 * | 0753-665 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3811 | 0,3811 | | |
| B-73 ** | 0753-665 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3130 | 0,3130 | | |
| B-73 *** | 0753-665 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3632 | 0,3632 | 0,0639 | 0,1076 |
| MIRTAZAPINE AB 45 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N06AX11 | | | |
| B-73 | 2896-132 | 90 comprimés orodispersibles, 45 mg | 90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg | G | 35,54 | 35,54 | 5,38 | 9,04 |
| | 2896-132 | | | | 24,24 | 24,24 | | |
| B-73 * | 0753-657 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | G | 0,3476 | 0,3476 | | |
| B-73 ** | 0753-657 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | G | 0,2854 | 0,2854 | | |
| B-73 *** | 0753-657 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | G | 0,3334 | 0,3334 | 0,0598 | 0,1004 |
| MIRTAZAPINE EG 15 mg | | EG | | | ATC: N06AX11 | | | |
| B-73 | 2205-714 | 30 comprimés pelliculés, 15 mg | 30 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 13,19 | 13,19 | 1,55 | 2,58 |
| | 2205-714 | | | | 5,84 | 5,84 | | |
| B-73 | 2205-706 | 60 comprimés pelliculés, 15 mg | 60 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 20,04 | 20,04 | 2,94 | 4,90 |
| | 2205-706 | | | | 11,08 | 11,08 | | |
| B-73 | 2526-085 | 100 comprimés pelliculés, 15 mg | 100 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 29,58 | 29,58 | 4,55 | 7,65 |
| | 2526-085 | | | | 19,06 | 19,06 | | |
| B-73 * | 0779-967 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2460 | 0,2460 | | |
| B-73 ** | 0779-967 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | | |
| B-73 *** | 0779-967 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | 0,0455 | 0,0765 |
| MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: N06AX11 | | | |
| B-73 | 4581-120 | 100 comprimés pelliculés, 15 mg | 100 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 29,58 | 29,58 | 4,55 | 7,65 |
| | 4581-120 | | | | 19,06 | 19,06 | | |
| B-73 * | 7735-285 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2460 | 0,2460 | | |
| B-73 ** | 7735-285 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | | |
| B-73 *** | 7735-285 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | 0,0455 | 0,0765 |
| MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N06AX11 | | | |
| B-73 | 3194-453 | 100 comprimés pelliculés, 15 mg | 100 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 29,58 | 29,58 | 4,55 | 7,65 |
| | 3194-453 | | | | 19,06 | 19,06 | | |
| B-73 * | 7719-891 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2460 | 0,2460 | | |
| B-73 ** | 7719-891 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73 *** | 7719-891 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | 0,0455 | 0,0765 |
| MIRTAZAPINE EG 30 mg | | EG | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2204-147 2204-147 | 60 comprimés pelliculés, 30 mg | 60 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 28,31 17,95 | 28,31 17,95 | 4,37 | 7,35 |
| B-73 | 2526-101 2526-101 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 44,14 31,73 | 44,14 31,73 | 6,58 | 11,07 |
| B-73 * | 0779-959 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,4074 | 0,4074 | | |
| B-73 ** | 0779-959 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3363 | 0,3363 | | |
| B-73 *** | 0779-959 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3861 | 0,3861 | 0,0658 | 0,1107 |
| MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 4581-138 4581-138 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 44,14 31,73 | 44,14 31,73 | 6,58 | 11,07 |
| B-73 * | 7735-293 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,4074 | 0,4074 | | |
| B-73 ** | 7735-293 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3363 | 0,3363 | | |
| B-73 *** | 7735-293 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3861 | 0,3861 | 0,0658 | 0,1107 |
| MIRTAZAPINE EG 45 mg | | EG | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2336-253 2336-253 | 50 comprimés pelliculés, 45 mg | 50 filmomhulde tabletten, 45 mg | G | 27,52 17,26 | 27,52 17,26 | 4,26 | 7,16 |
| B-73 | 2336-261 2336-261 | 100 comprimés pelliculés, 45 mg | 100 filmomhulde tabletten, 45 mg | G | 38,97 27,22 | 38,97 27,22 | 5,86 | 9,85 |
| B-73 * | 0783-613 | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | G | 0,3513 | 0,3513 | | |
| B-73 ** | 0783-613 | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | G | 0,2885 | 0,2885 | | |
| B-73 *** | 0783-613 | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | G | 0,3343 | 0,3343 | 0,0586 | 0,0985 |
| MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg | | EG | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2858-876 2858-876 | 30 comprimés orodispersibles, 15 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 13,19 5,84 | 13,19 5,84 | 1,55 | 2,58 |
| B-73 | 2858-835 2858-835 | 60 comprimés orodispersibles, 15 mg | 60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 20,04 11,08 | 20,04 11,08 | 2,94 | 4,90 |
| B-73 | 2858-868 2858-868 | 100 comprimés orodispersibles, 15 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 29,58 19,06 | 29,58 19,06 | 4,55 | 7,65 |
| B-73 * | 0755-454 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2460 | 0,2460 | | |
| B-73 ** | 0755-454 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | | |
| B-73 *** | 0755-454 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | 0,0455 | 0,0765 |
| MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg | | EG | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2858-827 2858-827 | 100 comprimés orodispersibles, 30 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 42,70 30,47 | 42,70 30,47 | 6,38 | 10,73 |
| B-73 * | 0755-447 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3932 | 0,3932 | | |
| B-73 ** | 0755-447 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3230 | 0,3230 | | |
| B-73 *** | 0755-447 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3716 | 0,3716 | 0,0638 | 0,1073 |
| MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2434-611 2434-611 | 30 comprimés orodispersibles, 15 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 13,03 5,72 | 13,03 5,72 | 1,52 | 2,53 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 | 2434-629 | 50 comprimés orodispersibles, 15 mg | 50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 16,46 | 16,46 | 2,21 | 3,69 |
| | 2434-629 | | | | 8,34 | 8,34 | | |
| B-73 | 2434-637 | 100 comprimés orodispersibles, 15 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 29,56 | 29,56 | 4,55 | 7,64 |
| | 2434-637 | | | | 19,04 | 19,04 | | |
| B-73 * | 0786-699 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2457 | 0,2457 | | |
| B-73 ** | 0786-699 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2018 | 0,2018 | | |
| B-73 *** | 0786-699 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 0,2403 | 0,2403 | 0,0455 | 0,0764 |
| MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ | | | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2434-645 | 30 comprimés orodispersibles, 30 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 18,82 | 18,82 | 2,69 | 4,48 |
| | 2434-645 | | | | 10,14 | 10,14 | | |
| B-73 | 2434-652 | 50 comprimés orodispersibles, 30 mg | 50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 23,21 | 23,21 | 3,59 | 5,98 |
| | 2434-652 | | | | 13,52 | 13,52 | | |
| B-73 | 2434-660 | 100 comprimés orodispersibles, 30 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | G | 42,68 | 42,68 | 6,37 | 10,72 |
| | 2434-660 | | | | 30,45 | 30,45 | | |
| B-73 * | 0786-707 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3930 | 0,3930 | | |
| B-73 ** | 0786-707 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3228 | 0,3228 | | |
| B-73 *** | 0786-707 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | G | 0,3714 | 0,3714 | 0,0637 | 0,1072 |
| MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ | | | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2434-678 | 30 comprimés orodispersibles, 45 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg | G | 19,98 | 19,98 | 2,92 | 4,87 |
| | 2434-678 | | | | 11,02 | 11,02 | | |
| B-73 | 2434-686 | 50 comprimés orodispersibles, 45 mg | 50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg | G | 27,34 | 27,34 | 4,24 | 7,12 |
| | 2434-686 | | | | 17,10 | 17,10 | | |
| B-73 | 2434-694 | 100 comprimés orodispersibles, 45 mg | 100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg | G | 38,64 | 38,64 | 5,81 | 9,77 |
| | 2434-694 | | | | 26,94 | 26,94 | | |
| B-73 * | 0786-715 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | G | 0,3477 | 0,3477 | | |
| B-73 ** | 0786-715 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | G | 0,2856 | 0,2856 | | |
| B-73 *** | 0786-715 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | G | 0,3310 | 0,3310 | 0,0581 | 0,0977 |
| MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg VIATRIS | | | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2201-408 | 30 comprimés pelliculés, 15 mg | 30 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 13,19 | 13,19 | 1,55 | 2,58 |
| | 2201-408 | | | | 5,84 | 5,84 | | |
| B-73 | 2201-416 | 50 comprimés pelliculés, 15 mg | 50 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 17,65 | 17,65 | 2,45 | 4,08 |
| | 2201-416 | | | | 9,24 | 9,24 | | |
| B-73 | 3380-854 | 100 comprimés pelliculés, 15 mg | 100 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 29,58 | 29,58 | 4,55 | 7,65 |
| | 3380-854 | | | | 19,06 | 19,06 | | |
| B-73 * | 0779-793 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2460 | 0,2460 | | |
| B-73 ** | 0779-793 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | | |
| B-73 *** | 0779-793 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | 0,0455 | 0,0765 |
| MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg VIATRIS | | | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 2201-424 | 30 comprimés pelliculés, 30 mg | 30 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 19,09 | 19,09 | 2,74 | 4,57 |
| | 2201-424 | | | | 10,34 | 10,34 | | |
| B-73 | 2201-432 | 50 comprimés pelliculés, 30 mg | 50 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 24,05 | 24,05 | 3,78 | 6,29 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73 | 2201-432 3380-862 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 14,24 44,14 | 14,24 44,14 | 6,58 | 11,07 |
| | 3380-862 | | | | 31,73 | 31,73 | | |
| B-73 * | 0779-801 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,4074 | 0,4074 | | |
| B-73 ** | 0779-801 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3363 | 0,3363 | | |
| B-73 *** | 0779-801 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3861 | 0,3861 | 0,0658 | 0,1107 |
| MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg VIATRIS ATC: N06AX11 | | | | | | | | |
| B-73 | 2201-440 | 30 comprimés pelliculés, 45 mg | 30 filmomhulde tabletten, 45 mg | G | 20,26 | 20,26 | 2,98 | 4,97 |
| | 2201-440 | | | | 11,24 | 11,24 | | |
| B-73 | 2201-465 | 50 comprimés pelliculés, 45 mg | 50 filmomhulde tabletten, 45 mg | G | 28,64 | 28,64 | 4,42 | 7,42 |
| | 2201-465 | | | | 18,24 | 18,24 | | |
| B-73 | 3380-870 | 100 comprimés pelliculés, 45 mg | 100 filmomhulde tabletten, 45 mg | G | 38,97 | 38,97 | 5,86 | 9,85 |
| | 3380-870 | | | | 27,22 | 27,22 | | |
| B-73 * | 0779-819 | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | G | 0,3513 | 0,3513 | | |
| B-73 ** | 0779-819 | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | G | 0,2885 | 0,2885 | | |
| B-73 *** | 0779-819 | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | G | 0,3343 | 0,3343 | 0,0586 | 0,0985 |
| MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DC03 | | | | | | | | |
| | 7715-899 | 5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg | 5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg | | 71,28 | 71,28 | | |
| A-25 * | 7715-899 | 1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg | 1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg | G | 16,5340 | 16,5340 | | |
| A-25 ** | 7715-899 | 1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg | 1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg | G | 15,1120 | 15,1120 | | |
| MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DC03 | | | | | | | | |
| | 7715-907 | 5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg | 5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg | | 142,56 | 142,56 | | |
| A-25 * | 7715-907 | 1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg | 1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg | G | 31,6440 | 31,6440 | | |
| A-25 ** | 7715-907 | 1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg | 1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg | G | 30,2220 | 30,2220 | | |
| MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB07 | | | | | | | | |
| | 0787-812 | 5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml | 5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml | | 374,87 | 374,87 | | |
| A-28 * | 0787-812 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 80,8940 | 80,8940 | | |
| A-28 ** | 0787-812 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 79,4720 | 79,4720 | | |
| MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB07 | | | | | | | | |
| | 0787-804 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml | | 37,50 | 37,50 | | |
| A-28 * | 0787-804 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 46,8600 | 46,8600 | | |
| A-28 ** | 0787-804 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL | G | 39,7500 | 39,7500 | | |
| MIVACRON ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 0745-208 | 5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 14,98 | 14,98 | | |
| B-140 * | 0745-208 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 3,8660 | 3,8660 | | |
| B-140 ** | 0745-208 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 3,1760 | 3,1760 | | |
| MIVACRON ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC10 | | | | | | | | |
| | 0745-190 | 5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 9,27 | 9,27 | | |
| B-140 * | 0745-190 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 2,3920 | 2,3920 | | |
| B-140 ** | 0745-190 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 1,9660 | 1,9660 | | |
| MOBIC BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: M01AC06 | | | | | | | | |
| B-63 | 1257-187 | 30 comprimés, 15 mg | 30 tabletten, 15 mg | R | 10,60 | 10,60 | 1,02 | 1,71 |
| | 1257-187 | | | | 3,86 | 3,86 | | |
| B-63 * | 0745-802 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 0,1660 | 0,1660 | | |
| B-63 ** | 0745-802 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 0,1363 | 0,1363 | | |
| B-63 *** | 0745-802 | 1 comprimé, 15 mg | 1 tablet, 15 mg | R | 0,1689 | 0,1689 | 0,0340 | 0,0570 |
| MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AG02 | | | | | | | | |
| B-212 | 1738-962 | 100 comprimés pelliculés, 150 mg | 100 filmomhulde tabletten, 150 mg | G | 23,81 | 23,81 | 3,72 | 6,20 |
| | 1738-962 | | | | 14,03 | 14,03 | | |
| B-212 * | 0772-020 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1811 | 0,1811 | | |
| B-212 ** | 0772-020 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1487 | 0,1487 | | |
| B-212 *** | 0772-020 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | G | 0,1827 | 0,1827 | 0,0372 | 0,0620 |
| MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01BA01 | | | | | | | | |
| B-165 | 2582-112 | 20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml | 20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml | | 12,42 | 12,42 | 1,39 | 2,32 |
| | 2582-112 | | | | 5,26 | 5,26 | | |
| B-165 * | 0795-369 | 1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL | | 0,3395 | 0,3395 | | |
| B-165 ** | 0795-369 | 1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL | | 0,2790 | 0,2790 | | |
| MONTELUKAST AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03 | | | | | | | | |
| B-241 | 2764-801 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 17,59 | 17,59 | 2,44 | 4,07 |
| | 2764-801 | | | | 9,20 | 9,20 | | |
| B-241 | 2764-819 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 49,98 | 49,98 | 7,39 | 12,44 |
| | 2764-819 | | | | 36,81 | 36,81 | | |
| B-241 * | 0758-813 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4707 | 0,4707 | | |
| B-241 ** | 0758-813 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3982 | 0,3982 | | |
| B-241 *** | 0758-813 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4535 | 0,4535 | 0,0754 | 0,1269 |
| MONTELUKAST AB 4 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03 | | | | | | | | |
| B-241 | 2764-785 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg | G | 17,59 | 17,59 | 2,44 | 4,07 |
| | 2764-785 | | | | 9,20 | 9,20 | | |
| B-241 | 2764-793 | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg | G | 47,49 | 47,49 | 7,04 | 11,85 |
| | 2764-793 | | | | 34,64 | 34,64 | | |
| B-241 * | 0758-839 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4472 | 0,4472 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-241 ** | 0758-839 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,3747 | 0,3747 | | |
| B-241 *** | 0758-839 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4281 | 0,4281 | 0,0718 | 0,1209 |
| MONTELUKAST AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 2764-827 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg | G | 17,59 | 17,59 | 2,44 | 4,07 |
| | 2764-827 | | | | 9,20 | 9,20 | | |
| B-241 | 2764-835 | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg | G | 49,98 | 49,98 | 7,39 | 12,44 |
| | 2764-835 | | | | 36,81 | 36,81 | | |
| B-241 * | 0758-821 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4707 | 0,4707 | | |
| B-241 ** | 0758-821 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,3982 | 0,3982 | | |
| B-241 *** | 0758-821 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4535 | 0,4535 | 0,0754 | 0,1269 |
| MONTELUKAST EG 10 mg | | EG | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 2605-483 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 17,60 | 17,60 | 2,44 | 4,07 |
| | 2605-483 | | | | 9,21 | 9,21 | | |
| B-241 | 2605-475 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 50,05 | 50,05 | 7,40 | 12,45 |
| | 2605-475 | | | | 36,87 | 36,87 | | |
| B-241 * | 0793-091 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4713 | 0,4713 | | |
| B-241 ** | 0793-091 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3988 | 0,3988 | | |
| B-241 *** | 0793-091 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4543 | 0,4543 | 0,0755 | 0,1270 |
| MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 3432-291 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 17,60 | 17,60 | 2,44 | 4,07 |
| | 3432-291 | | | | 9,21 | 9,21 | | |
| B-241 | 3111-564 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 50,05 | 50,05 | 7,40 | 12,45 |
| | 3111-564 | | | | 36,87 | 36,87 | | |
| B-241 * | 7706-526 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4713 | 0,4713 | | |
| B-241 ** | 7706-526 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3988 | 0,3988 | | |
| B-241 *** | 7706-526 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4543 | 0,4543 | 0,0755 | 0,1270 |
| MONTELUKAST EG 4 mg | | EG | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 2605-491 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg | G | 17,60 | 17,60 | 2,44 | 4,07 |
| | 2605-491 | | | | 9,21 | 9,21 | | |
| B-241 | 2605-509 | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg | G | 48,10 | 48,10 | 7,13 | 12,00 |
| | 2605-509 | | | | 35,18 | 35,18 | | |
| B-241 * | 0793-075 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4531 | 0,4531 | | |
| B-241 ** | 0793-075 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,3805 | 0,3805 | | |
| B-241 *** | 0793-075 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4344 | 0,4344 | 0,0728 | 0,1224 |
| MONTELUKAST EG 5 mg | | EG | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 2605-517 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg | G | 17,60 | 17,60 | 2,44 | 4,07 |
| | 2605-517 | | | | 9,21 | 9,21 | | |
| B-241 | 2605-525 | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg | G | 50,05 | 50,05 | 7,40 | 12,45 |
| | 2605-525 | | | | 36,87 | 36,87 | | |
| B-241 * | 0793-083 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4713 | 0,4713 | | |
| B-241 ** | 0793-083 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,3988 | 0,3988 | | |
| B-241 *** | 0793-083 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4543 | 0,4543 | 0,0755 | 0,1270 |
| MONTELUKAST KRKA 10 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 3155-447 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 17,59 | 17,59 | 2,44 | 4,07 |
| | 3155-447 | | | | 9,20 | 9,20 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-241 | 3155-454 3155-454 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 29,92 19,35 | 29,92 19,35 | 4,60 | 7,72 |
| B-241 | 3155-462 3155-462 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 49,98 36,81 | 49,98 36,81 | 7,39 | 12,44 |
| B-241 * | 7707-813 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4707 | 0,4707 | | |
| B-241 ** | 7707-813 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3982 | 0,3982 | | |
| B-241 *** | 7707-813 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4535 | 0,4535 | 0,0754 | 0,1269 |
| MONTELUKAST KRKA 4 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 3155-389 3155-389 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg | G | 17,59 9,20 | 17,59 9,20 | 2,44 | 4,07 |
| B-241 | 3155-405 3155-405 | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg | G | 47,49 34,64 | 47,49 34,64 | 7,04 | 11,85 |
| B-241 * | 7707-797 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4472 | 0,4472 | | |
| B-241 ** | 7707-797 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,3747 | 0,3747 | | |
| B-241 *** | 7707-797 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4281 | 0,4281 | 0,0718 | 0,1209 |
| MONTELUKAST KRKA 5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 3155-413 3155-413 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg | G | 17,59 9,20 | 17,59 9,20 | 2,44 | 4,07 |
| B-241 | 3155-421 3155-421 | 56 comprimés à croquer, 5 mg | 56 kauwtabletten, 5 mg | G | 29,76 19,21 | 29,76 19,21 | 4,57 | 7,69 |
| B-241 | 3155-439 3155-439 | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg | G | 49,98 36,81 | 49,98 36,81 | 7,39 | 12,44 |
| B-241 * | 7707-805 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4707 | 0,4707 | | |
| B-241 ** | 7707-805 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,3982 | 0,3982 | | |
| B-241 *** | 7707-805 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4535 | 0,4535 | 0,0754 | 0,1269 |
| MONTELUKAST SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 2666-352 2666-352 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 18,33 9,77 | 18,33 9,77 | 2,59 | 4,32 |
| B-241 | 2692-127 2692-127 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 30,43 19,80 | 30,43 19,80 | 4,67 | 7,85 |
| B-241 | 2652-105 2652-105 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 50,02 36,85 | 50,02 36,85 | 7,40 | 12,45 |
| B-241 * | 0795-781 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4711 | 0,4711 | | |
| B-241 ** | 0795-781 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3986 | 0,3986 | | |
| B-241 *** | 0795-781 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4540 | 0,4540 | 0,0755 | 0,1270 |
| MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 3420-940 3420-940 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 50,02 36,85 | 50,02 36,85 | 7,40 | 12,45 |
| B-241 * | 7715-204 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4711 | 0,4711 | | |
| B-241 ** | 7715-204 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3986 | 0,3986 | | |
| B-241 *** | 7715-204 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4540 | 0,4540 | 0,0755 | 0,1270 |
| MONTELUKAST SANDOZ 4 mg | | SANDOZ | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 2666-345 2666-345 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg | G | 18,18 9,65 | 18,18 9,65 | 2,56 | 4,27 |
| B-241 | 3091-626 | 56 comprimés à croquer, 4 mg | 56 kauwtabletten, 4 mg | G | 30,43 | 30,43 | 4,67 | 7,85 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-241 | 3091-626 2652-097 | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg | G | 19,80 49,39 | 19,80 49,39 | 7,31 | 12,30 |
| | 2652-097 | | | | 36,29 | 36,29 | | |
| B-241 * | 0795-765 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4651 | 0,4651 | | |
| B-241 ** | 0795-765 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,3926 | 0,3926 | | |
| B-241 *** | 0795-765 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4475 | 0,4475 | 0,0746 | 0,1255 |
| MONTELUKAST SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 2666-360 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg | G | 18,18 | 18,18 | 2,56 | 4,27 |
| | 2666-360 | | | | 9,65 | 9,65 | | |
| B-241 | 3091-634 | 56 comprimés à croquer, 5 mg | 56 kauwtabletten, 5 mg | G | 30,43 | 30,43 | 4,67 | 7,85 |
| | 3091-634 | | | | 19,80 | 19,80 | | |
| B-241 | 2652-113 | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg | G | 50,02 | 50,02 | 7,40 | 12,45 |
| | 2652-113 | | | | 36,85 | 36,85 | | |
| B-241 * | 0795-773 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4711 | 0,4711 | | |
| B-241 ** | 0795-773 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,3986 | 0,3986 | | |
| B-241 *** | 0795-773 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4540 | 0,4540 | 0,0755 | 0,1270 |
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 2576-528 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 18,33 | 18,33 | 2,59 | 4,32 |
| | 2576-528 | | | | 9,77 | 9,77 | | |
| B-241 | 2576-551 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 31,33 | 31,33 | 4,79 | 8,06 |
| | 2576-551 | | | | 20,58 | 20,58 | | |
| B-241 | 2655-108 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 50,40 | 50,40 | 7,45 | 12,54 |
| | 2655-108 | | | | 37,18 | 37,18 | | |
| B-241 * | 0791-715 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4747 | 0,4747 | | |
| B-241 ** | 0791-715 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4021 | 0,4021 | | |
| B-241 *** | 0791-715 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4579 | 0,4579 | 0,0760 | 0,1280 |
| MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 3117-496 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 50,40 | 50,40 | 7,45 | 12,54 |
| | 3117-496 | | | | 37,18 | 37,18 | | |
| B-241 * | 7706-815 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4747 | 0,4747 | | |
| B-241 ** | 7706-815 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4021 | 0,4021 | | |
| B-241 *** | 7706-815 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4579 | 0,4579 | 0,0760 | 0,1280 |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 2576-585 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg | G | 18,33 | 18,33 | 2,59 | 4,32 |
| | 2576-585 | | | | 9,77 | 9,77 | | |
| B-241 | 2655-082 | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg | G | 47,51 | 47,51 | 7,05 | 11,86 |
| | 2655-082 | | | | 34,66 | 34,66 | | |
| B-241 * | 0791-699 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4474 | 0,4474 | | |
| B-241 ** | 0791-699 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,3749 | 0,3749 | | |
| B-241 *** | 0791-699 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | G | 0,4283 | 0,4283 | 0,0719 | 0,1210 |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 3046-380 | 28 doses granulés, 4 mg | 28 doses granulaat, 4 mg | G | 18,33 | 18,33 | 2,59 | 4,32 |
| | 3046-380 | | | | 9,77 | 9,77 | | |
| B-241 | 3086-394 | 98 doses granulés, 4 mg | 98 doses granulaat, 4 mg | G | 47,51 | 47,51 | 7,05 | 11,86 |
| | 3086-394 | | | | 34,66 | 34,66 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-241 * | 7703-689 | 1 sachet-dose, 4 mg | 1 sachet, 4 mg | G | 0,4474 | 0,4474 | | |
| B-241 ** | 7703-689 | 1 sachet-dose, 4 mg | 1 sachet, 4 mg | G | 0,3749 | 0,3749 | | |
| B-241 *** | 7703-689 | 1 sachet-dose, 4 mg | 1 sachet, 4 mg | G | 0,4283 | 0,4283 | 0,0719 | 0,1210 |
| MONTELUKAST TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 2576-569 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg | G | 18,33 | 18,33 | 2,59 | 4,32 |
| | 2576-569 | | | | 9,77 | 9,77 | | |
| B-241 | 2655-090 | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg | G | 50,40 | 50,40 | 7,45 | 12,54 |
| | 2655-090 | | | | 37,18 | 37,18 | | |
| B-241 * | 0791-707 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4747 | 0,4747 | | |
| B-241 ** | 0791-707 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4021 | 0,4021 | | |
| B-241 *** | 0791-707 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | G | 0,4579 | 0,4579 | 0,0760 | 0,1280 |
| MONURIL | | ZAMBON | | ATC: J01XX01 | | | | |
| C-37 | 0639-880 | 1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g | | 10,21 | 10,21 | 3,16 | 3,16 |
| | 0639-880 | | | | 3,57 | 3,57 | | |
| C-37 * | 0734-210 | 1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g drank, 3 g | | 4,6100 | 4,6100 | | |
| C-37 ** | 0734-210 | 1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g drank, 3 g | | 3,7800 | 3,7800 | | |
| C-37 *** | 0734-210 | 1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g drank, 3 g | | 4,6746 | 4,6746 | 3,1600 | 3,1600 |
| MONURIL 3 g (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: J01XX01 | | | | |
| C-37 | 3666-005 | 1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g | | 10,21 | 10,21 | 3,16 | 3,16 |
| | 3666-005 | | | | 3,57 | 3,57 | | |
| C-37 * | 7722-382 | 1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g drank, 3 g | | 4,6100 | 4,6100 | | |
| C-37 ** | 7722-382 | 1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g drank, 3 g | | 3,7800 | 3,7800 | | |
| C-37 *** | 7722-382 | 1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g | 1 sachet 3 g drank, 3 g | | 4,6746 | 4,6746 | 3,1600 | 3,1600 |
| MORPHINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA01 | | | | |
| B-56 | 1395-656 | 30 comprimés à libération modifiée, 10 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg | G | 8,76 | 8,76 | 0,65 | 1,09 |
| | 1395-656 | | | | 2,46 | 2,46 | | |
| B-56 * | 0747-832 | 1 comprimé à libération modifiée, 10 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg | G | 0,1057 | 0,1057 | | |
| B-56 ** | 0747-832 | 1 comprimé à libération modifiée, 10 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg | G | 0,0870 | 0,0870 | | |
| B-56 *** | 0747-832 | 1 comprimé à libération modifiée, 10 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg | G | 0,1074 | 0,1074 | 0,0217 | 0,0363 |
| MORPHINE TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA01 | | | | |
| B-56 | 1395-680 | 30 comprimés à libération modifiée, 100 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 31,49 | 31,49 | 4,82 | 8,09 |
| | 1395-680 | | | | 20,72 | 20,72 | | |
| B-56 * | 0747-865 | 1 comprimé à libération modifiée, 100 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 0,8913 | 0,8913 | | |
| B-56 ** | 0747-865 | 1 comprimé à libération modifiée, 100 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 0,7320 | 0,7320 | | |
| B-56 *** | 0747-865 | 1 comprimé à libération modifiée, 100 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg | G | 0,8653 | 0,8653 | 0,1607 | 0,2697 |
| MORPHINE TEVA 30 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA01 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 | 1395-664 | 30 comprimés à libération modifiée, 30 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 13,38 | 13,38 | 1,59 | 2,65 |
| | 1395-664 | | | | 5,99 | 5,99 | | |
| B-56 | 1489-020 | 60 comprimés à libération modifiée, 30 mg | 60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 21,23 | 21,23 | 3,18 | 5,30 |
| | 1489-020 | | | | 11,98 | 11,98 | | |
| B-56 * | 0747-840 | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 0,2577 | 0,2577 | | |
| B-56 ** | 0747-840 | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 0,2117 | 0,2117 | | |
| B-56 *** | 0747-840 | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg | G | 0,2616 | 0,2616 | 0,0530 | 0,0883 |
| MORPHINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01 | | | | | | | | |
| B-56 | 1395-672 | 30 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 23,01 | 23,01 | 3,54 | 5,90 |
| | 1395-672 | | | | 13,34 | 13,34 | | |
| B-56 | 1489-012 | 60 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 34,91 | 34,91 | 5,29 | 8,90 |
| | 1489-012 | | | | 23,69 | 23,69 | | |
| B-56 * | 0747-857 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 0,5095 | 0,5095 | | |
| B-56 ** | 0747-857 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 0,4185 | 0,4185 | | |
| B-56 *** | 0747-857 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | G | 0,4895 | 0,4895 | 0,0882 | 0,1483 |
| MOTIFENE BEPHARBEL ATC: M01AB05 | | | | | | | | |
| B-60 | 2087-773 | 28 gélules à libération modifiée, 75 mg | 28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg | R | 10,37 | 10,37 | 0,98 | 1,63 |
| | 2087-773 | | | | 3,69 | 3,69 | | |
| B-60 | 1289-594 | 56 gélules à libération modifiée, 75 mg | 56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg | R | 11,14 | 11,14 | 1,13 | 1,89 |
| | 1289-594 | | | | 4,28 | 4,28 | | |
| B-60 * | 0746-610 | 1 gélule à libération modifiée, 75 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg | R | 0,0986 | 0,0986 | | |
| B-60 ** | 0746-610 | 1 gélule à libération modifiée, 75 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg | R | 0,0811 | 0,0811 | | |
| B-60 *** | 0746-610 | 1 gélule à libération modifiée, 75 mg | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg | R | 0,1001 | 0,1001 | 0,0202 | 0,0337 |
| MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14 | | | | | | | | |
| | 7719-438 | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | | 12,94 | 12,94 | | |
| C-37 * | 7719-438 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,6700 | 1,6700 | | |
| C-37 ** | 7719-438 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,3720 | 1,3720 | | |
| MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14 | | | | | | | | |
| | 7705-817 | 14 comprimés pelliculés, 400 mg | 14 filmomhulde tabletten, 400 mg | | 18,56 | 18,56 | | |
| C-37 * | 7705-817 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,7107 | 1,7107 | | |
| C-37 ** | 7705-817 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,4050 | 1,4050 | | |
| MOXIFLOXACINE EG 400 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14 | | | | | | | | |
| | 7705-890 | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | | 12,94 | 12,94 | | |
| C-37 * | 7705-890 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,6700 | 1,6700 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| C-37 ** | 7705-890 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,3720 | 1,3720 | | |
| MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400mg/250ml FRESENIUS KABI | | | | ATC: J01MA14 | | | | |
| | 7720-162 | 10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL | 10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL | | 115,08 | 115,08 | | |
| B-125 * | 7720-162 | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL | G | 12,9090 | 12,9090 | | |
| B-125 ** | 7720-162 | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL | G | 12,1980 | 12,1980 | | |
| MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg AREGA PHARMA | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA14 | |
| | 7705-833 | 14 comprimés pelliculés, 400 mg | 14 filmomhulde tabletten, 400 mg | | 18,11 | 18,11 | | |
| C-37 * | 7705-833 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,6693 | 1,6693 | | |
| C-37 ** | 7705-833 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G | 1,3714 | 1,3714 | | |
| MOXONIDINE EG 0,2 mg EG | | | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2154-979 | 28 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 9,42 | 9,42 | 0,79 | 1,31 |
| | 2154-979 | | | | 2,97 | 2,97 | | |
| B-240 | 2172-567 | 56 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 13,05 | 13,05 | 1,52 | 2,53 |
| | 2172-567 | | | | 5,73 | 5,73 | | |
| B-240 | 2490-977 | 98 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 17,72 | 17,72 | 2,47 | 4,11 |
| | 2490-977 | | | | 9,30 | 9,30 | | |
| B-240 * | 0777-185 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1224 | 0,1224 | | |
| B-240 ** | 0777-185 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1006 | 0,1006 | | |
| B-240 *** | 0777-185 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1244 | 0,1244 | 0,0252 | 0,0419 |
| MOXONIDINE EG 0,4 mg EG | | | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2154-995 | 28 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 11,73 | 11,73 | 1,25 | 2,09 |
| | 2154-995 | | | | 4,73 | 4,73 | | |
| B-240 | 2172-559 | 56 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 17,65 | 17,65 | 2,45 | 4,08 |
| | 2172-559 | | | | 9,24 | 9,24 | | |
| B-240 | 2490-993 | 98 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 24,78 | 24,78 | 3,88 | 6,52 |
| | 2490-993 | | | | 14,88 | 14,88 | | |
| B-240 * | 0777-201 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1959 | 0,1959 | | |
| B-240 ** | 0777-201 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1609 | 0,1609 | | |
| B-240 *** | 0777-201 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1964 | 0,1964 | 0,0396 | 0,0665 |
| MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ | | | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2124-980 | 30 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 9,47 | 9,47 | 0,80 | 1,33 |
| | 2124-980 | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| B-240 | 2312-544 | 60 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 12,65 | 12,65 | 1,44 | 2,40 |
| | 2312-544 | | | | 5,43 | 5,43 | | |
| B-240 | 2312-551 | 100 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 17,08 | 17,08 | 2,34 | 3,89 |
| | 2312-551 | | | | 8,81 | 8,81 | | |
| B-240 * | 0776-351 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1137 | 0,1137 | | |
| B-240 ** | 0776-351 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,0934 | 0,0934 | | |
| B-240 *** | 0776-351 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1154 | 0,1154 | 0,0234 | 0,0389 |
| MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ | | | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2124-998 | 30 comprimés pelliculés, 0,3 mg | 30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg | G | 12,11 | 12,11 | 1,33 | 2,22 |
| | 2124-998 | | | | 5,02 | 5,02 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-240 * | 0776-369 | 1 comprimé pelliculé, 0,3 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,3 mg | G | 0,2160 | 0,2160 | | |
| B-240 ** | 0776-369 | 1 comprimé pelliculé, 0,3 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,3 mg | G | 0,1773 | 0,1773 | | |
| B-240 *** | 0776-369 | 1 comprimé pelliculé, 0,3 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,3 mg | G | 0,2191 | 0,2191 | 0,0443 | 0,0740 |
| MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg | | SANDOZ | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2125-003 | 30 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 11,79 | 11,79 | 1,27 | 2,11 |
| | 2125-003 | | | | 4,78 | 4,78 | | |
| B-240 | 2312-569 | 60 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 16,63 | 16,63 | 2,25 | 3,74 |
| | 2312-569 | | | | 8,47 | 8,47 | | |
| B-240 | 2312-577 | 100 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 23,92 | 23,92 | 3,75 | 6,25 |
| | 2312-577 | | | | 14,13 | 14,13 | | |
| B-240 * | 0776-377 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1823 | 0,1823 | | |
| B-240 ** | 0776-377 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1498 | 0,1498 | | |
| B-240 *** | 0776-377 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1839 | 0,1839 | 0,0375 | 0,0625 |
| MOXONIDINE TEVA 0,2 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2159-820 | 56 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 12,36 | 12,36 | 1,38 | 2,30 |
| | 2159-820 | | | | 5,21 | 5,21 | | |
| B-240 | 2567-477 | 100 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 17,01 | 17,01 | 2,32 | 3,87 |
| | 2567-477 | | | | 8,76 | 8,76 | | |
| B-240 * | 0777-680 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1130 | 0,1130 | | |
| B-240 ** | 0777-680 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,0929 | 0,0929 | | |
| B-240 *** | 0777-680 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1148 | 0,1148 | 0,0232 | 0,0387 |
| MOXONIDINE TEVA 0,4 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2159-846 | 56 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 16,67 | 16,67 | 2,25 | 3,76 |
| | 2159-846 | | | | 8,50 | 8,50 | | |
| B-240 | 2567-501 | 100 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 23,82 | 23,82 | 3,72 | 6,21 |
| | 2567-501 | | | | 14,04 | 14,04 | | |
| B-240 * | 0777-672 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1812 | 0,1812 | | |
| B-240 ** | 0777-672 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1488 | 0,1488 | | |
| B-240 *** | 0777-672 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1829 | 0,1829 | 0,0372 | 0,0621 |
| MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg | | VIATRIS | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 3000-882 | 28 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 9,56 | 9,56 | 0,81 | 1,36 |
| | 3000-882 | | | | 3,07 | 3,07 | | |
| B-240 | 3012-176 | 98 comprimés pelliculés, 0,2 mg | 98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | G | 17,35 | 17,35 | 2,39 | 3,99 |
| | 3012-176 | | | | 9,02 | 9,02 | | |
| B-240 * | 0777-649 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1188 | 0,1188 | | |
| B-240 ** | 0777-649 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,0976 | 0,0976 | | |
| B-240 *** | 0777-649 | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | G | 0,1206 | 0,1206 | 0,0244 | 0,0407 |
| MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg | | VIATRIS | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 3000-890 | 28 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 11,94 | 11,94 | 1,30 | 2,16 |
| | 3000-890 | | | | 4,89 | 4,89 | | |
| B-240 | 3012-184 | 98 comprimés pelliculés, 0,4 mg | 98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | G | 24,09 | 24,09 | 3,79 | 6,31 |
| | 3012-184 | | | | 14,28 | 14,28 | | |
| B-240 * | 0777-664 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1881 | 0,1881 | | |
| B-240 ** | 0777-664 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1545 | 0,1545 | | |
| B-240 *** | 0777-664 | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | 0,0387 | 0,0644 |

| MS CONTIN 10 mg | | MUNDIPHARMA | | | | ATC: N02AA01 | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-56 | 1391-721 | 30 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | R | 8,94 | 8,94 | 0,69 | 1,15 | |
| | 1391-721 | | | | 2,60 | 2,60 | | | |
| B-56 * | 0739-417 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | R | 0,1120 | 0,1120 | | | |
| B-56 ** | 0739-417 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | R | 0,0920 | 0,0920 | | | |
| B-56 *** | 0739-417 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | R | 0,1134 | 0,1134 | 0,0230 | 0,0383 | |
| MS CONTIN 100 mg | | MUNDIPHARMA | | | | ATC: N02AA01 | | | |
| B-56 | 1391-754 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | R | 32,61 | 32,61 | 4,97 | 8,36 | |
| | 1391-754 | | | | 21,69 | 21,69 | | | |
| B-56 * | 0739-037 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | R | 0,9330 | 0,9330 | | | |
| B-56 ** | 0739-037 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | R | 0,7663 | 0,7663 | | | |
| B-56 *** | 0739-037 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | R | 0,9024 | 0,9024 | 0,1657 | 0,2787 | |
| MS CONTIN 30 mg | | MUNDIPHARMA | | | | ATC: N02AA01 | | | |
| B-56 | 0658-617 | 56 comprimés à libération prolongée, 30 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg | R | 20,87 | 20,87 | 3,10 | 5,17 | |
| | 0658-617 | | | | 11,70 | 11,70 | | | |
| B-56 * | 0734-541 | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg | R | 0,2696 | 0,2696 | | | |
| B-56 ** | 0734-541 | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg | R | 0,2214 | 0,2214 | | | |
| B-56 *** | 0734-541 | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg | R | 0,2739 | 0,2739 | 0,0554 | 0,0923 | |
| MS CONTIN 60 mg | | MUNDIPHARMA | | | | ATC: N02AA01 | | | |
| B-56 | 0658-625 | 56 comprimés à libération prolongée, 60 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg | R | 34,34 | 34,34 | 5,21 | 8,76 | |
| | 0658-625 | | | | 23,20 | 23,20 | | | |
| B-56 * | 0734-558 | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg | R | 0,5346 | 0,5346 | | | |
| B-56 ** | 0734-558 | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg | R | 0,4391 | 0,4391 | | | |
| B-56 *** | 0734-558 | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg | R | 0,5145 | 0,5145 | 0,0930 | 0,1564 | |
| MYAMBUTOL | | TEOFARMA | | | | ATC: J04AK02 | | | |
| A-19 | 0058-396 | 100 comprimés, 400 mg | 100 tabletten, 400 mg | | 30,97 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0058-396 | | | | 20,27 | 20,27 | | | |
| A-19 * | 0712-273 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | | 0,2616 | 0,2616 | | | |
| A-19 ** | 0712-273 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | | 0,2149 | 0,2149 | | | |
| A-19 *** | 0712-273 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | | 0,2544 | 0,2544 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MYATORLIP 10 mg/10 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA05 | | | |
| B-289 | 4826-707 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 46,77 | 46,77 | 6,94 | 11,69 | |
| | 4826-707 | | | | 34,02 | 34,02 | | | |
| B-289 * | 7741-150 | 1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4797 | 0,4797 | | | |
| B-289 ** | 7741-150 | 1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4007 | 0,4007 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| B-289 *** | 7741-150 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4582 | 0,4582 | 0,0771 | 0,1299 |
| MYATORLIP 10 mg/20 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4826-715 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg | G | 56,56 | 56,56 | 8,30 | 13,98 |
| | 4826-715 | | | | 42,53 | 42,53 | | |
| B-289 * | 7741-168 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | G | 0,5799 | 0,5799 | | |
| B-289 ** | 7741-168 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | G | 0,5009 | 0,5009 | | |
| B-289 *** | 7741-168 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg | G | 0,5670 | 0,5670 | 0,0922 | 0,1553 |
| MYATORLIP 10 mg/40 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4826-723 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg | G | 56,56 | 56,56 | 8,30 | 13,98 |
| | 4826-723 | | | | 42,53 | 42,53 | | |
| B-289 * | 7741-176 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | G | 0,5799 | 0,5799 | | |
| B-289 ** | 7741-176 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | G | 0,5009 | 0,5009 | | |
| B-289 *** | 7741-176 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg | G | 0,5670 | 0,5670 | 0,0922 | 0,1553 |
| MYATORLIP 10 mg/80 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA05 | |
| B-289 | 4826-731 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg | G | 56,56 | 56,56 | 8,30 | 13,98 |
| | 4826-731 | | | | 42,53 | 42,53 | | |
| B-289 * | 7741-184 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | G | 0,5799 | 0,5799 | | |
| B-289 ** | 7741-184 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | G | 0,5009 | 0,5009 | | |
| B-289 *** | 7741-184 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg | G | 0,5670 | 0,5670 | 0,0922 | 0,1553 |
| MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | | | | ATC: L04AA06 | |
| A-29 | 3506-680 | 300 gélules, 250 mg | 300 capsules, hard, 250 mg | G | 129,32 | 129,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 3506-680 | | | | 108,06 | 108,06 | | |
| A-29 * | 7717-416 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,4055 | 0,4055 | | |
| A-29 ** | 7717-416 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,3818 | 0,3818 | | |
| A-29 *** | 7717-416 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,4126 | 0,4126 | 0,0000 | 0,0000 |
| MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | | | | ATC: L04AA06 | |
| A-29 | 2735-835 | 150 comprimés pelliculés, 500 mg | 150 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 129,54 | 129,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 2735-835 | | | | 108,27 | 108,27 | | |
| A-29 * | 0759-985 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8125 | 0,8125 | | |
| A-29 ** | 0759-985 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,7651 | 0,7651 | | |
| A-29 *** | 0759-985 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8267 | 0,8267 | 0,0000 | 0,0000 |
| MYFENAX 250 mg | | AREGA PHARMA | | | | | ATC: L04AA06 | |
| A-29 | 2717-551 | 300 gélules, 250 mg | 300 capsules, hard, 250 mg | G | 131,92 | 131,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2717-551 | | | | 110,43 | 110,43 | | |
| A-29 * | 0797-738 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,4139 | 0,4139 | | |
| A-29 ** | 0797-738 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,3902 | 0,3902 | | |
| A-29 *** | 0797-738 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,4213 | 0,4213 | 0,0000 | 0,0000 |
| MYFENAX 500 mg | | AREGA PHARMA | | | | | ATC: L04AA06 | |
| A-29 | 2717-544 | 150 comprimés pelliculés, 500 mg | 150 filmomhulde tabletten, 500 mg | G | 131,92 | 131,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2717-544 | | | | 110,43 | 110,43 | | |
| A-29 * | 0797-746 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8278 | 0,8278 | | |
| A-29 ** | 0797-746 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,7804 | 0,7804 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|
| A-29 *** | 0797-746 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | G | 0,8426 | 0,8426 | 0,0000 | 0,0000 |
| MYLERAN 2 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | | ATC: L01AB01 | | | |
| A-23 | 1628-023 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | | 74,28 | 74,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 1628-023 | | | | 57,96 | 57,96 | | |
| A-23 * | 0712-307 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | | 0,6855 | 0,6855 | | |
| A-23 ** | 0712-307 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | | 0,6144 | 0,6144 | | |
| A-23 *** | 0712-307 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | | 0,6875 | 0,6875 | 0,0000 | 0,0000 |
| MYROSOR 10 mg/10 mg | | VIATRIS | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | |
| B-289 | 4182-507 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 26,57 | 26,57 | 4,13 | 6,94 |
| | 4182-507 | | | | 16,44 | 16,44 | | |
| B-289 | 3901-741 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 3901-741 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7725-609 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7725-609 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7725-609 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | |
| B-289 | 4791-679 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4791-679 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7739-964 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7739-964 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7739-964 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | |
| B-289 | 4851-978 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4851-978 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7742-380 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7742-380 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7742-380 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| MYROSOR 20 mg/10 mg | | VIATRIS | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | |
| B-289 | 4182-515 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 26,79 | 26,79 | 4,16 | 6,99 |
| | 4182-515 | | | | 16,63 | 16,63 | | |
| B-289 | 3901-758 | 90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 3901-758 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7725-617 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7725-617 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7725-617 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | mg | | | | | | | |
| MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10BA06 | | |
| B-289 | 4791-687 | 90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 | |
| | 4791-687 | | | | 40,90 | 40,90 | | | |
| B-289 * | 7739-972 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | | |
| B-289 ** | 7739-972 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | | |
| B-289 *** | 7739-972 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 | |
| MYSOLINE | | SERB SAS | | | | | ATC: N03AA03 | | |
| A-5 | 1359-793 | 90 comprimés, 250 mg | 90 tabletten, 250 mg | | 21,63 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1359-793 | | | | 12,29 | 12,29 | | | |
| A-5 * | 0712-349 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1762 | 0,1762 | | | |
| A-5 ** | 0712-349 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1448 | 0,1448 | | | |
| A-5 *** | 0712-349 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | | 0,1789 | 0,1789 | 0,0000 | 0,0000 | |
| NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | | ATC: M01AE02 | | |
| B-60 | 0287-532 | 30 comprimés gastro-résistants, 500 mg | 30 maagsapresistente tabletten, 500 mg | R | 10,42 | 10,42 | 0,99 | 1,65 | |
| | 0287-532 | | | | 3,73 | 3,73 | | | |
| B-60 * | 0737-759 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | R | 0,1603 | 0,1603 | | | |
| B-60 ** | 0737-759 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | R | 0,1317 | 0,1317 | | | |
| B-60 *** | 0737-759 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | R | 0,1629 | 0,1629 | 0,0330 | 0,0550 | |
| NAPROXEN AB 250 mg | | AUROBINDO NV | | | | | ATC: M01AE02 | | |
| B-60 | 4349-916 | 50 comprimés, 250 mg | 50 tabletten, 250 mg | G | 9,18 | 9,18 | 0,74 | 1,23 | |
| | 4349-916 | | | | 2,78 | 2,78 | | | |
| B-60 * | 7731-276 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,0718 | 0,0718 | | | |
| B-60 ** | 7731-276 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,0590 | 0,0590 | | | |
| B-60 *** | 7731-276 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,0729 | 0,0729 | 0,0148 | 0,0246 | |
| NAPROXEN AB 500 mg | | AUROBINDO NV | | | | | ATC: M01AE02 | | |
| B-60 | 4349-924 | 30 comprimés, 500 mg | 30 tabletten, 500 mg | G | 9,72 | 9,72 | 0,85 | 1,41 | |
| | 4349-924 | | | | 3,19 | 3,19 | | | |
| B-60 * | 7731-060 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1373 | 0,1373 | | | |
| B-60 ** | 7731-060 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1127 | 0,1127 | | | |
| B-60 *** | 7731-060 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1396 | 0,1396 | 0,0283 | 0,0470 | |
| NAPROXEN FORTE EG 550 mg | | EG | | | | | ATC: M01AE02 | | |
| B-60 | 2320-430 | 30 comprimés pelliculés, 550 mg | 30 filmomhulde tabletten, 550 mg | G | 9,62 | 9,62 | 0,83 | 1,38 | |
| | 2320-430 | | | | 3,12 | 3,12 | | | |
| B-60 | 2321-016 | 60 comprimés pelliculés, 550 mg | 60 filmomhulde tabletten, 550 mg | G | 12,47 | 12,47 | 1,40 | 2,34 | |
| | 2321-016 | | | | 5,29 | 5,29 | | | |
| B-60 * | 0782-847 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | G | 0,1138 | 0,1138 | | | |
| B-60 ** | 0782-847 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | G | 0,0935 | 0,0935 | | | |
| B-60 *** | 0782-847 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | G | 0,1155 | 0,1155 | 0,0233 | 0,0390 | |
| NAPROXEN KRKA 550 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | ATC: M01AE02 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-60 | 3775-178 3775-178 | 30 comprimés pelliculés, 550 mg | 30 filmomhulde tabletten, 550 mg | G | 9,41 2,96 | 9,41 2,96 | 0,78 | 1,31 |
| B-60 | 3775-186 3775-186 | 60 comprimés pelliculés, 550 mg | 60 filmomhulde tabletten, 550 mg | G | 12,09 5,01 | 12,09 5,01 | 1,33 | 2,21 |
| B-60 * | 7722-994 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | G | 0,1078 | 0,1078 | | |
| B-60 ** | 7722-994 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | G | 0,0885 | 0,0885 | | |
| B-60 *** | 7722-994 | 1 comprimé pelliculé, 550 mg | 1 filmomhulde tablet, 550 mg | G | 0,1094 | 0,1094 | 0,0222 | 0,0368 |
| NAPROXEN SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: M01AE02 | | | | |
| B-60 | 2274-934 2274-934 | 30 comprimés, 500 mg | 30 tabletten, 500 mg | G | 9,72 3,19 | 9,72 3,19 | 0,85 | 1,41 |
| B-60 * | 0782-268 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1373 | 0,1373 | | |
| B-60 ** | 0782-268 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1127 | 0,1127 | | |
| B-60 *** | 0782-268 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1396 | 0,1396 | 0,0283 | 0,0470 |
| NAPROXENE EG | | EG | | ATC: M01AE02 | | | | |
| B-60 | 0468-751 0468-751 | 50 comprimés, 250 mg | 50 tabletten, 250 mg | G | 9,18 2,78 | 9,18 2,78 | 0,74 | 1,23 |
| B-60 * | 0735-241 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,0718 | 0,0718 | | |
| B-60 ** | 0735-241 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,0590 | 0,0590 | | |
| B-60 *** | 0735-241 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,0729 | 0,0729 | 0,0148 | 0,0246 |
| NAPROXENE EG | | EG | | ATC: M01AE02 | | | | |
| B-60 | 0468-769 0468-769 | 30 comprimés, 500 mg | 30 tabletten, 500 mg | G | 9,91 3,34 | 9,91 3,34 | 0,89 | 1,48 |
| B-60 * | 0735-258 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1437 | 0,1437 | | |
| B-60 ** | 0735-258 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1180 | 0,1180 | | |
| B-60 *** | 0735-258 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | G | 0,1459 | 0,1459 | 0,0297 | 0,0493 |
| NEBIVOLOL AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C07AB12 | | | | |
| B-15 | 4349-106 4349-106 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 11,73 4,73 | 11,73 4,73 | 1,25 | 2,09 |
| B-15 | 4349-114 4349-114 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 18,29 9,73 | 18,29 9,73 | 2,58 | 4,30 |
| B-15 * | 7731-052 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1256 | 0,1256 | | |
| B-15 ** | 7731-052 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1031 | 0,1031 | | |
| B-15 *** | 7731-052 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1275 | 0,1275 | 0,0258 | 0,0430 |
| NEBIVOLOL EG 5 mg | | EG | | ATC: C07AB12 | | | | |
| B-15 | 2659-142 2659-142 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 11,34 4,43 | 11,34 4,43 | 1,17 | 1,96 |
| B-15 | 2663-581 2663-581 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 18,31 9,75 | 18,31 9,75 | 2,59 | 4,31 |
| B-15 * | 0795-260 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1284 | 0,1284 | | |
| B-15 ** | 0795-260 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1055 | 0,1055 | | |
| B-15 *** | 0795-260 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1303 | 0,1303 | 0,0264 | 0,0440 |
| NEBIVOLOL KRKA 5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C07AB12 | | | | |
| B-15 | 4136-057 4136-057 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 18,29 9,73 | 18,29 9,73 | 2,58 | 4,30 |
| B-15 * | 7726-821 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1256 | 0,1256 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-15 ** | 7726-821 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1031 | 0,1031 | | |
| B-15 *** | 7726-821 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1275 | 0,1275 | 0,0258 | 0,0430 |
| NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AB12 | | | | |
| B-15 | 2647-675 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 11,31 | 11,31 | 1,17 | 1,95 |
| | 2647-675 | | | | 4,41 | 4,41 | | |
| B-15 | 2647-691 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 13,65 | 13,65 | 1,64 | 2,74 |
| | 2647-691 | | | | 6,20 | 6,20 | | |
| B-15 | 2647-683 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 18,29 | 18,29 | 2,58 | 4,30 |
| | 2647-683 | | | | 9,73 | 9,73 | | |
| B-15 * | 0795-278 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1282 | 0,1282 | | |
| B-15 ** | 0795-278 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1052 | 0,1052 | | |
| B-15 *** | 0795-278 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1301 | 0,1301 | 0,0263 | 0,0439 |
| NEBIVOLOL TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C07AB12 | | | | |
| B-15 | 2682-672 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 11,41 | 11,41 | 1,19 | 1,98 |
| | 2682-672 | | | | 4,48 | 4,48 | | |
| B-15 | 2682-698 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 18,61 | 18,61 | 2,65 | 4,41 |
| | 2682-698 | | | | 9,98 | 9,98 | | |
| B-15 * | 0796-789 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1288 | 0,1288 | | |
| B-15 ** | 0796-789 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1058 | 0,1058 | | |
| B-15 *** | 0796-789 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1308 | 0,1308 | 0,0265 | 0,0441 |
| NEGABAN | | EUMEDICA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CA17 | |
| | 0728-162 | 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | | 27,38 | 27,38 | | |
| B-109 * | 0728-162 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | | 35,3300 | 35,3300 | | |
| B-109 ** | 0728-162 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g | | 29,0200 | 29,0200 | | |
| NEGABAN | | EUMEDICA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CA17 | |
| | 0728-170 | 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g | 1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g | | 54,74 | 54,74 | | |
| B-109 * | 0728-170 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g | | 65,1300 | 65,1300 | | |
| B-109 ** | 0728-170 | 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g | 1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g | | 58,0200 | 58,0200 | | |
| NEOBACITRACINE | | BEPHARBEL | | ATC: S03AA30 | | | | |
| C-36 | 0121-012 | 1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml | 1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml | | 10,47 | 10,47 | 3,33 | 3,33 |
| | 0121-012 | | | | 3,77 | 3,77 | | |
| C-36 * | 0712-554 | 1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL | 1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL | | 4,8700 | 4,8700 | | |
| C-36 ** | 0712-554 | 1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL | 1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL | | 4,0000 | 4,0000 | | |
| NEORAL-SANDIMUM | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AD01 | | | | |
| A-29 | 1428-044 | 60 capsules molles, 10 mg | 60 capsules, zacht, 10 mg | R | 17,72 | 17,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 1428-044 | | | | 9,30 | 9,30 | | |
| A-29 * | 0761-981 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | R | 0,2000 | 0,2000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-29 ** | 0761-981 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | R | 0,1643 | 0,1643 | | |
| A-29 *** | 0761-981 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | R | 0,2032 | 0,2032 | 0,0000 | 0,0000 |
| NEORAL-SANDIMMUN | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AD01 | | | | |
| A-29 | 1174-655 | 1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | R | 89,82 | 89,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 1174-655 | | | | 72,03 | 72,03 | | |
| A-29 * | 0744-359 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | R | 1,6692 | 1,6692 | | |
| A-29 ** | 0744-359 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | R | 1,5270 | 1,5270 | | |
| NEORAL-SANDIMMUN | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AD01 | | | | |
| A-29 | 1174-663 | 50 capsules molles, 100 mg | 50 capsules, zacht, 100 mg | R | 78,79 | 78,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 1174-663 | | | | 61,97 | 61,97 | | |
| A-29 * | 0744-342 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | R | 1,4560 | 1,4560 | | |
| A-29 ** | 0744-342 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | R | 1,3138 | 1,3138 | | |
| A-29 *** | 0744-342 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | R | 1,4651 | 1,4651 | 0,0000 | 0,0000 |
| NEORAL-SANDIMMUN | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AD01 | | | | |
| A-29 | 1174-689 | 50 capsules molles, 50 mg | 50 capsules, zacht, 50 mg | R | 47,73 | 47,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 1174-689 | | | | 34,85 | 34,85 | | |
| A-29 * | 0744-334 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | R | 0,8810 | 0,8810 | | |
| A-29 ** | 0744-334 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | R | 0,7388 | 0,7388 | | |
| A-29 *** | 0744-334 | 1 capsule molle, 50 mg | 1 capsule, zacht, 50 mg | R | 0,8440 | 0,8440 | 0,0000 | 0,0000 |
| NEORAL-SANDIMMUN | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AD01 | | | | |
| A-29 | 1174-671 | 50 capsules molles, 25 mg | 50 capsules, zacht, 25 mg | R | 29,12 | 29,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 1174-671 | | | | 18,66 | 18,66 | | |
| A-29 * | 0744-326 | 1 capsule molle, 25 mg | 1 capsule, zacht, 25 mg | R | 0,4816 | 0,4816 | | |
| A-29 ** | 0744-326 | 1 capsule molle, 25 mg | 1 capsule, zacht, 25 mg | R | 0,3956 | 0,3956 | | |
| A-29 *** | 0744-326 | 1 capsule molle, 25 mg | 1 capsule, zacht, 25 mg | R | 0,4717 | 0,4717 | 0,0000 | 0,0000 |
| NEOTIGASON 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: D05BB02 | | | | |
| B-160 | 0669-671 | 30 gélules, 10 mg | 30 capsules, hard, 10 mg | | 27,97 | 27,97 | 4,33 | 7,27 |
| | 0669-671 | | | | 17,66 | 17,66 | | |
| B-160 * | 0732-537 | 1 gélule, 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg | | 0,7597 | 0,7597 | | |
| B-160 ** | 0732-537 | 1 gélule, 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg | | 0,6240 | 0,6240 | | |
| B-160 *** | 0732-537 | 1 gélule, 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg | | 0,7480 | 0,7480 | 0,1443 | 0,2423 |
| NEOTIGASON 25 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: D05BB02 | | | | |
| B-160 | 0669-663 | 30 gélules, 25 mg | 30 capsules, hard, 25 mg | | 48,26 | 48,26 | 7,15 | 12,03 |
| | 0669-663 | | | | 35,31 | 35,31 | | |
| B-160 * | 0732-545 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | | 1,4847 | 1,4847 | | |
| B-160 ** | 0732-545 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | | 1,2477 | 1,2477 | | |
| B-160 *** | 0732-545 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | | 1,4243 | 1,4243 | 0,2383 | 0,4010 |
| NESTROLAN 100 mg | | AMOPHAR | | ATC: N06AX05 | | | | |
| B-73 | 1784-362 | 30 comprimés, 100 mg | 30 tabletten, 100 mg | G | 8,54 | 8,54 | 0,61 | 1,01 |
| | 1784-362 | | | | 2,29 | 2,29 | | |
| B-73 | 1784-370 | 90 comprimés, 100 mg | 90 tabletten, 100 mg | G | 12,43 | 12,43 | 1,40 | 2,33 |
| | 1784-370 | | | | 5,27 | 5,27 | | |
| B-73 * | 0774-661 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0756 | 0,0756 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-73 ** | 0774-661 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0621 | 0,0621 | | |
| B-73 *** | 0774-661 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1003 | 0,1003 | 0,0203 | 0,0337 |
| NEURONTIN 100 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 1325-422 | 90 gélules, 100 mg | 90 capsules, hard, 100 mg | R | 12,01 | 12,01 | 1,31 | 2,18 |
| | 1325-422 | | | | 4,94 | 4,94 | | |
| B-262 * | 0761-643 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,0709 | 0,0709 | | |
| B-262 ** | 0761-643 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,0582 | 0,0582 | | |
| B-262 *** | 0761-643 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,0720 | 0,0720 | 0,0146 | 0,0242 |
| NEURONTIN 300 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 1325-448 | 90 gélules, 300 mg | 90 capsules, hard, 300 mg | R | 20,48 | 20,48 | 3,02 | 5,04 |
| | 1325-448 | | | | 11,40 | 11,40 | | |
| B-262 * | 0761-650 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,1634 | 0,1634 | | |
| B-262 ** | 0761-650 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,1342 | 0,1342 | | |
| B-262 *** | 0761-650 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,1661 | 0,1661 | 0,0336 | 0,0560 |
| NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 3151-164 | 90 gélules, 300 mg | 90 capsules, hard, 300 mg | R | 20,48 | 20,48 | 3,02 | 5,04 |
| | 3151-164 | | | | 11,40 | 11,40 | | |
| B-262 * | 7712-904 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,1634 | 0,1634 | | |
| B-262 ** | 7712-904 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,1342 | 0,1342 | | |
| B-262 *** | 7712-904 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | R | 0,1661 | 0,1661 | 0,0336 | 0,0560 |
| NEURONTIN 400 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 1325-463 | 90 gélules, 400 mg | 90 capsules, hard, 400 mg | R | 25,12 | 25,12 | 3,93 | 6,60 |
| | 1325-463 | | | | 15,17 | 15,17 | | |
| B-262 * | 0761-668 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | R | 0,2176 | 0,2176 | | |
| B-262 ** | 0761-668 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | R | 0,1787 | 0,1787 | | |
| B-262 *** | 0761-668 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | R | 0,2177 | 0,2177 | 0,0437 | 0,0733 |
| NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 3151-198 | 90 gélules, 400 mg | 90 capsules, hard, 400 mg | R | 25,12 | 25,12 | 3,93 | 6,60 |
| | 3151-198 | | | | 15,17 | 15,17 | | |
| B-262 * | 7712-912 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | R | 0,2176 | 0,2176 | | |
| B-262 ** | 7712-912 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | R | 0,1787 | 0,1787 | | |
| B-262 *** | 7712-912 | 1 gélule, 400 mg | 1 capsule, hard, 400 mg | R | 0,2177 | 0,2177 | 0,0437 | 0,0733 |
| NEURONTIN 600 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 1640-994 | 90 comprimés pelliculés, 600 mg | 90 filmomhulde tabletten, 600 mg | R | 34,53 | 34,53 | 5,24 | 8,81 |
| | 1640-994 | | | | 23,37 | 23,37 | | |
| B-262 * | 0769-596 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | R | 0,3351 | 0,3351 | | |
| B-262 ** | 0769-596 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | R | 0,2752 | 0,2752 | | |
| B-262 *** | 0769-596 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | R | 0,3222 | 0,3222 | 0,0582 | 0,0979 |
| NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 3151-180 | 90 comprimés pelliculés, 600 mg | 90 filmomhulde tabletten, 600 mg | R | 34,53 | 34,53 | 5,24 | 8,81 |
| | 3151-180 | | | | 23,37 | 23,37 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-262 * | 7712-920 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | R | 0,3351 | 0,3351 | | |
| B-262 ** | 7712-920 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | R | 0,2752 | 0,2752 | | |
| B-262 *** | 7712-920 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | R | 0,3222 | 0,3222 | 0,0582 | 0,0979 |
| NEURONTIN 800 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 1641-000 | 90 comprimés pelliculés, 800 mg | 90 filmomhulde tabletten, 800 mg | R | 43,16 | 43,16 | 6,44 | 10,84 |
| | 1641-000 | | | | 30,88 | 30,88 | | |
| B-262 * | 0769-604 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | R | 0,4427 | 0,4427 | | |
| B-262 ** | 0769-604 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | R | 0,3637 | 0,3637 | | |
| B-262 *** | 0769-604 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | R | 0,4181 | 0,4181 | 0,0716 | 0,1204 |
| NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF01 | |
| B-262 | 3151-172 | 90 comprimés pelliculés, 800 mg | 90 filmomhulde tabletten, 800 mg | R | 43,16 | 43,16 | 6,44 | 10,84 |
| | 3151-172 | | | | 30,88 | 30,88 | | |
| B-262 * | 7712-938 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | R | 0,4427 | 0,4427 | | |
| B-262 ** | 7712-938 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | R | 0,3637 | 0,3637 | | |
| B-262 *** | 7712-938 | 1 comprimé pelliculé, 800 mg | 1 filmomhulde tablet, 800 mg | R | 0,4181 | 0,4181 | 0,0716 | 0,1204 |
| NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml | | AGUETTANT | | | | | ATC: C08CA04 | |
| | 7712-789 | 10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | 10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | | 42,61 | 42,61 | | |
| B-20 * | 7712-789 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 5,2280 | 5,2280 | | |
| B-20 ** | 7712-789 | 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | G | 4,5170 | 4,5170 | | |
| NICOTIBINE 300 mg | | BEPHARBEL | | | | | ATC: J04AC01 | |
| A-19 | 0061-143 | 30 comprimés, 300 mg | 30 tabletten, 300 mg | | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 0061-143 | | | | 12,96 | 12,96 | | |
| A-19 * | 0712-851 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | | 0,5573 | 0,5573 | | |
| A-19 ** | 0712-851 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | | 0,4580 | 0,4580 | | |
| A-19 *** | 0712-851 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | | 0,5660 | 0,5660 | 0,0000 | 0,0000 |
| NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg | | EG | | | | | ATC: C08CA05 | |
| B-6 | 2948-214 | 98 comprimés à libération prolongée, 30 mg | 98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg | G | 23,64 | 23,64 | 3,68 | 6,13 |
| | 2948-214 | | | | 13,88 | 13,88 | | |
| B-6 * | 7700-024 | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg | G | 0,1828 | 0,1828 | | |
| B-6 ** | 7700-024 | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg | G | 0,1501 | 0,1501 | | |
| B-6 *** | 7700-024 | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg | G | 0,1847 | 0,1847 | 0,0376 | 0,0626 |
| NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg | | EG | | | | | ATC: C08CA05 | |
| B-6 | 2948-198 | 98 comprimés à libération prolongée, 60 mg | 98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg | G | 38,49 | 38,49 | 5,79 | 9,74 |
| | 2948-198 | | | | 26,81 | 26,81 | | |
| B-6 * | 7700-032 | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg | G | 0,3531 | 0,3531 | | |
| B-6 ** | 7700-032 | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg | G | 0,2900 | 0,2900 | | |
| B-6 *** | 7700-032 | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg | G | 0,3363 | 0,3363 | 0,0591 | 0,0994 |

| NILSTAT | | TEOFARMA | | ATC: A07AA02 | | | | |
|------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-134 | 0061-184 | 1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml | 1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml | | 8,44 | 8,44 | 0,58 | 0,97 |
| | 0061-184 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| B-134 * | 0712-893 | 1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL | | 0,0947 | 0,0947 | | |
| B-134 ** | 0712-893 | 1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL | | 0,0777 | 0,0777 | | |
| NIMBEX | | SANDOZ | | ATC: M03AC11 | | | | |
| | 0745-430 | 5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 12,41 | 12,41 | | |
| B-140 * | 0745-430 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 3,2040 | 3,2040 | | |
| B-140 ** | 0745-430 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 2,6300 | 2,6300 | | |
| NIMBEX | | SANDOZ | | ATC: M03AC11 | | | | |
| | 0745-422 | 5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 6,20 | 6,20 | | |
| B-140 * | 0745-422 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 1,6000 | 1,6000 | | |
| B-140 ** | 0745-422 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 1,3140 | 1,3140 | | |
| NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: C07BB12 | | | | |
| B-15 | 2661-569 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | R | 11,52 | 11,52 | 1,21 | 2,02 |
| | 2661-569 | | | | 4,57 | 4,57 | | |
| B-15 | 2661-551 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | R | 15,94 | 15,94 | 2,11 | 3,51 |
| | 2661-551 | | | | 7,94 | 7,94 | | |
| B-15 | 2662-757 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg | R | 17,51 | 17,51 | 2,42 | 4,04 |
| | 2662-757 | | | | 9,14 | 9,14 | | |
| B-15 * | 0796-516 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,1311 | 0,1311 | | |
| B-15 ** | 0796-516 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,1077 | 0,1077 | | |
| B-15 *** | 0796-516 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,1331 | 0,1331 | 0,0269 | 0,0449 |
| NOBIRETIC 5 mg/25 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: C07BB12 | | | | |
| B-15 | 2661-585 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg | R | 11,52 | 11,52 | 1,21 | 2,02 |
| | 2661-585 | | | | 4,57 | 4,57 | | |
| B-15 | 2661-577 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg | R | 15,94 | 15,94 | 2,11 | 3,51 |
| | 2661-577 | | | | 7,94 | 7,94 | | |
| B-15 | 2662-666 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg | R | 17,51 | 17,51 | 2,42 | 4,04 |
| | 2662-666 | | | | 9,14 | 9,14 | | |
| B-15 * | 0796-524 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg | R | 0,1311 | 0,1311 | | |
| B-15 ** | 0796-524 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg | R | 0,1077 | 0,1077 | | |
| B-15 *** | 0796-524 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg | R | 0,1331 | 0,1331 | 0,0269 | 0,0449 |
| NOBITEN 5 mg | | MENARINI BENELUX | | ATC: C07AB12 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-15 | 1625-680 1625-680 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | R | 11,64 4,66 | 11,64 4,66 | 1,24 | 2,06 |
| B-15 | 2511-947 2511-947 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | R | 15,75 7,80 | 15,75 7,80 | 2,07 | 3,45 |
| B-15 | 2661-544 2661-544 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | R | 19,95 11,00 | 19,95 11,00 | 2,92 | 4,86 |
| B-15 * | 0767-152 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1420 | 0,1420 | | |
| B-15 ** | 0767-152 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1166 | 0,1166 | | |
| B-15 *** | 0767-152 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1442 | 0,1442 | 0,0292 | 0,0486 |
| NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12 | | | | | | | | |
| B-15 | 2594-034 2594-034 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | R | 11,64 4,66 | 11,64 4,66 | 1,24 | 2,06 |
| B-15 | 2630-903 2630-903 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | R | 15,75 7,80 | 15,75 7,80 | 2,07 | 3,45 |
| B-15 | 2804-466 2804-466 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | R | 18,69 10,04 | 18,69 10,04 | 2,66 | 4,44 |
| B-15 * | 0791-723 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1296 | 0,1296 | | |
| B-15 ** | 0791-723 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1064 | 0,1064 | | |
| B-15 *** | 0791-723 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1825 | 0,1825 | 0,0370 | 0,0616 |
| NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G03DB04 | | | | | | | | |
| B-90 | 2565-471 2565-471 | 90 comprimés, 5 mg | 90 tabletten, 5 mg | G | 19,63 10,76 | 19,63 10,76 | 2,85 | 4,76 |
| B-90 * | 0792-226 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1543 | 0,1543 | | |
| B-90 ** | 0792-226 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1268 | 0,1268 | | |
| B-90 *** | 0792-226 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1566 | 0,1566 | 0,0317 | 0,0529 |
| NOLVADEX - D 20 ASTRAZENECA ATC: L02BA01 | | | | | | | | |
| A-27 | 1197-797 1197-797 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | R | 17,76 9,33 | 17,76 9,33 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0713-040 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2150 | 0,2150 | | |
| A-27 ** | 0713-040 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1766 | 0,1766 | | |
| A-27 *** | 0713-040 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2182 | 0,2182 | 0,0000 | 0,0000 |
| NORTRILEN LUNDBECK ATC: N06AA10 | | | | | | | | |
| B-73 | 0061-747 0061-747 | 50 comprimés pelliculés, 25 mg | 50 filmomhulde tabletten, 25 mg | | 7,97 1,79 | 7,97 1,79 | 0,47 | 0,79 |
| B-73 * | 0713-156 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 0,0462 | 0,0462 | | |
| B-73 ** | 0713-156 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 0,0380 | 0,0380 | | |
| B-73 *** | 0713-156 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 0,0488 | 0,0488 | 0,0094 | 0,0158 |
| NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg VIATRIS ATC: R03BA02 | | | | | | | | |
| B-99 | 2178-978 2178-978 | 200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose | 200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis | G | 19,98 11,02 | 19,98 11,02 | 2,92 | 4,87 |
| B-99 | 2827-673 2827-673 | 400 doses poudre pour inhalation, 200 µg | 400 doses inhalatiepoeder, 200 µg | G | 32,41 21,52 | 32,41 21,52 | 4,94 | 8,31 |
| B-99 * | 0778-274 | 1 nébulisateur, 200 µg/dose | 1 vernevelaar, 200 µg/dosis | G | 13,8850 | 13,8850 | | |
| B-99 ** | 0778-274 | 1 nébulisateur, 200 µg/dose | 1 vernevelaar, 200 µg/dosis | G | 11,4050 | 11,4050 | | |

| NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg | | VIATRIS | | | | ATC: R03AC13 | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-216 | 2386-043 | 60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis | | 28,27 | 28,27 | 4,37 | 7,34 |
| | 2386-043 | | | | 17,92 | 17,92 | | |
| B-216 * | 0785-485 | 1 dose, 12 µg/dose | 1 dosis, 12 µg/dosis | | 0,3855 | 0,3855 | | |
| B-216 ** | 0785-485 | 1 dose, 12 µg/dose | 1 dosis, 12 µg/dosis | | 0,3167 | 0,3167 | | |
| NOVONORM | | NOVO NORDISK PHARMA | | | | ATC: A10BX02 | | |
| A-61 | 1578-137 | 120 comprimés, 0,5 mg | 120 tabletten, 0,5 mg | R | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 1578-137 | | | | 5,24 | 5,24 | | |
| A-61 * | 0766-527 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | R | 0,0563 | 0,0563 | | |
| A-61 ** | 0766-527 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | R | 0,0463 | 0,0463 | | |
| A-61 *** | 0766-527 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | R | 0,0572 | 0,0572 | 0,0000 | 0,0000 |
| NOVONORM | | NOVO NORDISK PHARMA | | | | ATC: A10BX02 | | |
| A-61 | 1578-145 | 120 comprimés, 1 mg | 120 tabletten, 1 mg | R | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 1578-145 | | | | 5,24 | 5,24 | | |
| A-61 * | 0766-535 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | R | 0,0563 | 0,0563 | | |
| A-61 ** | 0766-535 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | R | 0,0463 | 0,0463 | | |
| A-61 *** | 0766-535 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | R | 0,0572 | 0,0572 | 0,0000 | 0,0000 |
| NOVONORM | | NOVO NORDISK PHARMA | | | | ATC: A10BX02 | | |
| A-61 | 1578-152 | 120 comprimés, 2 mg | 120 tabletten, 2 mg | R | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 1578-152 | | | | 5,24 | 5,24 | | |
| A-61 * | 0766-543 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | R | 0,0563 | 0,0563 | | |
| A-61 ** | 0766-543 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | R | 0,0463 | 0,0463 | | |
| A-61 *** | 0766-543 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | R | 0,0572 | 0,0572 | 0,0000 | 0,0000 |
| NOZINAN 100 mg | | NEURAXPHARM BELGIUM | | | | ATC: N05AA02 | | |
| B-69 | 0122-275 | 20 comprimés, 100 mg | 20 tabletten, 100 mg | | 9,47 | 9,47 | 0,80 | 1,33 |
| | 0122-275 | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| B-69 * | 0713-305 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1935 | 0,1935 | | |
| B-69 ** | 0713-305 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1590 | 0,1590 | | |
| B-69 *** | 0713-305 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1966 | 0,1966 | 0,0400 | 0,0665 |
| NOZINAN 25 mg | | NEURAXPHARM BELGIUM | | | | ATC: N05AA02 | | |
| B-69 | 0122-283 | 20 comprimés, 25 mg | 20 tabletten, 25 mg | | 7,79 | 7,79 | 0,43 | 0,72 |
| | 0122-283 | | | | 1,63 | 1,63 | | |
| B-69 * | 0713-297 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | | 0,1050 | 0,1050 | | |
| B-69 ** | 0713-297 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | | 0,0865 | 0,0865 | | |
| B-69 *** | 0713-297 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | | 0,1129 | 0,1129 | 0,0215 | 0,0360 |
| NPLATE 125 µg | | AMGEN | | | | ATC: B02BX04 | | |
| | 7725-518 | 1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg | 1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg | | 256,07 | 256,07 | | |
| A-95 * | 7725-518 | 1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg | 1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg | | 278,5400 | 278,5400 | | |
| A-95 ** | 7725-518 | 1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg | 1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg | | 271,4300 | 271,4300 | | |
| NPLATE 250 µg | | AMGEN | | | | ATC: B02BX04 | | |
| | 0799-023 | 1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml | 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml | | 440,65 | 440,65 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| A-95 * | 0799-023 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL | | 474,2000 | 474,2000 | | |
| A-95 ** | 0799-023 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL | | 467,0900 | 467,0900 | | |
| NPLATE 500 µg | | AMGEN | | ATC: B02BX04 | | | | |
| | 0799-031 | 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml | 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml | | 881,30 | 881,30 | | |
| A-95 * | 0799-031 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL | | 941,2900 | 941,2900 | | |
| A-95 ** | 0799-031 | 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL | 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL | | 934,1800 | 934,1800 | | |
| NYSTATINE LABAZ | | SANOFI BELGIUM | | ATC: A07AA02 | | | | |
| B-134 | 0062-521 | 1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml | 1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml | | 8,36 | 8,36 | 0,56 | 0,94 |
| | 0062-521 | | | | 2,13 | 2,13 | | |
| B-134 * | 0713-438 | 1 mL suspension buvable, 100000 IU/mL | 1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/mL | | 0,1146 | 0,1146 | | |
| B-134 ** | 0713-438 | 1 mL suspension buvable, 100000 IU/mL | 1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/mL | | 0,0942 | 0,0942 | | |
| OBRACIN | | EUROCEPT | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01GB01 | |
| | 0713-453 | 10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL | 10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL | | 16,75 | 16,75 | | |
| B-116 ** | 0713-453 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL | R | 1,7760 | 1,7760 | | |
| OESTROGEL | | CONGRESS PHARMA | | ATC: G03CA03 | | | | |
| B-89 | 3952-462 | 1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 % | 1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 % | | 11,01 | 11,01 | 1,11 | 1,85 |
| | 3952-462 | | | | 4,18 | 4,18 | | |
| B-89 | 3952-470 | 3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 % | 3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 % | | 21,95 | 21,95 | 3,32 | 5,54 |
| | 3952-470 | | | | 12,53 | 12,53 | | |
| B-89 * | 7725-278 | 1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g | 1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g | | 5,3900 | 5,3900 | | |
| B-89 ** | 7725-278 | 1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g | 1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g | | 4,4267 | 4,4267 | | |
| OLANZAPINE AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 4550-141 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 26,82 | 26,82 | 4,16 | 7,00 |
| | 4550-141 | | | | 16,65 | 16,65 | | |
| B-72 | 4550-158 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 44,58 | 44,58 | 6,64 | 11,17 |
| | 4550-158 | | | | 32,12 | 32,12 | | |
| B-72 * | 7735-202 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,4200 | 0,4200 | | |
| B-72 ** | 7735-202 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,3474 | 0,3474 | | |
| B-72 *** | 7735-202 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,3985 | 0,3985 | 0,0678 | 0,1140 |
| OLANZAPINE AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 4409-108 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | 26,82 | 26,82 | 4,16 | 7,00 |
| | 4409-108 | | | | 16,65 | 16,65 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-72 | 4409-116 4409-116 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 44,58 32,12 | 44,58 32,12 | 6,64 | 11,17 |
| B-72 * | 7732-944 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,4200 | 0,4200 | | |
| B-72 ** | 7732-944 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3474 | 0,3474 | | |
| B-72 *** | 7732-944 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3985 | 0,3985 | 0,0678 | 0,1140 |
| OLANZAPINE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03 | | | | | | | | |
| B-72 | 4550-166 4550-166 | 28 comprimés orodispersibles, 15 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | G | 81,73 64,65 | 81,73 64,65 | 8,30 | 12,50 |
| B-72 * | 7735-335 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 2,7014 | 2,7014 | | |
| B-72 ** | 7735-335 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 2,4475 | 2,4475 | | |
| B-72 *** | 7735-335 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | G | 2,7212 | 2,7212 | 0,2964 | 0,4464 |
| OLANZAPINE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03 | | | | | | | | |
| B-72 | 4550-174 4550-174 | 98 comprimés orodispersibles, 20 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | G | 81,28 64,24 | 81,28 64,24 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 7735-343 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,7673 | 0,7673 | | |
| B-72 ** | 7735-343 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,6948 | 0,6948 | | |
| B-72 *** | 7735-343 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | G | 0,7729 | 0,7729 | 0,1041 | 0,1582 |
| OLANZAPINE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03 | | | | | | | | |
| B-72 | 4409-074 4409-074 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 19,37 10,56 | 19,37 10,56 | 2,80 | 4,67 |
| B-72 | 4409-082 4409-082 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 37,34 25,81 | 37,34 25,81 | 5,63 | 9,47 |
| B-72 * | 7732-928 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,3399 | 0,3399 | | |
| B-72 ** | 7732-928 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,2792 | 0,2792 | | |
| B-72 *** | 7732-928 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,3246 | 0,3246 | 0,0574 | 0,0966 |
| OLANZAPINE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03 | | | | | | | | |
| B-72 | 4550-125 4550-125 | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 19,37 10,56 | 19,37 10,56 | 2,80 | 4,67 |
| B-72 | 4550-133 4550-133 | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 37,25 25,73 | 37,25 25,73 | 5,62 | 9,45 |
| B-72 * | 7735-194 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,3388 | 0,3388 | | |
| B-72 ** | 7735-194 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,2783 | 0,2783 | | |
| B-72 *** | 7735-194 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,3236 | 0,3236 | 0,0573 | 0,0964 |
| OLANZAPINE AB 7,5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03 | | | | | | | | |
| B-72 | 4409-090 4409-090 | 56 comprimés, 7,5 mg | 56 tabletten, 7,5 mg | G | 26,84 16,67 | 26,84 16,67 | 4,17 | 7,00 |
| B-72 * | 7732-936 | 1 comprimé, 7,5 mg | 1 tablet, 7,5 mg | G | 0,3841 | 0,3841 | | |
| B-72 ** | 7732-936 | 1 comprimé, 7,5 mg | 1 tablet, 7,5 mg | G | 0,3155 | 0,3155 | | |
| B-72 *** | 7732-936 | 1 comprimé, 7,5 mg | 1 tablet, 7,5 mg | G | 0,3805 | 0,3805 | 0,0745 | 0,1250 |
| OLANZAPINE EG 10 mg EG ATC: N05AH03 | | | | | | | | |
| B-72 | 2805-299 2805-299 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 27,77 17,48 | 27,77 17,48 | 4,30 | 7,22 |
| B-72 | 2805-224 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 46,72 | 46,72 | 6,94 | 11,67 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2805-224 | | | | 33,98 | 33,98 | | |
| B-72 * | 0757-849 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4401 | 0,4401 | | |
| B-72 ** | 0757-849 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3676 | 0,3676 | | |
| B-72 *** | 0757-849 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4203 | 0,4203 | 0,0708 | 0,1191 |
| OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 3763-083 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 27,77 | 27,77 | 4,30 | 7,22 |
| | 3763-083 | | | | 17,48 | 17,48 | | |
| B-72 | 3763-091 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 85,81 | 85,81 | 8,30 | 12,50 |
| | 3763-091 | | | | 68,37 | 68,37 | | |
| B-72 | 3734-795 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 46,72 | 46,72 | 6,94 | 11,67 |
| | 3734-795 | | | | 33,98 | 33,98 | | |
| B-72 * | 7722-853 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4401 | 0,4401 | | |
| B-72 ** | 7722-853 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3676 | 0,3676 | | |
| B-72 *** | 7722-853 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4203 | 0,4203 | 0,0708 | 0,1191 |
| OLANZAPINE EG 5 mg | | EG | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 2805-232 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 20,09 | 20,09 | 2,95 | 4,91 |
| | 2805-232 | | | | 11,11 | 11,11 | | |
| B-72 | 2805-257 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 38,39 | 38,39 | 5,78 | 9,72 |
| | 2805-257 | | | | 26,73 | 26,73 | | |
| B-72 * | 0757-955 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3520 | 0,3520 | | |
| B-72 ** | 0757-955 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,2891 | 0,2891 | | |
| B-72 *** | 0757-955 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3353 | 0,3353 | 0,0590 | 0,0992 |
| OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 3763-059 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 20,09 | 20,09 | 2,95 | 4,91 |
| | 3763-059 | | | | 11,11 | 11,11 | | |
| B-72 | 3763-067 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 41,14 | 41,14 | 6,16 | 10,36 |
| | 3763-067 | | | | 29,12 | 29,12 | | |
| B-72 | 3734-779 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 38,39 | 38,39 | 5,78 | 9,72 |
| | 3734-779 | | | | 26,73 | 26,73 | | |
| B-72 * | 7722-838 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3520 | 0,3520 | | |
| B-72 ** | 7722-838 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,2891 | 0,2891 | | |
| B-72 *** | 7722-838 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3353 | 0,3353 | 0,0590 | 0,0992 |
| OLANZAPINE EG 7,5 mg | | EG | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 2805-281 | 98 comprimés pelliculés, 7,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | G | 104,55 | 104,55 | 10,20 | 15,50 |
| | 2805-281 | | | | 85,46 | 85,46 | | |
| B-72 * | 0757-963 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,9969 | 0,9969 | | |
| B-72 ** | 0757-963 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,9244 | 0,9244 | | |
| B-72 *** | 0757-963 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 1,0104 | 1,0104 | 0,1041 | 0,1582 |
| OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 3763-075 | 56 comprimés pelliculés, 7,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | G | 28,16 | 28,16 | 4,35 | 7,31 |
| | 3763-075 | | | | 17,83 | 17,83 | | |
| B-72 | 3734-787 | 98 comprimés pelliculés, 7,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | G | 104,55 | 104,55 | 10,20 | 15,50 |
| | 3734-787 | | | | 85,46 | 85,46 | | |
| B-72 * | 7722-846 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,9969 | 0,9969 | | |
| B-72 ** | 7722-846 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,9244 | 0,9244 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-72 *** | 7722-846 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 1,0104 | 1,0104 | 0,1041 | 0,1582 |
| OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EG | | | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2760-684 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 27,77 | 27,77 | 4,30 | 7,22 |
| | 2760-684 | | | | 17,48 | 17,48 | | |
| B-72 | 2745-198 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 46,72 | 46,72 | 6,94 | 11,67 |
| | 2745-198 | | | | 33,98 | 33,98 | | |
| B-72 * | 0759-373 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,4401 | 0,4401 | | |
| B-72 ** | 0759-373 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,3676 | 0,3676 | | |
| B-72 *** | 0759-373 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,4203 | 0,4203 | 0,0708 | 0,1191 |
| OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EG | | | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2760-676 | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 20,09 | 20,09 | 2,95 | 4,91 |
| | 2760-676 | | | | 11,11 | 11,11 | | |
| B-72 | 2745-214 | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 38,39 | 38,39 | 5,78 | 9,72 |
| | 2745-214 | | | | 26,73 | 26,73 | | |
| B-72 * | 0759-381 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,3520 | 0,3520 | | |
| B-72 ** | 0759-381 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,2891 | 0,2891 | | |
| B-72 *** | 0759-381 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,3353 | 0,3353 | 0,0590 | 0,0992 |
| OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ | | | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2970-077 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 27,77 | 27,77 | 4,30 | 7,22 |
| | 2970-077 | | | | 17,48 | 17,48 | | |
| B-72 | 2970-093 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | 46,72 | 46,72 | 6,94 | 11,67 |
| | 2970-093 | | | | 33,98 | 33,98 | | |
| B-72 * | 7700-123 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,4401 | 0,4401 | | |
| B-72 ** | 7700-123 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,3676 | 0,3676 | | |
| B-72 *** | 7700-123 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | 0,4203 | 0,4203 | 0,0708 | 0,1191 |
| OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ | | | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2775-674 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 27,77 | 27,77 | 4,30 | 7,22 |
| | 2775-674 | | | | 17,48 | 17,48 | | |
| B-72 | 2775-682 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 85,80 | 85,80 | 8,30 | 12,50 |
| | 2775-682 | | | | 68,36 | 68,36 | | |
| B-72 | 4486-189 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 47,52 | 47,52 | 7,05 | 11,86 |
| | 4486-189 | | | | 34,67 | 34,67 | | |
| B-72 * | 0758-367 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4386 | 0,4386 | | |
| B-72 ** | 0758-367 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3675 | 0,3675 | | |
| B-72 *** | 0758-367 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 1,4333 | 1,4333 | 0,1482 | 0,2232 |
| OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO | | | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 3445-723 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 85,80 | 85,80 | 8,30 | 12,50 |
| | 3445-723 | | | | 68,36 | 68,36 | | |
| B-72 | 3445-715 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 46,72 | 46,72 | 6,94 | 11,67 |
| | 3445-715 | | | | 33,98 | 33,98 | | |
| B-72 * | 7719-461 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4401 | 0,4401 | | |
| B-72 ** | 7719-461 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3676 | 0,3676 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-72 *** | 7719-461 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4203 | 0,4203 | 0,0708 | 0,1191 |
| OLANZAPINE SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2775-690 2775-690 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 20,09 11,11 | 20,09 11,11 | 2,95 | 4,91 |
| B-72 | 2877-686 2877-686 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 41,13 29,11 | 41,13 29,11 | 6,16 | 10,36 |
| B-72 | 2877-694 2877-694 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 38,39 26,73 | 38,39 26,73 | 5,78 | 9,72 |
| B-72 | 4486-163 4486-163 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 38,70 27,00 | 38,70 27,00 | 5,82 | 9,79 |
| B-72 * | 0758-383 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3484 | 0,3484 | | |
| B-72 ** | 0758-383 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,2862 | 0,2862 | | |
| B-72 *** | 0758-383 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3317 | 0,3317 | 0,0582 | 0,0979 |
| OLANZAPINE SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2970-051 2970-051 | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 20,09 11,11 | 20,09 11,11 | 2,95 | 4,91 |
| B-72 | 2890-523 2890-523 | 56 comprimés orodispersibles, 5 mg | 56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 41,13 29,11 | 41,13 29,11 | 6,16 | 10,36 |
| B-72 | 2970-069 2970-069 | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 38,39 26,73 | 38,39 26,73 | 5,78 | 9,72 |
| B-72 * | 0752-576 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,3520 | 0,3520 | | |
| B-72 ** | 0752-576 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,2891 | 0,2891 | | |
| B-72 *** | 0752-576 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | G | 0,5198 | 0,5198 | 0,1054 | 0,1754 |
| OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 3445-749 3445-749 | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 41,13 29,11 | 41,13 29,11 | 6,16 | 10,36 |
| B-72 | 3445-731 3445-731 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 38,39 26,73 | 38,39 26,73 | 5,78 | 9,72 |
| B-72 * | 7719-453 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3520 | 0,3520 | | |
| B-72 ** | 7719-453 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,2891 | 0,2891 | | |
| B-72 *** | 7719-453 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3353 | 0,3353 | 0,0590 | 0,0992 |
| OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 2775-708 2775-708 | 56 comprimés pelliculés, 7,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | G | 28,16 17,83 | 28,16 17,83 | 4,35 | 7,31 |
| B-72 | 4486-171 4486-171 | 100 comprimés pelliculés, 7,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | G | 106,43 87,19 | 106,43 87,19 | 10,20 | 15,50 |
| B-72 * | 0758-375 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,9953 | 0,9953 | | |
| B-72 ** | 0758-375 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,9242 | 0,9242 | | |
| B-72 *** | 0758-375 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 1,0090 | 1,0090 | 0,1020 | 0,1550 |
| OLANZAPINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 3049-210 3049-210 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 26,87 16,70 | 26,87 16,70 | 4,17 | 7,01 |
| B-72 | 3049-228 3049-228 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 44,67 32,19 | 44,67 32,19 | 6,65 | 11,19 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-72 * | 7704-380 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,4207 | 0,4207 | | |
| B-72 ** | 7704-380 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3482 | 0,3482 | | |
| B-72 *** | 7704-380 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3993 | 0,3993 | 0,0679 | 0,1142 |
| OLANZAPINE TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 3049-186 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 19,46 | 19,46 | 2,82 | 4,70 |
| | 3049-186 | | | | 10,63 | 10,63 | | |
| B-72 | 3049-194 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 37,42 | 37,42 | 5,64 | 9,49 |
| | 3049-194 | | | | 25,88 | 25,88 | | |
| B-72 * | 7704-364 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3408 | 0,3408 | | |
| B-72 ** | 7704-364 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,2799 | 0,2799 | | |
| B-72 *** | 7704-364 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,3254 | 0,3254 | 0,0576 | 0,0968 |
| OLANZAPINE TEVA 7,5 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 3049-202 | 56 comprimés pelliculés, 7,5 mg | 56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | G | 26,87 | 26,87 | 4,17 | 7,01 |
| | 3049-202 | | | | 16,70 | 16,70 | | |
| B-72 * | 7704-372 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,3848 | 0,3848 | | |
| B-72 ** | 7704-372 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,3161 | 0,3161 | | |
| B-72 *** | 7704-372 | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg | G | 0,3810 | 0,3810 | 0,0745 | 0,1252 |
| OLMESARTAN AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: C09CA08 | | | |
| B-224 | 4497-392 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 12,76 | 12,76 | 1,46 | 2,44 |
| | 4497-392 | | | | 5,52 | 5,52 | | |
| B-224 | 4497-400 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 30,08 | 30,08 | 4,62 | 7,76 |
| | 4497-400 | | | | 19,49 | 19,49 | | |
| B-224 * | 7735-210 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2566 | 0,2566 | | |
| B-224 ** | 7735-210 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2108 | 0,2108 | | |
| B-224 *** | 7735-210 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2505 | 0,2505 | 0,0471 | 0,0792 |
| OLMESARTAN AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: C09CA08 | | | |
| B-224 | 4497-418 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,03 | 14,03 | 1,72 | 2,87 |
| | 4497-418 | | | | 6,49 | 6,49 | | |
| B-224 | 4497-426 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 28,79 | 28,79 | 4,44 | 7,46 |
| | 4497-426 | | | | 18,37 | 18,37 | | |
| B-224 * | 7735-228 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2419 | 0,2419 | | |
| B-224 ** | 7735-228 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1987 | 0,1987 | | |
| B-224 *** | 7735-228 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2373 | 0,2373 | 0,0453 | 0,0761 |
| OLMESARTAN AB 40 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: C09CA08 | | | |
| B-224 | 4497-434 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 14,03 | 14,03 | 1,72 | 2,87 |
| | 4497-434 | | | | 6,49 | 6,49 | | |
| B-224 | 4497-442 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 30,08 | 30,08 | 4,62 | 7,76 |
| | 4497-442 | | | | 19,49 | 19,49 | | |
| B-224 * | 7735-236 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2566 | 0,2566 | | |
| B-224 ** | 7735-236 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2108 | 0,2108 | | |
| B-224 *** | 7735-236 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2505 | 0,2505 | 0,0471 | 0,0792 |
| OLMESARTAN EG 10 mg | | EG | | | ATC: C09CA08 | | | |
| B-224 | 3495-959 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3495-959 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7716-566 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 7716-566 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7716-566 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN EG 20 mg | | EG | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 3485-844 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3485-844 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3487-766 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 30,29 | 30,29 | 4,65 | 7,81 |
| | 3487-766 | | | | 19,68 | 19,68 | | |
| B-224 * | 7716-574 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2592 | 0,2592 | | |
| B-224 ** | 7716-574 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2129 | 0,2129 | | |
| B-224 *** | 7716-574 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2527 | 0,2527 | 0,0474 | 0,0797 |
| OLMESARTAN EG 40 mg | | EG | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 3488-129 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3488-129 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3488-376 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3488-376 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7716-582 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7716-582 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7716-582 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN KRKA 10 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 3528-742 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3528-742 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7717-937 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7717-937 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7717-937 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN KRKA 20 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 3529-773 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3529-773 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3528-759 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 28,80 | 28,80 | 4,44 | 7,46 |
| | 3528-759 | | | | 18,38 | 18,38 | | |
| B-224 * | 7717-945 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2420 | 0,2420 | | |
| B-224 ** | 7717-945 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1988 | 0,1988 | | |
| B-224 *** | 7717-945 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2374 | 0,2374 | 0,0453 | 0,0761 |
| OLMESARTAN KRKA 40 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 3528-767 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3528-767 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7717-952 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7717-952 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7717-952 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg | | EG | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3532-520 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3532-520 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3532-538 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg | G | 30,76 | 30,76 | 4,71 | 7,92 |
| | 3532-538 | | | | 20,08 | 20,08 | | |
| B-224 * | 7719-255 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 | G | 0,2644 | 0,2644 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 7719-255 | mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2171 | 0,2171 | | |
| B-224 *** | 7719-255 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2574 | 0,2574 | 0,0481 | 0,0808 |
| OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EG | | | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3532-546 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3532-546 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3532-561 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg | G | 30,76 | 30,76 | 4,71 | 7,92 |
| | 3532-561 | | | | 20,08 | 20,08 | | |
| B-224 * | 7719-263 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2644 | 0,2644 | | |
| B-224 ** | 7719-263 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2171 | 0,2171 | | |
| B-224 *** | 7719-263 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2574 | 0,2574 | 0,0481 | 0,0808 |
| OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EG | | | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3531-274 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3531-274 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3531-282 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3531-282 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7719-271 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7719-271 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7719-271 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EG | | | | ATC: C09DA08 | | | | |
| B-224 | 3531-290 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3531-290 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3531-308 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3531-308 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7719-289 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7719-289 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7719-289 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ | | | | ATC: C09CA08 | | | | |
| B-224 | 3466-992 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 13,25 | 13,25 | 1,56 | 2,60 |
| | 3466-992 | | | | 5,89 | 5,89 | | |
| B-224 | 3479-029 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3479-029 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7716-889 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7716-889 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7716-889 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |

| OLMESARTAN SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA08 | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-224 | 3467-008 3467-008 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,14 6,57 | 14,14 6,57 | 1,74 | 2,90 | |
| B-224 | 3467-016 3467-016 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 30,29 19,68 | 30,29 19,68 | 4,65 | 7,81 | |
| B-224 * | 7716-897 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2592 | 0,2592 | | | |
| B-224 ** | 7716-897 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2129 | 0,2129 | | | |
| B-224 *** | 7716-897 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2527 | 0,2527 | 0,0474 | 0,0797 | |
| OLMESARTAN SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA08 | | | | | |
| B-224 | 3467-024 3467-024 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 14,14 6,57 | 14,14 6,57 | 1,74 | 2,90 | |
| B-224 | 3467-032 3467-032 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 31,25 20,51 | 31,25 20,51 | 4,78 | 8,04 | |
| B-224 * | 7716-905 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | | |
| B-224 ** | 7716-905 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | | |
| B-224 *** | 7716-905 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 | |
| OLMESARTAN TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA08 | | | | | |
| B-224 | 4567-301 4567-301 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 13,13 5,80 | 13,13 5,80 | 1,54 | 2,56 | |
| B-224 | 4567-293 4567-293 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 30,09 19,50 | 30,09 19,50 | 4,62 | 7,76 | |
| B-224 * | 7736-630 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2567 | 0,2567 | | | |
| B-224 ** | 7736-630 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2109 | 0,2109 | | | |
| B-224 *** | 7736-630 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2506 | 0,2506 | 0,0471 | 0,0792 | |
| OLMESARTAN TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA08 | | | | | |
| B-224 | 4567-285 4567-285 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,05 6,50 | 14,05 6,50 | 1,72 | 2,87 | |
| B-224 | 4567-277 4567-277 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,85 19,29 | 29,85 19,29 | 4,59 | 7,71 | |
| B-224 * | 7736-648 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2540 | 0,2540 | | | |
| B-224 ** | 7736-648 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2087 | 0,2087 | | | |
| B-224 *** | 7736-648 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2481 | 0,2481 | 0,0468 | 0,0787 | |
| OLMESARTAN TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA08 | | | | | |
| B-224 | 4567-251 4567-251 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 14,05 6,50 | 14,05 6,50 | 1,72 | 2,87 | |
| B-224 | 4567-269 4567-269 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 30,09 19,50 | 30,09 19,50 | 4,62 | 7,76 | |
| B-224 * | 7736-655 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2567 | 0,2567 | | | |
| B-224 ** | 7736-655 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2109 | 0,2109 | | | |
| B-224 *** | 7736-655 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2506 | 0,2506 | 0,0471 | 0,0792 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg | | VIATRIS | | ATC: C09DX03 | | | | | |
| B-224 | 4213-757 4213-757 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 19,43 10,60 | 19,43 10,60 | 2,81 | 4,69 | |
| B-224 | 4213-765 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 33,02 | 33,02 | 5,03 | 8,45 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| | | mg/ 12,5 mg | mg/ 12,5 mg | | | | | | |
| | 4213-765 | | | | 22,04 | 22,04 | | | |
| B-224 * | 7728-819 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2902 | 0,2902 | | | |
| B-224 ** | 7728-819 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2384 | 0,2384 | | | |
| B-224 *** | 7728-819 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2805 | 0,2805 | 0,0513 | 0,0862 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg VIATRIS | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4213-781 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 44,27 | 44,27 | 6,59 | 11,10 | |
| | 4213-781 | | | | 31,84 | 31,84 | | | |
| B-224 * | 7728-843 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,4169 | 0,4169 | | | |
| B-224 ** | 7728-843 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,3444 | 0,3444 | | | |
| B-224 *** | 7728-843 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,3952 | 0,3952 | 0,0672 | 0,1133 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg VIATRIS | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4213-807 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 44,27 | 44,27 | 6,59 | 11,10 | |
| | 4213-807 | | | | 31,84 | 31,84 | | | |
| B-224 * | 7728-850 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,4169 | 0,4169 | | | |
| B-224 ** | 7728-850 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,3444 | 0,3444 | | | |
| B-224 *** | 7728-850 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,3952 | 0,3952 | 0,0672 | 0,1133 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg VIATRIS | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4213-773 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 33,02 | 33,02 | 5,03 | 8,45 | |
| | 4213-773 | | | | 22,04 | 22,04 | | | |
| B-224 * | 7728-827 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2902 | 0,2902 | | | |
| B-224 ** | 7728-827 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2384 | 0,2384 | | | |
| B-224 *** | 7728-827 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2805 | 0,2805 | 0,0513 | 0,0862 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg VIATRIS | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4213-799 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 33,02 | 33,02 | 5,03 | 8,45 | |
| | 4213-799 | | | | 22,04 | 22,04 | | | |
| B-224 * | 7728-835 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2902 | 0,2902 | | | |
| B-224 ** | 7728-835 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2384 | 0,2384 | | | |
| B-224 *** | 7728-835 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2805 | 0,2805 | 0,0513 | 0,0862 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg AUROBINDO NV | | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 4486-742 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 | |
| | 4486-742 | | | | 10,60 | 10,60 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 | 4486-726 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 4486-726 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 7734-452 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 7734-452 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7734-452 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 4486-684 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 19,19 | 19,19 | 2,76 | 4,61 |
| | 4486-684 | | | | 10,42 | 10,42 | | |
| B-224 | 4486-494 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 50,07 | 50,07 | 7,40 | 12,46 |
| | 4486-494 | | | | 36,89 | 36,89 | | |
| B-224 * | 7734-478 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 7734-478 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 7734-478 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 4486-700 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg | G | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 4486-700 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 4486-692 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg | G | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 4486-692 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 7734-460 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 7734-460 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7734-460 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg | | EG | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3714-672 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 20,41 | 20,41 | 3,01 | 5,02 |
| | 3714-672 | | | | 11,35 | 11,35 | | |
| B-224 | 3714-680 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 38,36 | 38,36 | 5,77 | 9,71 |
| | 3714-680 | | | | 26,70 | 26,70 | | |
| B-224 * | 7721-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3446 | 0,3446 | | |
| B-224 ** | 7721-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7721-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3283 | 0,3283 | 0,0577 | 0,0971 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg | | EG | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3714-698 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg | G | 20,17 | 20,17 | 2,96 | 4,94 |
| | 3714-698 | | | | 11,17 | 11,17 | | |
| B-224 | 3714-706 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg | G | 50,92 | 50,92 | 7,52 | 12,66 |
| | 3714-706 | | | | 37,63 | 37,63 | | |
| B-224 * | 7721-996 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4700 | 0,4700 | | |
| B-224 ** | 7721-996 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3989 | 0,3989 | | |
| B-224 *** | 7721-996 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4539 | 0,4539 | 0,0752 | 0,1266 |

| OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 | 3714-714 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg | G | 20,41 | 20,41 | 3,01 | 5,02 |
| | 3714-714 | | | | 11,35 | 11,35 | | |
| B-224 | 3714-722 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg | G | 38,36 | 38,36 | 5,77 | 9,71 |
| | 3714-722 | | | | 26,70 | 26,70 | | |
| B-224 * | 7721-988 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3446 | 0,3446 | | |
| B-224 ** | 7721-988 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7721-988 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3283 | 0,3283 | 0,0577 | 0,0971 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3689-361 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 3689-361 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 3689-379 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 3689-379 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 7721-731 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 7721-731 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7721-731 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3689-411 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 50,07 | 50,07 | 7,40 | 12,46 |
| | 3689-411 | | | | 36,89 | 36,89 | | |
| B-224 * | 7721-756 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 7721-756 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 7721-756 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3689-387 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg | G | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |
| | 3689-387 | | | | 10,60 | 10,60 | | |
| B-224 | 3689-395 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg | G | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 3689-395 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 7721-749 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 7721-749 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7721-749 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3745-445 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg | G | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 |
| | 3745-445 | | | | 26,16 | 26,16 | | |
| B-224 * | 7722-556 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 7722-556 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 7722-556 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | G | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3748-720 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | G | 50,07 | 50,07 | 7,40 | 12,46 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 3748-720 | | | | | 36,89 | 36,89 | | |
| B-224 * | 7722-572 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4715 | 0,4715 | | | |
| B-224 ** | 7722-572 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,3990 | 0,3990 | | | |
| B-224 *** | 7722-572 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | G | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ | | | | | ATC: C09DB02 | | | | |
| B-224 | 3745-437 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg | G | 37,75 | 37,75 | 5,69 | 9,56 | |
| | 3745-437 | | | | 26,16 | 26,16 | | | |
| B-224 * | 7722-564 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3445 | 0,3445 | | | |
| B-224 ** | 7722-564 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,2830 | 0,2830 | | | |
| B-224 *** | 7722-564 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | G | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EG | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4263-281 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 38,35 | 38,35 | 5,77 | 9,71 | |
| | 4263-281 | | | | 26,69 | 26,69 | | | |
| B-224 * | 7728-686 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,3444 | 0,3444 | | | |
| B-224 ** | 7728-686 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2829 | 0,2829 | | | |
| B-224 *** | 7728-686 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,3282 | 0,3282 | 0,0577 | 0,0971 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EG | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4263-349 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 50,92 | 50,92 | 7,52 | 12,66 | |
| | 4263-349 | | | | 37,63 | 37,63 | | | |
| B-224 * | 7728-702 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,4700 | 0,4700 | | | |
| B-224 ** | 7728-702 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,3989 | 0,3989 | | | |
| B-224 *** | 7728-702 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,4539 | 0,4539 | 0,0752 | 0,1266 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EG | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4263-406 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 50,92 | 50,92 | 7,52 | 12,66 | |
| | 4263-406 | | | | 37,63 | 37,63 | | | |
| B-224 * | 7728-728 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,4700 | 0,4700 | | | |
| B-224 ** | 7728-728 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,3989 | 0,3989 | | | |
| B-224 *** | 7728-728 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,4539 | 0,4539 | 0,0752 | 0,1266 | |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EG | | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4263-315 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 38,35 | 38,35 | 5,77 | 9,71 | |
| | 4263-315 | | | | 26,69 | 26,69 | | | |
| B-224 * | 7728-694 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,3444 | 0,3444 | | | |
| B-224 ** | 7728-694 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2829 | 0,2829 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 *** | 7728-694 | 12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,3282 | 0,3282 | 0,0577 | 0,0971 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg EG | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4263-372 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 38,35 | 38,35 | 5,77 | 9,71 |
| | 4263-372 | | | | 26,69 | 26,69 | | |
| B-224 * | 7728-710 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,3444 | 0,3444 | | |
| B-224 ** | 7728-710 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2829 | 0,2829 | | |
| B-224 *** | 7728-710 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,3282 | 0,3282 | 0,0577 | 0,0971 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4249-173 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 31,73 | 31,73 | 4,85 | 8,15 |
| | 4249-173 | | | | 20,93 | 20,93 | | |
| B-224 * | 7728-769 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2756 | 0,2756 | | |
| B-224 ** | 7728-769 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2264 | 0,2264 | | |
| B-224 *** | 7728-769 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2673 | 0,2673 | 0,0495 | 0,0832 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4249-199 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 41,61 | 41,61 | 6,22 | 10,47 |
| | 4249-199 | | | | 29,52 | 29,52 | | |
| B-224 * | 7728-793 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,3888 | 0,3888 | | |
| B-224 ** | 7728-793 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,3193 | 0,3193 | | |
| B-224 *** | 7728-793 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | G | 0,3681 | 0,3681 | 0,0635 | 0,1068 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4249-215 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 41,61 | 41,61 | 6,22 | 10,47 |
| | 4249-215 | | | | 29,52 | 29,52 | | |
| B-224 * | 7728-801 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,3888 | 0,3888 | | |
| B-224 ** | 7728-801 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,3193 | 0,3193 | | |
| B-224 *** | 7728-801 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | G | 0,3681 | 0,3681 | 0,0635 | 0,1068 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 4249-231 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 31,73 | 31,73 | 4,85 | 8,15 |
| | 4249-231 | | | | 20,93 | 20,93 | | |
| B-224 * | 7728-777 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2756 | 0,2756 | | |
| B-224 ** | 7728-777 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2264 | 0,2264 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 *** | 7728-777 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | G | 0,2673 | 0,2673 | 0,0495 | 0,0832 |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | ATC: C09DX03 | | | |
| B-224 | 4249-157 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 31,73 | 31,73 | 4,85 | 8,15 |
| | 4249-157 | | | | 20,93 | 20,93 | | |
| B-224 * | 7728-785 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2756 | 0,2756 | | |
| B-224 ** | 7728-785 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2264 | 0,2264 | | |
| B-224 *** | 7728-785 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | G | 0,2673 | 0,2673 | 0,0495 | 0,0832 |
| OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | ATC: C09DA08 | | | |
| B-224 | 3528-809 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3528-809 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3528-825 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg | G | 28,94 | 28,94 | 4,46 | 7,49 |
| | 3528-825 | | | | 18,50 | 18,50 | | |
| B-224 * | 7718-265 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2436 | 0,2436 | | |
| B-224 ** | 7718-265 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2001 | 0,2001 | | |
| B-224 *** | 7718-265 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | G | 0,2388 | 0,2388 | 0,0455 | 0,0764 |
| OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | ATC: C09DA08 | | | |
| B-224 | 3529-708 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3529-708 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3529-716 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg | G | 28,94 | 28,94 | 4,46 | 7,49 |
| | 3529-716 | | | | 18,50 | 18,50 | | |
| B-224 * | 7718-273 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2436 | 0,2436 | | |
| B-224 ** | 7718-273 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2001 | 0,2001 | | |
| B-224 *** | 7718-273 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | G | 0,2388 | 0,2388 | 0,0455 | 0,0764 |
| OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | ATC: C09DA08 | | | |
| B-224 | 3529-724 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | G | 14,14 | 14,14 | 1,74 | 2,90 |
| | 3529-724 | | | | 6,57 | 6,57 | | |
| B-224 | 3529-732 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3529-732 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7718-281 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7718-281 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7718-281 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | | ATC: C09DA08 | | | |
| B-224 | 3529-757 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| | 3529-757 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-224 * | 7718-299 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2701 | 0,2701 | | |
| B-224 ** | 7718-299 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2218 | 0,2218 | | |
| B-224 *** | 7718-299 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | G | 0,2624 | 0,2624 | 0,0488 | 0,0820 |
| OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2091-007 2091-007 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 12,78 5,53 | 12,78 5,53 | 1,47 | 2,44 |
| B-224 * | 0777-441 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,2550 | 0,2550 | | |
| B-224 ** | 0777-441 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,2093 | 0,2093 | | |
| B-224 *** | 0777-441 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,2589 | 0,2589 | 0,0525 | 0,0871 |
| OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2091-072 2091-072 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 14,20 6,62 | 14,20 6,62 | 1,76 | 2,93 |
| B-224 | 2091-080 2091-080 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 28,95 18,51 | 28,95 18,51 | 4,46 | 7,50 |
| B-224 * | 0777-433 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 0777-433 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 0777-433 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2091-098 2091-098 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 14,47 6,82 | 14,47 6,82 | 1,81 | 3,01 |
| B-224 | 2091-114 2091-114 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | R | 31,41 20,65 | 31,41 20,65 | 4,80 | 8,08 |
| B-224 * | 0777-458 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2719 | 0,2719 | | |
| B-224 ** | 0777-458 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2234 | 0,2234 | | |
| B-224 *** | 0777-458 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | R | 0,2640 | 0,2640 | 0,0490 | 0,0824 |
| OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2337-988 2337-988 | 28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg | R | 14,20 6,62 | 14,20 6,62 | 1,76 | 2,93 |
| B-224 | 2338-028 2338-028 | 98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg | R | 28,95 18,51 | 28,95 18,51 | 4,46 | 7,50 |
| B-224 * | 0784-447 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-224 ** | 0784-447 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 0784-447 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2338-051 2338-051 | 28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg | R | 14,20 6,62 | 14,20 6,62 | 1,76 | 2,93 |
| B-224 | 2337-947 2337-947 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg | R | 28,95 18,51 | 28,95 18,51 | 4,46 | 7,50 |
| B-224 * | 0785-048 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | R | 0,2438 | 0,2438 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-224 ** | 0785-048 | mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | R | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-224 *** | 0785-048 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg | R | 0,2389 | 0,2389 | 0,0455 | 0,0765 |
| OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2717-478 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | R | 14,51 | 14,51 | 1,82 | 3,03 |
| | 2717-478 | | | | 6,85 | 6,85 | | |
| B-224 | 2717-494 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg | R | 33,02 | 33,02 | 5,03 | 8,45 |
| | 2717-494 | | | | 22,04 | 22,04 | | |
| B-224 * | 0759-217 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | R | 0,2902 | 0,2902 | | |
| B-224 ** | 0759-217 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | R | 0,2384 | 0,2384 | | |
| B-224 *** | 0759-217 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg | R | 0,2805 | 0,2805 | 0,0513 | 0,0862 |
| OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08 | | | | | | | | |
| B-224 | 2717-510 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg | R | 16,23 | 16,23 | 2,16 | 3,61 |
| | 2717-510 | | | | 8,16 | 8,16 | | |
| B-224 | 2717-528 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg | R | 32,51 | 32,51 | 4,96 | 8,33 |
| | 2717-528 | | | | 21,61 | 21,61 | | |
| B-224 * | 0759-209 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | R | 0,2846 | 0,2846 | | |
| B-224 ** | 0759-209 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | R | 0,2338 | 0,2338 | | |
| B-224 *** | 0759-209 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg | R | 0,2753 | 0,2753 | 0,0506 | 0,0850 |
| OMNIPAQUE 240 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02 | | | | | | | | |
| B-178 | 0012-401 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml | | 11,27 | 11,27 | 1,16 | 1,94 |
| | 0012-401 | | | | 4,38 | 4,38 | | |
| B-178 * | 0727-289 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL | | 5,6500 | 5,6500 | | |
| B-178 ** | 0727-289 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL | | 4,6400 | 4,6400 | | |
| OMNIPAQUE 240 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02 | | | | | | | | |
| B-178 | 0012-443 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml | | 19,78 | 19,78 | 2,88 | 4,80 |
| | 0012-443 | | | | 10,87 | 10,87 | | |
| B-178 * | 0727-297 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL | | 14,0300 | 14,0300 | | |
| B-178 ** | 0727-297 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL | | 11,5200 | 11,5200 | | |
| OMNIPAQUE 240 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02 | | | | | | | | |
| B-178 | 0012-369 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml | | 9,00 | 9,00 | 0,70 | 1,17 |
| | 0012-369 | | | | 2,64 | 2,64 | | |
| B-178 * | 0727-271 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL | | 3,4100 | 3,4100 | | |
| B-178 ** | 0727-271 | 1 flacon injectable 10 mL solution | 1 injectieflacon 10 mL oplossing | | 2,8000 | 2,8000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|--|---------------|---------------|------|------|--|
| | | injectable, 518 mg/mL | voor injectie, 518 mg/mL | | | | | | |
| OMNIPAQUE 300 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB02 | | | |
| B-178 * | 7703-432 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml | | 125,35 | 125,35 | | | |
| | 7703-432 | 10 mL solution injectable, 647 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 2,7996 | 2,7996 | | | |
| B-178 ** | 7703-432 | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | | |
| | | 10 mL solution injectable, 647 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 2,6574 | 2,6574 | | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | | |
| OMNIPAQUE 300 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB02 | | | |
| B-178 | 0012-930 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml | | 37,85 | 37,85 | 5,70 | 9,59 | |
| | 0012-930 | | | | 26,25 | 26,25 | | | |
| B-178 * | 0727-347 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 33,8800 | 33,8800 | | | |
| B-178 ** | 0727-347 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 27,8300 | 27,8300 | | | |
| OMNIPAQUE 300 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB02 | | | |
| B-178 | 0012-542 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml | | 12,54 | 12,54 | 1,42 | 2,36 | |
| | 0012-542 | | | | 5,34 | 5,34 | | | |
| B-178 * | 0727-321 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 6,8900 | 6,8900 | | | |
| B-178 ** | 0727-321 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 5,6600 | 5,6600 | | | |
| OMNIPAQUE 300 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB02 | | | |
| B-178 | 0012-534 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml | | 9,76 | 9,76 | 0,86 | 1,43 | |
| | 0012-534 | | | | 3,23 | 3,23 | | | |
| B-178 * | 0727-313 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 4,1700 | 4,1700 | | | |
| B-178 ** | 0727-313 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 3,4200 | 3,4200 | | | |
| OMNIPAQUE 300 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB02 | | | |
| B-178 | 0012-872 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml | | 22,98 | 22,98 | 3,53 | 5,88 | |
| | 0012-872 | | | | 13,31 | 13,31 | | | |
| B-178 * | 0727-339 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 17,1800 | 17,1800 | | | |
| B-178 ** | 0727-339 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL | | 14,1100 | 14,1100 | | | |
| OMNIPAQUE 350 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB02 | | | |
| B-178 * | 0790-188 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml | | 125,78 | 125,78 | | | |
| | 0790-188 | 10 mL solution injectable, 755 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 2,8088 | 2,8088 | | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| B-178 ** | 0790-188 | montant dû par l'assurance est calculé par 500) 10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) 10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 2,6666 | 2,6666 | | |
| OMNIPAQUE 350 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V08AB02 | | | | |
| B-178 | 2494-508 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml | | 55,13 | 55,13 | 8,11 | 12,50 |
| | 2494-508 | | | | 41,30 | 41,30 | | |
| B-178 * | 0790-170 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 50,8900 | 50,8900 | | |
| B-178 ** | 0790-170 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 43,7800 | 43,7800 | | |
| OMNIPAQUE 350 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V08AB02 | | | | |
| B-178 | 0012-971 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml | | 25,18 | 25,18 | 3,94 | 6,61 |
| | 0012-971 | | | | 15,22 | 15,22 | | |
| B-178 * | 0727-362 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 19,6400 | 19,6400 | | |
| B-178 ** | 0727-362 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 16,1300 | 16,1300 | | |
| OMNIPAQUE 350 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V08AB02 | | | | |
| B-178 | 0013-144 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml | | 41,50 | 41,50 | 6,21 | 10,45 |
| | 0013-144 | | | | 29,43 | 29,43 | | |
| B-178 * | 0727-370 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 37,9800 | 37,9800 | | |
| B-178 ** | 0727-370 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 31,2000 | 31,2000 | | |
| OMNIPAQUE 350 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V08AB02 | | | | |
| B-178 | 0859-678 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml | | 71,93 | 71,93 | 8,30 | 12,50 |
| | 0859-678 | | | | 55,91 | 55,91 | | |
| B-178 * | 0728-931 | 1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 66,3700 | 66,3700 | | |
| B-178 ** | 0728-931 | 1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL | | 59,2600 | 59,2600 | | |
| ONBREZ BREEZHALER 150 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03AC18 | | | | |
| B-216 | 2681-286 | 30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg | 30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg | | 36,12 | 36,12 | 5,46 | 9,18 |
| | 2681-286 | | | | 24,75 | 24,75 | | |
| B-216 | 2681-310 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg | | 84,86 | 84,86 | 10,20 | 15,50 |
| | 2681-310 | | | | 67,51 | 67,51 | | |
| B-216 * | 0757-278 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg | | 0,8741 | 0,8741 | | |
| B-216 ** | 0757-278 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg | | 0,7951 | 0,7951 | | |
| ONBREZ BREEZHALER 300 µg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03AC18 | | | | |
| B-216 | 2681-260 | 30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg | 30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg | | 34,16 | 34,16 | 5,19 | 8,72 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| B-216 | 2681-260 2681-328 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg | | 23,04 86,82 | 23,04 86,82 | 10,20 | 15,50 |
| | 2681-328 | | | | 69,30 | 69,30 | | |
| B-216 * | 0756-338 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg | | 0,8952 | 0,8952 | | |
| B-216 ** | 0756-338 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg | | 0,8162 | 0,8162 | | |
| ONCOTICE | | MSD BELGIUM | | | ATC: L03AX03 | | | |
| | 0774-752 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis | | 56,80 | 56,80 | | |
| A-28 * | 0774-752 | 1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose | 1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis | | 67,3200 | 67,3200 | | |
| A-28 ** | 0774-752 | 1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose | 1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis | | 60,2100 | 60,2100 | | |
| ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0750-372 | 5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 12,99 | 12,99 | | |
| B-200 * | 0750-372 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 3,3520 | 3,3520 | | |
| B-200 ** | 0750-372 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 2,7540 | 2,7540 | | |
| ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0750-364 | 5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml | 5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml | | 13,02 | 13,02 | | |
| B-200 * | 0750-364 | 1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 3,3600 | 3,3600 | | |
| B-200 ** | 0750-364 | 1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 2,7600 | 2,7600 | | |
| ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0799-338 | 20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 50,52 | 50,52 | | |
| B-200 * | 0799-338 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,0330 | 3,0330 | | |
| B-200 ** | 0799-338 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,6775 | 2,6775 | | |
| ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0799-320 | 10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml | 10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 27,34 | 27,34 | | |
| B-200 * | 0799-320 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,5280 | 3,5280 | | |
| B-200 ** | 0799-320 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,8980 | 2,8980 | | |
| ONDANSETRON EG 2 mg/ml | | EG | | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0784-538 | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 13,02 | 13,02 | | |
| B-200 * | 0784-538 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,3600 | 3,3600 | | |
| B-200 ** | 0784-538 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,7600 | 2,7600 | | |
| ONDANSETRON EG 8 mg | | EG | | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0784-520 | 10 comprimés pelliculés, 8 mg | 10 filmomhulde tabletten, 8 mg | | 21,16 | 21,16 | | |
| B-200 * | 0784-520 | 1 comprimé pelliculé, 8 mg | 1 filmomhulde tablet, 8 mg | G | 2,7310 | 2,7310 | | |
| B-200 ** | 0784-520 | 1 comprimé pelliculé, 8 mg | 1 filmomhulde tablet, 8 mg | G | 2,2430 | 2,2430 | | |

| ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: A04AA01 | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 0788-240 | 1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml | 1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 2,60 | 2,60 | |
| B-200 * | 0788-240 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,3600 | 3,3600 | |
| B-200 ** | 0788-240 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,7600 | 2,7600 | |
| ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 7741-093 | 5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 12,40 | 12,40 | |
| B-200 * | 7741-093 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,2000 | 3,2000 | |
| B-200 ** | 7741-093 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,6280 | 2,6280 | |
| ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 7741-085 | 10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 26,00 | 26,00 | |
| B-200 * | 7741-085 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,3550 | 3,3550 | |
| B-200 ** | 7741-085 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,7560 | 2,7560 | |
| ONDANSETRON TEVA 4 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0790-105 | 10 comprimés pelliculés, 4 mg | 10 filmomhulde tabletten, 4 mg | | 14,09 | 14,09 | |
| B-200 * | 0790-105 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 1,8180 | 1,8180 | |
| B-200 ** | 0790-105 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 1,4940 | 1,4940 | |
| ONDANSETRON VIATRIS 8 mg | | VIATRIS | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0784-561 | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 13,02 | 13,02 | |
| B-200 * | 0784-561 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,3600 | 3,3600 | |
| B-200 ** | 0784-561 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,7600 | 2,7600 | |
| ONDANSETRON VIATRIS 8 mg | | VIATRIS | | ATC: A04AA01 | | | |
| | 0784-553 | 10 comprimés pelliculés, 8 mg | 10 filmomhulde tabletten, 8 mg | | 25,33 | 25,33 | |
| B-200 * | 0784-553 | 1 comprimé pelliculé, 8 mg | 1 filmomhulde tablet, 8 mg | G | 3,2690 | 3,2690 | |
| B-200 ** | 0784-553 | 1 comprimé pelliculé, 8 mg | 1 filmomhulde tablet, 8 mg | G | 2,6850 | 2,6850 | |
| OPTIRAY 300 | | GUERBET | | ATC: V08AB07 | | | |
| | 0787-556 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml | | 57,72 | 57,72 | |
| B-178 * | 0787-556 | 10 mL solution injectable, 636 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL | | 3,4145 | 3,4145 | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | | | |
| B-178 ** | 0787-556 | 10 mL solution injectable, 636 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL | | 3,0590 | 3,0590 | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | | | |
| OPTIRAY 300 | | GUERBET | | ATC: V08AB07 | | | |
| B-178 | 0242-685 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml | | 40,83 | 40,83 | 6,12 10,29 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 0242-685 | | | | 28,85 | 28,85 | | |
| B-178 * | 0736-421 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL | | 37,2300 | 37,2300 | | |
| B-178 ** | 0736-421 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL | | 30,5800 | 30,5800 | | |
| OPTIRAY 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB07 | | | | |
| | 0787-564 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml | | 67,32 | 67,32 | | |
| B-178 * | 0787-564 | 10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | 10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | 3,9235 | 3,9235 | | |
| B-178 ** | 0787-564 | 10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200) | 10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200) | | 3,5680 | 3,5680 | | |
| OPTIRAY 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB07 | | | | |
| B-178 | 0242-735 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml | | 46,35 | 46,35 | 6,88 | 11,59 |
| | 0242-735 | | | | 33,65 | 33,65 | | |
| B-178 * | 0736-470 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL | | 42,7800 | 42,7800 | | |
| B-178 ** | 0736-470 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL | | 35,6700 | 35,6700 | | |
| OPTIRAY 350 mg l/ml | | GUERBET | | ATC: V08AB07 | | | | |
| | 7707-144 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g | | 163,94 | 163,94 | | |
| B-178 * | 7707-144 | 10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,6178 | 3,6178 | | |
| B-178 ** | 7707-144 | 10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,4756 | 3,4756 | | |
| ORAP | | EUMEDICA | | ATC: N05AG02 | | | | |
| B-71 | 0062-547 | 75 comprimés, 1 mg | 75 tabletten, 1 mg | | 12,34 | 12,34 | 1,38 | 2,29 |
| | 0062-547 | | | | 5,19 | 5,19 | | |
| B-71 * | 0713-651 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0893 | 0,0893 | | |
| B-71 ** | 0713-651 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0733 | 0,0733 | | |
| B-71 *** | 0713-651 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0907 | 0,0907 | 0,0184 | 0,0305 |
| ORAP FORTE | | EUMEDICA | | ATC: N05AG02 | | | | |
| B-71 | 0062-554 | 20 comprimés, 4 mg | 20 tabletten, 4 mg | | 12,34 | 12,34 | 1,38 | 2,29 |
| | 0062-554 | | | | 5,19 | 5,19 | | |
| B-71 * | 0713-677 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,3350 | 0,3350 | | |
| B-71 ** | 0713-677 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,2750 | 0,2750 | | |
| B-71 *** | 0713-677 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,3403 | 0,3403 | 0,0690 | 0,1145 |

| ORGAMETRIL | | ORGANON BELGIUM BV | | | | ATC: G03DC03 | | | |
|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|--------|--------|--|
| B-90 | 0123-042 0123-042 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | | 8,12 1,92 | 8,12 1,92 | 0,51 | 0,85 | |
| B-90 * | 0713-743 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0827 | 0,0827 | | | |
| B-90 ** | 0713-743 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0680 | 0,0680 | | | |
| B-90 *** | 0713-743 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | | 0,0862 | 0,0862 | 0,0170 | 0,0283 | |
| OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01XA03 | | | |
| | 7702-582 | 1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 139,16 | 139,16 | | | |
| A-23 * | 7702-582 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 154,6200 | 154,6200 | | | |
| A-23 ** | 7702-582 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 147,5100 | 147,5100 | | | |
| OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/ml | | GRINDEKS - KALCEKS | | | | ATC: L01XA03 | | | |
| | 7740-616 | 1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL | | 34,90 | 34,90 | | | |
| A-23 * | 7740-616 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 44,1000 | 44,1000 | | | |
| A-23 ** | 7740-616 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 36,9900 | 36,9900 | | | |
| OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/ml | | GRINDEKS - KALCEKS | | | | ATC: L01XA03 | | | |
| | 7740-640 | 1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL | | 139,16 | 139,16 | | | |
| A-23 * | 7740-640 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 154,6200 | 154,6200 | | | |
| A-23 ** | 7740-640 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 147,5100 | 147,5100 | | | |
| OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/ml | | GRINDEKS - KALCEKS | | | | ATC: L01XA03 | | | |
| | 7740-632 | 1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL | | 69,80 | 69,80 | | | |
| A-23 * | 7740-632 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 81,1000 | 81,1000 | | | |
| A-23 ** | 7740-632 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 73,9900 | 73,9900 | | | |
| OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01XA03 | | | |
| | 0750-646 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 34,90 | 34,90 | | | |
| A-23 * | 0750-646 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 44,1000 | 44,1000 | | | |
| A-23 ** | 0750-646 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 36,9900 | 36,9900 | | | |
| OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01XA03 | | | |
| | 0750-653 | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 69,80 | 69,80 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------------|------|
| A-23 * | 0750-653 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 81,1000 | 81,1000 | | |
| A-23 ** | 0750-653 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | G | 73,9900 | 73,9900 | | |
| OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA03 | | | | |
| | 0756-478 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 34,90 | 34,90 | | |
| A-23 * | 0756-478 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 44,1000 | 44,1000 | | |
| A-23 ** | 0756-478 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 36,9900 | 36,9900 | | |
| OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA03 | | | | |
| | 0756-486 | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 69,80 | 69,80 | | |
| A-23 * | 0756-486 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 81,1000 | 81,1000 | | |
| A-23 ** | 0756-486 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 73,9900 | 73,9900 | | |
| OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01XA03 | | | | |
| | 7702-657 | 1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 139,16 | 139,16 | | |
| A-23 * | 7702-657 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 154,6200 | 154,6200 | | |
| A-23 ** | 7702-657 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 147,5100 | 147,5100 | | |
| OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01XA03 | | | | |
| | 0788-604 | 1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 34,90 | 34,90 | | |
| A-23 * | 0788-604 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL | G | 44,1000 | 44,1000 | | |
| A-23 ** | 0788-604 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL | G | 36,9900 | 36,9900 | | |
| OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01XA03 | | | | |
| | 0790-758 | 1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml | | 139,16 | 139,16 | | |
| A-23 * | 0790-758 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 154,6200 | 154,6200 | | |
| A-23 ** | 0790-758 | 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G | 147,5100 | 147,5100 | | |
| OXYBUTYNINE EG 5 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: G04BD04 | |
| Cx-9 | 1625-656 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 7,37 | 7,37 | 1,78 | 1,78 |
| | 1625-656 | | | | 1,26 | 1,26 | | |
| Cx-9 | 1625-664 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 9,88 | 9,88 | 4,68 | 4,68 |
| | 1625-664 | | | | 3,31 | 3,31 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Cx-9 * | 0767-129 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0427 | 0,0427 | | |
| Cx-9 ** | 0767-129 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0351 | 0,0351 | | |
| Cx-9 *** | 0767-129 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 |
| OXYCODON SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2614-964 | 30 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 9,18 | 9,18 | 0,74 | 1,23 |
| | 2614-964 | | | | 2,78 | 2,78 | | |
| B-56 | 2614-956 | 60 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 12,88 | 12,88 | 1,49 | 2,48 |
| | 2614-956 | | | | 5,60 | 5,60 | | |
| B-56 * | 0794-115 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1205 | 0,1205 | | |
| B-56 ** | 0794-115 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,0990 | 0,0990 | | |
| B-56 *** | 0794-115 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1224 | 0,1224 | 0,0248 | 0,0413 |
| OXYCODON SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2614-949 | 30 comprimés à libération prolongée, 20 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg | G | 12,65 | 12,65 | 1,44 | 2,40 |
| | 2614-949 | | | | 5,43 | 5,43 | | |
| B-56 | 2614-931 | 60 comprimés à libération prolongée, 20 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg | G | 19,57 | 19,57 | 2,84 | 4,73 |
| | 2614-931 | | | | 10,71 | 10,71 | | |
| B-56 * | 0794-123 | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg | G | 0,2303 | 0,2303 | | |
| B-56 ** | 0794-123 | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg | G | 0,1892 | 0,1892 | | |
| B-56 *** | 0794-123 | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg | G | 0,2339 | 0,2339 | 0,0473 | 0,0788 |
| OXYCODON SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2994-390 | 30 comprimés à libération prolongée, 40 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg | G | 19,01 | 19,01 | 2,73 | 4,54 |
| | 2994-390 | | | | 10,28 | 10,28 | | |
| B-56 | 2994-408 | 60 comprimés à libération prolongée, 40 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg | G | 30,67 | 30,67 | 4,70 | 7,90 |
| | 2994-408 | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| B-56 * | 7702-186 | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg | G | 0,4302 | 0,4302 | | |
| B-56 ** | 7702-186 | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg | G | 0,3533 | 0,3533 | | |
| B-56 *** | 7702-186 | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg | G | 0,4189 | 0,4189 | 0,0783 | 0,1317 |
| OXYCODON SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2614-923 | 30 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 7,77 | 7,77 | 0,43 | 0,71 |
| | 2614-923 | | | | 1,61 | 1,61 | | |
| B-56 | 2614-915 | 60 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 9,65 | 9,65 | 0,83 | 1,39 |
| | 2614-915 | | | | 3,14 | 3,14 | | |
| B-56 * | 0793-588 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0675 | 0,0675 | | |
| B-56 ** | 0793-588 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0555 | 0,0555 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 *** | 0793-588 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0685 | 0,0685 | 0,0138 | 0,0232 |
| OXYCODON SANDOZ 80 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2994-416 | 30 comprimés à libération prolongée, 80 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | G | 28,79 | 28,79 | 4,44 | 7,46 |
| | 2994-416 | | | | 18,37 | 18,37 | | |
| B-56 | 2994-382 | 60 comprimés à libération prolongée, 80 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | G | 44,27 | 44,27 | 6,59 | 11,10 |
| | 2994-382 | | | | 31,84 | 31,84 | | |
| B-56 * | 7702-194 | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg | G | 0,6810 | 0,6810 | | |
| B-56 ** | 7702-194 | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg | G | 0,5625 | 0,5625 | | |
| B-56 *** | 7702-194 | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg | G | 0,6455 | 0,6455 | 0,1098 | 0,1850 |
| OXYCODONE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 3507-522 | 30 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 9,18 | 9,18 | 0,74 | 1,23 |
| | 3507-522 | | | | 2,78 | 2,78 | | |
| B-56 | 3507-530 | 60 comprimés à libération prolongée, 10 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg | G | 12,88 | 12,88 | 1,49 | 2,48 |
| | 3507-530 | | | | 5,60 | 5,60 | | |
| B-56 * | 7716-988 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1205 | 0,1205 | | |
| B-56 ** | 7716-988 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,0990 | 0,0990 | | |
| B-56 *** | 7716-988 | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg | G | 0,1224 | 0,1224 | 0,0248 | 0,0413 |
| OXYCODONE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 3507-548 | 30 comprimés à libération prolongée, 20 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg | G | 12,65 | 12,65 | 1,44 | 2,40 |
| | 3507-548 | | | | 5,43 | 5,43 | | |
| B-56 | 3507-555 | 60 comprimés à libération prolongée, 20 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg | G | 19,57 | 19,57 | 2,84 | 4,73 |
| | 3507-555 | | | | 10,71 | 10,71 | | |
| B-56 * | 7716-996 | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg | G | 0,2303 | 0,2303 | | |
| B-56 ** | 7716-996 | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg | G | 0,1892 | 0,1892 | | |
| B-56 *** | 7716-996 | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg | G | 0,2339 | 0,2339 | 0,0473 | 0,0788 |
| OXYCODONE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 3507-563 | 30 comprimés à libération prolongée, 40 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg | G | 19,01 | 19,01 | 2,73 | 4,54 |
| | 3507-563 | | | | 10,28 | 10,28 | | |
| B-56 | 3507-571 | 60 comprimés à libération prolongée, 40 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg | G | 30,67 | 30,67 | 4,70 | 7,90 |
| | 3507-571 | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| B-56 * | 7717-036 | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg | G | 0,4302 | 0,4302 | | |
| B-56 ** | 7717-036 | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg | G | 0,3533 | 0,3533 | | |
| B-56 *** | 7717-036 | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg | G | 0,4189 | 0,4189 | 0,0783 | 0,1317 |

| OXYCODONE TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 | 3507-506 | 30 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 7,77 | 7,77 | 0,43 | 0,71 |
| | 3507-506 | | | | 1,61 | 1,61 | | |
| B-56 | 3507-514 | 60 comprimés à libération prolongée, 5 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg | G | 9,65 | 9,65 | 0,83 | 1,39 |
| | 3507-514 | | | | 3,14 | 3,14 | | |
| B-56 * | 7716-822 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0675 | 0,0675 | | |
| B-56 ** | 7716-822 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0555 | 0,0555 | | |
| B-56 *** | 7716-822 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg | G | 0,0685 | 0,0685 | 0,0138 | 0,0232 |
| OXYCODONE TEVA 80 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 3507-597 | 60 comprimés à libération prolongée, 80 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | G | 44,27 | 44,27 | 6,59 | 11,10 |
| | 3507-597 | | | | 31,84 | 31,84 | | |
| B-56 * | 7717-275 | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg | G | 0,6810 | 0,6810 | | |
| B-56 ** | 7717-275 | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg | G | 0,5625 | 0,5625 | | |
| B-56 *** | 7717-275 | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg | G | 0,6455 | 0,6455 | 0,1098 | 0,1850 |
| OXYNORM INSTANT 10 mg | | MUNDIPHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2552-644 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | R | 12,30 | 12,30 | 1,37 | 2,28 |
| | 2552-644 | | | | 5,16 | 5,16 | | |
| B-56 * | 0795-195 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,2379 | 0,2379 | | |
| B-56 ** | 0795-195 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,1954 | 0,1954 | | |
| B-56 *** | 0795-195 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,2415 | 0,2415 | 0,0489 | 0,0814 |
| OXYNORM INSTANT 20 mg | | MUNDIPHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2552-651 | 28 comprimés orodispersibles, 20 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg | R | 19,05 | 19,05 | 2,73 | 4,56 |
| | 2552-651 | | | | 10,31 | 10,31 | | |
| B-56 * | 0795-203 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | R | 0,4754 | 0,4754 | | |
| B-56 ** | 0795-203 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | R | 0,3904 | 0,3904 | | |
| B-56 *** | 0795-203 | 1 comprimé orodispersible, 20 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg | R | 0,4827 | 0,4827 | 0,0975 | 0,1629 |
| OXYNORM INSTANT 5 mg | | MUNDIPHARMA | | ATC: N02AA05 | | | | |
| B-56 | 2552-636 | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | R | 8,93 | 8,93 | 0,69 | 1,14 |
| | 2552-636 | | | | 2,59 | 2,59 | | |
| B-56 * | 0795-187 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,1193 | 0,1193 | | |
| B-56 ** | 0795-187 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,0982 | 0,0982 | | |
| B-56 *** | 0795-187 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,1211 | 0,1211 | 0,0246 | 0,0407 |
| OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: H01BB02 | | | | |
| | 7740-160 | 10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL | 10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL | | 10,12 | 10,12 | | |
| B-93 * | 7740-160 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL | G | 1,3060 | 1,3060 | | |
| B-93 ** | 7740-160 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL | G | 1,0730 | 1,0730 | | |

| OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: H01BB02 | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--|
| | 7740-665 | 5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL | 5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL | | 2,53 | 2,53 | |
| B-93 * | 7740-665 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL | G | 0,6520 | 0,6520 | |
| B-93 ** | 7740-665 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL | G | 0,5360 | 0,5360 | |
| PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD01 | | | |
| | 7705-494 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 150,83 | 150,83 | |
| A-28 * | 7705-494 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL | G | 166,9900 | 166,9900 | |
| A-28 ** | 7705-494 | 1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL | G | 159,8800 | 159,8800 | |
| PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD01 | | | |
| | 7701-212 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 30,17 | 30,17 | |
| A-28 * | 7701-212 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 38,9300 | 38,9300 | |
| A-28 ** | 7701-212 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 31,9800 | 31,9800 | |
| PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD01 | | | |
| | 7709-108 | 1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 718,37 | 718,37 | |
| A-28 * | 7709-108 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 768,5800 | 768,5800 | |
| A-28 ** | 7709-108 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 761,4700 | 761,4700 | |
| PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD01 | | | |
| | 7701-238 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 302,29 | 302,29 | |
| A-28 * | 7701-238 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL | G | 327,5400 | 327,5400 | |
| A-28 ** | 7701-238 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL | G | 320,4300 | 320,4300 | |
| PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01CD01 | | | |
| | 7701-220 | 1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 100,77 | 100,77 | |
| A-28 * | 7701-220 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 113,9300 | 113,9300 | |
| A-28 ** | 7701-220 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 106,8200 | 106,8200 | |
| PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD01 | | | |
| | 0758-862 | 1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL | | 30,72 | 30,72 | |
| A-28 * | 0758-862 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 39,6400 | 39,6400 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| A-28 ** | 0758-862 | mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 32,5600 | 32,5600 | | | |
| PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| A-28 * | 0758-847 | 1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL | | 307,88 | 307,88 | | | |
| A-28 * | 0758-847 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 333,4600 | 333,4600 | | | |
| A-28 ** | 0758-847 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 326,3500 | 326,3500 | | | |
| PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| A-28 * | 0758-854 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL | | 100,81 | 100,81 | | | |
| A-28 * | 0758-854 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 113,9700 | 113,9700 | | | |
| A-28 ** | 0758-854 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 106,8600 | 106,8600 | | | |
| PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml | | AUROBINDO NV | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| A-28 * | 0757-484 | 1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL | | 150,92 | 150,92 | | | |
| A-28 * | 0757-484 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL | G | 167,0900 | 167,0900 | | | |
| A-28 ** | 0757-484 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL | G | 159,9800 | 159,9800 | | | |
| PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| A-28 * | 0795-070 | 1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 98,99 | 98,99 | | | |
| A-28 * | 0795-070 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 112,0400 | 112,0400 | | | |
| A-28 ** | 0795-070 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 104,9300 | 104,9300 | | | |
| PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| A-28 * | 0795-062 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 30,17 | 30,17 | | | |
| A-28 * | 0795-062 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 38,9300 | 38,9300 | | | |
| A-28 ** | 0795-062 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 31,9800 | 31,9800 | | | |
| PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| A-28 * | 0795-088 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 302,29 | 302,29 | | | |
| A-28 * | 0795-088 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 327,5400 | 327,5400 | | | |
| A-28 ** | 0795-088 | 1 flacon injectable 50 mL solution | 1 injectieflacon 50 mL oplossing | G | 320,4300 | 320,4300 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|--|--|
| | | pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | | | | | | |
| PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0756-049 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | | 150,83 | 150,83 | | |
| A-28 * | 0756-049 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 166,9900 | 166,9900 | | |
| A-28 ** | 0756-049 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 159,8800 | 159,8800 | | |
| PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0784-850 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | | 29,26 | 29,26 | | |
| A-28 * | 0784-850 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 37,7600 | 37,7600 | | |
| A-28 ** | 0784-850 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 31,0200 | 31,0200 | | |
| PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0784-876 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | | 143,73 | 143,73 | | |
| A-28 * | 0784-876 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 159,4600 | 159,4600 | | |
| A-28 ** | 0784-876 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 152,3500 | 152,3500 | | |
| PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0784-868 | 1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | | 96,01 | 96,01 | | |
| A-28 * | 0784-868 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 108,8800 | 108,8800 | | |
| A-28 ** | 0784-868 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 101,7700 | 101,7700 | | |
| PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml | | Pfizer | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0784-884 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | | 293,22 | 293,22 | | |
| A-28 * | 0784-884 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 317,9200 | 317,9200 | | |
| A-28 ** | 0784-884 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 310,8100 | 310,8100 | | |
| PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0786-780 | 1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | | 98,99 | 98,99 | | |
| A-28 * | 0786-780 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | | 112,0400 | 112,0400 | | |
| A-28 ** | 0786-780 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 | G | | 104,9300 | 104,9300 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|--|
| | | (intraveineuse), 6 mg/mL | mg/mL | | | | | | |
| PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0786-798 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 302,28 | 302,28 | | | |
| A-28 * | 0786-798 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 327,5300 | 327,5300 | | | |
| A-28 ** | 0786-798 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 320,4200 | 320,4200 | | | |
| PACLITAXIN 150 mg/25 ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0792-176 | 1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 150,92 | 150,92 | | | |
| A-28 * | 0792-176 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 167,0900 | 167,0900 | | | |
| A-28 ** | 0792-176 | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 159,9800 | 159,9800 | | | |
| PACLITAXIN 6 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0783-902 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 30,72 | 30,72 | | | |
| A-28 * | 0783-902 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 39,6400 | 39,6400 | | | |
| A-28 ** | 0783-902 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 32,5600 | 32,5600 | | | |
| PACLITAXIN 6 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0782-987 | 1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 100,81 | 100,81 | | | |
| A-28 * | 0782-987 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 113,9700 | 113,9700 | | | |
| A-28 ** | 0782-987 | 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 106,8600 | 106,8600 | | | |
| PACLITAXIN 6 mg/ml | | AREGA PHARMA | | ATC: L01CD01 | | | | | |
| | 0783-001 | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml | | 307,87 | 307,87 | | | |
| A-28 * | 0783-001 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 333,4500 | 333,4500 | | | |
| A-28 ** | 0783-001 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL | G | 326,3400 | 326,3400 | | | |
| PALEXIA 100 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | | |
| B-347 | 3679-297 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | | 30,78 | 30,78 | 4,72 | 7,93 | |
| | 3679-297 | | | | 20,10 | 20,10 | | | |
| B-347 * | 7722-226 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | | 0,8647 | 0,8647 | | | |
| B-347 ** | 7722-226 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | | 0,7103 | 0,7103 | | | |
| B-347 *** | 7722-226 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | | 0,8416 | 0,8416 | 0,1573 | 0,2643 | |
| PALEXIA 50 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-347 | 3679-313 3679-313 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | | 18,71 10,05 | 18,71 10,05 | 2,67 | 4,44 |
| B-347 * | 7722-200 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | | 0,4323 | 0,4323 | | |
| B-347 ** | 7722-200 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | | 0,3550 | 0,3550 | | |
| B-347 *** | 7722-200 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | | 0,4392 | 0,4392 | 0,0890 | 0,1480 |
| PALEXIA 75 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | |
| B-347 | 3679-305 3679-305 | 30 comprimés pelliculés, 75 mg | 30 filmomhulde tabletten, 75 mg | | 25,02 15,08 | 25,02 15,08 | 3,91 | 6,57 |
| B-347 * | 7722-218 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | | 0,6487 | 0,6487 | | |
| B-347 ** | 7722-218 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | | 0,5327 | 0,5327 | | |
| B-347 *** | 7722-218 | 1 comprimé pelliculé, 75 mg | 1 filmomhulde tablet, 75 mg | | 0,6494 | 0,6494 | 0,1303 | 0,2190 |
| PALEXIA RETARD 100 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | |
| B-347 | 2695-823 2695-823 | 60 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | | 62,03 47,30 | 62,03 47,30 | 8,30 | 12,50 |
| B-347 * | 7722-242 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | | 0,9542 | 0,9542 | | |
| B-347 ** | 7722-242 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | | 0,8357 | 0,8357 | | |
| B-347 *** | 7722-242 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | | 0,9416 | 0,9416 | 0,1383 | 0,2083 |
| PALEXIA RETARD 150 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | |
| B-347 | 2695-831 2695-831 | 60 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | | 88,63 70,95 | 88,63 70,95 | 8,30 | 12,50 |
| B-347 * | 7722-259 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | | 1,3720 | 1,3720 | | |
| B-347 ** | 7722-259 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | | 1,2535 | 1,2535 | | |
| B-347 *** | 7722-259 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | | 1,3849 | 1,3849 | 0,1383 | 0,2083 |
| PALEXIA RETARD 200 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | |
| B-347 | 2695-849 2695-849 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | | 114,56 94,60 | 114,56 94,60 | 8,30 | 12,50 |
| B-347 * | 7722-267 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | | 1,7898 | 1,7898 | | |
| B-347 ** | 7722-267 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | | 1,6713 | 1,6713 | | |
| B-347 *** | 7722-267 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | | 1,8172 | 1,8172 | 0,1383 | 0,2083 |
| PALEXIA RETARD 250 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | |
| B-347 | 2695-765 2695-765 | 60 comprimés à libération prolongée, 250 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg | | 140,49 118,25 | 140,49 118,25 | 8,30 | 12,50 |
| B-347 * | 7722-275 | 1 comprimé à libération prolongée, 250 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg | | 2,2077 | 2,2077 | | |
| B-347 ** | 7722-275 | 1 comprimé à libération prolongée, 250 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg | | 2,0892 | 2,0892 | | |
| B-347 *** | 7722-275 | 1 comprimé à libération prolongée, 250 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg | | 2,2493 | 2,2493 | 0,1383 | 0,2083 |
| PALEXIA RETARD 50 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AX06 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-347 | 2695-815 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | | 34,85 | 34,85 | 5,28 | 8,89 |
| | 2695-815 | | | | 23,65 | 23,65 | | |
| B-347 * | 7722-234 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | | 0,5087 | 0,5087 | | |
| B-347 ** | 7722-234 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | | 0,4178 | 0,4178 | | |
| B-347 *** | 7722-234 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | | 0,4887 | 0,4887 | 0,0880 | 0,1482 |
| PALIPERIDON KRKA 3 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13 | | | | | | | | |
| B-220 | 3779-600 | 56 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | G | 86,07 | 86,07 | 8,30 | 12,50 |
| | 3779-600 | | | | 68,62 | 68,62 | | |
| B-220 * | 7723-489 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,4259 | 1,4259 | | |
| B-220 ** | 7723-489 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,2989 | 1,2989 | | |
| B-220 *** | 7723-489 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,4382 | 1,4382 | 0,1482 | 0,2232 |
| PALIPERIDON KRKA 6 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13 | | | | | | | | |
| B-220 | 3779-568 | 56 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | G | 92,21 | 92,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 3779-568 | | | | 74,21 | 74,21 | | |
| B-220 * | 7723-471 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,5316 | 1,5316 | | |
| B-220 ** | 7723-471 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,4046 | 1,4046 | | |
| B-220 *** | 7723-471 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,5478 | 1,5478 | 0,1482 | 0,2232 |
| PALIPERIDON KRKA 9 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13 | | | | | | | | |
| B-220 | 3776-390 | 56 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | G | 92,21 | 92,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 3776-390 | | | | 74,21 | 74,21 | | |
| B-220 * | 7723-463 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,5316 | 1,5316 | | |
| B-220 ** | 7723-463 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,4046 | 1,4046 | | |
| B-220 *** | 7723-463 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,5478 | 1,5478 | 0,1482 | 0,2232 |
| PALIPERIDON SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX13 | | | | | | | | |
| B-220 | 3789-641 | 56 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | G | 86,07 | 86,07 | 8,30 | 12,50 |
| | 3789-641 | | | | 68,62 | 68,62 | | |
| B-220 * | 7723-539 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,4259 | 1,4259 | | |
| B-220 ** | 7723-539 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,2989 | 1,2989 | | |
| B-220 *** | 7723-539 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,4382 | 1,4382 | 0,1482 | 0,2232 |
| PALIPERIDON SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX13 | | | | | | | | |
| B-220 | 3789-658 | 56 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | G | 92,21 | 92,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 3789-658 | | | | 74,21 | 74,21 | | |
| B-220 * | 7723-521 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,5316 | 1,5316 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-220 ** | 7723-521 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,4046 | 1,4046 | | |
| B-220 *** | 7723-521 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,5478 | 1,5478 | 0,1482 | 0,2232 |
| PALIPERIDON SANDOZ 9 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 3789-690 | 56 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | G | 92,21 | 92,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 3789-690 | | | | 74,21 | 74,21 | | |
| B-220 * | 7723-513 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,5316 | 1,5316 | | |
| B-220 ** | 7723-513 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,4046 | 1,4046 | | |
| B-220 *** | 7723-513 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,5478 | 1,5478 | 0,1482 | 0,2232 |
| PALIPERIDONE TEVA 3 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 3784-386 | 56 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | G | 86,07 | 86,07 | 8,30 | 12,50 |
| | 3784-386 | | | | 68,62 | 68,62 | | |
| B-220 | 3784-378 | 112 comprimés à libération prolongée, 3 mg | 112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg | G | 131,21 | 131,21 | 10,20 | 15,50 |
| | 3784-378 | | | | 109,78 | 109,78 | | |
| B-220 * | 7723-414 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,1025 | 1,1025 | | |
| B-220 ** | 7723-414 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,0390 | 1,0390 | | |
| B-220 *** | 7723-414 | 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg | G | 1,1221 | 1,1221 | 0,0911 | 0,1384 |
| PALIPERIDONE TEVA 6 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 3784-345 | 56 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | G | 92,21 | 92,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 3784-345 | | | | 74,21 | 74,21 | | |
| B-220 | 3784-329 | 112 comprimés à libération prolongée, 6 mg | 112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg | G | 141,01 | 141,01 | 10,20 | 15,50 |
| | 3784-329 | | | | 118,73 | 118,73 | | |
| B-220 * | 7723-422 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,1871 | 1,1871 | | |
| B-220 ** | 7723-422 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,1237 | 1,1237 | | |
| B-220 *** | 7723-422 | 1 comprimé à libération prolongée, 6 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg | G | 1,2096 | 1,2096 | 0,0911 | 0,1384 |
| PALIPERIDONE TEVA 9 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX13 | | | | |
| B-220 | 3784-303 | 56 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | G | 92,21 | 92,21 | 8,30 | 12,50 |
| | 3784-303 | | | | 74,21 | 74,21 | | |
| B-220 | 3784-295 | 112 comprimés à libération prolongée, 9 mg | 112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg | G | 141,01 | 141,01 | 10,20 | 15,50 |
| | 3784-295 | | | | 118,73 | 118,73 | | |
| B-220 * | 7723-430 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,1871 | 1,1871 | | |
| B-220 ** | 7723-430 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,1237 | 1,1237 | | |
| B-220 *** | 7723-430 | 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg | G | 1,2096 | 1,2096 | 0,0911 | 0,1384 |
| PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg | | MUNDIPHARMA | | ATC: N02AA03 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-56 | 2119-139 2119-139 | 28 gélules, 2,6 mg | 28 capsules, hard, 2,6 mg | | 15,47 7,58 | 15,47 7,58 | 2,01 | 3,35 |
| B-56 * | 0759-480 | 1 gélule, 2,6 mg | 1 capsule, hard, 2,6 mg | | 0,3493 | 0,3493 | | |
| B-56 ** | 0759-480 | 1 gélule, 2,6 mg | 1 capsule, hard, 2,6 mg | | 0,2868 | 0,2868 | | |
| B-56 *** | 0759-480 | 1 gélule, 2,6 mg | 1 capsule, hard, 2,6 mg | | 0,3547 | 0,3547 | 0,0718 | 0,1196 |
| PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03 | | | | | | | | |
| B-56 | 2048-270 2048-270 | 30 gélules à libération prolongée, 4 mg | 30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg | | 22,79 13,17 | 22,79 13,17 | 3,49 | 5,82 |
| B-56 * | 0775-759 | 1 gélule à libération prolongée, 4 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg | | 0,5667 | 0,5667 | | |
| B-56 ** | 0775-759 | 1 gélule à libération prolongée, 4 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg | | 0,4653 | 0,4653 | | |
| B-56 *** | 0775-759 | 1 gélule à libération prolongée, 4 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg | | 0,5752 | 0,5752 | 0,1163 | 0,1940 |
| PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03 | | | | | | | | |
| B-56 | 2048-262 2048-262 | 30 gélules à libération prolongée, 8 mg | 30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg | | 37,61 26,05 | 37,61 26,05 | 5,67 | 9,53 |
| B-56 * | 0775-767 | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | | 1,1207 | 1,1207 | | |
| B-56 ** | 0775-767 | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | | 0,9203 | 0,9203 | | |
| B-56 *** | 0775-767 | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | | 1,0692 | 1,0692 | 0,1890 | 0,3177 |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: N02BE01 | | | | | | | | |
| | 7731-037 | 20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | | 27,07 | 27,07 | | |
| B-313 * | 7731-037 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | G | 1,7465 | 1,7465 | | |
| B-313 ** | 7731-037 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | G | 1,4345 | 1,4345 | | |
| PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml B. BRAUN MEDICAL ATC: N02BE01 | | | | | | | | |
| | 7702-111 | 10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml | 10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 13,81 | 13,81 | | |
| B-313 * | 7702-111 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 1,7820 | 1,7820 | | |
| B-313 ** | 7702-111 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 1,4640 | 1,4640 | | |
| PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml B. BRAUN MEDICAL ATC: N02BE01 | | | | | | | | |
| | 7702-103 | 10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml | 10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 9,85 | 9,85 | | |
| B-313 * | 7702-103 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 1,2710 | 1,2710 | | |
| B-313 ** | 7702-103 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 1,0440 | 1,0440 | | |
| PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: N02BE01 | | | | | | | | |
| | 7706-625 | 20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml | 20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml | | 20,40 | 20,40 | | |
| B-313 * | 7706-625 | 1 poche 100 mL solution pour | 1 zak 100 mL oplossing voor | G | 1,3165 | 1,3165 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| B-313 ** | 7706-625 | perfusion, 10 mg/mL 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | infusie, 10 mg/mL 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 1,0810 | 1,0810 | | | |
| PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: N02BE01 | | | | | |
| B-313 * | 0758-805 0758-805 | 10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 9,85 1,2710 | 9,85 1,2710 | | | |
| B-313 ** | 0758-805 | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 1,0440 | 1,0440 | | | |
| PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: N02BE01 | | | | | |
| B-313 * | 0758-797 0758-797 | 10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 13,81 1,7820 | 13,81 1,7820 | | | |
| B-313 ** | 0758-797 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL | G | 1,4640 | 1,4640 | | | |
| PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: N02BE01 | | | | | |
| B-313 * | 7706-617 7706-617 | 20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 14,55 0,9390 | 14,55 0,9390 | | | |
| B-313 ** | 7706-617 | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL | G | 0,7710 | 0,7710 | | | |
| PAROXETINE AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AB05 | | | | | |
| B-73 | 4374-831 4374-831 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 13,98 6,45 | 13,98 6,45 | 1,71 | 2,85 | |
| B-73 | 4374-849 4374-849 | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 17,65 9,24 | 17,65 9,24 | 2,45 | 4,08 | |
| B-73 | 4374-856 4374-856 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 28,27 17,92 | 28,27 17,92 | 4,37 | 7,34 | |
| B-73 * | 7731-797 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | | |
| B-73 ** | 7731-797 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | | |
| B-73 *** | 7731-797 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2274 | 0,2274 | 0,0437 | 0,0734 | |
| PAROXETINE AB 30 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AB05 | | | | | |
| B-73 | 4374-872 4374-872 | 30 comprimés pelliculés, 30 mg | 30 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 18,00 9,51 | 18,00 9,51 | 2,52 | 4,20 | |
| B-73 | 4374-864 4374-864 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 40,69 28,73 | 40,69 28,73 | 6,10 | 10,26 | |
| B-73 * | 7731-789 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3708 | 0,3708 | | | |
| B-73 ** | 7731-789 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3045 | 0,3045 | | | |
| B-73 *** | 7731-789 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3516 | 0,3516 | 0,0610 | 0,1026 | |
| PAROXETINE EG 20 mg | | EG | | ATC: N06AB05 | | | | | |
| B-73 | 1715-168 1715-168 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,13 6,56 | 14,13 6,56 | 1,74 | 2,90 | |
| B-73 | 2079-655 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 17,63 | 17,63 | 2,45 | 4,08 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-73 | 2079-655 2605-467 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 9,23 29,03 | 9,23 29,03 | 4,47 | 7,52 |
| B-73 * | 2605-467 0770-420 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 18,58 0,2447 | 18,58 0,2447 | | |
| B-73 ** | 0770-420 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2009 | 0,2009 | | |
| B-73 *** | 0770-420 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2398 | 0,2398 | 0,0456 | 0,0767 |
| PAROXETINE EG 30 mg | | EG | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2445-450 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | G | 18,18 | 18,18 | 2,56 | 4,27 |
| B-73 | 2445-450 2445-443 | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg | G | 9,65 41,88 | 9,65 41,88 | 6,26 | 10,54 |
| B-73 * | 2445-443 0789-438 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 29,76 0,3919 | 29,76 0,3919 | | |
| B-73 ** | 0789-438 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 0,3219 | 0,3219 | | |
| B-73 *** | 0789-438 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | G | 0,3709 | 0,3709 | 0,0639 | 0,1076 |
| PAROXETINE EG 40 mg | | EG | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2623-767 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 57,76 | 57,76 | 8,47 | 14,27 |
| B-73 * | 2623-767 0795-450 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 43,58 0,5439 | 43,58 0,5439 | | |
| B-73 ** | 0795-450 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,4713 | 0,4713 | | |
| B-73 *** | 0795-450 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,5329 | 0,5329 | 0,0864 | 0,1456 |
| PAROXETINE SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2162-915 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 13,44 | 13,44 | 1,60 | 2,67 |
| B-73 | 2162-915 2159-853 | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 6,03 18,49 | 6,03 18,49 | 2,62 | 4,37 |
| B-73 | 2159-853 2159-861 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 9,89 29,48 | 9,89 29,48 | 4,53 | 7,62 |
| B-73 * | 2159-861 0771-840 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 18,96 0,2447 | 18,96 0,2447 | | |
| B-73 ** | 0771-840 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2010 | 0,2010 | | |
| B-73 *** | 0771-840 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2395 | 0,2395 | 0,0453 | 0,0762 |
| PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 3439-155 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,48 | 29,48 | 4,53 | 7,62 |
| B-73 * | 3439-155 7718-034 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 18,96 0,2447 | 18,96 0,2447 | | |
| B-73 ** | 7718-034 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2010 | 0,2010 | | |
| B-73 *** | 7718-034 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2395 | 0,2395 | 0,0453 | 0,0762 |
| PAROXETINE SANDOZ 30 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2511-863 | 28 comprimés pelliculés, 30 mg | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 17,92 | 17,92 | 2,51 | 4,18 |
| B-73 | 2511-863 2511-871 | 60 comprimés pelliculés, 30 mg | 60 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 9,46 28,01 | 9,46 28,01 | 4,33 | 7,28 |
| B-73 | 2511-871 2511-889 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 17,69 40,70 | 17,69 40,70 | 6,10 | 10,26 |
| B-73 * | 2511-889 0789-461 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 28,74 0,3709 | 28,74 0,3709 | | |
| B-73 ** | 0789-461 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3046 | 0,3046 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 *** | 0789-461 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3517 | 0,3517 | 0,0610 | 0,1026 |
| PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 3439-122 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 40,70 | 40,70 | 6,10 | 10,26 |
| | 3439-122 | | | | 28,74 | 28,74 | | |
| B-73 * | 7718-042 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3709 | 0,3709 | | |
| B-73 ** | 7718-042 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3046 | 0,3046 | | |
| B-73 *** | 7718-042 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3517 | 0,3517 | 0,0610 | 0,1026 |
| PAROXETINE SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 1728-880 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,26 | 24,26 | 3,81 | 6,40 |
| | 1728-880 | | | | 14,43 | 14,43 | | |
| B-73 | 2159-879 | 60 comprimés pelliculés, 40 mg | 60 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 43,25 | 43,25 | 6,45 | 10,86 |
| | 2159-879 | | | | 30,95 | 30,95 | | |
| B-73 | 2159-887 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 58,78 | 58,78 | 8,61 | 14,50 |
| | 2159-887 | | | | 44,46 | 44,46 | | |
| B-73 * | 0771-857 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,5424 | 0,5424 | | |
| B-73 ** | 0771-857 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,4713 | 0,4713 | | |
| B-73 *** | 0771-857 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,5324 | 0,5324 | 0,0861 | 0,1450 |
| PAROXETINE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2567-360 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 28,27 | 28,27 | 4,37 | 7,34 |
| | 2567-360 | | | | 17,92 | 17,92 | | |
| B-73 | 4797-866 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,31 | 29,31 | 4,51 | 7,58 |
| | 4797-866 | | | | 18,82 | 18,82 | | |
| B-73 * | 0773-382 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 0773-382 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 0773-382 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2274 | 0,2274 | 0,0437 | 0,0734 |
| PAROXETINE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2654-952 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée) | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking) | G | 13,96 | 13,96 | 1,71 | 2,84 |
| | 2654-952 | | | | 6,43 | 6,43 | | |
| B-73 | 2646-982 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée) | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking) | G | 17,63 | 17,63 | 2,45 | 4,08 |
| | 2646-982 | | | | 9,23 | 9,23 | | |
| B-73 | 2545-309 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 29,48 | 29,48 | 4,53 | 7,62 |
| | 2545-309 | | | | 18,96 | 18,96 | | |
| B-73 * | 0771-295 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2447 | 0,2447 | | |
| B-73 ** | 0771-295 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2010 | 0,2010 | | |
| B-73 *** | 0771-295 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,2395 | 0,2395 | 0,0453 | 0,0762 |
| PAROXETINE VIATRIS 30 mg | | VIATRIS | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 2647-006 | 28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée) | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking) | G | 17,92 | 17,92 | 2,51 | 4,18 |
| | 2647-006 | | | | 9,46 | 9,46 | | |
| B-73 | 2647-022 | 56 comprimés pelliculés, 30 mg | 56 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 25,93 | 25,93 | 4,04 | 6,79 |
| | 2647-022 | | | | 15,88 | 15,88 | | |
| B-73 | 2919-892 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 42,57 | 42,57 | 6,36 | 10,70 |
| | 2919-892 | | | | 30,36 | 30,36 | | |
| B-73 * | 0776-229 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3918 | 0,3918 | | |
| B-73 ** | 0776-229 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3218 | 0,3218 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|
| B-73 *** | 0776-229 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,3704 | 0,3704 | 0,0636 | 0,1070 |
| PENICILLINE 1.000.000 IU | | KELA PHARMA | | ATC: J01CE01 | | | | |
| B-105 * | 0714-220 | 100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU 1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) | 100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU 1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) | | 286,11 | 286,11 | | |
| B-105 ** | 0714-220 | 1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) | 1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) | | 3,1039 | 3,1039 | | |
| B-105 ** | 0714-220 | 1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6) | 1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) | | 3,0328 | 3,0328 | | |
| PENICILLINE 2.000.000 IU | | KELA PHARMA | | ATC: J01CE01 | | | | |
| B-105 * | 0714-238 | 100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | | 319,01 | 319,01 | | |
| B-105 ** | 0714-238 | 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | | 3,4526 | 3,4526 | | |
| B-105 ** | 0714-238 | 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3) | 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3) | | 3,3815 | 3,3815 | | |
| PENICILLINE 5.000.000 IU | | KELA PHARMA | | ATC: J01CE01 | | | | |
| B-105 * | 7734-049 | 100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU 1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU | 100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU 1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU | | 395,92 | 395,92 | | |
| B-105 ** | 7734-049 | 1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU | 1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU | | 4,2679 | 4,2679 | | |
| B-105 ** | 7734-049 | 1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU | 1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU | | 4,1968 | 4,1968 | | |
| PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU | | SANDOZ | | ATC: J01CE01 | | | | |
| B-105 * | 7731-599 | 100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU 1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU | 100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU 1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU | | 286,11 | 286,11 | | |
| B-105 ** | 7731-599 | 1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU | 1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU | | 3,1039 | 3,1039 | | |
| B-105 ** | 7731-599 | 1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU | 1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU | | 3,0328 | 3,0328 | | |
| PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU | | SANDOZ | | ATC: J01CE01 | | | | |
| B-105 * | 7731-607 | 25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU 1 flacon injectable 5000000 IU | 25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU 1 injectieflacon 5000000 IU | | 110,66 | 110,66 | | |
| B-105 * | 7731-607 | 1 flacon injectable 5000000 IU | 1 injectieflacon 5000000 IU | | 4,9764 | 4,9764 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-105 ** | 7731-607 | solution pour perfusion et injection, 5000000 IU 1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU | oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU 1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU | | 4,6920 | 4,6920 | | |
| PENTACARINAT 300 mg | | THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED | | ATC: P01CX01 | | | | |
| A-40 | 0435-586 | 5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg | 5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg | | 105,32 | 105,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0435-586 | | | | 86,18 | 86,18 | | |
| A-40 * | 0734-392 | 1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg | 1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg | | 19,6920 | 19,6920 | | |
| A-40 ** | 0734-392 | 1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg | 1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg | | 18,2700 | 18,2700 | | |
| PENTASA | | FERRING | | ATC: A07EC02 | | | | |
| B-55 | 1550-771 | 50 g granulés à libération prolongée, 1 g | 50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g | R | 40,41 | 40,41 | 6,06 | 10,19 |
| | 1550-771 | | | | 28,48 | 28,48 | | |
| B-55 | 1550-789 | 150 g granulés à libération prolongée, 1 g | 150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g | R | 90,65 | 90,65 | 10,20 | 15,50 |
| | 1550-789 | | | | 72,79 | 72,79 | | |
| B-55 * | 0767-574 | 1 granulés à libération modifiée, 1 g | 1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g | R | 0,5618 | 0,5618 | | |
| B-55 ** | 0767-574 | 1 granulés à libération modifiée, 1 g | 1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g | R | 0,5144 | 0,5144 | | |
| B-55 *** | 0767-574 | 1 granulés à libération modifiée, 1 g | 1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g | R | 0,5675 | 0,5675 | 0,0680 | 0,1033 |
| PENTASA 1 g | | FERRING | | ATC: A07EC02 | | | | |
| B-55 | 3010-154 | 28 suppositoires, 1 g | 28 zetpillen, 1 g | R | 38,85 | 38,85 | 5,84 | 9,82 |
| | 3010-154 | | | | 27,12 | 27,12 | | |
| B-55 * | 0742-502 | 1 suppositoire, 1 g | 1 zetpil, 1 g | R | 1,2500 | 1,2500 | | |
| B-55 ** | 0742-502 | 1 suppositoire, 1 g | 1 zetpil, 1 g | R | 1,0268 | 1,0268 | | |
| PENTASA 2 g | | FERRING | | ATC: A07EC02 | | | | |
| B-55 | 2744-910 | 120 g granulés à libération prolongée, 2 g | 120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g | R | 78,14 | 78,14 | 8,30 | 12,50 |
| | 2744-910 | | | | 61,38 | 61,38 | | |
| B-55 * | 0752-196 | 1 sachet-dose, 2 g | 1 sachet, 2 g | R | 1,2028 | 1,2028 | | |
| B-55 ** | 0752-196 | 1 sachet-dose, 2 g | 1 sachet, 2 g | R | 1,0843 | 1,0843 | | |
| B-55 *** | 0752-196 | 1 sachet-dose, 2 g | 1 sachet, 2 g | R | 1,2102 | 1,2102 | 0,1383 | 0,2083 |
| PENTASA 4g | | FERRING | | ATC: A07EC02 | | | | |
| B-55 | 3786-829 | 30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose | 30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis | R | 78,14 | 78,14 | 8,30 | 12,50 |
| | 3786-829 | | | | 61,38 | 61,38 | | |
| B-55 * | 7723-141 | 1 granulés à libération modifiée, 4 g | 1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g | R | 2,4057 | 2,4057 | | |
| B-55 ** | 7723-141 | 1 granulés à libération modifiée, 4 g | 1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g | R | 2,1687 | 2,1687 | | |
| B-55 *** | 7723-141 | 1 granulés à libération modifiée, 4 g | 1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g | R | 2,4203 | 2,4203 | 0,2767 | 0,4167 |
| PERINDOPRIL EG 10 mg | | EG | | ATC: C09AA04 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-21 | 4851-614 4851-614 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 16,96 8,72 | 16,96 8,72 | 2,31 | 3,85 |
| B-21 | 4851-622 4851-622 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 36,98 25,50 | 36,98 25,50 | 5,58 | 9,38 |
| B-21 * | 7741-002 | 1 comprimé péliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3657 | 0,3657 | | |
| B-21 ** | 7741-002 | 1 comprimé péliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3003 | 0,3003 | | |
| B-21 *** | 7741-002 | 1 comprimé péliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3494 | 0,3494 | 0,0620 | 0,1042 |
| PERINDOPRIL EG 5 mg | | EG | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 4851-630 4851-630 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 11,59 4,62 | 11,59 4,62 | 1,23 | 2,04 |
| B-21 | 4851-648 4851-648 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 21,61 12,27 | 21,61 12,27 | 3,25 | 5,42 |
| B-21 * | 7741-010 | 1 comprimé péliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1759 | 0,1759 | | |
| B-21 ** | 7741-010 | 1 comprimé péliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1446 | 0,1446 | | |
| B-21 *** | 7741-010 | 1 comprimé péliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1787 | 0,1787 | 0,0361 | 0,0602 |
| PERINDOPRIL KRKA 4 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 3260-429 3260-429 | 30 comprimés, 4 mg | 30 tabletten, 4 mg | G | 10,73 3,97 | 10,73 3,97 | 1,05 | 1,75 |
| B-21 | 3354-743 3354-743 | 90 comprimés, 4 mg | 90 tabletten, 4 mg | G | 18,26 9,72 | 18,26 9,72 | 2,58 | 4,30 |
| B-21 * | 7709-546 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1393 | 0,1393 | | |
| B-21 ** | 7709-546 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1144 | 0,1144 | | |
| B-21 *** | 7709-546 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1415 | 0,1415 | 0,0287 | 0,0478 |
| PERINDOPRIL KRKA 8 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 3260-437 3260-437 | 90 comprimés, 8 mg | 90 tabletten, 8 mg | G | 29,60 19,07 | 29,60 19,07 | 4,55 | 7,65 |
| B-21 * | 7709-553 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,2734 | 0,2734 | | |
| B-21 ** | 7709-553 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,2246 | 0,2246 | | |
| B-21 *** | 7709-553 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,2674 | 0,2674 | 0,0506 | 0,0850 |
| PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 2510-592 2510-592 | 30 comprimés, 4 mg | 30 tabletten, 4 mg | G | 10,85 4,06 | 10,85 4,06 | 1,08 | 1,79 |
| B-21 | 2510-600 2510-600 | 60 comprimés, 4 mg | 60 tabletten, 4 mg | G | 15,52 7,62 | 15,52 7,62 | 2,02 | 3,37 |
| B-21 | 2510-618 2510-618 | 100 comprimés, 4 mg | 100 tabletten, 4 mg | G | 23,21 13,52 | 23,21 13,52 | 3,59 | 5,98 |
| B-21 * | 0789-446 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1745 | 0,1745 | | |
| B-21 ** | 0789-446 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1433 | 0,1433 | | |
| B-21 *** | 0789-446 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | G | 0,1768 | 0,1768 | 0,0359 | 0,0598 |
| PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 2605-293 2605-293 | 60 comprimés, 8 mg | 60 tabletten, 8 mg | G | 27,31 17,07 | 27,31 17,07 | 4,23 | 7,11 |
| B-21 | 2605-301 2605-301 | 90 comprimés, 8 mg | 90 tabletten, 8 mg | G | 30,94 20,24 | 30,94 20,24 | 4,74 | 7,96 |
| B-21 * | 0793-174 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,2902 | 0,2902 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-21 ** | 0793-174 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,2383 | 0,2383 | | |
| B-21 *** | 0793-174 | 1 comprimé, 8 mg | 1 tablet, 8 mg | G | 0,2823 | 0,2823 | 0,0527 | 0,0884 |
| PERINDOPRIL SERVIER 4 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 * | 0734-871 0734-871 | 100 comprimés, 4 mg 1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 100 tabletten, 4 mg 1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | R | 15,18 0,1959 | 15,18 0,1959 | | |
| B-21 ** | 0734-871 | 1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | R | 0,1609 | 0,1609 | | |
| PERINDOPRIL SERVIER 8 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 * | 0780-395 0780-395 | 100 comprimés, 8 mg 1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 100 tabletten, 8 mg 1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | R | 31,98 0,4101 | 31,98 0,4101 | | |
| B-21 ** | 0780-395 | 1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100) | 1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) | R | 0,3390 | 0,3390 | | |
| PERINDOPRIL TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 3624-046 3624-046 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 16,41 8,30 | 16,41 8,30 | 2,20 | 3,67 |
| B-21 | 3624-053 3624-053 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 35,96 24,60 | 35,96 24,60 | 5,44 | 9,14 |
| B-21 * | 7721-038 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3528 | 0,3528 | | |
| B-21 ** | 7721-038 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,2898 | 0,2898 | | |
| B-21 *** | 7721-038 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3380 | 0,3380 | 0,0604 | 0,1016 |
| PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 3624-012 3624-012 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg | G | 9,07 2,70 | 9,07 2,70 | 0,72 | 1,19 |
| B-21 * | 7721-020 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,1160 | 0,1160 | | |
| B-21 ** | 7721-020 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,0953 | 0,0953 | | |
| B-21 *** | 7721-020 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg | G | 0,1180 | 0,1180 | 0,0240 | 0,0397 |
| PERINDOPRIL TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 3624-020 3624-020 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 11,34 4,43 | 11,34 4,43 | 1,17 | 1,96 |
| B-21 | 3624-038 3624-038 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 21,41 12,12 | 21,41 12,12 | 3,21 | 5,36 |
| B-21 * | 7720-618 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1738 | 0,1738 | | |
| B-21 ** | 7720-618 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1428 | 0,1428 | | |
| B-21 *** | 7720-618 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1764 | 0,1764 | 0,0357 | 0,0596 |
| PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: C09AA04 | | | | |
| B-21 | 4635-413 | 60 comprimés pelliculés, 10 mg | 60 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 30,57 | 30,57 | 4,69 | 7,88 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-21 | 4635-413 4635-421 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 19,92 36,99 | 19,92 36,99 | 5,58 | 9,39 |
| | 4635-421 | | | | 25,51 | 25,51 | | |
| B-21 * | 7737-950 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3658 | 0,3658 | | |
| B-21 ** | 7737-950 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3004 | 0,3004 | | |
| B-21 *** | 7737-950 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,3496 | 0,3496 | 0,0620 | 0,1043 |
| PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg VIATRIS ATC: C09AA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4635-397 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 11,60 | 11,60 | 1,23 | 2,05 |
| | 4635-397 | | | | 4,63 | 4,63 | | |
| B-21 | 4635-405 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 21,62 | 21,62 | 3,26 | 5,43 |
| | 4635-405 | | | | 12,28 | 12,28 | | |
| B-21 * | 7737-943 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1761 | 0,1761 | | |
| B-21 ** | 7737-943 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1447 | 0,1447 | | |
| B-21 *** | 7737-943 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1788 | 0,1788 | 0,0362 | 0,0603 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4623-849 | 90 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 53,05 | 53,05 | 7,82 | 13,16 |
| | 4623-849 | | | | 39,48 | 39,48 | | |
| B-21 * | 7735-913 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,5440 | 0,5440 | | |
| B-21 ** | 7735-913 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4650 | 0,4650 | | |
| B-21 *** | 7735-913 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,5280 | 0,5280 | 0,0869 | 0,1462 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4623-856 | 90 comprimés, 10 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 5 mg | G | 43,78 | 43,78 | 6,53 | 10,98 |
| | 4623-856 | | | | 31,41 | 31,41 | | |
| B-21 * | 7735-905 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | G | 0,4489 | 0,4489 | | |
| B-21 ** | 7735-905 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | G | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 7735-905 | 1 gélule, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | G | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 3733-342 | 90 comprimés, 4 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 4 mg/ 10 mg | G | 39,98 | 39,98 | 6,00 | 10,09 |
| | 3733-342 | | | | 28,11 | 28,11 | | |
| B-21 * | 7722-523 | 1 comprimé, 4 mg/ 10 mg | 1 tablet, 4 mg/ 10 mg | G | 0,4031 | 0,4031 | | |
| B-21 ** | 7722-523 | 1 comprimé, 4 mg/ 10 mg | 1 tablet, 4 mg/ 10 mg | G | 0,3311 | 0,3311 | | |
| B-21 *** | 7722-523 | 1 comprimé, 4 mg/ 10 mg | 1 tablet, 4 mg/ 10 mg | G | 0,3828 | 0,3828 | 0,0667 | 0,1121 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 3733-326 | 30 comprimés, 4 mg/ 5 mg | 30 tabletten, 4 mg/ 5 mg | G | 18,48 | 18,48 | 2,62 | 4,37 |
| | 3733-326 | | | | 9,88 | 9,88 | | |
| B-21 | 3733-318 | 90 comprimés, 4 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 4 mg/ 5 mg | G | 28,78 | 28,78 | 4,44 | 7,46 |
| | 3733-318 | | | | 18,36 | 18,36 | | |
| B-21 * | 7722-515 | 1 comprimé, 4 mg/ 5 mg | 1 tablet, 4 mg/ 5 mg | G | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 7722-515 | 1 comprimé, 4 mg/ 5 mg | 1 tablet, 4 mg/ 5 mg | G | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 7722-515 | 1 comprimé, 4 mg/ 5 mg | 1 tablet, 4 mg/ 5 mg | G | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4623-831 | 90 comprimés, 5 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 10 mg | G | 38,05 | 38,05 | 5,73 | 9,64 |
| | 4623-831 | | | | 26,43 | 26,43 | | |
| B-21 * | 7735-897 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | G | 0,3790 | 0,3790 | | |
| B-21 ** | 7735-897 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | G | 0,3113 | 0,3113 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-21 *** | 7735-897 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | G | 0,3613 | 0,3613 | 0,0637 | 0,1071 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4618-450 4618-450 | 90 comprimés, 5 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 5 mg | G | 28,78 18,36 | 28,78 18,36 | 4,44 | 7,46 |
| B-21 * | 7735-947 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | G | 0,2632 | 0,2632 | | |
| B-21 ** | 7735-947 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | G | 0,2162 | 0,2162 | | |
| B-21 *** | 7735-947 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | G | 0,2583 | 0,2583 | 0,0493 | 0,0829 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 3733-276 3733-276 | 90 comprimés, 8 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 8 mg/ 10 mg | G | 54,97 41,16 | 54,97 41,16 | 8,09 | 13,61 |
| B-21 * | 7722-549 | 1 comprimé, 8 mg/ 10 mg | 1 tablet, 8 mg/ 10 mg | G | 0,5638 | 0,5638 | | |
| B-21 ** | 7722-549 | 1 comprimé, 8 mg/ 10 mg | 1 tablet, 8 mg/ 10 mg | G | 0,4848 | 0,4848 | | |
| B-21 *** | 7722-549 | 1 comprimé, 8 mg/ 10 mg | 1 tablet, 8 mg/ 10 mg | G | 0,5493 | 0,5493 | 0,0899 | 0,1512 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 3733-292 3733-292 | 90 comprimés, 8 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 8 mg/ 5 mg | G | 43,78 31,41 | 43,78 31,41 | 6,53 | 10,98 |
| B-21 * | 7722-531 | 1 comprimé, 8 mg/ 5 mg | 1 tablet, 8 mg/ 5 mg | G | 0,4489 | 0,4489 | | |
| B-21 ** | 7722-531 | 1 comprimé, 8 mg/ 5 mg | 1 tablet, 8 mg/ 5 mg | G | 0,3699 | 0,3699 | | |
| B-21 *** | 7722-531 | 1 comprimé, 8 mg/ 5 mg | 1 tablet, 8 mg/ 5 mg | G | 0,4249 | 0,4249 | 0,0726 | 0,1220 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4425-385 4425-385 | 30 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 30 tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 20,61 11,51 | 20,61 11,51 | 3,05 | 5,09 |
| B-21 | 4425-443 4425-443 | 90 comprimés, 10 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 10 mg | G | 53,05 39,48 | 53,05 39,48 | 7,82 | 13,16 |
| B-21 * | 7734-676 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,5440 | 0,5440 | | |
| B-21 ** | 7734-676 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,4650 | 0,4650 | | |
| B-21 *** | 7734-676 | 1 comprimé, 10 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 10 mg | G | 0,5280 | 0,5280 | 0,0869 | 0,1462 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4425-401 4425-401 | 30 comprimés, 10 mg/ 5 mg | 30 tabletten, 10 mg/ 5 mg | G | 19,23 10,45 | 19,23 10,45 | 2,77 | 4,62 |
| B-21 | 4425-393 4425-393 | 90 comprimés, 10 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 5 mg | G | 43,86 31,48 | 43,86 31,48 | 6,54 | 11,00 |
| B-21 * | 7734-668 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | G | 0,4498 | 0,4498 | | |
| B-21 ** | 7734-668 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | G | 0,3708 | 0,3708 | | |
| B-21 *** | 7734-668 | 1 comprimé, 10 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 5 mg | G | 0,4259 | 0,4259 | 0,0727 | 0,1222 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4425-419 4425-419 | 90 comprimés, 5 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 10 mg | G | 38,05 26,43 | 38,05 26,43 | 5,73 | 9,64 |
| B-21 * | 7734-650 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | G | 0,3790 | 0,3790 | | |
| B-21 ** | 7734-650 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | G | 0,3113 | 0,3113 | | |
| B-21 *** | 7734-650 | 1 comprimé, 5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 5 mg/ 10 mg | G | 0,3613 | 0,3613 | 0,0637 | 0,1071 |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA | | | | ATC: C09BB04 | | | | |
| B-21 | 4425-435 4425-435 | 30 comprimés, 5 mg/ 5 mg | 30 tabletten, 5 mg/ 5 mg | G | 16,27 8,19 | 16,27 8,19 | 2,17 | 3,62 |
| B-21 | 4425-427 | 90 comprimés, 5 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 5 mg | G | 28,85 | 28,85 | 4,45 | 7,47 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 4425-427 | | | | | 18,42 | 18,42 | | |
| B-21 * | 7734-643 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | G | 0,2641 | 0,2641 | | | |
| B-21 ** | 7734-643 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | G | 0,2170 | 0,2170 | | | |
| B-21 *** | 7734-643 | 1 comprimé, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 5 mg | G | 0,2591 | 0,2591 | 0,0494 | 0,0830 | |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA04 | | | | | | | | | |
| B-21 | 4625-893 | 90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | G | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 | |
| | 4625-893 | | | | 25,48 | 25,48 | | | |
| B-21 * | 7735-939 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg | G | 0,3653 | 0,3653 | | | |
| B-21 ** | 7735-939 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg | G | 0,3001 | 0,3001 | | | |
| B-21 *** | 7735-939 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg | G | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 | |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA04 | | | | | | | | | |
| B-21 | 4625-885 | 90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg | G | 26,80 | 26,80 | 4,16 | 6,99 | |
| | 4625-885 | | | | 16,64 | 16,64 | | | |
| B-21 * | 7735-921 | 1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2386 | 0,2386 | | | |
| B-21 ** | 7735-921 | 1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,1960 | 0,1960 | | | |
| B-21 *** | 7735-921 | 1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2363 | 0,2363 | 0,0462 | 0,0777 | |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ ATC: C09BA04 | | | | | | | | | |
| B-21 | 2726-339 | 90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg | 90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg | G | 25,12 | 25,12 | 3,93 | 6,60 | |
| | 2726-339 | | | | 15,17 | 15,17 | | | |
| B-21 * | 0799-130 | 1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg | 1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg | G | 0,2176 | 0,2176 | | | |
| B-21 ** | 0799-130 | 1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg | 1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg | G | 0,1787 | 0,1787 | | | |
| B-21 *** | 0799-130 | 1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg | 1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg | G | 0,2177 | 0,2177 | 0,0437 | 0,0733 | |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ ATC: C09BA04 | | | | | | | | | |
| B-21 | 2726-305 | 90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg | 90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg | G | 27,42 | 27,42 | 4,25 | 7,14 | |
| | 2726-305 | | | | 17,18 | 17,18 | | | |
| B-21 * | 0799-148 | 1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg | 1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg | G | 0,2463 | 0,2463 | | | |
| B-21 ** | 0799-148 | 1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg | 1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg | G | 0,2023 | 0,2023 | | | |
| B-21 *** | 0799-148 | 1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg | 1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg | G | 0,2432 | 0,2432 | 0,0472 | 0,0793 | |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg VIATRIS ATC: C09BA04 | | | | | | | | | |
| B-21 | 4662-094 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 14,20 | 14,20 | 1,76 | 2,93 | |
| | 4662-094 | | | | 6,62 | 6,62 | | | |
| B-21 | 4662-102 | 90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg | 90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 25,78 | 25,78 | 4,02 | 6,75 | |
| | 4662-102 | | | | 15,75 | 15,75 | | | |
| B-21 * | 7738-263 | 1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 0,2259 | 0,2259 | | | |
| B-21 ** | 7738-263 | 1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 0,1856 | 0,1856 | | | |
| B-21 *** | 7738-263 | 1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | G | 0,2250 | 0,2250 | 0,0447 | 0,0750 | |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg VIATRIS ATC: C09BA04 | | | | | | | | | |
| B-21 | 4662-110 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg | G | 14,62 | 14,62 | 1,84 | 3,07 | |
| | 4662-110 | | | | 6,94 | 6,94 | | | |
| B-21 | 4662-128 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg/ | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ | G | 27,23 | 27,23 | 4,22 | 7,09 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 4662-128 | 1,25 mg | 1,25 mg | | 17,01 | 17,01 | | |
| B-21 * | 7738-271 | 1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2439 | 0,2439 | | |
| B-21 ** | 7738-271 | 1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2003 | 0,2003 | | |
| B-21 *** | 7738-271 | 1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | G | 0,2411 | 0,2411 | 0,0469 | 0,0788 |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 4851-937 | 90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | G | 56,17 | 56,17 | 8,25 | 13,89 |
| | 4851-937 | | | | 42,20 | 42,20 | | |
| B-21 * | 7742-018 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | G | 0,5760 | 0,5760 | | |
| B-21 ** | 7742-018 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | G | 0,4970 | 0,4970 | | |
| B-21 *** | 7742-018 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | G | 0,5626 | 0,5626 | 0,0917 | 0,1543 |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 4851-952 | 90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | G | 45,78 | 45,78 | 6,81 | 11,45 |
| | 4851-952 | | | | 33,16 | 33,16 | | |
| B-21 * | 7742-026 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | G | 0,4696 | 0,4696 | | |
| B-21 ** | 7742-026 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | G | 0,3906 | 0,3906 | | |
| B-21 *** | 7742-026 | 1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | G | 0,4472 | 0,4472 | 0,0757 | 0,1272 |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 4851-945 | 90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | G | 29,56 | 29,56 | 4,55 | 7,64 |
| | 4851-945 | | | | 19,04 | 19,04 | | |
| B-21 * | 7742-034 | 1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | G | 0,2730 | 0,2730 | | |
| B-21 ** | 7742-034 | 1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | G | 0,2242 | 0,2242 | | |
| B-21 *** | 7742-034 | 1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | G | 0,2670 | 0,2670 | 0,0506 | 0,0849 |
| PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01EB01 | | | | |
| B-168 | 0050-666 | 1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml | 1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml | | 6,81 | 6,81 | 0,20 | 0,34 |
| | 0050-666 | | | | 0,76 | 0,76 | | |
| B-168 * | 0709-667 | 1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL | | 0,9800 | 0,9800 | | |
| B-168 ** | 0709-667 | 1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL | | 0,8100 | 0,8100 | | |
| PILOCARPINE-ISOPTO 2% NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01EB01 | | | | |
| B-168 | 0050-658 | 1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml | 1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml | | 7,12 | 7,12 | 0,28 | 0,46 |
| | 0050-658 | | | | 1,04 | 1,04 | | |
| B-168 * | 0709-675 | 1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | | 1,3400 | 1,3400 | | |
| B-168 ** | 0709-675 | 1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | | 1,1000 | 1,1000 | | |
| PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg AUROBINDO NV | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: J01CR05 | | |
| | 7734-353 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg | | 31,55 | 31,55 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
| B-108 ** | 7734-353 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg | G | 3,3440 | 3,3440 | | |
| PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 7734-361 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg | | 71,71 | 71,71 | | |
| B-108 ** | 7734-361 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg | G | 7,6010 | 7,6010 | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 0792-648 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis | | 3,16 | 3,16 | | |
| B-108 ** | 0792-648 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g | G | 3,3500 | 3,3500 | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 0792-655 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | | 80,40 | 80,40 | | |
| B-108 ** | 0792-655 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | G | 8,5220 | 8,5220 | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 7737-141 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g | | 3,31 | 3,31 | | |
| B-108 ** | 7737-141 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g | G | 3,5100 | 3,5100 | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 7737-158 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | | 8,44 | 8,44 | | |
| B-108 ** | 7737-158 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | G | 8,9500 | 8,9500 | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 0792-853 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g | | 44,40 | 44,40 | | |
| B-108 ** | 0792-853 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g | G | 4,7060 | 4,7060 | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01CR05 | |
| B-108 ** | 0792-879 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g | | 44,40 | 44,40 | | |
| B-108 ** | 0792-879 | 1 flacon injectable 1 doses solution | 1 injectieflacon 1 doses oplossing | G | 4,7060 | 4,7060 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--|--------------|--------------|--------|--------------|--|
| | | pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g | voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g | | | | | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01CR05 | |
| | 0792-861 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g | | 80,40 | 80,40 | | | |
| B-108 ** | 0792-861 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | G | 8,5220 | 8,5220 | | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g | | GRINDEKS - KALCEKS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01CR05 | |
| | 7739-683 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g | | 44,40 | 44,40 | | | |
| B-108 ** | 7739-683 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g | G | 4,7060 | 4,7060 | | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g | | GRINDEKS - KALCEKS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01CR05 | |
| | 7739-568 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg | | 80,40 | 80,40 | | | |
| B-108 ** | 7739-568 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg | G | 8,5220 | 8,5220 | | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01CR05 | |
| | 7719-032 | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | | 80,40 | 80,40 | | | |
| B-108 ** | 7719-032 | 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g | G | 8,5220 | 8,5220 | | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01CR05 | |
| | 0796-912 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis | | 4,93 | 4,93 | | | |
| B-108 ** | 0796-912 | 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g | G | 5,2300 | 5,2300 | | | |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01CR05 | |
| | 0796-904 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis | | 8,94 | 8,94 | | | |
| B-108 ** | 0796-904 | 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g | G | 9,4800 | 9,4800 | | | |
| PIROXICAM EG | | EG | | | | | | ATC: M01AC01 | |
| B-63 | 1173-749 | 30 gélules, 20 mg | 30 capsules, hard, 20 mg | G | 7,21 | 7,21 | 0,30 | 0,49 | |
| | 1173-749 | | | | 1,12 | 1,12 | | | |
| B-63 * | 0742-817 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,0483 | 0,0483 | | | |
| B-63 ** | 0742-817 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,0397 | 0,0397 | | | |
| B-63 *** | 0742-817 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 0,0558 | 0,0558 | 0,0100 | 0,0163 | |
| PIROXICAM EG | | EG | | | | | | ATC: M01AC01 | |
| B-63 | 1173-756 | 30 comprimés dispersibles, 20 mg | 30 disperseerbare tabletten, 20 mg | G | 7,21 | 7,21 | 0,30 | 0,49 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-63 * | 1173-756 0742-825 | 1 comprimé dispersible, 20 mg | 1 disperseerbare tablet, 20 mg | G | 1,12 0,0483 | 1,12 0,0483 | | |
| B-63 ** | 0742-825 | 1 comprimé dispersible, 20 mg | 1 disperseerbare tablet, 20 mg | G | 0,0397 | 0,0397 | | |
| B-63 *** | 0742-825 | 1 comprimé dispersible, 20 mg | 1 disperseerbare tablet, 20 mg | G | 0,0558 | 0,0558 | 0,0100 | 0,0163 |
| PLAQUENIL SANOFI BELGIUM ATC: P01BA02 | | | | | | | | |
| B-133 | 0125-575 0125-575 | 100 comprimés enrobés, 200 mg | 100 omhulde tabletten, 200 mg | | 15,64 7,71 | 15,64 7,71 | 2,04 | 3,41 |
| B-133 * | 0715-060 | 1 comprimé enrobé, 200 mg | 1 omhulde tablet, 200 mg | | 0,0995 | 0,0995 | | |
| B-133 ** | 0715-060 | 1 comprimé enrobé, 200 mg | 1 omhulde tablet, 200 mg | | 0,0817 | 0,0817 | | |
| B-133 *** | 0715-060 | 1 comprimé enrobé, 200 mg | 1 omhulde tablet, 200 mg | | 0,1010 | 0,1010 | 0,0204 | 0,0341 |
| PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 1641-257 1641-257 | 28 comprimés, 20 mg | 28 tabletten, 20 mg | R | 9,01 2,65 | 9,01 2,65 | 0,70 | 1,17 |
| B-41 | 1641-240 1641-240 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | R | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-41 * | 0768-796 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1372 | 0,1372 | | |
| B-41 ** | 0768-796 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1128 | 0,1128 | | |
| B-41 *** | 0768-796 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1393 | 0,1393 | 0,0282 | 0,0470 |
| PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 1641-190 1641-190 | 28 comprimés, 40 mg | 28 tabletten, 40 mg | R | 17,89 9,43 | 17,89 9,43 | 2,50 | 4,17 |
| B-41 | 1641-208 1641-208 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | R | 31,88 21,06 | 31,88 21,06 | 4,87 | 8,19 |
| B-41 * | 0768-804 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,2773 | 0,2773 | | |
| B-41 ** | 0768-804 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,2278 | 0,2278 | | |
| B-41 *** | 0768-804 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,2689 | 0,2689 | 0,0497 | 0,0836 |
| PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 4169-371 4169-371 | 28 comprimés enrobés, 40 mg | 28 omhulde tabletten, 40 mg | G | 17,82 9,37 | 17,82 9,37 | 2,48 | 4,14 |
| B-41 | 4169-363 4169-363 | 98 comprimés enrobés, 40 mg | 98 omhulde tabletten, 40 mg | G | 30,74 20,06 | 30,74 20,06 | 4,71 | 7,92 |
| B-41 * | 7727-639 | 1 comprimé enrobé, 40 mg | 1 omhulde tablet, 40 mg | G | 0,2642 | 0,2642 | | |
| B-41 ** | 7727-639 | 1 comprimé enrobé, 40 mg | 1 omhulde tablet, 40 mg | G | 0,2169 | 0,2169 | | |
| B-41 *** | 7727-639 | 1 comprimé enrobé, 40 mg | 1 omhulde tablet, 40 mg | G | 0,2572 | 0,2572 | 0,0481 | 0,0808 |
| PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 4570-115 4570-115 | 28 comprimés, 20 mg | 28 tabletten, 20 mg | G | 8,99 2,63 | 8,99 2,63 | 0,70 | 1,16 |
| B-41 | 4570-123 4570-123 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 17,91 9,45 | 17,91 9,45 | 2,51 | 4,18 |
| B-41 * | 7735-681 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1245 | 0,1245 | | |
| B-41 ** | 7735-681 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1022 | 0,1022 | | |
| B-41 *** | 7735-681 | 1 gélule, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1263 | 0,1263 | 0,0256 | 0,0427 |
| PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |

| hoofdstuk: IV) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 | 4570-149 4570-149 | 28 comprimés, 40 mg | 28 tabletten, 40 mg | G | 17,52 9,15 | 17,52 9,15 | 2,43 | 4,04 |
| B-41 | 4570-131 4570-131 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 30,71 20,03 | 30,71 20,03 | 4,70 | 7,91 |
| B-41 * | 7735-814 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2638 | 0,2638 | | |
| B-41 ** | 7735-814 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2166 | 0,2166 | | |
| B-41 *** | 7735-814 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2569 | 0,2569 | 0,0480 | 0,0807 |
| PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 2162-568 2162-568 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 17,91 9,45 | 17,91 9,45 | 2,51 | 4,18 |
| B-41 * | 0779-207 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1245 | 0,1245 | | |
| B-41 ** | 0779-207 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1022 | 0,1022 | | |
| B-41 *** | 0779-207 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1263 | 0,1263 | 0,0256 | 0,0427 |
| PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 2162-543 2162-543 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 30,71 20,03 | 30,71 20,03 | 4,70 | 7,91 |
| B-41 * | 0779-215 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2638 | 0,2638 | | |
| B-41 ** | 0779-215 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2166 | 0,2166 | | |
| B-41 *** | 0779-215 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2569 | 0,2569 | 0,0480 | 0,0807 |
| PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 2199-321 2199-321 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-41 * | 0780-114 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1372 | 0,1372 | | |
| B-41 ** | 0780-114 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1128 | 0,1128 | | |
| B-41 *** | 0780-114 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1393 | 0,1393 | 0,0282 | 0,0470 |
| PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 2199-313 2199-313 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 31,88 21,06 | 31,88 21,06 | 4,87 | 8,19 |
| B-41 * | 0780-122 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2773 | 0,2773 | | |
| B-41 ** | 0780-122 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2278 | 0,2278 | | |
| B-41 *** | 0780-122 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2689 | 0,2689 | 0,0497 | 0,0836 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 2202-323 2202-323 | 28 comprimés, 20 mg | 28 tabletten, 20 mg | G | 9,01 2,65 | 9,01 2,65 | 0,70 | 1,17 |
| B-41 | 2202-331 2202-331 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-41 * | 0779-272 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1372 | 0,1372 | | |
| B-41 ** | 0779-272 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1128 | 0,1128 | | |
| B-41 *** | 0779-272 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1393 | 0,1393 | 0,0282 | 0,0470 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 | | | | | | | | |
| B-41 | 2202-349 | 28 comprimés, 40 mg | 28 tabletten, 40 mg | G | 17,78 | 17,78 | 2,48 | 4,13 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------|--------|
| B-41 | 2202-349 2202-356 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 9,35 31,88 | 9,35 31,88 | 4,87 | 8,19 |
| B-41 * | 2202-356 0779-280 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 21,06 0,2773 | 21,06 0,2773 | | |
| B-41 ** | 0779-280 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2278 | 0,2278 | | |
| B-41 *** | 0779-280 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2689 | 0,2689 | 0,0497 | 0,0836 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA03 | |
| B-41 | 4499-810 4499-810 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 31,88 21,06 | 31,88 21,06 | 4,87 | 8,19 |
| B-41 * | 7734-965 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2773 | 0,2773 | | |
| B-41 ** | 7734-965 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2278 | 0,2278 | | |
| B-41 *** | 7734-965 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2689 | 0,2689 | 0,0497 | 0,0836 |
| PRAVASTATINE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA03 | |
| B-41 | 2234-904 2234-904 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | G | 17,94 9,47 | 17,94 9,47 | 2,51 | 4,19 |
| B-41 * | 0780-742 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1247 | 0,1247 | | |
| B-41 ** | 0780-742 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1024 | 0,1024 | | |
| B-41 *** | 0780-742 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1266 | 0,1266 | 0,0256 | 0,0428 |
| PRAVASTATINE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA03 | |
| B-41 | 2234-920 2234-920 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 30,74 20,06 | 30,74 20,06 | 4,71 | 7,92 |
| B-41 * | 0780-759 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2642 | 0,2642 | | |
| B-41 ** | 0780-759 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2169 | 0,2169 | | |
| B-41 *** | 0780-759 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2572 | 0,2572 | 0,0481 | 0,0808 |
| PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA03 | |
| B-41 | 2440-535 2440-535 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 8,99 2,63 | 8,99 2,63 | 0,70 | 1,16 |
| B-41 | 2440-568 2440-568 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-41 * | 0786-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1372 | 0,1372 | | |
| B-41 ** | 0786-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1128 | 0,1128 | | |
| B-41 *** | 0786-970 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1393 | 0,1393 | 0,0282 | 0,0470 |
| PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA03 | |
| B-41 | 2440-550 2440-550 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 17,52 9,15 | 17,52 9,15 | 2,43 | 4,04 |
| B-41 | 2440-543 2440-543 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 31,88 21,06 | 31,88 21,06 | 4,87 | 8,19 |
| B-41 * | 0786-988 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2773 | 0,2773 | | |
| B-41 ** | 0786-988 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2278 | 0,2278 | | |
| B-41 *** | 0786-988 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2689 | 0,2689 | 0,0497 | 0,0836 |
| PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | | | | ATC: V03AB37 | |
| | 7716-301 | 2 flacons injectables 50 ml | 2 injectieflacons 50 ml | | 2535,16 | 1774,61 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| Fa-19 * | 7716-301 | <i>solution pour perfusion, 2,5 g</i> | <i>oplossing voor infusie, 2,5 g</i> | | 2694,3800 | 1888,2000 | | |
| Fa-19 ** | 7716-301 | 2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g | 2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g | | 2687,2700 | 1881,0900 | | |
| PRED FORTE ABBVIE ATC: S01BA04 | | | | | | | | |
| B-165 | 0664-219 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml | | 8,64 | 8,64 | 0,63 | 1,05 |
| | 0664-219 | | | | 2,37 | 2,37 | | |
| B-165 * | 0732-347 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL | | 3,0600 | 3,0600 | | |
| B-165 ** | 0732-347 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL | | 2,5100 | 2,5100 | | |
| PREGABALIN AB 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 4570-198 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | G | 18,73 | 18,73 | 2,67 | 4,45 |
| | 4570-198 | | | | 10,07 | 10,07 | | |
| B-262 | 4570-180 | 200 gélules, 150 mg | 200 capsules, hard, 150 mg | G | 62,38 | 62,38 | 9,12 | 15,35 |
| | 4570-180 | | | | 47,60 | 47,60 | | |
| B-262 * | 7719-313 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2879 | 0,2879 | | |
| B-262 ** | 7719-313 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2523 | 0,2523 | | |
| B-262 *** | 7719-313 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2842 | 0,2842 | 0,0456 | 0,0767 |
| PREGABALIN AB 25 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 4609-384 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | G | 13,55 | 13,55 | 1,62 | 2,70 |
| | 4609-384 | | | | 6,12 | 6,12 | | |
| B-262 * | 7736-168 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0790 | 0,0790 | | |
| B-262 ** | 7736-168 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0649 | 0,0649 | | |
| B-262 *** | 7736-168 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0801 | 0,0801 | 0,0162 | 0,0270 |
| PREGABALIN AB 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 4570-206 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G | 33,76 | 33,76 | 5,13 | 8,63 |
| | 4570-206 | | | | 22,70 | 22,70 | | |
| B-262 | 4570-214 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 89,19 | 89,19 | 10,20 | 15,50 |
| | 4570-214 | | | | 71,46 | 71,46 | | |
| B-262 * | 7719-321 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4143 | 0,4143 | | |
| B-262 ** | 7719-321 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3788 | 0,3788 | | |
| B-262 *** | 7719-321 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4183 | 0,4183 | 0,0510 | 0,0775 |
| PREGABALIN AB 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 4570-156 | 14 gélules, 75 mg | 14 capsules, hard, 75 mg | G | 8,38 | 8,38 | 0,57 | 0,95 |
| | 4570-156 | | | | 2,15 | 2,15 | | |
| B-262 | 4570-164 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | G | 14,30 | 14,30 | 1,77 | 2,96 |
| | 4570-164 | | | | 6,69 | 6,69 | | |
| B-262 | 4570-172 | 200 gélules, 75 mg | 200 capsules, hard, 75 mg | G | 37,32 | 37,32 | 5,63 | 9,47 |
| | 4570-172 | | | | 25,80 | 25,80 | | |
| B-262 * | 7719-305 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1665 | 0,1665 | | |
| B-262 ** | 7719-305 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1368 | 0,1368 | | |
| B-262 *** | 7719-305 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1589 | 0,1589 | 0,0281 | 0,0473 |

| PREGABALIN SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: N02BF02 | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-262 | 3542-081 3542-081 | 14 gélules, 150 mg | 14 capsules, hard, 150 mg | G | 12,27 5,15 | 12,27 5,15 | 1,37 | 2,28 |
| B-262 | 3542-099 3542-099 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | G | 19,55 10,70 | 19,55 10,70 | 2,84 | 4,73 |
| B-262 | 3542-107 3542-107 | 210 gélules, 150 mg | 210 capsules, hard, 150 mg | G | 76,67 60,04 | 76,67 60,04 | 10,20 | 15,50 |
| B-262 * | 7719-057 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3369 | 0,3369 | | |
| B-262 ** | 7719-057 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3030 | 0,3030 | | |
| B-262 *** | 7719-057 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2502 | 0,2502 | 0,0507 | 0,0845 |
| PREGABALIN SANDOZ 25 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: N02BF02 | | |
| B-262 | 3542-040 3542-040 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | G | 13,86 6,36 | 13,86 6,36 | 1,69 | 2,81 |
| B-262 * | 7718-380 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0821 | 0,0821 | | |
| B-262 ** | 7718-380 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0674 | 0,0674 | | |
| B-262 *** | 7718-380 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0833 | 0,0833 | 0,0169 | 0,0281 |
| PREGABALIN SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: N02BF02 | | |
| B-262 | 3542-115 3542-115 | 14 gélules, 300 mg | 14 capsules, hard, 300 mg | G | 15,92 7,93 | 15,92 7,93 | 2,10 | 3,50 |
| B-262 | 3542-123 3542-123 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G | 35,11 23,87 | 35,11 23,87 | 5,32 | 8,94 |
| B-262 | 3542-131 3542-131 | 210 gélules, 300 mg | 210 capsules, hard, 300 mg | G | 110,63 91,02 | 110,63 91,02 | 10,20 | 15,50 |
| B-262 * | 7719-065 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4933 | 0,4933 | | |
| B-262 ** | 7719-065 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4594 | 0,4594 | | |
| B-262 *** | 7719-065 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,5005 | 0,5005 | 0,0486 | 0,0738 |
| PREGABALIN SANDOZ 75 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: N02BF02 | | |
| B-262 | 3542-057 3542-057 | 14 gélules, 75 mg | 14 capsules, hard, 75 mg | G | 8,55 2,30 | 8,55 2,30 | 0,61 | 1,02 |
| B-262 | 3542-065 3542-065 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | G | 15,23 7,40 | 15,23 7,40 | 1,96 | 3,27 |
| B-262 | 3542-073 3542-073 | 210 gélules, 75 mg | 210 capsules, hard, 75 mg | G | 45,52 32,93 | 45,52 32,93 | 6,77 | 11,39 |
| B-262 * | 7719-040 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,2001 | 0,2001 | | |
| B-262 ** | 7719-040 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1662 | 0,1662 | | |
| B-262 *** | 7719-040 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1904 | 0,1904 | 0,0322 | 0,0542 |
| PREGABALINE EG 150 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: N02BF02 | | |
| B-262 | 3978-301 3978-301 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | G | 19,55 10,70 | 19,55 10,70 | 2,84 | 4,73 |
| B-262 | 3977-030 3977-030 | 200 gélules, 150 mg | 200 capsules, hard, 150 mg | G | 66,26 50,98 | 66,26 50,98 | 9,66 | 15,50 |
| B-262 * | 7725-674 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3058 | 0,3058 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-262 ** | 7725-674 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2702 | 0,2702 | | |
| B-262 *** | 7725-674 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3036 | 0,3036 | 0,0483 | 0,0775 |
| PREGABALINE EG 25 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 4354-965 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | G | 13,95 | 13,95 | 1,70 | 2,84 |
| | 4354-965 | | | | 6,42 | 6,42 | | |
| B-262 * | 7730-591 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0829 | 0,0829 | | |
| B-262 ** | 7730-591 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0681 | 0,0681 | | |
| B-262 *** | 7730-591 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0842 | 0,0842 | 0,0170 | 0,0284 |
| PREGABALINE EG 300 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3977-048 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G | 35,27 | 35,27 | 5,34 | 8,98 |
| | 3977-048 | | | | 24,01 | 24,01 | | |
| B-262 | 3978-319 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 95,24 | 95,24 | 10,20 | 15,50 |
| | 3978-319 | | | | 76,98 | 76,98 | | |
| B-262 * | 7725-682 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4436 | 0,4436 | | |
| B-262 ** | 7725-682 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4080 | 0,4080 | | |
| B-262 *** | 7725-682 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4485 | 0,4485 | 0,0510 | 0,0775 |
| PREGABALINE EG 75 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3978-285 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | G | 15,23 | 15,23 | 1,96 | 3,27 |
| | 3978-285 | | | | 7,40 | 7,40 | | |
| B-262 | 3978-293 | 200 gélules, 75 mg | 200 capsules, hard, 75 mg | G | 40,49 | 40,49 | 6,07 | 10,21 |
| | 3978-293 | | | | 28,55 | 28,55 | | |
| B-262 * | 7725-922 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1842 | 0,1842 | | |
| B-262 ** | 7725-922 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1513 | 0,1513 | | |
| B-262 *** | 7725-922 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1748 | 0,1748 | 0,0303 | 0,0510 |
| PREGABALINE KRKA 150 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-332 | 3315-447 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | G | 18,73 | 18,73 | 2,67 | 4,45 |
| | 3315-447 | | | | 10,07 | 10,07 | | |
| B-332 | 3460-961 | 100 gélules, 150 mg | 100 capsules, hard, 150 mg | G | 44,27 | 44,27 | 6,59 | 11,10 |
| | 3460-961 | | | | 31,84 | 31,84 | | |
| B-332 * | 7713-548 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,4086 | 0,4086 | | |
| B-332 ** | 7713-548 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3375 | 0,3375 | | |
| B-332 *** | 7713-548 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3873 | 0,3873 | 0,0659 | 0,1110 |
| PREGABALINE KRKA 300 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-332 | 3315-454 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G | 34,99 | 34,99 | 5,30 | 8,92 |
| | 3315-454 | | | | 23,77 | 23,77 | | |
| B-332 | 3460-979 | 100 gélules, 300 mg | 100 capsules, hard, 300 mg | G | 62,39 | 62,39 | 9,12 | 15,35 |
| | 3460-979 | | | | 47,61 | 47,61 | | |
| B-332 * | 7713-555 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,5758 | 0,5758 | | |
| B-332 ** | 7713-555 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,5047 | 0,5047 | | |
| B-332 *** | 7713-555 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,5686 | 0,5686 | 0,0912 | 0,1535 |
| PREGABALINE KRKA 75 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-332 | 3315-439 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | G | 14,30 | 14,30 | 1,77 | 2,96 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| B-332 | 3315-439 3460-953 | 100 gélules, 75 mg | 100 capsules, hard, 75 mg | G | 6,69 31,11 | 6,69 31,11 | 4,76 | 8,01 |
| | 3460-953 | | | | 20,39 | 20,39 | | |
| B-332 * | 7713-530 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,2631 | 0,2631 | | |
| B-332 ** | 7713-530 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,2161 | 0,2161 | | |
| B-332 *** | 7713-530 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,2558 | 0,2558 | 0,0476 | 0,0801 |
| PREGABALINE MYLAN 150 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3296-738 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | G | 19,55 | 19,55 | 2,84 | 4,73 |
| | 3296-738 | | | | 10,70 | 10,70 | | |
| B-262 | 3296-746 | 200 gélules, 150 mg | 200 capsules, hard, 150 mg | G | 62,61 | 62,61 | 9,15 | 15,41 |
| | 3296-746 | | | | 47,80 | 47,80 | | |
| B-262 * | 7720-386 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2889 | 0,2889 | | |
| B-262 ** | 7720-386 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2534 | 0,2534 | | |
| B-262 *** | 7720-386 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2502 | 0,2502 | 0,0507 | 0,0845 |
| PREGABALINE MYLAN 25 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3631-272 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | G | 13,55 | 13,55 | 1,62 | 2,70 |
| | 3631-272 | | | | 6,12 | 6,12 | | |
| B-262 * | 7720-642 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0790 | 0,0790 | | |
| B-262 ** | 7720-642 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0649 | 0,0649 | | |
| B-262 *** | 7720-642 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0801 | 0,0801 | 0,0162 | 0,0270 |
| PREGABALINE MYLAN 300 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3296-753 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G | 33,78 | 33,78 | 5,13 | 8,63 |
| | 3296-753 | | | | 22,71 | 22,71 | | |
| B-262 | 3296-761 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 89,26 | 89,26 | 10,20 | 15,50 |
| | 3296-761 | | | | 71,53 | 71,53 | | |
| B-262 * | 7720-394 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4147 | 0,4147 | | |
| B-262 ** | 7720-394 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,3791 | 0,3791 | | |
| B-262 *** | 7720-394 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4186 | 0,4186 | 0,0510 | 0,0775 |
| PREGABALINE MYLAN 75 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3296-712 | 14 gélules, 75 mg | 14 capsules, hard, 75 mg | G | 8,38 | 8,38 | 0,57 | 0,95 |
| | 3296-712 | | | | 2,15 | 2,15 | | |
| B-262 | 3296-720 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | G | 14,33 | 14,33 | 1,78 | 2,97 |
| | 3296-720 | | | | 6,71 | 6,71 | | |
| B-262 | 3631-280 | 200 gélules, 75 mg | 200 capsules, hard, 75 mg | G | 37,37 | 37,37 | 5,63 | 9,47 |
| | 3631-280 | | | | 25,83 | 25,83 | | |
| B-262 * | 7720-378 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1667 | 0,1667 | | |
| B-262 ** | 7720-378 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1369 | 0,1369 | | |
| B-262 *** | 7720-378 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,2037 | 0,2037 | 0,0407 | 0,0679 |
| PREGABALINE TEVA 150 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: N02BF02 | |
| B-262 | 3360-393 | 56 gélules, 150 mg | 56 capsules, hard, 150 mg | G | 18,77 | 18,77 | 2,68 | 4,46 |
| | 3360-393 | | | | 10,10 | 10,10 | | |
| B-262 | 3360-401 | 200 gélules, 150 mg | 200 capsules, hard, 150 mg | G | 65,12 | 65,12 | 9,50 | 15,50 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 3360-401 | | | | 49,98 | 49,98 | | |
| B-262 * | 7714-686 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,3005 | 0,3005 | | |
| B-262 ** | 7714-686 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2649 | 0,2649 | | |
| B-262 *** | 7714-686 | 1 gélule, 150 mg | 1 capsule, hard, 150 mg | G | 0,2979 | 0,2979 | 0,0475 | 0,0775 |
| PREGABALINE TEVA 25 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 4843-991 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | G | 13,96 | 13,96 | 1,71 | 2,84 |
| | 4843-991 | | | | 6,43 | 6,43 | | |
| B-262 * | 7741-895 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | |
| B-262 ** | 7741-895 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0682 | 0,0682 | | |
| B-262 *** | 7741-895 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | G | 0,0843 | 0,0843 | 0,0171 | 0,0284 |
| PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 3360-419 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G | 35,11 | 35,11 | 5,32 | 8,94 |
| | 3360-419 | | | | 23,87 | 23,87 | | |
| B-262 | 3360-443 | 200 gélules, 300 mg | 200 capsules, hard, 300 mg | G | 93,58 | 93,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 3360-443 | | | | 75,46 | 75,46 | | |
| B-262 * | 7714-694 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4355 | 0,4355 | | |
| B-262 ** | 7714-694 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4000 | 0,4000 | | |
| B-262 *** | 7714-694 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | G | 0,4402 | 0,4402 | 0,0510 | 0,0775 |
| PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02 | | | | | | | | |
| B-262 | 3360-385 | 56 gélules, 75 mg | 56 capsules, hard, 75 mg | G | 15,23 | 15,23 | 1,96 | 3,27 |
| | 3360-385 | | | | 7,40 | 7,40 | | |
| B-262 | 3457-744 | 200 gélules, 75 mg | 200 capsules, hard, 75 mg | G | 40,33 | 40,33 | 6,05 | 10,17 |
| | 3457-744 | | | | 28,41 | 28,41 | | |
| B-262 * | 7714-678 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1833 | 0,1833 | | |
| B-262 ** | 7714-678 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1506 | 0,1506 | | |
| B-262 *** | 7714-678 | 1 gélule, 75 mg | 1 capsule, hard, 75 mg | G | 0,1740 | 0,1740 | 0,0302 | 0,0508 |
| PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 2877-314 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg | R | 19,45 | 19,45 | 2,82 | 4,69 |
| | 2877-314 | | | | 10,62 | 10,62 | | |
| B-21 | 2747-681 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg | R | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 |
| | 2747-681 | | | | 25,48 | 25,48 | | |
| B-21 * | 0754-937 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3653 | 0,3653 | | |
| B-21 ** | 0754-937 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3001 | 0,3001 | | |
| B-21 *** | 0754-937 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 |
| PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09BA04 | | | | | | | | |
| B-21 | 4636-221 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | R | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 |
| | 4636-221 | | | | 25,48 | 25,48 | | |
| B-21 * | 7738-610 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3653 | 0,3653 | | |
| B-21 ** | 7738-610 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3001 | 0,3001 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-21 *** | 7738-610 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 | |
| PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BA04 | | | | | |
| B-21 | 4644-431 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg | R | 36,96 | 36,96 | 5,58 | 9,38 | |
| | 4644-431 | | | | 25,48 | 25,48 | | | |
| B-21 * | 7722-861 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3653 | 0,3653 | | | |
| B-21 ** | 7722-861 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3001 | 0,3001 | | | |
| B-21 *** | 7722-861 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg | R | 0,3492 | 0,3492 | 0,0620 | 0,1042 | |
| PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BA04 | | | | | |
| B-21 | 2595-510 | 30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg | 30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg | R | 14,02 | 14,02 | 1,72 | 2,86 | |
| | 2595-510 | | | | 6,48 | 6,48 | | | |
| B-21 | 2595-528 | 90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg | 90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg | R | 25,78 | 25,78 | 4,02 | 6,75 | |
| | 2595-528 | | | | 15,75 | 15,75 | | | |
| B-21 * | 0758-789 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 0,2259 | 0,2259 | | | |
| B-21 ** | 0758-789 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 0,1856 | 0,1856 | | | |
| B-21 *** | 0758-789 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 0,2250 | 0,2250 | 0,0447 | 0,0750 | |
| PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BA04 | | | | | |
| B-21 | 3641-792 | 90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg | 90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 25,78 | 25,78 | 4,02 | 6,75 | |
| | 3641-792 | | | | 15,75 | 15,75 | | | |
| B-21 * | 7722-887 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 0,2259 | 0,2259 | | | |
| B-21 ** | 7722-887 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 0,1856 | 0,1856 | | | |
| B-21 *** | 7722-887 | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg | R | 0,2250 | 0,2250 | 0,0447 | 0,0750 | |
| PRETERAX 5 mg/1,25 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BA04 | | | | | |
| B-21 | 2595-536 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | R | 14,62 | 14,62 | 1,84 | 3,07 | |
| | 2595-536 | | | | 6,94 | 6,94 | | | |
| B-21 | 2595-544 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg | R | 27,23 | 27,23 | 4,22 | 7,09 | |
| | 2595-544 | | | | 17,01 | 17,01 | | | |
| B-21 * | 0758-771 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | R | 0,2439 | 0,2439 | | | |
| B-21 ** | 0758-771 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | R | 0,2003 | 0,2003 | | | |
| B-21 *** | 0758-771 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | R | 0,2411 | 0,2411 | 0,0469 | 0,0788 | |
| PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BA04 | | | | | |
| B-21 | 3641-818 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg | R | 27,23 | 27,23 | 4,22 | 7,09 | |
| | 3641-818 | | | | 17,01 | 17,01 | | | |
| B-21 * | 7722-879 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | R | 0,2439 | 0,2439 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 ** | 7722-879 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | R | 0,2003 | 0,2003 | | |
| B-21 *** | 7722-879 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg | R | 0,2411 | 0,2411 | 0,0469 | 0,0788 |
| PRIMPERAN | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: A03FA01 | | | |
| B-54 | 0126-342 | 6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml | 6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | r | 6,92 | 6,92 | 0,23 | 0,38 |
| | 0126-342 | | | | 0,87 | 0,87 | | |
| B-54 * | 0715-656 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | r | 0,1867 | 0,1867 | | |
| B-54 ** | 0715-656 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL | r | 0,1533 | 0,1533 | | |
| PRIORIX | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | ATC: J07BD52 | | | |
| B-201 | 1358-167 | 1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable | 1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie | | 23,47 | 23,47 | 3,64 | 6,07 |
| | 1358-167 | | | | 13,74 | 13,74 | | |
| B-201 * | 0749-465 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose | 1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis | | 17,7300 | 17,7300 | | |
| B-201 ** | 0749-465 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose | 1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis | | 14,5600 | 14,5600 | | |
| PROGEBEL 100 mg | | EFFIK BENELUX | | | ATC: G03DA04 | | | |
| B-90 | 3203-239 | 90 capsules molles, 100 mg | 90 capsules, zacht, 100 mg | G | 16,95 | 16,95 | 2,31 | 3,85 |
| | 3203-239 | | | | 8,71 | 8,71 | | |
| B-90 * | 7709-363 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | G | 0,1249 | 0,1249 | | |
| B-90 ** | 7709-363 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | | |
| B-90 *** | 7709-363 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | G | 0,1268 | 0,1268 | 0,0257 | 0,0428 |
| PROGEBEL 200 mg | | EFFIK BENELUX | | | ATC: G03DA04 | | | |
| B-90 | 3203-254 | 45 capsules molles, 200 mg | 45 capsules, zacht, 200 mg | G | 16,95 | 16,95 | 2,31 | 3,85 |
| | 3203-254 | | | | 8,71 | 8,71 | | |
| B-90 | 3774-700 | 90 capsules molles, 200 mg | 90 capsules, zacht, 200 mg | G | 25,68 | 25,68 | 4,01 | 6,73 |
| | 3774-700 | | | | 15,67 | 15,67 | | |
| B-90 * | 7709-371 | 1 capsule molle, 200 mg | 1 capsule, zacht, 200 mg | G | 0,2247 | 0,2247 | | |
| B-90 ** | 7709-371 | 1 capsule molle, 200 mg | 1 capsule, zacht, 200 mg | G | 0,1846 | 0,1846 | | |
| B-90 *** | 7709-371 | 1 capsule molle, 200 mg | 1 capsule, zacht, 200 mg | G | 0,2239 | 0,2239 | 0,0446 | 0,0748 |
| PROGOR 120 mg | | LABORATOIRES SMB | | | ATC: C08DB01 | | | |
| B-20 | 1390-335 | 28 gélules à libération prolongée, 120 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg | R | 9,32 | 9,32 | 0,77 | 1,28 |
| | 1390-335 | | | | 2,89 | 2,89 | | |
| B-20 * | 0761-403 | 1 gélule à libération prolongée, 120 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg | R | 0,1332 | 0,1332 | | |
| B-20 ** | 0761-403 | 1 gélule à libération prolongée, 120 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg | R | 0,1093 | 0,1093 | | |
| B-20 *** | 0761-403 | 1 gélule à libération prolongée, 120 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg | R | 0,1352 | 0,1352 | 0,0275 | 0,0457 |
| PROGOR 180 mg | | LABORATOIRES SMB | | | ATC: C08DB01 | | | |
| B-20 | 1390-301 | 28 gélules à libération prolongée, 180 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg | R | 10,87 | 10,87 | 1,08 | 1,80 |
| | 1390-301 | | | | 4,07 | 4,07 | | |
| B-20 | 2159-291 | 56 gélules à libération prolongée, | 56 capsules met verlengde afgifte, | R | 12,54 | 12,54 | 1,42 | 2,36 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|-------------|--------|--|
| | | 180 mg | hard, 180 mg | | | 5,34 | 5,34 | | |
| B-20 * | 0761-411 | 1 gélule à libération prolongée, 180 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg | R | 0,1230 | 0,1230 | | | |
| B-20 ** | 0761-411 | 1 gélule à libération prolongée, 180 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg | R | 0,1011 | 0,1011 | | | |
| B-20 *** | 0761-411 | 1 gélule à libération prolongée, 180 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg | R | 0,1251 | 0,1251 | 0,0254 | 0,0421 | |
| PROGOR 240 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01 | | | | | | | | | |
| B-20 | 1390-319 | 28 gélules à libération prolongée, 240 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg | R | 12,00 | 12,00 | 1,31 | 2,18 | |
| | 1390-319 | | | | 4,93 | 4,93 | | | |
| B-20 | 2553-030 | 56 gélules à libération prolongée, 240 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg | R | 15,84 | 15,84 | 2,09 | 3,48 | |
| | 2553-030 | | | | 7,87 | 7,87 | | | |
| B-20 * | 0761-429 | 1 gélule à libération prolongée, 240 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg | R | 0,1814 | 0,1814 | | | |
| B-20 ** | 0761-429 | 1 gélule à libération prolongée, 240 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg | R | 0,1489 | 0,1489 | | | |
| B-20 *** | 0761-429 | 1 gélule à libération prolongée, 240 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg | R | 0,1840 | 0,1840 | 0,0373 | 0,0621 | |
| PROGOR 300 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01 | | | | | | | | | |
| B-20 | 1350-222 | 28 gélules à libération prolongée, 300 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 12,59 | 12,59 | 1,43 | 2,38 | |
| | 1350-222 | | | | 5,39 | 5,39 | | | |
| B-20 | 2159-309 | 56 gélules à libération prolongée, 300 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 17,09 | 17,09 | 2,34 | 3,90 | |
| | 2159-309 | | | | 8,82 | 8,82 | | | |
| B-20 * | 0746-719 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 0,2032 | 0,2032 | | | |
| B-20 ** | 0746-719 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 0,1670 | 0,1670 | | | |
| B-20 *** | 0746-719 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 0,2063 | 0,2063 | 0,0418 | 0,0696 | |
| PROGOR 360 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01 | | | | | | | | | |
| B-20 | 1390-327 | 28 gélules à libération prolongée, 360 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg | R | 13,46 | 13,46 | 1,60 | 2,67 | |
| | 1390-327 | | | | 6,05 | 6,05 | | | |
| B-20 * | 0761-437 | 1 gélule à libération prolongée, 360 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg | R | 0,2789 | 0,2789 | | | |
| B-20 ** | 0761-437 | 1 gélule à libération prolongée, 360 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg | R | 0,2289 | 0,2289 | | | |
| B-20 *** | 0761-437 | 1 gélule à libération prolongée, 360 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg | R | 0,2832 | 0,2832 | 0,0571 | 0,0954 | |
| PROGRAFT ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02 | | | | | | | | | |
| | 0760-975 | 10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | | 399,68 | 399,68 | | | |
| A-29 * | 0760-975 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | r | 43,0770 | 43,0770 | | | |
| A-29 ** | 0760-975 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | r | 42,3660 | 42,3660 | | | |
| PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02 | | | | | | | | | |
| A-29 | 2657-633 | 100 gélules, 0,5 mg | 100 capsules, hard, 0,5 mg | R | 63,76 | 63,76 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--|---------------|---------------|--------|--------|
| | 2657-633 | | | | | 48,80 | 48,80 | | |
| A-29 * | 0774-489 | 1 gélule, 0,5 mg | 1 capsule, hard, 0,5 mg | R | | 0,5884 | 0,5884 | | |
| A-29 ** | 0774-489 | 1 gélule, 0,5 mg | 1 capsule, hard, 0,5 mg | R | | 0,5173 | 0,5173 | | |
| A-29 *** | 0774-489 | 1 gélule, 0,5 mg | 1 capsule, hard, 0,5 mg | R | | 0,5823 | 0,5823 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02 | | | | | | | | | |
| A-29 | 2657-641 | 100 gélules, 1 mg | 100 capsules, hard, 1 mg | R | | 100,95 | 100,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 2657-641 | | | | | 82,19 | 82,19 | | |
| A-29 * | 0748-913 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | R | | 0,9423 | 0,9423 | | |
| A-29 ** | 0748-913 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | R | | 0,8712 | 0,8712 | | |
| A-29 *** | 0748-913 | 1 gélule, 1 mg | 1 capsule, hard, 1 mg | R | | 0,9542 | 0,9542 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROGRAFT 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02 | | | | | | | | | |
| A-29 | 2657-658 | 100 gélules, 5 mg | 100 capsules, hard, 5 mg | R | | 437,77 | 437,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2657-658 | | | | | 389,40 | 389,40 | | |
| A-29 * | 0748-921 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | R | | 4,1987 | 4,1987 | | |
| A-29 ** | 0748-921 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | R | | 4,1276 | 4,1276 | | |
| A-29 *** | 0748-921 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | R | | 4,3224 | 4,3224 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROGYNOVA 1 mg AMDIPHARM ATC: G03CA03 | | | | | | | | | |
| B-89 | 1745-496 | 84 comprimés, 1 mg | 84 tabletten, 1 mg | | | 9,40 | 9,40 | 0,78 | 1,30 |
| | 1745-496 | | | | | 2,95 | 2,95 | | |
| B-89 * | 0715-797 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | | 0,0454 | 0,0454 | | |
| B-89 ** | 0715-797 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | | 0,0373 | 0,0373 | | |
| B-89 *** | 0715-797 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | | 0,0461 | 0,0461 | 0,0093 | 0,0155 |
| PROGYNOVA 2 mg AMDIPHARM ATC: G03CA03 | | | | | | | | | |
| B-89 | 1745-470 | 84 comprimés, 2 mg | 84 tabletten, 2 mg | | | 10,36 | 10,36 | 0,98 | 1,63 |
| | 1745-470 | | | | | 3,68 | 3,68 | | |
| B-89 * | 0715-789 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | | 0,0565 | 0,0565 | | |
| B-89 ** | 0715-789 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | | 0,0464 | 0,0464 | | |
| B-89 *** | 0715-789 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | | | 0,0574 | 0,0574 | 0,0117 | 0,0194 |
| PROLOPA 125 ROCHE ATC: N04BA02 | | | | | | | | | |
| B-76 | 1324-722 | 100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg | 100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg | R | | 20,66 | 20,66 | 3,06 | 5,10 |
| | 1324-722 | | | | | 11,54 | 11,54 | | |
| B-76 * | 0747-568 | 1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg | 1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg | R | | 0,1489 | 0,1489 | | |
| B-76 ** | 0747-568 | 1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg | 1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg | R | | 0,1223 | 0,1223 | | |
| B-76 *** | 0747-568 | 1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg | 1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg | R | | 0,1513 | 0,1513 | 0,0306 | 0,0510 |
| PROLOPA 250 ROCHE ATC: N04BA02 | | | | | | | | | |
| B-76 | 0072-678 | 100 comprimés, 200 mg / 50 mg | 100 tabletten, 200 mg / 50 mg | R | | 29,16 | 29,16 | 4,49 | 7,55 |
| | 0072-678 | | | | | 18,69 | 18,69 | | |
| B-76 * | 0728-121 | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg | 1 tablet, 200 mg / 50 mg | R | | 0,2412 | 0,2412 | | |
| B-76 ** | 0728-121 | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg | 1 tablet, 200 mg / 50 mg | R | | 0,1981 | 0,1981 | | |
| B-76 *** | 0728-121 | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg | 1 tablet, 200 mg / 50 mg | R | | 0,2363 | 0,2363 | 0,0449 | 0,0755 |
| PROLOPA 250 (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BA02 | | | | | | | | | |
| B-76 | 4793-949 | 100 comprimés, 200 mg / 50 mg | 100 tabletten, 200 mg / 50 mg | R | | 29,16 | 29,16 | 4,49 | 7,55 |
| | 4793-949 | | | | | 18,69 | 18,69 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-76 * | 7741-853 | 1 comprimé, 200 mg/ 50 mg | 1 tablet, 200 mg/ 50 mg | R | 0,2412 | 0,2412 | | |
| B-76 ** | 7741-853 | 1 comprimé, 200 mg/ 50 mg | 1 tablet, 200 mg/ 50 mg | R | 0,1981 | 0,1981 | | |
| B-76 *** | 7741-853 | 1 comprimé, 200 mg/ 50 mg | 1 tablet, 200 mg/ 50 mg | R | 0,2363 | 0,2363 | 0,0449 | 0,0755 |
| PROLOPA 250 (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N04BA02 | | | | |
| B-76 | 2724-771 2724-771 | 100 comprimés, 200 mg/ 50 mg | 100 tabletten, 200 mg/ 50 mg | R | 29,16 18,69 | 29,16 18,69 | 4,49 | 7,55 |
| B-76 * | 0797-910 | 1 comprimé, 200 mg/ 50 mg | 1 tablet, 200 mg/ 50 mg | R | 0,2412 | 0,2412 | | |
| B-76 ** | 0797-910 | 1 comprimé, 200 mg/ 50 mg | 1 tablet, 200 mg/ 50 mg | R | 0,1981 | 0,1981 | | |
| B-76 *** | 0797-910 | 1 comprimé, 200 mg/ 50 mg | 1 tablet, 200 mg/ 50 mg | R | 0,2363 | 0,2363 | 0,0449 | 0,0755 |
| PROLOPA HBS '125' | | ROCHE | | ATC: N04BA02 | | | | |
| B-76 | 0257-741 0257-741 | 100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg | R | 20,66 11,54 | 20,66 11,54 | 3,06 | 5,10 |
| B-76 * | 0737-411 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1489 | 0,1489 | | |
| B-76 ** | 0737-411 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1223 | 0,1223 | | |
| B-76 *** | 0737-411 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1513 | 0,1513 | 0,0306 | 0,0510 |
| PROPOFOL 2 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0772-673 | 1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l | 1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l | | 10,34 | 10,34 | | |
| A-30 * | 0772-673 | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | G | 13,3400 | 13,3400 | | |
| A-30 ** | 0772-673 | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | G | 10,9600 | 10,9600 | | |
| PROPOFOL 2 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0772-665 | 1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l | 1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l | | 5,17 | 5,17 | | |
| A-30 * | 0772-665 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | G | 6,6700 | 6,6700 | | |
| A-30 ** | 0772-665 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | G | 5,4800 | 5,4800 | | |
| PROPOFOL B. BRAUN 1 % | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0799-411 | 10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 38,82 | 38,82 | | |
| A-30 * | 0799-411 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 4,8260 | 4,8260 | | |
| A-30 ** | 0799-411 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 4,1150 | 4,1150 | | |
| PROPOFOL B. BRAUN 1 % | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0799-403 | 5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 7,18 | 7,18 | | |
| A-30 * | 0799-403 | 1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 1,8540 | 1,8540 | | |
| A-30 ** | 0799-403 | 1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 1,5220 | 1,5220 | | |
| PROPOFOL B. BRAUN 2 % | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: N01AX10 | | | | |
| | 0799-312 | 10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml | 10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml | | 57,46 | 57,46 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|-------------|-------------|--|--|
| A-30 * | 0799-312 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL | G | 6,8020 | 6,8020 | | |
| A-30 ** | 0799-312 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL | G | 6,0910 | 6,0910 | | |
| PROPOLIPID 1 % FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |
| | 7705-775 | 1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 % | 1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 % | | 8,11 | 8,11 | | |
| A-30 * | 7705-775 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL | G | 10,4700 | 10,4700 | | |
| A-30 ** | 7705-775 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL | G | 8,6000 | 8,6000 | | |
| PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |
| | 0787-846 | 1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 3,85 | 3,85 | | |
| A-30 * | 0787-846 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 4,9700 | 4,9700 | | |
| A-30 ** | 0787-846 | 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 4,0800 | 4,0800 | | |
| PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |
| | 0787-838 | 1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 1,43 | 1,43 | | |
| A-30 * | 0787-838 | 1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 1,8500 | 1,8500 | | |
| A-30 ** | 0787-838 | 1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 1,5200 | 1,5200 | | |
| PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |
| | 0787-820 | 5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 7,11 | 7,11 | | |
| A-30 * | 0787-820 | 1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 1,8360 | 1,8360 | | |
| A-30 ** | 0787-820 | 1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 1,5080 | 1,5080 | | |
| PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |
| | 0787-853 | 1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 7,70 | 7,70 | | |
| A-30 * | 0787-853 | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 9,9400 | 9,9400 | | |
| A-30 ** | 0787-853 | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL | R | 8,1600 | 8,1600 | | |
| PROPOLIPID 2 % FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |
| | 7705-783 | 1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 % | 1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 % | | 9,31 | 9,31 | | |
| A-30 * | 7705-783 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | G | 12,0100 | 12,0100 | | |
| A-30 ** | 7705-783 | 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL | G | 9,8700 | 9,8700 | | |
| PROPOLIPID 2% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 0787-861 | 1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml | | 5,71 | 5,71 | | |
| A-30 * | 0787-861 | 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL | 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL | R | 7,3700 | 7,3700 | | |
| A-30 ** | 0787-861 | 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL | 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL | R | 6,0500 | 6,0500 | | |
| PROPRANOLOL EG EG | | | | ATC: C07AA05 | | | | |
| B-9 | 0468-801 | 100 comprimés, 40 mg | 100 tabletten, 40 mg | G | 8,82 | 8,82 | 0,66 | 1,10 |
| | 0468-801 | | | | 2,50 | 2,50 | | |
| B-9 * | 0735-282 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,0323 | 0,0323 | | |
| B-9 ** | 0735-282 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,0265 | 0,0265 | | |
| B-9 *** | 0735-282 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,0329 | 0,0329 | 0,0066 | 0,0110 |
| PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg EG | | | | ATC: C07AA05 | | | | |
| B-14 | 3142-320 | 60 gélules à libération prolongée, 160 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg | G | 13,32 | 13,32 | 1,58 | 2,63 |
| | 3142-320 | | | | 5,95 | 5,95 | | |
| B-14 * | 0735-290 | 1 gélule à libération prolongée, 160 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg | G | 0,1280 | 0,1280 | | |
| B-14 ** | 0735-290 | 1 gélule à libération prolongée, 160 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg | G | 0,1052 | 0,1052 | | |
| B-14 *** | 0735-290 | 1 gélule à libération prolongée, 160 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg | G | 0,1299 | 0,1299 | 0,0263 | 0,0438 |
| PROSTIN E2 0,5 mg Pfizer | | | | ATC: G02AD02 | | | | |
| B-93 * | 0715-953 | 10 comprimés, 0,5 mg | 10 tabletten, 0,5 mg | | 21,80 | 21,80 | | |
| | 0715-953 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | | 2,8130 | 2,8130 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | | | | | |
| B-93 ** | 0715-953 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | | 2,3110 | 2,3110 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | | | | | |
| PROSTIN E2 1 mg/ml Pfizer | | | | ATC: G02AD02 | | | | |
| B-93 * | 0727-073 | 1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 14,69 | 14,69 | | |
| | 0727-073 | 1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | | 18,9600 | 18,9600 | | |
| B-93 ** | 0727-073 | 1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | | 15,5700 | 15,5700 | | |
| PROSTIN E2 10 mg/ml Pfizer | | | | ATC: G02AD02 | | | | |
| B-93 * | 0727-081 | 1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml | 1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing pour infusie, 10 mg/ml | | 34,05 | 34,05 | | |
| | 0727-081 | 1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | | 43,2000 | 43,2000 | | |
| B-93 ** | 0727-081 | 1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | 1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | | 36,0900 | 36,0900 | | |
| PROSTIN E2 3 mg Pfizer | | | | ATC: G02AD02 | | | | |
| | 0730-259 | 4 comprimés vaginaux, 3 mg | 4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg | | 42,50 | 42,50 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-93 * | 0730-259 | 1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) | 1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) | | 13,0400 | 13,0400 | | |
| B-93 ** | 0730-259 | 1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) | 1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) | | 11,2625 | 11,2625 | | |
| PROSTIN VR 0,5 mg | | Pfizer | | ATC: C01EA01 | | | | |
| | 0715-961 | 1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml | 1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml | | 67,33 | 67,33 | | |
| B-42 ** | 0715-961 | 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL | | 71,3700 | 71,3700 | | |
| PROTHIADEN | | TEOFARMA | | ATC: N06AA16 | | | | |
| B-73 | 0072-702 | 100 gélules, 25 mg | 100 capsules, hard, 25 mg | | 10,88 | 10,88 | 1,08 | 1,80 |
| | 0072-702 | | | | 4,08 | 4,08 | | |
| B-73 * | 0715-987 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | | 0,0527 | 0,0527 | | |
| B-73 ** | 0715-987 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | | 0,0432 | 0,0432 | | |
| B-73 *** | 0715-987 | 1 gélule, 25 mg | 1 capsule, hard, 25 mg | | 0,0534 | 0,0534 | 0,0108 | 0,0180 |
| PROTHIADEN 75 MG | | TEOFARMA | | ATC: N06AA16 | | | | |
| B-73 | 0815-522 | 28 comprimés enrobés, 75 mg | 28 omhulde tabletten, 75 mg | | 10,08 | 10,08 | 0,92 | 1,53 |
| | 0815-522 | | | | 3,47 | 3,47 | | |
| B-73 * | 0715-995 | 1 comprimé, 75 mg | 1 tablet, 75 mg | | 0,1600 | 0,1600 | | |
| B-73 ** | 0715-995 | 1 comprimé, 75 mg | 1 tablet, 75 mg | | 0,1314 | 0,1314 | | |
| B-73 *** | 0715-995 | 1 comprimé, 75 mg | 1 tablet, 75 mg | | 0,1624 | 0,1624 | 0,0329 | 0,0546 |
| PROVERA 100 mg | | Pfizer | | ATC: L02AB02 | | | | |
| A-27 | 0069-732 | 50 comprimés, 100 mg | 50 tabletten, 100 mg | R | 29,68 | 29,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 0069-732 | | | | 19,14 | 19,14 | | |
| A-27 * | 0716-019 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,4940 | 0,4940 | | |
| A-27 ** | 0716-019 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,4058 | 0,4058 | | |
| A-27 *** | 0716-019 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,4829 | 0,4829 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROVERA 250 mg | | Pfizer | | ATC: L02AB02 | | | | |
| A-27 | 0839-100 | 40 comprimés, 250 mg | 40 tabletten, 250 mg | R | 49,57 | 49,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 0839-100 | | | | 36,45 | 36,45 | | |
| A-27 * | 0728-188 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 1,1438 | 1,1438 | | |
| A-27 ** | 0728-188 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,9660 | 0,9660 | | |
| A-27 *** | 0728-188 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 1,1008 | 1,1008 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROVERA 400 mg | | Pfizer | | ATC: L02AB02 | | | | |
| A-27 | 0604-066 | 25 comprimés, 400 mg | 25 tabletten, 400 mg | R | 46,41 | 46,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 0604-066 | | | | 33,70 | 33,70 | | |
| A-27 * | 0732-099 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,7132 | 1,7132 | | |
| A-27 ** | 0732-099 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,4288 | 1,4288 | | |
| A-27 *** | 0732-099 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,6349 | 1,6349 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROVERA 500 mg | | Pfizer | | ATC: L02AB02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-27 | 2407-682 2407-682 | 30 comprimés, 500 mg | 30 tabletten, 500 mg | R | 54,29 40,56 | 54,29 40,56 | 0,00 | 0,00 |
| A-27 * | 0788-463 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 1,6700 | 1,6700 | | |
| A-27 ** | 0788-463 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 1,4330 | 1,4330 | | |
| A-27 *** | 0788-463 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 1,6253 | 1,6253 | 0,0000 | 0,0000 |
| PULMICORT 0,25 mg/mL ASTRAZENECA ATC: R03BA02 | | | | | | | | |
| B-99 | 1204-692 1204-692 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | R | 21,56 12,23 | 21,56 12,23 | 3,24 | 5,41 |
| B-99 * | 0744-193 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 0,7890 | 0,7890 | | |
| B-99 ** | 0744-193 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 0,6480 | 0,6480 | | |
| PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03BA02 | | | | | | | | |
| B-99 | 4636-015 4636-015 | 20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 21,56 12,23 | 21,56 12,23 | 3,24 | 5,41 |
| B-99 * | 7742-240 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 0,7890 | 0,7890 | | |
| B-99 ** | 7742-240 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 0,6480 | 0,6480 | | |
| PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02 | | | | | | | | |
| B-99 | 1732-593 1732-593 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | R | 21,56 12,23 | 21,56 12,23 | 3,24 | 5,41 |
| B-99 * | 0773-135 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 0,7890 | 0,7890 | | |
| B-99 ** | 0773-135 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL | R | 0,6480 | 0,6480 | | |
| PULMICORT 0,5 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02 | | | | | | | | |
| B-99 | 0391-292 0391-292 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml | R | 31,90 21,07 | 31,90 21,07 | 4,87 | 8,19 |
| B-99 * | 0742-510 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | R | 1,3595 | 1,3595 | | |
| B-99 ** | 0742-510 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | R | 1,1165 | 1,1165 | | |
| PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02 | | | | | | | | |
| B-99 | 1739-093 1739-093 | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml | R | 31,90 21,07 | 31,90 21,07 | 4,87 | 8,19 |
| B-99 * | 0773-143 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | R | 1,3595 | 1,3595 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-99 ** | 0773-143 | 1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL | R | 1,1165 | 1,1165 | | |
| PURINETHOL 50 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: L01BB02 | | | | |
| A-24 | 0072-900 | 25 comprimés, 50 mg | 25 tabletten, 50 mg | | 22,10 | 22,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0072-900 | | | | 12,64 | 12,64 | | |
| A-24 * | 0716-043 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,6524 | 0,6524 | | |
| A-24 ** | 0716-043 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,5360 | 0,5360 | | |
| A-24 *** | 0716-043 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | | 0,6627 | 0,6627 | 0,0000 | 0,0000 |
| QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 4251-815 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 50,77 | 50,77 | 7,50 | 12,50 |
| | 4251-815 | | | | 37,50 | 37,50 | | |
| B-220 | 4251-823 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 71,48 | 71,48 | 10,20 | 15,50 |
| | 4251-823 | | | | 55,52 | 55,52 | | |
| B-220 * | 0750-638 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6596 | 0,6596 | | |
| B-220 ** | 0750-638 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,5885 | 0,5885 | | |
| B-220 *** | 0750-638 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,7540 | 0,7540 | 0,1250 | 0,2083 |
| QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 4251-773 | 60 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 72,32 | 72,32 | 8,30 | 12,50 |
| | 4251-773 | | | | 56,26 | 56,26 | | |
| B-220 | 4251-799 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 102,14 | 102,14 | 10,20 | 15,50 |
| | 4251-799 | | | | 83,27 | 83,27 | | |
| B-220 * | 0750-612 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9538 | 0,9538 | | |
| B-220 ** | 0750-612 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,8827 | 0,8827 | | |
| B-220 *** | 0750-612 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9661 | 0,9661 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 4251-831 | 60 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | G | 83,88 | 83,88 | 8,30 | 12,50 |
| | 4251-831 | | | | 66,62 | 66,62 | | |
| B-220 | 4251-849 | 100 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | G | 132,58 | 132,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 4251-849 | | | | 111,04 | 111,04 | | |
| B-220 * | 0750-596 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2481 | 1,2481 | | |
| B-220 ** | 0750-596 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,1770 | 1,1770 | | |
| B-220 *** | 0750-596 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,3057 | 1,3057 | 0,1383 | 0,2083 |
| QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 4251-856 | 10 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 11,90 | 11,90 | 1,29 | 2,15 |
| | 4251-856 | | | | 4,86 | 4,86 | | |
| B-220 | 4251-864 | 30 comprimés à libération | 30 tabletten met verlengde afgifte, | G | 24,39 | 24,39 | 3,83 | 6,43 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|---------------|---------------|--------|--|
| | | prolongée, 50 mg | 50 mg | | | | | | |
| | 4251-864 | | | | | 14,54 | 14,54 | | |
| B-220 | 4251-872 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 34,49 | 34,49 | 5,23 | 8,80 | |
| | 4251-872 | | | | | 23,33 | 23,33 | | |
| B-220 * | 7706-302 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,5018 | 0,5018 | | | |
| B-220 ** | 7706-302 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4122 | 0,4122 | | | |
| B-220 *** | 7706-302 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,6371 | 0,6371 | 0,1290 | 0,2150 | |
| QUETIAPIN SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2926-442 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 19,09 | 19,09 | 2,74 | 4,57 | |
| | 2926-442 | | | | | 10,34 | 10,34 | | |
| B-220 | 2871-838 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 31,29 | 31,29 | 4,79 | 8,05 | |
| | 2871-838 | | | | | 20,55 | 20,55 | | |
| B-220 | 2871-846 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 38,13 | 38,13 | 5,74 | 9,65 | |
| | 2871-846 | | | | | 26,49 | 26,49 | | |
| B-220 | 2963-460 | 180 comprimés pelliculés, 100 mg | 180 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 65,13 | 65,13 | 9,50 | 15,50 | |
| | 2963-460 | | | | | 49,99 | 49,99 | | |
| B-220 * | 0753-061 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3339 | 0,3339 | | | |
| B-220 ** | 0753-061 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2944 | 0,2944 | | | |
| B-220 *** | 0753-061 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3311 | 0,3311 | 0,0528 | 0,0861 | |
| QUETIAPIN SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2926-459 | 30 comprimés pelliculés, 200 mg | 30 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 18,04 | 18,04 | 2,53 | 4,22 | |
| | 2926-459 | | | | | 9,54 | 9,54 | | |
| B-220 | 2871-879 | 60 comprimés pelliculés, 200 mg | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 36,28 | 36,28 | 5,48 | 9,22 | |
| | 2871-879 | | | | | 24,89 | 24,89 | | |
| B-220 | 2871-887 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 65,69 | 65,69 | 9,58 | 15,50 | |
| | 2871-887 | | | | | 50,48 | 50,48 | | |
| B-220 | 2963-478 | 180 comprimés pelliculés, 200 mg | 180 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 134,21 | 134,21 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2963-478 | | | | | 112,52 | 112,52 | | |
| B-220 * | 0753-053 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,7021 | 0,7021 | | | |
| B-220 ** | 0753-053 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,6626 | 0,6626 | | | |
| B-220 *** | 0753-053 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,7149 | 0,7149 | 0,0567 | 0,0861 | |
| QUETIAPIN SANDOZ 25 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2871-788 | 10 comprimés pelliculés, 25 mg | 10 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 6,83 | 6,83 | 0,21 | 0,34 | |
| | 2871-788 | | | | | 0,78 | 0,78 | | |
| B-220 | 2871-796 | 60 comprimés pelliculés, 25 mg | 60 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 12,35 | 12,35 | 1,38 | 2,30 | |
| | 2871-796 | | | | | 5,20 | 5,20 | | |
| B-220 | 2871-804 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 15,47 | 15,47 | 2,01 | 3,35 | |
| | 2871-804 | | | | | 7,58 | 7,58 | | |
| B-220 * | 0753-079 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0978 | 0,0978 | | | |
| B-220 ** | 0753-079 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0803 | 0,0803 | | | |
| B-220 *** | 0753-079 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0993 | 0,0993 | 0,0201 | 0,0335 | |
| QUETIAPIN SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2926-467 | 30 comprimés pelliculés, 300 mg | 30 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 18,04 | 18,04 | 2,53 | 4,22 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|-------------|--------|--|
| | 2926-467 | | | | | 9,54 | 9,54 | | |
| B-220 | 2871-911 | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 36,28 | 36,28 | 5,48 | 9,22 | |
| | 2871-911 | | | | 24,89 | 24,89 | | | |
| B-220 | 2871-929 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 96,59 | 96,59 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2871-929 | | | | 78,20 | 78,20 | | | |
| B-220 | 2963-486 | 180 comprimés pelliculés, 300 mg | 180 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 195,88 | 195,88 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2963-486 | | | | 168,77 | 168,77 | | | |
| B-220 * | 0752-923 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,0334 | 1,0334 | | | |
| B-220 ** | 0752-923 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,9939 | 0,9939 | | | |
| B-220 *** | 0752-923 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,0575 | 1,0575 | 0,0567 | 0,0861 | |
| QUETIAPINE AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 4641-650 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 18,24 | 18,24 | 2,57 | 4,29 | |
| | 4641-650 | | | | 9,70 | 9,70 | | | |
| B-220 | 4641-668 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 31,24 | 31,24 | 4,78 | 8,03 | |
| | 4641-668 | | | | 20,50 | 20,50 | | | |
| B-220 | 4641-635 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 36,53 | 36,53 | 5,52 | 9,28 | |
| | 4641-635 | | | | 25,10 | 25,10 | | | |
| B-220 | 4641-643 | 180 comprimés pelliculés, 100 mg | 180 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 59,39 | 59,39 | 8,70 | 14,65 | |
| | 4641-643 | | | | 45,00 | 45,00 | | | |
| B-220 * | 7737-679 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3045 | 0,3045 | | | |
| B-220 ** | 7737-679 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2650 | 0,2650 | | | |
| B-220 *** | 7737-679 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2992 | 0,2992 | 0,0483 | 0,0814 | |
| QUETIAPINE AB 150 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 4653-630 | 100 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 55,49 | 55,49 | 8,16 | 13,73 | |
| | 4653-630 | | | | 41,60 | 41,60 | | | |
| B-220 * | 7737-596 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,5121 | 0,5121 | | | |
| B-220 ** | 7737-596 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,4410 | 0,4410 | | | |
| B-220 *** | 7737-596 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,4996 | 0,4996 | 0,0816 | 0,1373 | |
| QUETIAPINE AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 4641-676 | 30 comprimés pelliculés, 200 mg | 30 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 17,98 | 17,98 | 2,52 | 4,20 | |
| | 4641-676 | | | | 9,50 | 9,50 | | | |
| B-220 | 4641-684 | 60 comprimés pelliculés, 200 mg | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 34,85 | 34,85 | 5,28 | 8,89 | |
| | 4641-684 | | | | 23,65 | 23,65 | | | |
| B-220 | 4641-692 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 63,35 | 63,35 | 9,25 | 15,50 | |
| | 4641-692 | | | | 48,45 | 48,45 | | | |
| B-220 | 4641-700 | 180 comprimés pelliculés, 200 mg | 180 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 134,19 | 134,19 | 10,20 | 15,50 | |
| | 4641-700 | | | | 112,50 | 112,50 | | | |
| B-220 * | 7737-687 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,7020 | 0,7020 | | | |
| B-220 ** | 7737-687 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,6625 | 0,6625 | | | |
| B-220 *** | 7737-687 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,7147 | 0,7147 | 0,0567 | 0,0861 | |
| QUETIAPINE AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 4653-648 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 71,45 | 71,45 | 10,20 | 15,50 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 4653-648 | | | | 55,50 | 55,50 | | |
| B-220 * | 7737-711 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6594 | 0,6594 | | |
| B-220 ** | 7737-711 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,5883 | 0,5883 | | |
| B-220 *** | 7737-711 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6592 | 0,6592 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE AB 25 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 4641-585 | 30 comprimés pelliculés, 25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 8,22 | 8,22 | 0,53 | 0,88 |
| | 4641-585 | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| B-220 | 4641-601 | 60 comprimés pelliculés, 25 mg | 60 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 12,27 | 12,27 | 1,37 | 2,28 |
| | 4641-601 | | | | 5,15 | 5,15 | | |
| B-220 | 4641-627 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 15,42 | 15,42 | 2,00 | 3,34 |
| | 4641-627 | | | | 7,55 | 7,55 | | |
| B-220 * | 7737-588 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0974 | 0,0974 | | |
| B-220 ** | 7737-588 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0800 | 0,0800 | | |
| B-220 *** | 7737-588 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0989 | 0,0989 | 0,0200 | 0,0334 |
| QUETIAPINE AB 300 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 4641-718 | 30 comprimés pelliculés, 300 mg | 30 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 17,98 | 17,98 | 2,52 | 4,20 |
| | 4641-718 | | | | 9,50 | 9,50 | | |
| B-220 | 4641-726 | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 34,92 | 34,92 | 5,29 | 8,90 |
| | 4641-726 | | | | 23,70 | 23,70 | | |
| B-220 | 4641-734 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 92,41 | 92,41 | 10,20 | 15,50 |
| | 4641-734 | | | | 74,40 | 74,40 | | |
| B-220 | 4641-742 | 180 comprimés pelliculés, 300 mg | 180 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 195,80 | 195,80 | 10,20 | 15,50 |
| | 4641-742 | | | | 168,70 | 168,70 | | |
| B-220 * | 7737-695 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,0329 | 1,0329 | | |
| B-220 ** | 7737-695 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,9934 | 0,9934 | | |
| B-220 *** | 7737-695 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,0571 | 1,0571 | 0,0567 | 0,0861 |
| QUETIAPINE AB 300 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 4653-655 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 102,06 | 102,06 | 10,20 | 15,50 |
| | 4653-655 | | | | 83,20 | 83,20 | | |
| B-220 * | 7737-729 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9530 | 0,9530 | | |
| B-220 ** | 7737-729 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,8819 | 0,8819 | | |
| B-220 *** | 7737-729 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9652 | 0,9652 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE AB 400 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 4653-663 | 100 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | G | 132,54 | 132,54 | 10,20 | 15,50 |
| | 4653-663 | | | | 111,00 | 111,00 | | |
| B-220 * | 7737-737 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2477 | 1,2477 | | |
| B-220 ** | 7737-737 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,1766 | 1,1766 | | |
| B-220 *** | 7737-737 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2701 | 1,2701 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE AB 50 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: N05AH04 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|----|---------------|---------------|--------|--------|
| B-220 | 4653-614 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 34,46 | 34,46 | 5,23 | 8,79 |
| | 4653-614 | | | | 23,30 | 23,30 | | |
| B-220 | 4653-622 | 100 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 52,39 | 52,39 | 7,72 | 13,00 |
| | 4653-622 | | | | 38,90 | 38,90 | | |
| B-220 * | 7737-703 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4834 | 0,4834 | | |
| B-220 ** | 7737-703 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4123 | 0,4123 | | |
| B-220 *** | 7737-703 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4685 | 0,4685 | 0,0772 | 0,1300 |
| QUETIAPINE EG 100mg | | | | EG | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2866-267 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 18,26 | 18,26 | 2,58 | 4,30 |
| | 2866-267 | | | | 9,72 | 9,72 | | |
| B-220 | 2866-614 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 37,99 | 37,99 | 5,72 | 9,62 |
| | 2866-614 | | | | 26,37 | 26,37 | | |
| B-220 | 2903-904 | 180 comprimés pelliculés, 100 mg | 180 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 65,13 | 65,13 | 9,50 | 15,50 |
| | 2903-904 | | | | 49,99 | 49,99 | | |
| B-220 * | 0755-785 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3339 | 0,3339 | | |
| B-220 ** | 0755-785 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2944 | 0,2944 | | |
| B-220 *** | 0755-785 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3311 | 0,3311 | 0,0528 | 0,0861 |
| QUETIAPINE EG 200 mg | | | | EG | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2866-630 | 60 comprimés pelliculés, 200 mg | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 34,93 | 34,93 | 5,29 | 8,90 |
| | 2866-630 | | | | 23,71 | 23,71 | | |
| B-220 | 2866-648 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 65,69 | 65,69 | 9,58 | 15,50 |
| | 2866-648 | | | | 50,48 | 50,48 | | |
| B-220 | 2890-937 | 180 comprimés pelliculés, 200 mg | 180 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 146,11 | 146,11 | 10,20 | 15,50 |
| | 2890-937 | | | | 123,38 | 123,38 | | |
| B-220 * | 0755-777 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,7661 | 0,7661 | | |
| B-220 ** | 0755-777 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,7266 | 0,7266 | | |
| B-220 *** | 0755-777 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,6016 | 0,6016 | 0,0958 | 0,1550 |
| QUETIAPINE EG 25 mg | | | | EG | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3237-575 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 15,79 | 15,79 | 2,08 | 3,46 |
| | 3237-575 | | | | 7,83 | 7,83 | | |
| B-220 * | 7709-504 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,1010 | 0,1010 | | |
| B-220 ** | 7709-504 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | |
| B-220 *** | 7709-504 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | 0,0208 | 0,0346 |
| QUETIAPINE EG 300 mg | | | | EG | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2866-663 | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 34,93 | 34,93 | 5,29 | 8,90 |
| | 2866-663 | | | | 23,71 | 23,71 | | |
| B-220 | 2866-671 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 96,39 | 96,39 | 10,20 | 15,50 |
| | 2866-671 | | | | 78,03 | 78,03 | | |
| B-220 | 2890-903 | 180 comprimés pelliculés, 300 mg | 180 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 208,67 | 208,67 | 10,20 | 15,50 |
| | 2890-903 | | | | 180,44 | 180,44 | | |
| B-220 * | 0755-769 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,1021 | 1,1021 | | |
| B-220 ** | 0755-769 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,0626 | 1,0626 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-220 *** | 0755-769 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 1,1285 | 1,1285 | 0,0567 | 0,0861 |
| QUETIAPINE KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3260-452 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 18,26 | 18,26 | 2,58 | 4,30 |
| | 3260-452 | | | | 9,72 | 9,72 | | |
| B-220 | 3260-460 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 31,25 | 31,25 | 4,78 | 8,04 |
| | 3260-460 | | | | 20,51 | 20,51 | | |
| B-220 | 3260-478 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 36,54 | 36,54 | 5,52 | 9,28 |
| | 3260-478 | | | | 25,11 | 25,11 | | |
| B-220 * | 7709-561 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3240 | 0,3240 | | |
| B-220 ** | 7709-561 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2662 | 0,2662 | | |
| B-220 *** | 7709-561 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3101 | 0,3101 | 0,0552 | 0,0928 |
| QUETIAPINE KRKA 200 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3260-486 | 30 comprimés pelliculés, 200 mg | 30 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 18,02 | 18,02 | 2,53 | 4,21 |
| | 3260-486 | | | | 9,53 | 9,53 | | |
| B-220 | 3260-502 | 60 comprimés pelliculés, 200 mg | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 34,93 | 34,93 | 5,29 | 8,90 |
| | 3260-502 | | | | 23,71 | 23,71 | | |
| B-220 | 3260-528 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 63,38 | 63,38 | 9,26 | 15,50 |
| | 3260-528 | | | | 48,47 | 48,47 | | |
| B-220 * | 7709-579 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5849 | 0,5849 | | |
| B-220 ** | 7709-579 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5138 | 0,5138 | | |
| B-220 *** | 7709-579 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5784 | 0,5784 | 0,0926 | 0,1550 |
| QUETIAPINE KRKA 200 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3573-482 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 50,77 | 50,77 | 7,50 | 12,50 |
| | 3573-482 | | | | 37,50 | 37,50 | | |
| B-220 | 3567-880 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 71,48 | 71,48 | 10,20 | 15,50 |
| | 3567-880 | | | | 55,52 | 55,52 | | |
| B-220 * | 7718-968 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6596 | 0,6596 | | |
| B-220 ** | 7718-968 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,5885 | 0,5885 | | |
| B-220 *** | 7718-968 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6594 | 0,6594 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE KRKA 25 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3380-144 | 30 comprimés pelliculés, 25 mg | 30 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 8,30 | 8,30 | 0,55 | 0,92 |
| | 3380-144 | | | | 2,08 | 2,08 | | |
| B-220 | 3380-151 | 60 comprimés pelliculés, 25 mg | 60 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 12,35 | 12,35 | 1,38 | 2,30 |
| | 3380-151 | | | | 5,20 | 5,20 | | |
| B-220 | 3380-169 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 15,47 | 15,47 | 2,01 | 3,35 |
| | 3380-169 | | | | 7,58 | 7,58 | | |
| B-220 * | 7715-196 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0978 | 0,0978 | | |
| B-220 ** | 7715-196 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0803 | 0,0803 | | |
| B-220 *** | 7715-196 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0993 | 0,0993 | 0,0201 | 0,0335 |
| QUETIAPINE KRKA 300 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3573-490 | 60 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 72,32 | 72,32 | 8,30 | 12,50 |
| | 3573-490 | | | | 56,26 | 56,26 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-220 | 3567-898 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 102,14 | 102,14 | 10,20 | 15,50 |
| | 3567-898 | | | | 83,27 | 83,27 | | |
| B-220 * | 7718-976 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9538 | 0,9538 | | |
| B-220 ** | 7718-976 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,8827 | 0,8827 | | |
| B-220 *** | 7718-976 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9661 | 0,9661 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3260-536 | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 34,93 | 34,93 | 5,29 | 8,90 |
| | 3260-536 | | | | 23,71 | 23,71 | | |
| B-220 | 3260-544 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 93,43 | 93,43 | 10,20 | 15,50 |
| | 3260-544 | | | | 75,32 | 75,32 | | |
| B-220 * | 7709-587 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,8695 | 0,8695 | | |
| B-220 ** | 7709-587 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,7984 | 0,7984 | | |
| B-220 *** | 7709-587 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,8790 | 0,8790 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3892-015 | 100 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | G | 132,58 | 132,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 3892-015 | | | | 111,04 | 111,04 | | |
| B-220 * | 7724-099 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2481 | 1,2481 | | |
| B-220 ** | 7724-099 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,1770 | 1,1770 | | |
| B-220 *** | 7724-099 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2705 | 1,2705 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3567-872 | 30 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 24,39 | 24,39 | 3,83 | 6,43 |
| | 3567-872 | | | | 14,54 | 14,54 | | |
| B-220 | 3573-474 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 34,49 | 34,49 | 5,23 | 8,80 |
| | 3573-474 | | | | 23,33 | 23,33 | | |
| B-220 * | 7718-950 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,5018 | 0,5018 | | |
| B-220 ** | 7718-950 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4122 | 0,4122 | | |
| B-220 *** | 7718-950 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,6286 | 0,6286 | 0,1277 | 0,2143 |
| QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EG ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3276-250 | 120 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 83,89 | 83,89 | 10,20 | 15,50 |
| | 3276-250 | | | | 66,63 | 66,63 | | |
| B-220 * | 7712-730 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6478 | 0,6478 | | |
| B-220 ** | 7712-730 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,5886 | 0,5886 | | |
| B-220 *** | 7712-730 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6530 | 0,6530 | 0,0850 | 0,1292 |
| QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EG ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3276-268 | 120 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 120,41 | 120,41 | 10,20 | 15,50 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 3276-268 | | | | 99,93 | 99,93 | | |
| B-220 * | 7712-748 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9420 | 0,9420 | | |
| B-220 ** | 7712-748 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,8828 | 0,8828 | | |
| B-220 *** | 7712-748 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9573 | 0,9573 | 0,0850 | 0,1292 |
| QUETIAPINE RETARD EG 400 mg EG ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3276-276 | 120 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | G | 156,92 | 156,92 | 10,20 | 15,50 |
| | 3276-276 | | | | 133,23 | 133,23 | | |
| B-220 * | 7712-755 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2361 | 1,2361 | | |
| B-220 ** | 7712-755 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,1768 | 1,1768 | | |
| B-220 *** | 7712-755 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2616 | 1,2616 | 0,0850 | 0,1292 |
| QUETIAPINE RETARD EG 50 mg EG ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3271-491 | 30 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 |
| | 3271-491 | | | | 14,60 | 14,60 | | |
| B-220 | 3604-642 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 34,49 | 34,49 | 5,23 | 8,80 |
| | 3604-642 | | | | 23,33 | 23,33 | | |
| B-220 * | 7712-722 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,5018 | 0,5018 | | |
| B-220 ** | 7712-722 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4122 | 0,4122 | | |
| B-220 *** | 7712-722 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,6307 | 0,6307 | 0,1280 | 0,2147 |
| QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 3364-031 | 100 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 55,53 | 55,53 | 8,16 | 13,74 |
| | 3364-031 | | | | 41,64 | 41,64 | | |
| B-220 * | 7720-303 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,5125 | 0,5125 | | |
| B-220 ** | 7720-303 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,4414 | 0,4414 | | |
| B-220 *** | 7720-303 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,5000 | 0,5000 | 0,0816 | 0,1374 |
| QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 2929-537 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 71,49 | 71,49 | 10,20 | 15,50 |
| | 2929-537 | | | | 55,53 | 55,53 | | |
| B-220 * | 7707-300 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6597 | 0,6597 | | |
| B-220 ** | 7707-300 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,5886 | 0,5886 | | |
| B-220 *** | 7707-300 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,6595 | 0,6595 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04 | | | | | | | | |
| B-220 | 2929-552 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 102,15 | 102,15 | 10,20 | 15,50 |
| | 2929-552 | | | | 83,28 | 83,28 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-220 * | 7707-318 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9539 | 0,9539 | | |
| B-220 ** | 7707-318 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,8828 | 0,8828 | | |
| B-220 *** | 7707-318 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,9662 | 0,9662 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2929-578 | 100 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | G | 132,58 | 132,58 | 10,20 | 15,50 |
| | 2929-578 | | | | 111,04 | 111,04 | | |
| B-220 * | 7707-326 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2481 | 1,2481 | | |
| B-220 ** | 7707-326 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,1770 | 1,1770 | | |
| B-220 *** | 7707-326 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | G | 1,2705 | 1,2705 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 3138-476 | 30 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 |
| | 3138-476 | | | | 14,60 | 14,60 | | |
| B-220 | 3680-121 | 60 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 34,49 | 34,49 | 5,23 | 8,80 |
| | 3680-121 | | | | 23,33 | 23,33 | | |
| B-220 | 3562-212 | 100 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 52,39 | 52,39 | 7,72 | 13,00 |
| | 3562-212 | | | | 38,90 | 38,90 | | |
| B-220 * | 7707-292 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4834 | 0,4834 | | |
| B-220 ** | 7707-292 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4123 | 0,4123 | | |
| B-220 *** | 7707-292 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4685 | 0,4685 | 0,0772 | 0,1300 |
| QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 4799-664 | 100 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | G | 52,39 | 52,39 | 7,72 | 13,00 |
| | 4799-664 | | | | 38,90 | 38,90 | | |
| B-220 * | 7740-079 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4834 | 0,4834 | | |
| B-220 ** | 7740-079 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4123 | 0,4123 | | |
| B-220 *** | 7740-079 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | G | 0,4685 | 0,4685 | 0,0772 | 0,1300 |
| QUETIAPINE TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2941-805 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 36,54 | 36,54 | 5,52 | 9,28 |
| | 2941-805 | | | | 25,11 | 25,11 | | |
| B-220 * | 0750-810 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3240 | 0,3240 | | |
| B-220 ** | 0750-810 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2662 | 0,2662 | | |
| B-220 *** | 0750-810 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3101 | 0,3101 | 0,0552 | 0,0928 |
| QUETIAPINE TEVA 200 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2941-813 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 63,70 | 63,70 | 9,30 | 15,50 |
| | 2941-813 | | | | 48,74 | 48,74 | | |
| B-220 * | 0750-802 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5877 | 0,5877 | | |
| B-220 ** | 0750-802 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5166 | 0,5166 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-220 *** | 0750-802 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5816 | 0,5816 | 0,0930 | 0,1550 |
| QUETIAPINE TEVA 25 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2941-797 | 6 comprimés pelliculés, 25 mg | 6 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 6,42 | 6,42 | 0,11 | 0,19 |
| | 2941-797 | | | | 0,43 | 0,43 | | |
| B-220 | 3139-508 | 60 comprimés pelliculés, 25 mg | 60 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 12,35 | 12,35 | 1,38 | 2,30 |
| | 3139-508 | | | | 5,20 | 5,20 | | |
| B-220 | 3346-046 | 100 comprimés pelliculés, 25 mg | 100 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 15,47 | 15,47 | 2,01 | 3,35 |
| | 3346-046 | | | | 7,58 | 7,58 | | |
| B-220 * | 0750-828 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0978 | 0,0978 | | |
| B-220 ** | 0750-828 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0803 | 0,0803 | | |
| B-220 *** | 0750-828 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0993 | 0,0993 | 0,0201 | 0,0335 |
| QUETIAPINE TEVA 300 mg | | AREGA PHARMA | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2941-789 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 93,43 | 93,43 | 10,20 | 15,50 |
| | 2941-789 | | | | 75,32 | 75,32 | | |
| B-220 * | 0750-794 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,8695 | 0,8695 | | |
| B-220 ** | 0750-794 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,7984 | 0,7984 | | |
| B-220 *** | 0750-794 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,8790 | 0,8790 | 0,1020 | 0,1550 |
| QUETIAPINE VIATRIS 100 mg | | VIATRIS | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2893-766 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 31,32 | 31,32 | 4,79 | 8,05 |
| | 2893-766 | | | | 20,57 | 20,57 | | |
| B-220 | 2893-774 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 38,13 | 38,13 | 5,74 | 9,65 |
| | 2893-774 | | | | 26,49 | 26,49 | | |
| B-220 * | 0752-485 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3419 | 0,3419 | | |
| B-220 ** | 0752-485 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2808 | 0,2808 | | |
| B-220 *** | 0752-485 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3260 | 0,3260 | 0,0574 | 0,0965 |
| QUETIAPINE VIATRIS 200 mg | | VIATRIS | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2893-790 | 60 comprimés pelliculés, 200 mg | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 36,28 | 36,28 | 5,48 | 9,22 |
| | 2893-790 | | | | 24,89 | 24,89 | | |
| B-220 | 2893-808 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | G | 65,69 | 65,69 | 9,58 | 15,50 |
| | 2893-808 | | | | 50,48 | 50,48 | | |
| B-220 * | 0752-477 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,6062 | 0,6062 | | |
| B-220 ** | 0752-477 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,5351 | 0,5351 | | |
| B-220 *** | 0752-477 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | G | 0,6016 | 0,6016 | 0,0958 | 0,1550 |
| QUETIAPINE VIATRIS 25 mg | | VIATRIS | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 3209-509 | 60 comprimés pelliculés, 25 mg | 60 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 12,35 | 12,35 | 1,38 | 2,30 |
| | 3209-509 | | | | 5,20 | 5,20 | | |
| B-220 * | 0752-857 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,1118 | 0,1118 | | |
| B-220 ** | 0752-857 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,0918 | 0,0918 | | |
| B-220 *** | 0752-857 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,1136 | 0,1136 | 0,0230 | 0,0383 |
| QUETIAPINE VIATRIS 300 mg | | VIATRIS | | | ATC: N05AH04 | | | |
| B-220 | 2893-816 | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 36,28 | 36,28 | 5,48 | 9,22 |
| | 2893-816 | | | | 24,89 | 24,89 | | |
| B-220 | 2893-832 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | G | 96,59 | 96,59 | 10,20 | 15,50 |
| | 2893-832 | | | | 78,20 | 78,20 | | |
| B-220 * | 0752-469 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,9000 | 0,9000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-220 ** | 0752-469 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,8289 | 0,8289 | | |
| B-220 *** | 0752-469 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | G | 0,5125 | 0,5125 | 0,0913 | 0,1537 |
| QUINAPRIL EG 40 mg | | EG | | ATC: C09AA06 | | | | |
| B-21 | 2180-800 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 39,73 | 39,73 | 5,96 | 10,03 |
| | 2180-800 | | | | 27,89 | 27,89 | | |
| B-21 * | 0778-712 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,3672 | 0,3672 | | |
| B-21 ** | 0778-712 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,3016 | 0,3016 | | |
| B-21 *** | 0778-712 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,3489 | 0,3489 | 0,0608 | 0,1023 |
| QVAR AUTOHALER 100 µg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: R03BA01 | | | | |
| B-99 | 1625-474 | 200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose | 200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis | R | 19,72 | 19,72 | 2,87 | 4,79 |
| | 1625-474 | | | | 10,83 | 10,83 | | |
| B-99 * | 0769-935 | 1 cartouche, 100 µg/dose | 1 patroon, 100 µg/dosis | R | 13,9800 | 13,9800 | | |
| B-99 ** | 0769-935 | 1 cartouche, 100 µg/dose | 1 patroon, 100 µg/dosis | R | 11,4800 | 11,4800 | | |
| QVAR AUTOHALER 50 µg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: R03BA01 | | | | |
| B-99 | 1740-059 | 200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose | 200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis | R | 14,12 | 14,12 | 1,74 | 2,90 |
| | 1740-059 | | | | 6,55 | 6,55 | | |
| B-99 * | 0773-010 | 1 cartouche, 50 µg/dose | 1 patroon, 50 µg/dosis | R | 8,4500 | 8,4500 | | |
| B-99 ** | 0773-010 | 1 cartouche, 50 µg/dose | 1 patroon, 50 µg/dosis | R | 6,9400 | 6,9400 | | |
| RABIPUR | | VALNEVA FRANCE SAS | | ATC: J07BG01 | | | | |
| B-201 | 2765-444 | 1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose | 1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis | | 65,18 | 65,18 | 8,30 | 12,50 |
| | 2765-444 | | | | 50,04 | 50,04 | | |
| B-201 * | 7700-693 | 1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose | 1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis | | 60,1500 | 60,1500 | | |
| B-201 ** | 7700-693 | 1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose | 1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis | | 53,0400 | 53,0400 | | |
| RAMIPRIL AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4281-218 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 37,52 | 37,52 | 5,66 | 9,51 |
| | 4281-218 | | | | 25,97 | 25,97 | | |
| B-21 * | 7730-112 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3419 | 0,3419 | | |
| B-21 ** | 7730-112 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2809 | 0,2809 | | |
| B-21 *** | 7730-112 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3264 | 0,3264 | 0,0578 | 0,0970 |
| RAMIPRIL AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4281-192 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 12,20 | 12,20 | 1,35 | 2,25 |
| | 4281-192 | | | | 5,09 | 5,09 | | |
| B-21 | 4281-184 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 23,26 | 23,26 | 3,59 | 5,99 |
| | 4281-184 | | | | 13,55 | 13,55 | | |
| B-21 * | 7730-104 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | |
| B-21 ** | 7730-104 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | |
| B-21 *** | 7730-104 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 |
| RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 3060-530 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 37,53 | 37,53 | 5,66 | 9,51 |
| | 3060-530 | | | | 25,98 | 25,98 | | |
| B-21 * | 7703-606 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3421 | 0,3421 | | |
| B-21 ** | 7703-606 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2810 | 0,2810 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 *** | 7703-606 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3265 | 0,3265 | 0,0578 | 0,0970 |
| RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4843-041 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 37,53 | 37,53 | 5,66 | 9,51 |
| | 4843-041 | | | | 25,98 | 25,98 | | |
| B-21 * | 7740-798 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3421 | 0,3421 | | |
| B-21 ** | 7740-798 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2810 | 0,2810 | | |
| B-21 *** | 7740-798 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3265 | 0,3265 | 0,0578 | 0,0970 |
| RAMIPRIL EG 2,5 mg | | EG | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 2459-337 | 28 comprimés, 2,5 mg | 28 tabletten, 2,5 mg | G | 9,34 | 9,34 | 0,77 | 1,28 |
| | 2459-337 | | | | 2,90 | 2,90 | | |
| B-21 | 2180-834 | 98 comprimés, 2,5 mg | 98 tabletten, 2,5 mg | G | 13,56 | 13,56 | 1,63 | 2,71 |
| | 2180-834 | | | | 6,13 | 6,13 | | |
| B-21 * | 0786-749 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0807 | 0,0807 | | |
| B-21 ** | 0786-749 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0663 | 0,0663 | | |
| B-21 *** | 0786-749 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0819 | 0,0819 | 0,0166 | 0,0277 |
| RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 3060-522 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 23,27 | 23,27 | 3,60 | 5,99 |
| | 3060-522 | | | | 13,56 | 13,56 | | |
| B-21 * | 7703-598 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1786 | 0,1786 | | |
| B-21 ** | 7703-598 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1466 | 0,1466 | | |
| B-21 *** | 7703-598 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1810 | 0,1810 | 0,0367 | 0,0611 |
| RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4832-028 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 23,27 | 23,27 | 3,60 | 5,99 |
| | 4832-028 | | | | 13,56 | 13,56 | | |
| B-21 * | 7740-384 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1786 | 0,1786 | | |
| B-21 ** | 7740-384 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1466 | 0,1466 | | |
| B-21 *** | 7740-384 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1810 | 0,1810 | 0,0367 | 0,0611 |
| RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg | | EG | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 2469-914 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 37,53 | 37,53 | 5,66 | 9,51 |
| | 2469-914 | | | | 25,98 | 25,98 | | |
| B-21 * | 0786-764 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3421 | 0,3421 | | |
| B-21 ** | 0786-764 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2810 | 0,2810 | | |
| B-21 *** | 0786-764 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3265 | 0,3265 | 0,0578 | 0,0970 |
| RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg | | EG | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 2469-906 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 23,27 | 23,27 | 3,60 | 5,99 |
| | 2469-906 | | | | 13,56 | 13,56 | | |
| B-21 * | 0786-756 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1786 | 0,1786 | | |
| B-21 ** | 0786-756 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1466 | 0,1466 | | |
| B-21 *** | 0786-756 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1810 | 0,1810 | 0,0367 | 0,0611 |
| RAMIPRIL KRKA 10 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 3495-876 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 38,15 | 38,15 | 5,74 | 9,66 |
| | 3495-876 | | | | 26,51 | 26,51 | | |
| B-21 * | 7716-152 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3421 | 0,3421 | | |
| B-21 ** | 7716-152 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2810 | 0,2810 | | |
| B-21 *** | 7716-152 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3262 | 0,3262 | 0,0574 | 0,0966 |

| RAMIPRIL KRKA 2,5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09AA05 | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-21 | 3495-850 3495-850 | 100 comprimés, 2,5 mg | 100 tabletten, 2,5 mg | G | 13,72 6,25 | 13,72 6,25 | 1,66 | 2,76 | |
| B-21 * | 7716-137 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0807 | 0,0807 | | | |
| B-21 ** | 7716-137 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0663 | 0,0663 | | | |
| B-21 *** | 7716-137 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0818 | 0,0818 | 0,0166 | 0,0276 | |
| RAMIPRIL KRKA 5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09AA05 | | | | | |
| B-21 | 3495-868 3495-868 | 100 comprimés, 5 mg | 100 tabletten, 5 mg | G | 23,59 13,84 | 23,59 13,84 | 3,67 | 6,12 | |
| B-21 * | 7716-145 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1786 | 0,1786 | | | |
| B-21 ** | 7716-145 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1467 | 0,1467 | | | |
| B-21 *** | 7716-145 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1805 | 0,1805 | 0,0367 | 0,0612 | |
| RAMIPRIL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA05 | | | | | |
| B-21 | 2312-734 2312-734 | 56 comprimés, 10 mg | 56 tabletten, 10 mg | G | 21,24 11,99 | 21,24 11,99 | 3,18 | 5,30 | |
| B-21 | 2312-726 2312-726 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 37,52 25,97 | 37,52 25,97 | 5,66 | 9,51 | |
| B-21 * | 0783-118 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3419 | 0,3419 | | | |
| B-21 ** | 0783-118 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2809 | 0,2809 | | | |
| B-21 *** | 0783-118 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3264 | 0,3264 | 0,0578 | 0,0970 | |
| RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09AA05 | | | | | |
| B-21 | 4784-575 4784-575 | 98 comprimés, 10 mg | 98 tabletten, 10 mg | G | 37,52 25,97 | 37,52 25,97 | 5,66 | 9,51 | |
| B-21 * | 7739-899 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3419 | 0,3419 | | | |
| B-21 ** | 7739-899 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2809 | 0,2809 | | | |
| B-21 *** | 7739-899 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,3264 | 0,3264 | 0,0578 | 0,0970 | |
| RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA05 | | | | | |
| B-21 | 2312-643 2312-643 | 28 comprimés, 2,5 mg | 28 tabletten, 2,5 mg | G | 9,39 2,94 | 9,39 2,94 | 0,78 | 1,30 | |
| B-21 | 2312-650 2312-650 | 56 comprimés, 2,5 mg | 56 tabletten, 2,5 mg | G | 11,58 4,61 | 11,58 4,61 | 1,22 | 2,04 | |
| B-21 | 2312-668 2312-668 | 98 comprimés, 2,5 mg | 98 tabletten, 2,5 mg | G | 13,56 6,13 | 13,56 6,13 | 1,63 | 2,71 | |
| B-21 * | 0783-092 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0807 | 0,0807 | | | |
| B-21 ** | 0783-092 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0663 | 0,0663 | | | |
| B-21 *** | 0783-092 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | G | 0,0819 | 0,0819 | 0,0166 | 0,0277 | |
| RAMIPRIL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: C09AA05 | | | | | |
| B-21 | 2312-676 2312-676 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | 12,35 5,20 | 12,35 5,20 | 1,38 | 2,30 | |
| B-21 | 2312-684 2312-684 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | G | 13,56 6,13 | 13,56 6,13 | 1,63 | 2,71 | |
| B-21 | 2312-692 2312-692 | 98 comprimés, 5 mg | 98 tabletten, 5 mg | G | 23,26 13,55 | 23,26 13,55 | 3,59 | 5,99 | |
| B-21 * | 0783-100 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | | |
| B-21 ** | 0783-100 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1465 | 0,1465 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-21 *** | 0783-100 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,1808 | 0,1808 | 0,0366 | 0,0611 |
| RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: C09BB07 | | | | |
| B-288 | 3668-423 | 98 gélules, 10 mg/ 10 mg | 98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 57,14 | 57,14 | 8,39 | 14,12 |
| | 3668-423 | | | | 43,05 | 43,05 | | |
| B-288 * | 7723-596 | 1 gélule, 10 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5382 | 0,5382 | | |
| B-288 ** | 7723-596 | 1 gélule, 10 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4656 | 0,4656 | | |
| B-288 *** | 7723-596 | 1 gélule, 10 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5266 | 0,5266 | 0,0856 | 0,1441 |
| RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: C09BB07 | | | | |
| B-288 | 3668-415 | 98 gélules, 10 mg/ 5 mg | 98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg | R | 46,52 | 46,52 | 6,91 | 11,63 |
| | 3668-415 | | | | 33,80 | 33,80 | | |
| B-288 * | 7723-588 | 1 gélule, 10 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4382 | 0,4382 | | |
| B-288 ** | 7723-588 | 1 gélule, 10 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg | R | 0,3656 | 0,3656 | | |
| B-288 *** | 7723-588 | 1 gélule, 10 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg | R | 0,4183 | 0,4183 | 0,0705 | 0,1187 |
| RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: C09BB07 | | | | |
| B-288 | 3668-407 | 98 gélules, 5 mg/ 10 mg | 98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg | R | 41,91 | 41,91 | 6,27 | 10,54 |
| | 3668-407 | | | | 29,79 | 29,79 | | |
| B-288 * | 7723-570 | 1 gélule, 5 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3922 | 0,3922 | | |
| B-288 ** | 7723-570 | 1 gélule, 5 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3222 | 0,3222 | | |
| B-288 *** | 7723-570 | 1 gélule, 5 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg | R | 0,3712 | 0,3712 | 0,0640 | 0,1076 |
| RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg AUROBINDO NV | | | | ATC: C09BB07 | | | | |
| B-288 | 3668-258 | 28 gélules, 5 mg/ 5 mg | 28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg | R | 18,44 | 18,44 | 2,61 | 4,35 |
| | 3668-258 | | | | 9,85 | 9,85 | | |
| B-288 | 3668-399 | 98 gélules, 5 mg/ 5 mg | 98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg | R | 31,28 | 31,28 | 4,79 | 8,05 |
| | 3668-399 | | | | 20,54 | 20,54 | | |
| B-288 * | 7723-562 | 1 gélule, 5 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2705 | 0,2705 | | |
| B-288 ** | 7723-562 | 1 gélule, 5 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2221 | 0,2221 | | |
| B-288 *** | 7723-562 | 1 gélule, 5 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg | R | 0,4611 | 0,4611 | 0,0932 | 0,1554 |
| RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | | ATC: C09BA05 | | | | |
| B-21 | 3497-849 | 28 comprimés, 5 mg / 25 mg | 28 tabletten, 5 mg / 25 mg | G | 13,24 | 13,24 | 1,56 | 2,60 |
| | 3497-849 | | | | 5,88 | 5,88 | | |
| B-21 | 3497-864 | 98 comprimés, 5 mg / 25 mg | 98 tabletten, 5 mg / 25 mg | G | 26,60 | 26,60 | 4,13 | 6,94 |
| | 3497-864 | | | | 16,46 | 16,46 | | |
| B-21 * | 7716-780 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | G | 0,2167 | 0,2167 | | |
| B-21 ** | 7716-780 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | G | 0,1781 | 0,1781 | | |
| B-21 *** | 7716-780 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | G | 0,2149 | 0,2149 | 0,0421 | 0,0708 |
| RAPAMUNE 1 mg Pfizer | | | | ATC: L04AH01 | | | | |
| A-29 | 1708-635 | 100 comprimés enrobés, 1 mg | 100 omhulde tabletten, 1 mg | | 363,62 | 363,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 1708-635 | | | | 321,77 | 321,77 | | |
| A-29 * | 0772-301 | 1 comprimé enrobé, 1 mg | 1 omhulde tablet, 1 mg | | 3,4819 | 3,4819 | | |
| A-29 ** | 0772-301 | 1 comprimé enrobé, 1 mg | 1 omhulde tablet, 1 mg | | 3,4108 | 3,4108 | | |
| A-29 *** | 0772-301 | 1 comprimé enrobé, 1 mg | 1 omhulde tablet, 1 mg | | 3,5809 | 3,5809 | 0,0000 | 0,0000 |
| RAPAMUNE 1 mg/ml Pfizer | | | | ATC: L04AH01 | | | | |
| A-29 | 1618-172 | 1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml | | 223,07 | 223,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 1618-172 | | | | 193,57 | 193,57 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-29 * | 0770-644 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | | 3,5382 | 3,5382 | | |
| A-29 ** | 0770-644 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | | 3,4197 | 3,4197 | | |
| RAPAMUNE 2 mg | | Pfizer | | ATC: L04AH01 | | | | |
| A-29 | 2054-682 2054-682 | 30 comprimés enrobés, 2 mg | 30 omhulde tabletten, 2 mg | | 223,07 193,57 | 223,07 193,57 | 0,00 | 0,00 |
| A-29 * | 0775-973 | 1 comprimé enrobé, 2 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg | | 7,0763 | 7,0763 | | |
| A-29 ** | 0775-973 | 1 comprimé enrobé, 2 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg | | 6,8393 | 6,8393 | | |
| A-29 *** | 0775-973 | 1 comprimé enrobé, 2 mg | 1 omhulde tablet, 2 mg | | 7,2511 | 7,2511 | 0,0000 | 0,0000 |
| RAPIFEN | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | ATC: N01AH02 | | | | |
| | 0716-209 | 50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | | 101,36 | 101,36 | | |
| A-30 * | 0716-209 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | | 2,2910 | 2,2910 | | |
| A-30 ** | 0716-209 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | | 2,1488 | 2,1488 | | |
| RAPIFEN | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | ATC: N01AH02 | | | | |
| | 0716-191 | 30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | | 12,17 | 12,17 | | |
| A-30 * | 0716-191 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | | 0,5237 | 0,5237 | | |
| A-30 ** | 0716-191 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | | 0,4300 | 0,4300 | | |
| REDOMEX 10 mg | | LUNDBECK | | ATC: N06AA09 | | | | |
| B-73 | 0077-842 0077-842 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | | 7,45 1,33 | 7,45 1,33 | 0,35 | 0,59 |
| B-73 * | 0716-274 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0172 | 0,0172 | | |
| B-73 ** | 0716-274 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0141 | 0,0141 | | |
| B-73 *** | 0716-274 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0192 | 0,0192 | 0,0035 | 0,0059 |
| REDOMEX 25 mg | | LUNDBECK | | ATC: N06AA09 | | | | |
| B-73 | 0078-105 0078-105 | 100 comprimés, 25 mg | 100 tabletten, 25 mg | | 8,85 2,53 | 8,85 2,53 | 0,67 | 1,12 |
| B-73 * | 0716-282 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | | 0,0326 | 0,0326 | | |
| B-73 ** | 0716-282 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | | 0,0268 | 0,0268 | | |
| B-73 *** | 0716-282 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | | 0,0332 | 0,0332 | 0,0067 | 0,0112 |
| RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK10 | | | | |
| B-245 | 3090-230 3090-230 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis | | 50,98 37,67 | 50,98 37,67 | 7,53 | 12,50 |
| B-245 | 4235-370 4235-370 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 117,28 97,08 | 117,28 97,08 | 8,30 | 12,50 |
| B-245 * | 7709-223 | 1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 36,6700 | 36,6700 | | |
| B-245 ** | 7709-223 | 1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 34,3000 | 34,3000 | | |
| RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: R03AK10 | | | | |
| B-245 | 4314-399 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 50,98 | 50,98 | 7,53 | 12,50 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|------|-------|
| B-245 * | 4314-399 7731-086 | 1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 37,67 47,0400 | 37,67 47,0400 | | |
| B-245 ** | 7731-086 | 1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 39,9300 | 39,9300 | | |
| RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK10 | | | | | | | | |
| B-245 | 3090-214 3090-214 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis | | 50,98 37,67 | 50,98 37,67 | 7,53 | 12,50 |
| B-245 | 3343-738 3343-738 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 109,98 90,41 | 109,98 90,41 | 8,30 | 12,50 |
| B-245 * | 7708-092 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 34,3133 | 34,3133 | | |
| B-245 ** | 7708-092 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 31,9433 | 31,9433 | | |
| RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03AK10 | | | | | | | | |
| B-245 | 4235-420 4235-420 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 50,98 37,67 | 50,98 37,67 | 7,53 | 12,50 |
| B-245 | 4235-511 4235-511 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 109,98 90,41 | 109,98 90,41 | 8,30 | 12,50 |
| B-245 * | 7729-742 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 34,3133 | 34,3133 | | |
| B-245 ** | 7729-742 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 31,9433 | 31,9433 | | |
| RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: R03AK10 | | | | | | | | |
| B-245 | 4272-340 4272-340 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg | | 105,11 85,98 | 105,11 85,98 | 8,30 | 12,50 |
| B-245 * | 7730-666 | 1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg | 1 inhalator, 92 µg/ 22 µg | | 32,7500 | 32,7500 | | |
| B-245 ** | 7730-666 | 1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg | 1 inhalator, 92 µg/ 22 µg | | 30,3800 | 30,3800 | | |
| RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03AK10 | | | | | | | | |
| B-245 | 4679-973 4679-973 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 50,98 37,67 | 50,98 37,67 | 7,53 | 12,50 |
| B-245 | 4679-965 4679-965 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg | | 109,98 90,41 | 109,98 90,41 | 8,30 | 12,50 |
| B-245 * | 7739-162 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 34,3133 | 34,3133 | | |
| B-245 ** | 7739-162 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 31,9433 | 31,9433 | | |
| REMERGON SolTab 15 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11 | | | | | | | | |
| B-73 | 1766-393 1766-393 | 30 comprimés orodispersibles, 15 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg | R | 12,58 5,38 | 12,58 5,38 | 1,43 | 2,38 |
| B-73 * | 0773-408 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | R | 0,2313 | 0,2313 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 ** | 0773-408 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | R | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 0773-408 | 1 comprimé orodispersible, 15 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 15 mg | R | 0,2350 | 0,2350 | 0,0477 | 0,0793 |
| REMERGON SolTab 30 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 1766-401 | 30 comprimés orodispersibles, 30 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | R | 17,94 | 17,94 | 2,51 | 4,19 |
| | 1766-401 | | | | 9,47 | 9,47 | | |
| B-73 * | 0773-416 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | R | 0,4073 | 0,4073 | | |
| B-73 ** | 0773-416 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | R | 0,3347 | 0,3347 | | |
| B-73 *** | 0773-416 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | R | 0,4134 | 0,4134 | 0,0837 | 0,1397 |
| B-73 *** | 0773-416 | 1 comprimé orodispersible, 30 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 30 mg | R | 0,4134 | 0,4134 | 0,0837 | 0,1397 |
| REMERGON SolTab 45 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: N06AX11 | | | | |
| B-73 | 1766-419 | 30 comprimés orodispersibles, 45 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg | R | 19,19 | 19,19 | 2,76 | 4,61 |
| | 1766-419 | | | | 10,42 | 10,42 | | |
| B-73 * | 0773-424 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | R | 0,4483 | 0,4483 | | |
| B-73 ** | 0773-424 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | R | 0,3683 | 0,3683 | | |
| B-73 *** | 0773-424 | 1 comprimé orodispersible, 45 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 45 mg | R | 0,4551 | 0,4551 | 0,0920 | 0,1537 |
| RENEPHO 435 mg/235 mg | | VIFOR PHARMA BELGIUM | | ATC: V03AE04 | | | | |
| B-256 | 2672-491 | 180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg | 180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg | | 24,93 | 24,93 | 3,90 | 6,55 |
| | 2672-491 | | | | 15,01 | 15,01 | | |
| B-256 * | 7701-865 | 1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg | 1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg | | 0,1076 | 0,1076 | | |
| B-256 ** | 7701-865 | 1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg | 1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg | | 0,0884 | 0,0884 | | |
| B-256 *** | 7701-865 | 1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg | 1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg | | 0,1078 | 0,1078 | 0,0217 | 0,0364 |
| RENITEC | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: C09AA02 | | | | |
| B-21 | 1459-783 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | R | 16,59 | 16,59 | 2,24 | 3,73 |
| | 1459-783 | | | | 8,43 | 8,43 | | |
| B-21 * | 0727-248 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1110 | 0,1110 | | |
| B-21 ** | 0727-248 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,0912 | 0,0912 | | |
| B-21 *** | 0727-248 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1128 | 0,1128 | 0,0229 | 0,0381 |
| REPAGLINIDE EG 0,5 mg | | EG | | ATC: A10BX02 | | | | |
| A-61 | 2720-977 | 270 comprimés, 0,5 mg | 270 tabletten, 0,5 mg | G | 22,82 | 22,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720-977 | | | | 13,19 | 13,19 | | |
| A-61 * | 0798-546 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | G | 0,0630 | 0,0630 | | |
| A-61 ** | 0798-546 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | G | 0,0518 | 0,0518 | | |
| A-61 *** | 0798-546 | 1 comprimé, 0,5 mg | 1 tablet, 0,5 mg | G | 0,0640 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0000 |
| REPAGLINIDE EG 1 mg | | EG | | ATC: A10BX02 | | | | |
| A-61 | 2720-993 | 270 comprimés, 1 mg | 270 tabletten, 1 mg | G | 22,82 | 22,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720-993 | | | | 13,19 | 13,19 | | |
| A-61 * | 0798-553 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | G | 0,0630 | 0,0630 | | |
| A-61 ** | 0798-553 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | G | 0,0518 | 0,0518 | | |
| A-61 *** | 0798-553 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | G | 0,0640 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0000 |
| REPAGLINIDE EG 2 mg | | EG | | ATC: A10BX02 | | | | |
| A-61 | 2721-033 | 270 comprimés, 2 mg | 270 tabletten, 2 mg | G | 22,82 | 22,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2721-033 | | | | 13,19 | 13,19 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--------|--------|
| A-61 * | 0798-561 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0630 | 0,0630 | | |
| A-61 ** | 0798-561 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0518 | 0,0518 | | |
| A-61 *** | 0798-561 | 1 comprimé, 2 mg | 1 tablet, 2 mg | G | 0,0640 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0000 |
| REVOLADE 25 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: B02BX05 | | | | |
| | 0798-496 | 28 comprimés pelliculés, 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg | | 722,21 | 722,21 | | |
| A-95 * | 0798-496 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 27,5946 | 27,5946 | | |
| A-95 ** | 0798-496 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | | 27,3407 | 27,3407 | | |
| REVOLADE 50 mg | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: B02BX05 | | | | |
| | 0798-504 | 28 comprimés pelliculés, 50 mg | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg | | 1444,41 | 1444,41 | | |
| A-95 * | 0798-504 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | | 54,9350 | 54,9350 | | |
| A-95 ** | 0798-504 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | | 54,6811 | 54,6811 | | |
| RHOGAM | | KEDRION | | ATC: J06BB01 | | | | |
| A-22 | 0807-081 | 1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml | | 42,42 | 42,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0807-081 | | | | 30,23 | 30,23 | | |
| A-22 * | 0716-472 | 1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL | | 39,0100 | 39,0100 | | |
| A-22 ** | 0716-472 | 1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL | | 32,0400 | 32,0400 | | |
| RIFOCINE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: J04AB03 | | | | |
| B-120 | 0128-165 | 2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml | 2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | | 11,14 | 11,14 | 1,13 | 1,89 |
| | 0128-165 | | | | 4,28 | 4,28 | | |
| B-120 * | 0716-522 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 2,7600 | 2,7600 | | |
| B-120 ** | 0716-522 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 2,2700 | 2,2700 | | |
| RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg | | SANDOZ | | ATC: M05BA07 | | | | |
| B-230 | 2745-701 | 12 comprimés pelliculés, 35 mg | 12 filmomhulde tabletten, 35 mg | G | 28,25 | 28,25 | 4,36 | 7,33 |
| | 2745-701 | | | | 17,90 | 17,90 | | |
| B-230 | 2853-158 | 16 comprimés pelliculés, 35 mg | 16 filmomhulde tabletten, 35 mg | G | 36,58 | 36,58 | 5,52 | 9,29 |
| | 2853-158 | | | | 25,14 | 25,14 | | |
| B-230 * | 0758-474 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 2,0275 | 2,0275 | | |
| B-230 ** | 0758-474 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,6656 | 1,6656 | | |
| B-230 *** | 0758-474 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,9405 | 1,9405 | 0,3450 | 0,5806 |
| RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: M05BA07 | | | | |
| B-230 | 4636-213 | 12 comprimés pelliculés, 35 mg | 12 filmomhulde tabletten, 35 mg | G | 28,25 | 28,25 | 4,36 | 7,33 |
| | 4636-213 | | | | 17,90 | 17,90 | | |
| B-230 * | 7741-861 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,9250 | 1,9250 | | |
| B-230 ** | 7741-861 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,5808 | 1,5808 | | |
| B-230 *** | 7741-861 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,8930 | 1,8930 | 0,3633 | 0,6108 |
| RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: M05BA07 | | | | |
| B-230 | 4433-199 | 12 comprimés pelliculés, 35 mg | 12 filmomhulde tabletten, 35 mg | G | 28,25 | 28,25 | 4,36 | 7,33 |
| | 4433-199 | | | | 17,90 | 17,90 | | |
| B-230 * | 7734-106 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,9250 | 1,9250 | | |
| B-230 ** | 7734-106 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,5808 | 1,5808 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-230 *** | 7734-106 | 1 comprimé pelliculé, 35 mg | 1 filmomhulde tablet, 35 mg | G | 1,8930 | 1,8930 | 0,3633 | 0,6108 | |
| RISPERDAL 1 mg | | JANSSEN-CILAG | | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 1493-618 | 60 comprimés pelliculés, 1 mg | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 21,08 | 21,08 | 3,15 | 5,25 | |
| | 1493-618 | | | | 11,87 | 11,87 | | | |
| B-220 | 2447-803 | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 24,71 | 24,71 | 3,87 | 6,50 | |
| | 2447-803 | | | | 14,82 | 14,82 | | | |
| B-220 * | 0744-631 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,1913 | 0,1913 | | | |
| B-220 ** | 0744-631 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,1571 | 0,1571 | | | |
| B-220 *** | 0744-631 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,1918 | 0,1918 | 0,0387 | 0,0650 | |
| RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 2631-034 | 60 comprimés pelliculés, 1 mg | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 21,08 | 21,08 | 3,15 | 5,25 | |
| | 2631-034 | | | | 11,87 | 11,87 | | | |
| B-220 | 2631-042 | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | R | 24,71 | 24,71 | 3,87 | 6,50 | |
| | 2631-042 | | | | 14,82 | 14,82 | | | |
| B-220 * | 0794-370 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,1913 | 0,1913 | | | |
| B-220 ** | 0794-370 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,1571 | 0,1571 | | | |
| B-220 *** | 0794-370 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | R | 0,1918 | 0,1918 | 0,0387 | 0,0650 | |
| RISPERDAL 1 mg/ml | | JANSSEN-CILAG | | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 1334-499 | 1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml | R | 30,43 | 30,43 | 4,67 | 7,85 | |
| | 1334-499 | | | | 19,80 | 19,80 | | | |
| B-220 | 1660-026 | 1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml | R | 14,29 | 14,29 | 1,77 | 2,95 | |
| | 1660-026 | | | | 6,68 | 6,68 | | | |
| B-220 * | 0760-389 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | R | 0,2555 | 0,2555 | | | |
| B-220 ** | 0760-389 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | R | 0,2099 | 0,2099 | | | |
| RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 2710-341 | 1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL | R | 30,43 | 30,43 | 4,67 | 7,85 | |
| | 2710-341 | | | | 19,80 | 19,80 | | | |
| B-220 * | 0798-090 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | R | 0,2555 | 0,2555 | | | |
| B-220 ** | 0798-090 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | R | 0,2099 | 0,2099 | | | |
| RISPERDAL 2 mg | | JANSSEN-CILAG | | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 1101-559 | 20 comprimés pelliculés, 2 mg | 20 filmomhulde tabletten, 2 mg | R | 17,23 | 17,23 | 2,37 | 3,94 | |
| | 1101-559 | | | | 8,92 | 8,92 | | | |
| B-220 | 1101-567 | 60 comprimés pelliculés, 2 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg | R | 34,98 | 34,98 | 5,30 | 8,92 | |
| | 1101-567 | | | | 23,76 | 23,76 | | | |
| B-220 | 2447-795 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | R | 42,03 | 42,03 | 6,28 | 10,57 | |
| | 2447-795 | | | | 29,89 | 29,89 | | | |
| B-220 * | 0744-649 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | R | 0,3857 | 0,3857 | | | |
| B-220 ** | 0744-649 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | R | 0,3168 | 0,3168 | | | |
| B-220 *** | 0744-649 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | R | 0,3650 | 0,3650 | 0,0628 | 0,1057 | |
| RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 2630-937 | 60 comprimés pelliculés, 2 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg | R | 34,98 | 34,98 | 5,30 | 8,92 | |
| | 2630-937 | | | | 23,76 | 23,76 | | | |
| B-220 | 2630-952 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | R | 42,03 | 42,03 | 6,28 | 10,57 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 2630-952 | | | | | 29,89 | 29,89 | | |
| B-220 * | 0794-388 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | R | 0,3857 | 0,3857 | | | |
| B-220 ** | 0794-388 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | R | 0,3168 | 0,3168 | | | |
| B-220 *** | 0794-388 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | R | 0,3650 | 0,3650 | 0,0628 | 0,1057 | |
| RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 1101-583 | 60 comprimés pelliculés, 3 mg | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg | R | 48,62 | 48,62 | 7,20 | 12,12 | |
| | 1101-583 | | | | 35,63 | 35,63 | | | |
| B-220 | 2447-787 | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | R | 60,30 | 60,30 | 8,83 | 14,86 | |
| | 2447-787 | | | | 45,79 | 45,79 | | | |
| B-220 * | 0744-656 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | R | 0,5565 | 0,5565 | | | |
| B-220 ** | 0744-656 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | R | 0,4854 | 0,4854 | | | |
| B-220 *** | 0744-656 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | R | 0,5477 | 0,5477 | 0,0883 | 0,1486 | |
| RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2630-978 | 60 comprimés pelliculés, 3 mg | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg | R | 48,62 | 48,62 | 7,20 | 12,12 | |
| | 2630-978 | | | | 35,63 | 35,63 | | | |
| B-220 | 2630-994 | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | R | 60,30 | 60,30 | 8,83 | 14,86 | |
| | 2630-994 | | | | 45,79 | 45,79 | | | |
| B-220 * | 0794-396 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | R | 0,5565 | 0,5565 | | | |
| B-220 ** | 0794-396 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | R | 0,4854 | 0,4854 | | | |
| B-220 *** | 0794-396 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | R | 0,5477 | 0,5477 | 0,0883 | 0,1486 | |
| RISPERDAL 4 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 1101-609 | 60 comprimés pelliculés, 4 mg | 60 filmomhulde tabletten, 4 mg | R | 62,28 | 62,28 | 8,30 | 12,50 | |
| | 1101-609 | | | | 47,51 | 47,51 | | | |
| B-220 * | 0784-140 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | R | 0,9578 | 0,9578 | | | |
| B-220 ** | 0784-140 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | R | 0,8393 | 0,8393 | | | |
| B-220 *** | 0784-140 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | R | 0,9457 | 0,9457 | 0,1383 | 0,2083 | |
| RISPERDAL 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2391-241 | 60 comprimés pelliculés, 6 mg | 60 filmomhulde tabletten, 6 mg | R | 89,00 | 89,00 | 8,30 | 12,50 | |
| | 2391-241 | | | | 71,28 | 71,28 | | | |
| B-220 * | 0785-675 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | R | 1,3778 | 1,3778 | | | |
| B-220 ** | 0785-675 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | R | 1,2593 | 1,2593 | | | |
| B-220 *** | 0785-675 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | R | 1,3911 | 1,3911 | 0,1383 | 0,2083 | |
| RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2398-527 | 1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml | G | 30,15 | 30,15 | 4,63 | 7,78 | |
| | 2398-527 | | | | 19,55 | 19,55 | | | |
| B-220 * | 0786-491 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | G | 0,2523 | 0,2523 | | | |
| B-220 ** | 0786-491 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | G | 0,2072 | 0,2072 | | | |
| RISPERIDON SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 3091-873 | 100 comprimés pelliculés, 4 mg | 100 filmomhulde tabletten, 4 mg | G | 97,66 | 97,66 | 10,20 | 15,50 | |
| | 3091-873 | | | | 79,18 | 79,18 | | | |
| B-220 * | 7706-849 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9104 | 0,9104 | | | |
| B-220 ** | 7706-849 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,8393 | 0,8393 | | | |
| B-220 *** | 7706-849 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9212 | 0,9212 | 0,1020 | 0,1550 | |
| RISPERIDONE EG 1 mg EG ATC: N05AX08 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2451-458 | 60 comprimés pelliculés, 1 mg | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 21,08 | 21,08 | 3,15 | 5,25 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--|----|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-220 | 2451-458 2451-466 | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 11,87 25,20 | 11,87 25,20 | 3,94 | 6,61 |
| | 2451-466 | | | | 15,24 | 15,24 | | |
| B-220 * | 0787-226 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1967 | 0,1967 | | |
| B-220 ** | 0787-226 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1615 | 0,1615 | | |
| B-220 *** | 0787-226 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1966 | 0,1966 | 0,0394 | 0,0661 |
| RISPERIDONE EG 1 mg/ml | | | | EG | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 2476-349 | 1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml | G | 30,42 | 30,42 | 4,67 | 7,84 |
| | 2476-349 | | | | 19,79 | 19,79 | | |
| B-220 | 2476-356 | 1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml | G | 14,29 | 14,29 | 1,77 | 2,95 |
| | 2476-356 | | | | 6,68 | 6,68 | | |
| B-220 * | 0789-107 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | G | 0,2554 | 0,2554 | | |
| B-220 ** | 0789-107 | 1 mL solution buvable, 1 mg/mL | 1 mL drank, 1 mg/mL | G | 0,2098 | 0,2098 | | |
| RISPERIDONE EG 2 mg | | | | EG | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 2451-474 | 20 comprimés pelliculés, 2 mg | 20 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 17,20 | 17,20 | 2,36 | 3,94 |
| | 2451-474 | | | | 8,91 | 8,91 | | |
| B-220 | 2451-482 | 60 comprimés pelliculés, 2 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 34,97 | 34,97 | 5,30 | 8,91 |
| | 2451-482 | | | | 23,75 | 23,75 | | |
| B-220 | 2451-490 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 42,72 | 42,72 | 6,38 | 10,73 |
| | 2451-490 | | | | 30,49 | 30,49 | | |
| B-220 * | 0787-234 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3935 | 0,3935 | | |
| B-220 ** | 0787-234 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3232 | 0,3232 | | |
| B-220 *** | 0787-234 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3718 | 0,3718 | 0,0638 | 0,1073 |
| RISPERIDONE EG 3 mg | | | | EG | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 2451-516 | 60 comprimés pelliculés, 3 mg | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 48,61 | 48,61 | 7,20 | 12,12 |
| | 2451-516 | | | | 35,62 | 35,62 | | |
| B-220 | 2451-524 | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 58,88 | 58,88 | 8,63 | 14,53 |
| | 2451-524 | | | | 44,55 | 44,55 | | |
| B-220 * | 0787-242 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5433 | 0,5433 | | |
| B-220 ** | 0787-242 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,4722 | 0,4722 | | |
| B-220 *** | 0787-242 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5335 | 0,5335 | 0,0863 | 0,1453 |
| RISPERIDONE EG 4 mg | | | | EG | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 2451-532 | 60 comprimés pelliculés, 4 mg | 60 filmomhulde tabletten, 4 mg | G | 62,25 | 62,25 | 8,30 | 12,50 |
| | 2451-532 | | | | 47,50 | 47,50 | | |
| B-220 | 2451-540 | 100 comprimés pelliculés, 4 mg | 100 filmomhulde tabletten, 4 mg | G | 97,65 | 97,65 | 10,20 | 15,50 |
| | 2451-540 | | | | 79,17 | 79,17 | | |
| B-220 * | 0788-679 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9103 | 0,9103 | | |
| B-220 ** | 0788-679 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,8392 | 0,8392 | | |
| B-220 *** | 0788-679 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9211 | 0,9211 | 0,1020 | 0,1550 |
| RISPERIDONE EG 6 mg | | | | EG | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 2451-433 | 100 comprimés pelliculés, 6 mg | 100 filmomhulde tabletten, 6 mg | G | 141,06 | 141,06 | 10,20 | 15,50 |
| | 2451-433 | | | | 118,78 | 118,78 | | |
| B-220 * | 0788-687 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,3302 | 1,3302 | | |
| B-220 ** | 0788-687 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,2591 | 1,2591 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-220 *** | 0788-687 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,3553 | 1,3553 | 0,1020 | 0,1550 |
| RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 4880-340 | 60 comprimés pelliculés, 1 mg | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 20,11 | 20,11 | 2,95 | 4,91 |
| | 4880-340 | | | | 11,12 | 11,12 | | |
| B-220 | 4880-332 | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 23,34 | 23,34 | 3,61 | 6,02 |
| | 4880-332 | | | | 13,63 | 13,63 | | |
| B-220 * | 7742-158 | 1 comprimé péliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1759 | 0,1759 | | |
| B-220 ** | 7742-158 | 1 comprimé péliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1445 | 0,1445 | | |
| B-220 *** | 7742-158 | 1 comprimé péliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1781 | 0,1781 | 0,0361 | 0,0602 |
| RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 4880-357 | 60 comprimés pelliculés, 2 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 34,96 | 34,96 | 5,30 | 8,91 |
| | 4880-357 | | | | 23,74 | 23,74 | | |
| B-220 | 4880-365 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 40,56 | 40,56 | 6,08 | 10,22 |
| | 4880-365 | | | | 28,61 | 28,61 | | |
| B-220 * | 7742-166 | 1 comprimé péliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3692 | 0,3692 | | |
| B-220 ** | 7742-166 | 1 comprimé péliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3033 | 0,3033 | | |
| B-220 *** | 7742-166 | 1 comprimé péliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3502 | 0,3502 | 0,0608 | 0,1022 |
| RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 4880-373 | 60 comprimés pelliculés, 3 mg | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 48,62 | 48,62 | 7,20 | 12,12 |
| | 4880-373 | | | | 35,63 | 35,63 | | |
| B-220 | 4880-381 | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 57,82 | 57,82 | 8,48 | 14,28 |
| | 4880-381 | | | | 43,63 | 43,63 | | |
| B-220 * | 7742-174 | 1 comprimé péliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5336 | 0,5336 | | |
| B-220 ** | 7742-174 | 1 comprimé péliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,4625 | 0,4625 | | |
| B-220 *** | 7742-174 | 1 comprimé péliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5229 | 0,5229 | 0,0848 | 0,1428 |
| RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 4880-407 | 60 comprimés pelliculés, 4 mg | 60 filmomhulde tabletten, 4 mg | G | 62,25 | 62,25 | 8,30 | 12,50 |
| | 4880-407 | | | | 47,50 | 47,50 | | |
| B-220 | 4880-399 | 100 comprimés pelliculés, 4 mg | 100 filmomhulde tabletten, 4 mg | G | 97,65 | 97,65 | 10,20 | 15,50 |
| | 4880-399 | | | | 79,17 | 79,17 | | |
| B-220 * | 7742-182 | 1 comprimé péliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9103 | 0,9103 | | |
| B-220 ** | 7742-182 | 1 comprimé péliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,8392 | 0,8392 | | |
| B-220 *** | 7742-182 | 1 comprimé péliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9211 | 0,9211 | 0,1020 | 0,1550 |
| RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 4880-415 | 60 comprimés pelliculés, 6 mg | 60 filmomhulde tabletten, 6 mg | G | 89,00 | 89,00 | 8,30 | 12,50 |
| | 4880-415 | | | | 71,28 | 71,28 | | |
| B-220 | 4880-423 | 100 comprimés pelliculés, 6 mg | 100 filmomhulde tabletten, 6 mg | G | 141,06 | 141,06 | 10,20 | 15,50 |
| | 4880-423 | | | | 118,78 | 118,78 | | |
| B-220 * | 7742-190 | 1 comprimé péliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,3302 | 1,3302 | | |
| B-220 ** | 7742-190 | 1 comprimé péliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,2591 | 1,2591 | | |
| B-220 *** | 7742-190 | 1 comprimé péliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,3553 | 1,3553 | 0,1020 | 0,1550 |
| RISPERIDONE SANDOZ 1 mg | | SANDOZ | | | ATC: N05AX08 | | | |
| B-220 | 2463-677 | 6 comprimés pelliculés, 1 mg | 6 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 7,34 | 7,34 | 0,33 | 0,54 |
| | 2463-677 | | | | 1,23 | 1,23 | | |
| B-220 | 2463-685 | 60 comprimés pelliculés, 1 mg | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 20,11 | 20,11 | 2,95 | 4,91 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-220 | 2463-685 2463-693 | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 11,12 24,71 | 11,12 24,71 | 3,87 | 6,50 |
| B-220 * | 2463-693 0787-879 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 14,82 0,1913 | 14,82 0,1913 | | |
| B-220 ** | 0787-879 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1571 | 0,1571 | | |
| B-220 *** | 0787-879 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1918 | 0,1918 | 0,0387 | 0,0650 |
| RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08 | | | | | | | | |
| B-220 | 2463-701 2463-701 | 20 comprimés pelliculés, 2 mg | 20 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 17,19 8,90 | 17,19 8,90 | 2,36 | 3,93 |
| B-220 | 2463-719 2463-719 | 60 comprimés pelliculés, 2 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 34,96 23,74 | 34,96 23,74 | 5,30 | 8,91 |
| B-220 | 2463-727 2463-727 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 42,03 29,89 | 42,03 29,89 | 6,28 | 10,57 |
| B-220 * | 0787-887 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3857 | 0,3857 | | |
| B-220 ** | 0787-887 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3168 | 0,3168 | | |
| B-220 *** | 0787-887 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3650 | 0,3650 | 0,0628 | 0,1057 |
| RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX08 | | | | | | | | |
| B-220 | 2463-818 2463-818 | 60 comprimés pelliculés, 3 mg | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 48,60 35,61 | 48,60 35,61 | 7,20 | 12,11 |
| B-220 | 2463-826 2463-826 | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 58,86 44,54 | 58,86 44,54 | 8,63 | 14,53 |
| B-220 * | 0787-895 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5432 | 0,5432 | | |
| B-220 ** | 0787-895 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,4721 | 0,4721 | | |
| B-220 *** | 0787-895 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5333 | 0,5333 | 0,0863 | 0,1453 |
| RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N05AX08 | | | | | | | | |
| B-220 | 2463-842 2463-842 | 60 comprimés pelliculés, 4 mg | 60 filmomhulde tabletten, 4 mg | G | 62,25 47,50 | 62,25 47,50 | 8,30 | 12,50 |
| B-220 * | 0787-903 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9577 | 0,9577 | | |
| B-220 ** | 0787-903 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,8392 | 0,8392 | | |
| B-220 *** | 0787-903 | 1 comprimé pelliculé, 4 mg | 1 filmomhulde tablet, 4 mg | G | 0,9453 | 0,9453 | 0,1383 | 0,2083 |
| RISPERIDONE SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX08 | | | | | | | | |
| B-220 | 2970-903 2970-903 | 100 comprimés pelliculés, 6 mg | 100 filmomhulde tabletten, 6 mg | G | 147,56 124,70 | 147,56 124,70 | 10,20 | 15,50 |
| B-220 * | 7701-329 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,3929 | 1,3929 | | |
| B-220 ** | 7701-329 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,3218 | 1,3218 | | |
| B-220 *** | 7701-329 | 1 comprimé pelliculé, 6 mg | 1 filmomhulde tablet, 6 mg | G | 1,4203 | 1,4203 | 0,1020 | 0,1550 |
| RISPERIDONE TEVA 1 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX08 | | | | | | | | |
| B-220 | 2430-437 2430-437 | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | G | 23,34 13,63 | 23,34 13,63 | 3,61 | 6,02 |
| B-220 * | 0786-145 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1759 | 0,1759 | | |
| B-220 ** | 0786-145 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1445 | 0,1445 | | |
| B-220 *** | 0786-145 | 1 comprimé pelliculé, 1 mg | 1 filmomhulde tablet, 1 mg | G | 0,1781 | 0,1781 | 0,0361 | 0,0602 |
| RISPERIDONE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX08 | | | | | | | | |
| B-220 | 2430-460 2430-460 | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | G | 40,56 28,61 | 40,56 28,61 | 6,08 | 10,22 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-220 * | 0786-152 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3692 | 0,3692 | | |
| B-220 ** | 0786-152 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3033 | 0,3033 | | |
| B-220 *** | 0786-152 | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | G | 0,3502 | 0,3502 | 0,0608 | 0,1022 |
| RISPERIDONE TEVA 3 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-220 | 2430-494 | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | G | 57,82 | 57,82 | 8,48 | 14,28 |
| | 2430-494 | | | | 43,63 | 43,63 | | |
| B-220 * | 0786-160 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5336 | 0,5336 | | |
| B-220 ** | 0786-160 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,4625 | 0,4625 | | |
| B-220 *** | 0786-160 | 1 comprimé pelliculé, 3 mg | 1 filmomhulde tablet, 3 mg | G | 0,5229 | 0,5229 | 0,0848 | 0,1428 |
| ROACCUTANE 10 mg | | EUROCEPT | | ATC: D10BA01 | | | | |
| B-160 | 0891-713 | 30 capsules molles, 10 mg | 30 capsules, zacht, 10 mg | R | 15,65 | 15,65 | 2,05 | 3,41 |
| | 0891-713 | | | | 7,72 | 7,72 | | |
| B-160 * | 0727-529 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | R | 0,3320 | 0,3320 | | |
| B-160 ** | 0727-529 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | R | 0,2727 | 0,2727 | | |
| B-160 *** | 0727-529 | 1 capsule molle, 10 mg | 1 capsule, zacht, 10 mg | R | 0,3371 | 0,3371 | 0,0683 | 0,1137 |
| ROACCUTANE 20 mg | | EUROCEPT | | ATC: D10BA01 | | | | |
| B-160 | 0891-721 | 30 capsules molles, 20 mg | 30 capsules, zacht, 20 mg | R | 23,10 | 23,10 | 3,56 | 5,93 |
| | 0891-721 | | | | 13,41 | 13,41 | | |
| B-160 * | 0727-537 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | R | 0,5770 | 0,5770 | | |
| B-160 ** | 0727-537 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | R | 0,4737 | 0,4737 | | |
| B-160 *** | 0727-537 | 1 capsule molle, 20 mg | 1 capsule, zacht, 20 mg | R | 0,5855 | 0,5855 | 0,1187 | 0,1977 |
| ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml | | ROCHE | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01DD04 | |
| | 0727-966 | 1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g | 1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g | | 10,17 | 10,17 | | |
| B-112 ** | 0727-966 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g | 1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g | R | 10,7800 | 10,7800 | | |
| ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: M03AC09 | | | | |
| | 7724-792 | 20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | | 56,61 | 56,61 | | |
| B-140 * | 7724-792 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 3,3560 | 3,3560 | | |
| B-140 ** | 7724-792 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 3,0005 | 3,0005 | | |
| ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: M03AC09 | | | | |
| | 0792-846 | 10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 48,14 | 48,14 | | |
| B-140 * | 0792-846 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 5,8140 | 5,8140 | | |
| B-140 ** | 0792-846 | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 5,1030 | 5,1030 | | |
| ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | ATC: M03AC09 | | | | |
| | 0792-838 | 10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml | 10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml | | 28,30 | 28,30 | | |
| B-140 * | 0792-838 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 3,6520 | 3,6520 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-140 ** | 0792-838 | mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL | G | 3,0000 | 3,0000 | | |
| ROFENID 200 LONG ACTING | | SANOFI BELGIUM | | ATC: M01AE03 | | | | |
| B-60 | 1082-080 1082-080 | 28 gélules à libération prolongée, 200 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 13,13 5,80 | 13,13 5,80 | 1,54 | 2,56 |
| B-60 * | 0741-652 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 0,2671 | 0,2671 | | |
| B-60 ** | 0741-652 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 0,2196 | 0,2196 | | |
| B-60 *** | 0741-652 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 0,2714 | 0,2714 | 0,0550 | 0,0914 |
| ROFENID READY MIX | | SANOFI BELGIUM | | ATC: M01AE03 | | | | |
| B-60 | 0060-020 0060-020 | 6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml | 6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | | 10,84 4,05 | 10,84 4,05 | 1,07 | 1,79 |
| B-60 * | 0729-178 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 0,8717 | 0,8717 | | |
| B-60 ** | 0729-178 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | | 0,7150 | 0,7150 | | |
| ROSUVASTATIN AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA07 | | |
| B-41 | 3606-944 3606-944 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,77 3,99 | 10,77 3,99 | 1,06 | 1,76 |
| B-41 | 3606-936 3606-936 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,18 12,70 | 22,18 12,70 | 3,37 | 5,61 |
| B-41 * | 7720-691 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1672 | 0,1672 | | |
| B-41 ** | 7720-691 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1373 | 0,1373 | | |
| B-41 *** | 7720-691 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1698 | 0,1698 | 0,0344 | 0,0572 |
| ROSUVASTATIN AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA07 | | |
| B-41 | 3606-928 3606-928 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 10,94 4,12 | 10,94 4,12 | 1,09 | 1,82 |
| B-41 | 3606-910 3606-910 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 22,43 12,89 | 22,43 12,89 | 3,42 | 5,70 |
| B-41 * | 7720-956 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1697 | 0,1697 | | |
| B-41 ** | 7720-956 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1394 | 0,1394 | | |
| B-41 *** | 7720-956 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1724 | 0,1724 | 0,0349 | 0,0582 |
| ROSUVASTATIN AB 40 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA07 | | |
| B-41 | 3606-902 3606-902 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 10,94 4,12 | 10,94 4,12 | 1,09 | 1,82 |
| B-41 | 3606-894 3606-894 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 22,92 13,27 | 22,92 13,27 | 3,52 | 5,87 |
| B-41 * | 7720-964 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1747 | 0,1747 | | |
| B-41 ** | 7720-964 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1436 | 0,1436 | | |
| B-41 *** | 7720-964 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1774 | 0,1774 | 0,0359 | 0,0599 |
| ROSUVASTATIN AB 5 mg | | AUROBINDO NV | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10AA07 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 | 3606-969 3606-969 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,37 2,93 | 9,37 2,93 | 0,78 | 1,29 |
| B-41 * | 7720-683 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1350 | 0,1350 | | |
| B-41 ** | 7720-683 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1111 | 0,1111 | | |
| B-41 *** | 7720-683 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1370 | 0,1370 | 0,0279 | 0,0461 |
| ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3659-802 3659-802 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,97 4,15 | 10,97 4,15 | 1,10 | 1,83 |
| B-41 | 3659-810 3659-810 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 23,54 13,81 | 23,54 13,81 | 3,66 | 6,10 |
| B-41 * | 7721-616 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1782 | 0,1782 | | |
| B-41 ** | 7721-616 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1464 | 0,1464 | | |
| B-41 *** | 7721-616 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1801 | 0,1801 | 0,0366 | 0,0610 |
| ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3659-828 3659-828 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,69 4,70 | 11,69 4,70 | 1,25 | 2,08 |
| B-41 | 3659-836 3659-836 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,86 14,08 | 23,86 14,08 | 3,73 | 6,22 |
| B-41 * | 7721-624 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1817 | 0,1817 | | |
| B-41 ** | 7721-624 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1492 | 0,1492 | | |
| B-41 *** | 7721-624 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1833 | 0,1833 | 0,0373 | 0,0622 |
| ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3659-844 3659-844 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 11,69 4,70 | 11,69 4,70 | 1,25 | 2,08 |
| B-41 | 3659-851 3659-851 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,58 14,71 | 24,58 14,71 | 3,85 | 6,47 |
| B-41 * | 7721-632 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1898 | 0,1898 | | |
| B-41 ** | 7721-632 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1559 | 0,1559 | | |
| B-41 *** | 7721-632 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1905 | 0,1905 | 0,0385 | 0,0647 |
| ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3659-794 3659-794 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,67 3,16 | 9,67 3,16 | 0,84 | 1,40 |
| B-41 * | 7721-608 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1457 | 0,1457 | | |
| B-41 ** | 7721-608 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1196 | 0,1196 | | |
| B-41 *** | 7721-608 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,1476 | 0,1476 | 0,0300 | 0,0500 |
| ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3603-214 3603-214 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,95 4,13 | 10,95 4,13 | 1,10 | 1,83 |
| B-41 | 3603-222 3603-222 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 23,24 13,54 | 23,24 13,54 | 3,59 | 5,98 |
| B-41 | 3603-230 3603-230 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 23,54 13,81 | 23,54 13,81 | 3,66 | 6,10 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-41 * | 7721-277 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1782 | 0,1782 | | |
| B-41 ** | 7721-277 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1464 | 0,1464 | | |
| B-41 *** | 7721-277 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1801 | 0,1801 | 0,0366 | 0,0610 |
| ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3603-248 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,27 | 11,27 | 1,16 | 1,94 |
| | 3603-248 | | | | 4,38 | 4,38 | | |
| B-41 | 3603-255 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,52 | 23,52 | 3,66 | 6,10 |
| | 3603-255 | | | | 13,79 | 13,79 | | |
| B-41 | 3603-263 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,86 | 23,86 | 3,73 | 6,22 |
| | 3603-263 | | | | 14,08 | 14,08 | | |
| B-41 * | 7721-269 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1817 | 0,1817 | | |
| B-41 ** | 7721-269 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1492 | 0,1492 | | |
| B-41 *** | 7721-269 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1833 | 0,1833 | 0,0373 | 0,0622 |
| ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3603-289 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,06 | 24,06 | 3,78 | 6,30 |
| | 3603-289 | | | | 14,25 | 14,25 | | |
| B-41 | 3603-297 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 24,58 | 24,58 | 3,85 | 6,47 |
| | 3603-297 | | | | 14,71 | 14,71 | | |
| B-41 * | 7721-251 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1898 | 0,1898 | | |
| B-41 ** | 7721-251 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1559 | 0,1559 | | |
| B-41 *** | 7721-251 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1891 | 0,1891 | 0,0386 | 0,0643 |
| ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3603-180 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,74 | 9,74 | 0,85 | 1,42 |
| | 3603-180 | | | | 3,21 | 3,21 | | |
| B-41 | 3603-198 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 13,86 | 13,86 | 1,69 | 2,81 |
| | 3603-198 | | | | 6,36 | 6,36 | | |
| B-41 * | 7720-550 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0838 | 0,0838 | | |
| B-41 ** | 7720-550 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0688 | 0,0688 | | |
| B-41 *** | 7720-550 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0850 | 0,0850 | 0,0172 | 0,0287 |
| ROSUVASTATINE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3577-152 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,44 | 11,44 | 1,20 | 1,99 |
| | 3577-152 | | | | 4,51 | 4,51 | | |
| B-41 | 3577-160 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,68 | 22,68 | 3,47 | 5,79 |
| | 3577-160 | | | | 13,09 | 13,09 | | |
| B-41 * | 7720-741 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1689 | 0,1689 | | |
| B-41 ** | 7720-741 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1388 | 0,1388 | | |
| B-41 *** | 7720-741 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1715 | 0,1715 | 0,0347 | 0,0579 |
| ROSUVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3577-186 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,44 | 11,44 | 1,20 | 1,99 |
| | 3577-186 | | | | 4,51 | 4,51 | | |
| B-41 | 3577-194 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,02 | 23,02 | 3,54 | 5,90 |
| | 3577-194 | | | | 13,35 | 13,35 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-41 * | 7720-758 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1723 | 0,1723 | | |
| B-41 ** | 7720-758 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1415 | 0,1415 | | |
| B-41 *** | 7720-758 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1749 | 0,1749 | 0,0354 | 0,0590 |
| ROSUVASTATINE EG 40 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3577-236 3577-236 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,51 13,78 | 23,51 13,78 | 3,65 | 6,09 |
| B-41 * | 7720-766 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1778 | 0,1778 | | |
| B-41 ** | 7720-766 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1461 | 0,1461 | | |
| B-41 *** | 7720-766 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1798 | 0,1798 | 0,0365 | 0,0609 |
| ROSUVASTATINE EG 5 mg | | EG | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3577-251 3577-251 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,85 3,30 | 9,85 3,30 | 0,88 | 1,46 |
| B-41 | 3577-269 3577-269 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 13,91 6,39 | 13,91 6,39 | 1,69 | 2,82 |
| B-41 * | 7720-527 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0825 | 0,0825 | | |
| B-41 ** | 7720-527 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0677 | 0,0677 | | |
| B-41 *** | 7720-527 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0837 | 0,0837 | 0,0169 | 0,0282 |
| ROSUVASTATINE TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3582-368 3582-368 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 11,50 4,55 | 11,50 4,55 | 1,21 | 2,01 |
| B-41 | 3582-376 3582-376 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,68 13,09 | 22,68 13,09 | 3,47 | 5,79 |
| B-41 | 3667-102 3667-102 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,68 13,09 | 22,68 13,09 | 3,47 | 5,79 |
| B-41 * | 7721-202 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1689 | 0,1689 | | |
| B-41 ** | 7721-202 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1388 | 0,1388 | | |
| B-41 *** | 7721-202 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1715 | 0,1715 | 0,0347 | 0,0579 |
| ROSUVASTATINE TEVA 15 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3582-392 3582-392 | 100 comprimés pelliculés, 15 mg | 100 filmomhulde tabletten, 15 mg | G | 22,85 13,22 | 22,85 13,22 | 3,51 | 5,84 |
| B-41 * | 7721-194 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,1706 | 0,1706 | | |
| B-41 ** | 7721-194 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,1401 | 0,1401 | | |
| B-41 *** | 7721-194 | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | G | 0,1732 | 0,1732 | 0,0351 | 0,0584 |
| ROSUVASTATINE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3582-400 3582-400 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 11,69 4,70 | 11,69 4,70 | 1,25 | 2,08 |
| B-41 | 3582-418 3582-418 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,02 13,35 | 23,02 13,35 | 3,54 | 5,90 |
| B-41 | 3667-110 3667-110 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 23,02 13,35 | 23,02 13,35 | 3,54 | 5,90 |
| B-41 * | 7721-186 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1723 | 0,1723 | | |
| B-41 ** | 7721-186 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1415 | 0,1415 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-41 *** | 7721-186 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1749 | 0,1749 | 0,0354 | 0,0590 |
| ROSUVASTATINE TEVA 30 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3582-434 3582-434 | 100 comprimés pelliculés, 30 mg | 100 filmomhulde tabletten, 30 mg | G | 23,28 13,57 | 23,28 13,57 | 3,60 | 6,00 |
| B-41 * | 7721-178 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,1751 | 0,1751 | | |
| B-41 ** | 7721-178 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,1438 | 0,1438 | | |
| B-41 *** | 7721-178 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | G | 0,1774 | 0,1774 | 0,0360 | 0,0600 |
| ROSUVASTATINE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3582-459 3582-459 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,51 13,78 | 23,51 13,78 | 3,65 | 6,09 |
| B-41 * | 7721-160 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1778 | 0,1778 | | |
| B-41 ** | 7721-160 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1461 | 0,1461 | | |
| B-41 *** | 7721-160 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1798 | 0,1798 | 0,0365 | 0,0609 |
| ROSUVASTATINE TEVA 5 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3582-343 3582-343 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 10,05 3,44 | 10,05 3,44 | 0,91 | 1,52 |
| B-41 | 3639-333 3639-333 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 13,91 6,39 | 13,91 6,39 | 1,69 | 2,82 |
| B-41 * | 7720-626 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0825 | 0,0825 | | |
| B-41 ** | 7720-626 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0677 | 0,0677 | | |
| B-41 *** | 7720-626 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0837 | 0,0837 | 0,0169 | 0,0282 |
| ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3641-032 3641-032 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 10,96 4,14 | 10,96 4,14 | 1,10 | 1,83 |
| B-41 | 3641-040 3641-040 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | 22,54 12,98 | 22,54 12,98 | 3,44 | 5,74 |
| B-41 * | 7720-840 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1709 | 0,1709 | | |
| B-41 ** | 7720-840 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1404 | 0,1404 | | |
| B-41 *** | 7720-840 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | 0,1735 | 0,1735 | 0,0351 | 0,0586 |
| ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3641-057 3641-057 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 10,95 4,13 | 10,95 4,13 | 1,10 | 1,83 |
| B-41 | 3641-065 3641-065 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 22,87 13,24 | 22,87 13,24 | 3,51 | 5,85 |
| B-41 * | 7720-857 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1744 | 0,1744 | | |
| B-41 ** | 7720-857 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1432 | 0,1432 | | |
| B-41 *** | 7720-857 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1770 | 0,1770 | 0,0358 | 0,0597 |
| ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA07 | |
| B-41 | 3641-073 3641-073 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 10,95 4,13 | 10,95 4,13 | 1,10 | 1,83 |
| B-41 | 3641-081 3641-081 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 23,40 13,68 | 23,40 13,68 | 3,63 | 6,05 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 * | 7720-865 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1801 | 0,1801 | | |
| B-41 ** | 7720-865 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1480 | 0,1480 | | |
| B-41 *** | 7720-865 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1824 | 0,1824 | 0,0370 | 0,0617 |
| ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07 | | | | | | | | |
| B-41 | 3641-206 3641-206 | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 9,43 2,98 | 9,43 2,98 | 0,79 | 1,32 |
| B-41 | 3677-853 3677-853 | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | G | 13,86 6,36 | 13,86 6,36 | 1,69 | 2,81 |
| B-41 * | 7720-543 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0838 | 0,0838 | | |
| B-41 ** | 7720-543 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0688 | 0,0688 | | |
| B-41 *** | 7720-543 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | G | 0,0850 | 0,0850 | 0,0172 | 0,0287 |
| ROVAMYCINE SANOFI BELGIUM ATC: J01FA02 | | | | | | | | |
| C-37 | 0128-272 0128-272 | 16 comprimés, 500 mg | 16 tabletten, 500 mg | | 11,66 4,67 | 11,66 4,67 | 4,13 | 4,13 |
| C-37 * | 0716-662 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,3769 | 0,3769 | | |
| C-37 ** | 0716-662 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,3094 | 0,3094 | | |
| C-37 *** | 0716-662 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,3829 | 0,3829 | 0,2581 | 0,2581 |
| RUPATADINE EG 10 mg EG ATC: R06AX28 | | | | | | | | |
| Cs-7 | 3447-182 3447-182 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 10,34 3,67 | 10,34 3,67 | 3,89 | 3,89 |
| Cs-7 | 3479-045 3479-045 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | G | 18,32 9,76 | 18,32 9,76 | 10,35 | 10,35 |
| Cs-7 * | 7716-277 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1260 | 0,1260 | | |
| Cs-7 ** | 7716-277 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1035 | 0,1035 | | |
| Cs-7 *** | 7716-277 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1601 | 0,1601 | 0,1297 | 0,1297 |
| RUPATALL 10 mg BIOPROJET PHARMA ATC: R06AX28 | | | | | | | | |
| Cs-7 | 2546-976 2546-976 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | R | 10,54 3,82 | 10,54 3,82 | 4,05 | 4,05 |
| Cs-7 | 2573-103 2573-103 | 50 comprimés, 10 mg | 50 tabletten, 10 mg | R | 13,05 5,73 | 13,05 5,73 | 6,08 | 6,08 |
| Cs-7 | 2573-111 2573-111 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | R | 18,89 10,19 | 18,89 10,19 | 10,81 | 10,81 |
| Cs-7 * | 0792-341 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,1315 | 0,1315 | | |
| Cs-7 ** | 0792-341 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,1080 | 0,1080 | | |
| Cs-7 *** | 0792-341 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,1336 | 0,1336 | 0,1081 | 0,1081 |
| RYDENE I.V. LABORATOIRE X.O SAS ATC: C08CA04 | | | | | | | | |
| | 0743-021 | 10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml | 10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 21,31 | 21,31 | | |
| B-20 * | 0743-021 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 2,7500 | 2,7500 | | |
| B-20 ** | 0743-021 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 2,2590 | 2,2590 | | |
| RYTHMODAN EUROCEPT ATC: C01BA03 | | | | | | | | |
| B-8 | 0077-602 0077-602 | 120 gélules, 100 mg | 120 capsules, hard, 100 mg | | 15,15 7,34 | 15,15 7,34 | 1,95 | 3,24 |
| B-8 * | 0716-712 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | | 0,0789 | 0,0789 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-8 ** | 0716-712 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | | 0,0648 | 0,0648 | | |
| B-8 *** | 0716-712 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | | 0,0801 | 0,0801 | 0,0162 | 0,0270 |
| RYTHMODAN LONG ACTION | | EUROCEPT | | ATC: C01BA03 | | | | |
| B-8 | 0818-195 | 40 comprimés pelliculés, 250 mg | 40 filmomhulde tabletten, 250 mg | | 15,35 | 15,35 | 1,99 | 3,31 |
| | 0818-195 | | | | 7,49 | 7,49 | | |
| B-8 * | 0716-738 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | | 0,2418 | 0,2418 | | |
| B-8 ** | 0716-738 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | | 0,1985 | 0,1985 | | |
| B-8 *** | 0716-738 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | | 0,2454 | 0,2454 | 0,0497 | 0,0827 |
| RYTMONORM | | AREGA PHARMA | | ATC: C01BC03 | | | | |
| B-8 | 0869-669 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | | 23,84 | 23,84 | 3,73 | 6,21 |
| | 0869-669 | | | | 14,06 | 14,06 | | |
| B-8 * | 0716-753 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | | 0,1814 | 0,1814 | | |
| B-8 ** | 0716-753 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | | 0,1490 | 0,1490 | | |
| B-8 *** | 0716-753 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | | 0,1831 | 0,1831 | 0,0373 | 0,0621 |
| RYTMONORM | | AREGA PHARMA | | ATC: C01BC03 | | | | |
| B-8 | 0869-644 | 100 comprimés pelliculés, 150 mg | 100 filmomhulde tabletten, 150 mg | | 16,44 | 16,44 | 2,21 | 3,68 |
| | 0869-644 | | | | 8,32 | 8,32 | | |
| B-8 * | 0716-746 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | | 0,1074 | 0,1074 | | |
| B-8 ** | 0716-746 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | | 0,0882 | 0,0882 | | |
| B-8 *** | 0716-746 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | | 0,1091 | 0,1091 | 0,0221 | 0,0368 |
| SALAZOPYRINE EC 500 mg | | Pfizer | | ATC: A07EC01 | | | | |
| B-55 | 0864-611 | 300 comprimés gastro-résistants, 500 mg | 300 maagsapresistente tabletten, 500 mg | | 31,35 | 31,35 | 4,80 | 8,06 |
| | 0864-611 | | | | 20,60 | 20,60 | | |
| B-55 * | 0716-779 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | | 0,0886 | 0,0886 | | |
| B-55 ** | 0716-779 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | | 0,0728 | 0,0728 | | |
| B-55 *** | 0716-779 | 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg | 1 maagsapresistente tablet, 500 mg | | 0,0861 | 0,0861 | 0,0160 | 0,0269 |
| SALVACYL 11,25 mg | | IPSEN | | ATC: L02AE04 | | | | |
| A-94 | 2581-882 | 1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml | 1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml | | 218,94 | 218,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 2581-882 | | | | 189,81 | 189,81 | | |
| A-94 * | 0793-729 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL | | 208,3100 | 208,3100 | | |
| A-94 ** | 0793-729 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL | | 201,2000 | 201,2000 | | |
| SANDIMMUN | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L04AD01 | | | | |
| A-29 | 0861-187 | 10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml | 10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml | r | 60,23 | 60,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0861-187 | | | | 45,73 | 45,73 | | |
| A-29 * | 0716-787 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL | r | 5,5580 | 5,5580 | | |
| A-29 ** | 0716-787 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL | r | 4,8470 | 4,8470 | | |

| SANDOSTATINE | | NOVARTIS PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB02 | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|------|-------|
| B-50 | 0380-493 0380-493 | 10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | R | 193,96 167,02 | 193,96 167,02 | 8,30 | 12,50 |
| B-50 * | 0738-864 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | R | 18,4150 | 18,4150 | | |
| B-50 ** | 0738-864 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | R | 17,7040 | 17,7040 | | |
| SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB02 | | |
| B-50 | 4635-991 4635-991 | 1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL | R | 649,26 582,30 | 649,26 582,30 | 8,30 | 12,50 |
| B-50 * | 7738-693 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL | R | 624,3500 | 624,3500 | | |
| B-50 ** | 7738-693 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL | R | 617,2400 | 617,2400 | | |
| SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg | | NOVARTIS PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB02 | | |
| B-50 | 1395-060 1395-060 | 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml | 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml | R | 561,54 502,29 | 561,54 502,29 | 8,30 | 12,50 |
| B-50 * | 0761-064 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL | R | 539,5400 | 539,5400 | | |
| B-50 ** | 0761-064 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL | R | 532,4300 | 532,4300 | | |
| SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB02 | | |
| B-50 | 4636-007 4636-007 | 1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL | R | 872,71 786,12 | 872,71 786,12 | 8,30 | 12,50 |
| B-50 * | 7738-701 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL | R | 840,4000 | 840,4000 | | |
| B-50 ** | 7738-701 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL | R | 833,2900 | 833,2900 | | |
| SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg | | NOVARTIS PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB02 | | |
| B-50 | 1395-052 1395-052 | 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml | 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml | R | 754,30 678,11 | 754,30 678,11 | 8,30 | 12,50 |
| B-50 * | 0762-096 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL | R | 725,9100 | 725,9100 | | |
| B-50 ** | 0762-096 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL | R | 718,8000 | 718,8000 | | |
| SECTRAL | | EUROCEPT | | | | ATC: C07AB04 | | |
| B-15 | 0812-909 0812-909 | 70 comprimés, 400 mg | 70 tabletten, 400 mg | R | 16,23 8,16 | 16,23 8,16 | 2,16 | 3,61 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-15 * | 0716-837 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 0,1504 | 0,1504 | | |
| B-15 ** | 0716-837 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 0,1236 | 0,1236 | | |
| B-15 *** | 0716-837 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 0,1528 | 0,1528 | 0,0309 | 0,0516 |
| SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: R03BB06 | | | | |
| B-267 | 2992-774 | 30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur | 30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator | | 42,99 | 42,99 | 6,42 | 10,80 |
| | 2992-774 | | | | 30,73 | 30,73 | | |
| B-267 | 2992-766 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren | | 101,79 | 101,79 | 10,20 | 15,50 |
| | 2992-766 | | | | 82,96 | 82,96 | | |
| B-267 * | 7703-978 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis | | 1,0561 | 1,0561 | | |
| B-267 ** | 7703-978 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis | | 0,9771 | 0,9771 | | |
| SELOKEN 100 mg | | RECORDATI | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 0079-673 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | R | 13,06 | 13,06 | 1,52 | 2,54 |
| | 0079-673 | | | | 5,74 | 5,74 | | |
| B-15 * | 0716-894 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,0741 | 0,0741 | | |
| B-15 ** | 0716-894 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,0608 | 0,0608 | | |
| B-15 *** | 0716-894 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,0753 | 0,0753 | 0,0152 | 0,0254 |
| SELOZOK 200 | | RECORDATI | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 0640-698 | 28 comprimés à libération modifiée, 190 mg | 28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg | R | 10,84 | 10,84 | 1,07 | 1,79 |
| | 0640-698 | | | | 4,05 | 4,05 | | |
| B-15 * | 0731-943 | 1 comprimé à libération modifiée, 190 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg | R | 0,1868 | 0,1868 | | |
| B-15 ** | 0731-943 | 1 comprimé à libération modifiée, 190 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg | R | 0,1532 | 0,1532 | | |
| B-15 *** | 0731-943 | 1 comprimé à libération modifiée, 190 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg | R | 0,1897 | 0,1897 | 0,0382 | 0,0639 |
| SELOZOK 25 | | RECORDATI | | ATC: C07AB02 | | | | |
| B-15 | 2234-102 | 28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg | R | 7,96 | 7,96 | 0,47 | 0,79 |
| | 2234-102 | | | | 1,78 | 1,78 | | |
| B-15 * | 0781-518 | 1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg | R | 0,0821 | 0,0821 | | |
| B-15 ** | 0781-518 | 1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg | R | 0,0675 | 0,0675 | | |
| B-15 *** | 0781-518 | 1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg | R | 0,0867 | 0,0867 | 0,0168 | 0,0282 |
| SERETIDE 25/125 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK06 | | | | |
| B-245 | 1593-102 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose | 120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis | R | 28,64 | 28,64 | 4,42 | 7,42 |
| | 1593-102 | | | | 18,24 | 18,24 | | |
| B-245 * | 0768-945 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis | R | 23,5400 | 23,5400 | | |
| B-245 ** | 0768-945 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis | R | 19,3300 | 19,3300 | | |
| SERETIDE 25/250 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK06 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-245 | 1593-110 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis | R | 36,09 | 36,09 | 5,46 | 9,18 |
| | 1593-110 | | | | 24,73 | 24,73 | | |
| B-245 * | 0768-952 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis | R | 31,9100 | 31,9100 | | |
| B-245 ** | 0768-952 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis | R | 26,2100 | 26,2100 | | |
| SERETIDE 25/50 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK06 | | | | |
| B-245 | 1593-094 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis | R | 23,52 | 23,52 | 3,66 | 6,10 |
| | 1593-094 | | | | 13,79 | 13,79 | | |
| B-245 * | 0768-937 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis | R | 17,8000 | 17,8000 | | |
| B-245 ** | 0768-937 | 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose | 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis | R | 14,6200 | 14,6200 | | |
| SERETIDE DISKUS 50µg/100µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK06 | | | | |
| B-245 | 1463-694 | 60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg | 60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg | R | 26,07 | 26,07 | 4,06 | 6,82 |
| | 1463-694 | | | | 15,99 | 15,99 | | |
| B-245 * | 0767-012 | 1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis | R | 0,3440 | 0,3440 | | |
| B-245 ** | 0767-012 | 1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis | R | 0,2825 | 0,2825 | | |
| SERETIDE DISKUS 50µg/250µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK06 | | | | |
| B-245 | 1463-702 | 60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg | 60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg | R | 28,64 | 28,64 | 4,42 | 7,42 |
| | 1463-702 | | | | 18,24 | 18,24 | | |
| B-245 * | 0767-020 | 1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | R | 0,3923 | 0,3923 | | |
| B-245 ** | 0767-020 | 1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis | R | 0,3222 | 0,3222 | | |
| SERETIDE DISKUS 50µg/500µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AK06 | | | | |
| B-245 | 1463-710 | 60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg | 60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg | R | 36,08 | 36,08 | 5,46 | 9,17 |
| | 1463-710 | | | | 24,72 | 24,72 | | |
| B-245 * | 0767-038 | 1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | R | 0,5317 | 0,5317 | | |
| B-245 ** | 0767-038 | 1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis | R | 0,4367 | 0,4367 | | |
| SEREVENT DISKUS 50 µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AC12 | | | | |
| B-216 | 1221-514 | 60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis | | 28,91 | 28,91 | 4,46 | 7,49 |
| | 1221-514 | | | | 18,47 | 18,47 | | |
| B-216 * | 0747-683 | 1 dose, 50 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis | | 0,3973 | 0,3973 | | |
| B-216 ** | 0747-683 | 1 dose, 50 µg/dose | 1 dosis, 50 µg/dosis | | 0,3263 | 0,3263 | | |
| SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03AC12 | | | | |
| B-216 | 2396-109 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis | | 28,91 | 28,91 | 4,46 | 7,49 |
| | 2396-109 | | | | 18,47 | 18,47 | | |
| B-216 * | 0787-374 | 1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose | 1 spuitbus, 25 µg/dosis | | 23,8400 | 23,8400 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-216 ** | 0787-374 | 1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose | 1 spuitbus, 25 µg/dosis | | 19,5800 | 19,5800 | | |
| SERLAIN 100 mg | | VIATRIS | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 1779-404 1779-404 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 14,83 7,09 | 14,83 7,09 | 1,88 | 3,13 |
| B-73 | 2967-057 2967-057 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 29,12 18,66 | 29,12 18,66 | 4,49 | 7,54 |
| B-73 * | 0777-722 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2408 | 0,2408 | | |
| B-73 ** | 0777-722 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,1978 | 0,1978 | | |
| B-73 *** | 0777-722 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | R | 0,2359 | 0,2359 | 0,0449 | 0,0754 |
| SERLAIN 50 mg | | VIATRIS | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 1390-343 1390-343 | 30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg | 30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 14,80 7,07 | 14,80 7,07 | 1,87 | 3,12 |
| B-73 | 2213-536 2213-536 | 60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg | 60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 16,63 8,47 | 16,63 8,47 | 2,25 | 3,74 |
| B-73 | 2967-065 2967-065 | 100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg | 100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 29,12 18,66 | 29,12 18,66 | 4,49 | 7,54 |
| B-73 * | 0747-584 | 1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg | 1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,2408 | 0,2408 | | |
| B-73 ** | 0747-584 | 1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg | 1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1978 | 0,1978 | | |
| B-73 *** | 0747-584 | 1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg | 1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,2359 | 0,2359 | 0,0449 | 0,0754 |
| SERLAIN 50 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 2732-766 2732-766 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 14,77 7,05 | 14,77 7,05 | 1,87 | 3,12 |
| B-73 | 3155-561 3155-561 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | R | 29,12 18,66 | 29,12 18,66 | 4,49 | 7,54 |
| B-73 * | 0799-353 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,2408 | 0,2408 | | |
| B-73 ** | 0799-353 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,1978 | 0,1978 | | |
| B-73 *** | 0799-353 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | R | 0,2359 | 0,2359 | 0,0449 | 0,0754 |
| SEROQUEL 100 mg | | EUROCEPT | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 2899-367 2899-367 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 19,09 10,34 | 19,09 10,34 | 2,74 | 4,57 |
| B-220 | 1540-624 1540-624 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 31,60 20,82 | 31,60 20,82 | 4,83 | 8,12 |
| B-220 | 2879-641 2879-641 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | R | 38,13 26,49 | 38,13 26,49 | 5,74 | 9,65 |
| B-220 * | 0750-430 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3419 | 0,3419 | | |
| B-220 ** | 0750-430 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,2808 | 0,2808 | | |
| B-220 *** | 0750-430 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3260 | 0,3260 | 0,0574 | 0,0965 |
| SEROQUEL 200 mg | | EUROCEPT | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 1540-608 1540-608 | 60 comprimés pelliculés, 200 mg | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg | R | 36,02 24,66 | 36,02 24,66 | 5,45 | 9,16 |
| B-220 | 2805-786 | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | R | 65,69 | 65,69 | 9,58 | 15,50 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | 2805-786 | | | | | 50,48 | 50,48 | | |
| B-220 * | 0768-655 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | R | 0,6062 | 0,6062 | | | |
| B-220 ** | 0768-655 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | R | 0,5351 | 0,5351 | | | |
| B-220 *** | 0768-655 | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | R | 0,6016 | 0,6016 | 0,0958 | 0,1550 | |
| SEROQUEL 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 1722-404 | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | R | 36,02 | 36,02 | 5,45 | 9,16 | |
| | 1722-404 | | | | 24,66 | 24,66 | | | |
| B-220 | 2805-778 | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | R | 96,59 | 96,59 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2805-778 | | | | 78,20 | 78,20 | | | |
| B-220 * | 0770-792 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | R | 0,9000 | 0,9000 | | | |
| B-220 ** | 0770-792 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | R | 0,8289 | 0,8289 | | | |
| B-220 *** | 0770-792 | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | R | 0,9105 | 0,9105 | 0,1020 | 0,1550 | |
| SEROQUEL XR 200 mg EUROCEPT ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2570-299 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | R | 71,49 | 71,49 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2570-299 | | | | 55,53 | 55,53 | | | |
| B-220 * | 0790-006 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | R | 0,6597 | 0,6597 | | | |
| B-220 ** | 0790-006 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | R | 0,5886 | 0,5886 | | | |
| B-220 *** | 0790-006 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | R | 0,6595 | 0,6595 | 0,1020 | 0,1550 | |
| SEROQUEL XR 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2570-315 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | R | 102,15 | 102,15 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2570-315 | | | | 83,28 | 83,28 | | | |
| B-220 * | 0790-014 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | R | 0,9539 | 0,9539 | | | |
| B-220 ** | 0790-014 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | R | 0,8828 | 0,8828 | | | |
| B-220 *** | 0790-014 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | R | 0,9662 | 0,9662 | 0,1020 | 0,1550 | |
| SEROQUEL XR 400 mg EUROCEPT ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2570-323 | 100 comprimés à libération prolongée, 400 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | R | 132,58 | 132,58 | 10,20 | 15,50 | |
| | 2570-323 | | | | 111,04 | 111,04 | | | |
| B-220 * | 0790-022 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | R | 1,2481 | 1,2481 | | | |
| B-220 ** | 0790-022 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | R | 1,1770 | 1,1770 | | | |
| B-220 *** | 0790-022 | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | R | 1,2705 | 1,2705 | 0,1020 | 0,1550 | |
| SEROQUEL XR 50 mg EUROCEPT ATC: N05AH04 | | | | | | | | | |
| B-220 | 2489-904 | 10 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | R | 11,90 | 11,90 | 1,29 | 2,15 | |
| | 2489-904 | | | | 4,86 | 4,86 | | | |
| B-220 | 3019-189 | 30 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | R | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 | |
| | 3019-189 | | | | 14,60 | 14,60 | | | |
| B-220 * | 0793-240 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,6280 | 0,6280 | | | |
| B-220 ** | 0793-240 | 1 comprimé à libération prolongée, | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 | R | 0,5160 | 0,5160 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-220 *** | 0793-240 | 50 mg 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | mg 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,6307 | 0,6307 | 0,1280 | 0,2147 |
| SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N05AH04 | | | | |
| B-220 | 3662-772 | 30 comprimés à libération prolongée, 50 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg | R | 24,45 | 24,45 | 3,84 | 6,44 |
| | 3662-772 | | | | 14,60 | 14,60 | | |
| B-220 * | 7723-026 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,6280 | 0,6280 | | |
| B-220 ** | 7723-026 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,5160 | 0,5160 | | |
| B-220 *** | 7723-026 | 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg | R | 0,6307 | 0,6307 | 0,1280 | 0,2147 |
| SEROXAT | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 0321-471 | 28 comprimés, 20 mg | 28 tabletten, 20 mg | R | 14,13 | 14,13 | 1,74 | 2,90 |
| | 0321-471 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| B-73 | 1755-123 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | R | 16,85 | 16,85 | 2,29 | 3,82 |
| | 1755-123 | | | | 8,64 | 8,64 | | |
| B-73 * | 0740-076 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1991 | 0,1991 | | |
| B-73 ** | 0740-076 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1636 | 0,1636 | | |
| B-73 *** | 0740-076 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2022 | 0,2022 | 0,0409 | 0,0682 |
| SEROXAT 30 mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: N06AB05 | | | | |
| B-73 | 1684-265 | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg | R | 17,17 | 17,17 | 2,35 | 3,92 |
| | 1684-265 | | | | 8,88 | 8,88 | | |
| B-73 * | 0770-511 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 0,4093 | 0,4093 | | |
| B-73 ** | 0770-511 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 0,3361 | 0,3361 | | |
| B-73 *** | 0770-511 | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg | R | 0,4157 | 0,4157 | 0,0839 | 0,1400 |
| SERTRALINE AB 100 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 4338-687 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 14,59 | 14,59 | 1,83 | 3,05 |
| | 4338-687 | | | | 6,91 | 6,91 | | |
| B-73 | 4338-679 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 16,20 | 16,20 | 2,16 | 3,60 |
| | 4338-679 | | | | 8,14 | 8,14 | | |
| B-73 | 4338-711 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 28,24 | 28,24 | 4,36 | 7,33 |
| | 4338-711 | | | | 17,89 | 17,89 | | |
| B-73 * | 7730-963 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2309 | 0,2309 | | |
| B-73 ** | 7730-963 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1896 | 0,1896 | | |
| B-73 *** | 7730-963 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2271 | 0,2271 | 0,0436 | 0,0733 |
| SERTRALINE AB 50 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 4338-703 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 14,59 | 14,59 | 1,83 | 3,05 |
| | 4338-703 | | | | 6,91 | 6,91 | | |
| B-73 | 4338-695 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 16,20 | 16,20 | 2,16 | 3,60 |
| | 4338-695 | | | | 8,14 | 8,14 | | |
| B-73 | 4338-729 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 28,24 | 28,24 | 4,36 | 7,33 |
| | 4338-729 | | | | 17,89 | 17,89 | | |
| B-73 * | 7730-955 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2309 | 0,2309 | | |
| B-73 ** | 7730-955 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1896 | 0,1896 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73 *** | 7730-955 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2271 | 0,2271 | 0,0436 | 0,0733 |
| SERTRALINE EG 100 mg | | EG | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 2224-293 2224-293 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 14,82 7,08 | 14,82 7,08 | 1,88 | 3,13 |
| B-73 | 2224-301 2224-301 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 17,18 8,89 | 17,18 8,89 | 2,36 | 3,93 |
| B-73 | 2554-095 2554-095 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 29,12 18,66 | 29,12 18,66 | 4,49 | 7,54 |
| B-73 * | 0779-983 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2408 | 0,2408 | | |
| B-73 ** | 0779-983 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1978 | 0,1978 | | |
| B-73 *** | 0779-983 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2359 | 0,2359 | 0,0449 | 0,0754 |
| SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 3716-172 3716-172 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 14,82 7,08 | 14,82 7,08 | 1,88 | 3,13 |
| B-73 | 3716-164 3716-164 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 17,18 8,89 | 17,18 8,89 | 2,36 | 3,93 |
| B-73 | 3716-156 3716-156 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 29,12 18,66 | 29,12 18,66 | 4,49 | 7,54 |
| B-73 * | 7722-481 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2408 | 0,2408 | | |
| B-73 ** | 7722-481 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1978 | 0,1978 | | |
| B-73 *** | 7722-481 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2359 | 0,2359 | 0,0449 | 0,0754 |
| SERTRALINE EG 50 mg | | EG | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 2224-277 2224-277 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 14,51 6,85 | 14,51 6,85 | 1,82 | 3,03 |
| B-73 | 2224-285 2224-285 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 16,20 8,14 | 16,20 8,14 | 2,16 | 3,60 |
| B-73 | 2554-103 2554-103 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 28,41 18,03 | 28,41 18,03 | 4,38 | 7,37 |
| B-73 * | 0779-975 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2327 | 0,2327 | | |
| B-73 ** | 0779-975 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1911 | 0,1911 | | |
| B-73 *** | 0779-975 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2287 | 0,2287 | 0,0438 | 0,0737 |
| SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 3716-206 3716-206 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 14,51 6,85 | 14,51 6,85 | 1,82 | 3,03 |
| B-73 | 3716-198 3716-198 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 16,20 8,14 | 16,20 8,14 | 2,16 | 3,60 |
| B-73 | 3716-180 3716-180 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 28,41 18,03 | 28,41 18,03 | 4,38 | 7,37 |
| B-73 * | 7722-473 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2327 | 0,2327 | | |
| B-73 ** | 7722-473 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1911 | 0,1911 | | |
| B-73 *** | 7722-473 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2287 | 0,2287 | 0,0438 | 0,0737 |
| SERTRALINE SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AB06 | | | | |
| B-73 | 2252-005 2252-005 | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 14,83 7,09 | 14,83 7,09 | 1,88 | 3,13 |
| B-73 | 2275-071 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 17,18 | 17,18 | 2,36 | 3,93 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-73 | 2275-071 2275-089 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 8,89 29,11 | 8,89 29,11 | 4,48 | 7,54 |
| B-73 * | 2275-089 0781-203 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 18,65 0,2407 | 18,65 0,2407 | | |
| B-73 ** | 0781-203 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1977 | 0,1977 | | |
| B-73 *** | 0781-203 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2357 | 0,2357 | 0,0448 | 0,0754 |
| SERTRALINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N06AB06 | | | | | | | | |
| B-73 | 2251-981 2251-981 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 14,51 6,85 | 14,51 6,85 | 1,82 | 3,03 |
| B-73 | 2275-055 2275-055 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 16,35 8,25 | 16,35 8,25 | 2,19 | 3,65 |
| B-73 | 2275-063 2275-063 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 28,24 17,89 | 28,24 17,89 | 4,36 | 7,33 |
| B-73 * | 0781-195 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2309 | 0,2309 | | |
| B-73 ** | 0781-195 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1896 | 0,1896 | | |
| B-73 *** | 0781-195 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2271 | 0,2271 | 0,0436 | 0,0733 |
| SERTRALINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06 | | | | | | | | |
| B-73 | 2573-038 2573-038 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 16,35 8,25 | 16,35 8,25 | 2,19 | 3,65 |
| B-73 | 2572-998 2572-998 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 28,27 17,92 | 28,27 17,92 | 4,37 | 7,34 |
| B-73 * | 0792-374 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 0792-374 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 0792-374 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2274 | 0,2274 | 0,0437 | 0,0734 |
| SERTRALINE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06 | | | | | | | | |
| B-73 | 2573-053 2573-053 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 16,35 8,25 | 16,35 8,25 | 2,19 | 3,65 |
| B-73 | 2573-079 2573-079 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 28,27 17,92 | 28,27 17,92 | 4,37 | 7,34 |
| B-73 * | 0792-366 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2313 | 0,2313 | | |
| B-73 ** | 0792-366 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1900 | 0,1900 | | |
| B-73 *** | 0792-366 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2274 | 0,2274 | 0,0437 | 0,0734 |
| SERTRALINE VIATRIS 100 mg VIATRIS ATC: N06AB06 | | | | | | | | |
| B-73 | 2216-182 2216-182 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 17,18 8,89 | 17,18 8,89 | 2,36 | 3,93 |
| B-73 | 2216-190 2216-190 | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 29,48 18,96 | 29,48 18,96 | 4,53 | 7,62 |
| B-73 * | 0780-825 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2447 | 0,2447 | | |
| B-73 ** | 0780-825 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,2010 | 0,2010 | | |
| B-73 *** | 0780-825 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,1942 | 0,1942 | 0,0393 | 0,0655 |
| SERTRALINE VIATRIS 50 mg VIATRIS ATC: N06AB06 | | | | | | | | |
| B-73 | 2216-141 2216-141 | 30 comprimés pelliculés, 50 mg | 30 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 14,51 6,85 | 14,51 6,85 | 1,82 | 3,03 |
| B-73 | 2216-158 2216-158 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 17,18 8,89 | 17,18 8,89 | 2,36 | 3,93 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73 | 2216-166 2216-166 | 100 comprimés pelliculés, 50 mg | 100 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 29,38 18,89 | 29,38 18,89 | 4,52 | 7,60 |
| B-73 * | 0780-817 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2438 | 0,2438 | | |
| B-73 ** | 0780-817 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2002 | 0,2002 | | |
| B-73 *** | 0780-817 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1942 | 0,1942 | 0,0393 | 0,0655 |
| SEVIKAR 20 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 2582-146 2582-146 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg | R | 19,43 10,60 | 19,43 10,60 | 2,81 | 4,69 |
| B-224 | 2582-153 2582-153 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg | R | 37,75 26,16 | 37,75 26,16 | 5,69 | 9,56 |
| B-224 * | 0792-044 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0792-044 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0792-044 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| SEVIKAR 40 mg/10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 2582-138 2582-138 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg | R | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-224 | 2582-120 2582-120 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg | R | 50,07 36,89 | 50,07 36,89 | 7,40 | 12,46 |
| B-224 * | 0792-069 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 0792-069 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 0792-069 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02 | | | | | | | | |
| B-224 | 2582-187 2582-187 | 28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg | R | 19,43 10,60 | 19,43 10,60 | 2,81 | 4,69 |
| B-224 | 2582-195 2582-195 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg | R | 37,75 26,16 | 37,75 26,16 | 5,69 | 9,56 |
| B-224 * | 0792-051 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0792-051 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0792-051 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03 | | | | | | | | |
| B-224 | 2816-510 2816-510 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,43 10,60 | 19,43 10,60 | 2,81 | 4,69 |
| B-224 | 2816-536 2816-536 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 37,75 26,16 | 37,75 26,16 | 5,69 | 9,56 |
| B-224 * | 0754-663 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0754-663 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0754-663 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-224 | 2816-478 2816-478 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-224 | 2816-494 2816-494 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 50,07 36,89 | 50,07 36,89 | 7,40 | 12,46 |
| B-224 * | 0754-648 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | R | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 0754-648 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | R | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 0754-648 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg | R | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg | | DAIICHI SANKYO BELGIUM | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 2816-684 2816-684 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,19 10,42 | 19,19 10,42 | 2,76 | 4,61 |
| B-224 | 2816-700 2816-700 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 50,07 36,89 | 50,07 36,89 | 7,40 | 12,46 |
| B-224 * | 0754-622 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | R | 0,4715 | 0,4715 | | |
| B-224 ** | 0754-622 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | R | 0,3990 | 0,3990 | | |
| B-224 *** | 0754-622 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg | R | 0,4545 | 0,4545 | 0,0755 | 0,1271 |
| SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg | | DAIICHI SANKYO BELGIUM | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 2816-635 2816-635 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,43 10,60 | 19,43 10,60 | 2,81 | 4,69 |
| B-224 | 2816-668 2816-668 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 37,75 26,16 | 37,75 26,16 | 5,69 | 9,56 |
| B-224 * | 0754-655 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0754-655 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0754-655 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg | | DAIICHI SANKYO BELGIUM | | ATC: C09DX03 | | | | |
| B-224 | 2816-569 2816-569 | 28 comprimés pelliculés | 28 filmomhulde tabletten | R | 19,43 10,60 | 19,43 10,60 | 2,81 | 4,69 |
| B-224 | 2816-593 2816-593 | 98 comprimés pelliculés | 98 filmomhulde tabletten | R | 37,75 26,16 | 37,75 26,16 | 5,69 | 9,56 |
| B-224 * | 0754-630 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | R | 0,3445 | 0,3445 | | |
| B-224 ** | 0754-630 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | R | 0,2830 | 0,2830 | | |
| B-224 *** | 0754-630 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg | R | 0,3287 | 0,3287 | 0,0581 | 0,0976 |
| SEVORANE Quick Fill | | ABBVIE | | ATC: N01AB08 | | | | |
| | 0746-792 | 1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml | 1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml | | 86,12 | 86,12 | | |
| A-30 * | 0746-792 | 1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL | 1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL | | 0,3936 | 0,3936 | | |
| A-30 ** | 0746-792 | 1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL | 1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL | | 0,3652 | 0,3652 | | |
| SIKLOS 100 mg | | ADDMEDICA | | ATC: L01XX05 | | | | |
| A-123 | 3422-086 | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|---|----|---------------|---------------|--------|--------|
| | 3422-086 | | | | 70,37 | 70,37 | | |
| A-123 * | 7717-960 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | | 1,3617 | 1,3617 | | |
| A-123 ** | 7717-960 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | | 1,2432 | 1,2432 | | |
| A-123 *** | 7717-960 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | | 1,3745 | 1,3745 | 0,0000 | 0,0000 |
| SIMALVIANE 60 mg/300 mg | | MAYOLY BENELUX | | | ATC: A03AX58 | | | |
| Cx-10 | 3495-983 | 30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg | 30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg | | 13,40 | 13,40 | 8,49 | 8,49 |
| | 3495-983 | | | | 6,00 | 6,00 | | |
| Cx-10 | 4309-126 | 90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg | 90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg | | 24,23 | 24,23 | 20,38 | 20,38 |
| | 4309-126 | | | | 14,40 | 14,40 | | |
| Cx-10 * | 7719-750 | 1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg | 1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg | | 0,2064 | 0,2064 | | |
| Cx-10 ** | 7719-750 | 1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg | 1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg | | 0,1696 | 0,1696 | | |
| Cx-10 *** | 7719-750 | 1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg | 1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg | | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 |
| SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: S01EC54 | | | |
| B-168 | 3194-370 | 3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml | CR | 37,20 | 37,20 | 5,61 | 9,43 |
| | 3194-370 | | | | 25,68 | 25,68 | | |
| B-168 * | 7713-191 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL | CR | 11,0467 | 11,0467 | | |
| B-168 ** | 7713-191 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL | CR | 9,0733 | 9,0733 | | |
| SIMDAX 2,5 mg/ml | | ORION CORPORATION | | | ATC: C01CX08 | | | |
| | 7715-915 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml | | 279,80 | 279,80 | | |
| B-2 ** | 7715-915 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2,5 mg/mL | R | 296,5900 | 296,5900 | | |
| SIMULECT 20 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L04AC02 | | | |
| | 0764-704 | 1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg | 1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg | | 781,77 | 781,77 | | |
| A-29 * | 0764-704 | 1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg | 1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg | | 835,7900 | 835,7900 | | |
| A-29 ** | 0764-704 | 1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg | 1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg | | 828,6800 | 828,6800 | | |
| SIMVASTATIN AB 20 mg | | AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA01 | | | |
| B-41 | 4314-357 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 9,92 | 9,92 | 0,89 | 1,48 |
| | 4314-357 | | | | 3,35 | 3,35 | | |
| B-41 | 4314-365 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 15,79 | 15,79 | 2,08 | 3,46 |
| | 4314-365 | | | | 7,83 | 7,83 | | |
| B-41 * | 7730-971 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1010 | 0,1010 | | |
| B-41 ** | 7730-971 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | |
| B-41 *** | 7730-971 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | 0,0208 | 0,0346 |
| SIMVASTATIN AB 40 mg | | AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA01 | | | |
| B-41 | 4314-381 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 11,56 | 11,56 | 1,22 | 2,03 |
| | 4314-381 | | | | 4,60 | 4,60 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-41 | 4314-373 4314-373 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 20,01 11,05 | 20,01 11,05 | 2,93 | 4,88 |
| B-41 * | 7730-989 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1426 | 0,1426 | | |
| B-41 ** | 7730-989 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1171 | 0,1171 | | |
| B-41 *** | 7730-989 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1448 | 0,1448 | 0,0293 | 0,0488 |
| SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 1766-245 1766-245 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 10,34 3,67 | 10,34 3,67 | 0,97 | 1,62 |
| B-41 | 1766-252 1766-252 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 15,79 7,83 | 15,79 7,83 | 2,08 | 3,46 |
| B-41 * | 0772-392 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1010 | 0,1010 | | |
| B-41 ** | 0772-392 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | |
| B-41 *** | 0772-392 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | 0,0208 | 0,0346 |
| SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 1766-260 1766-260 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 12,01 4,94 | 12,01 4,94 | 1,31 | 2,18 |
| B-41 | 1766-278 1766-278 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 21,33 12,06 | 21,33 12,06 | 3,20 | 5,33 |
| B-41 * | 0772-400 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| B-41 ** | 0772-400 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1278 | 0,1278 | | |
| B-41 *** | 0772-400 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1579 | 0,1579 | 0,0320 | 0,0533 |
| SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 2282-481 2282-481 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 58,81 44,49 | 58,81 44,49 | 8,62 | 14,51 |
| B-41 * | 0781-534 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,5427 | 0,5427 | | |
| B-41 ** | 0781-534 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,4716 | 0,4716 | | |
| B-41 *** | 0781-534 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,5328 | 0,5328 | 0,0862 | 0,1451 |
| SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 3562-337 3562-337 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 10,42 3,73 | 10,42 3,73 | 0,99 | 1,65 |
| B-41 | 3491-404 3491-404 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 15,79 7,83 | 15,79 7,83 | 2,08 | 3,46 |
| B-41 | 3562-345 3562-345 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 15,79 7,83 | 15,79 7,83 | 2,08 | 3,46 |
| B-41 * | 0784-579 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1010 | 0,1010 | | |
| B-41 ** | 0784-579 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | |
| B-41 *** | 0784-579 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | 0,0208 | 0,0346 |
| SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 3562-352 3562-352 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 12,01 4,94 | 12,01 4,94 | 1,31 | 2,18 |
| B-41 | 3491-446 3491-446 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 21,33 12,06 | 21,33 12,06 | 3,20 | 5,33 |
| B-41 | 3562-360 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 21,33 | 21,33 | 3,20 | 5,33 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 3562-360 | | | | | 12,06 | 12,06 | | |
| B-41 * | 0784-587 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | | |
| B-41 ** | 0784-587 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1278 | 0,1278 | | | |
| B-41 *** | 0784-587 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1579 | 0,1579 | 0,0320 | 0,0533 | |
| SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 4180-485 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 21,33 | 21,33 | 3,20 | 5,33 | |
| | 4180-485 | | | | 12,06 | 12,06 | | | |
| B-41 * | 0792-713 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | | |
| B-41 ** | 0792-713 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1278 | 0,1278 | | | |
| B-41 *** | 0792-713 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1579 | 0,1579 | 0,0320 | 0,0533 | |
| SIMVASTATINE MYLAN 80 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 2195-774 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 56,41 | 56,41 | 8,29 | 13,95 | |
| | 2195-774 | | | | 42,41 | 42,41 | | | |
| B-41 * | 0778-852 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,5206 | 0,5206 | | | |
| B-41 ** | 0778-852 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,4495 | 0,4495 | | | |
| B-41 *** | 0778-852 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,5088 | 0,5088 | 0,0829 | 0,1395 | |
| SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 3364-072 | 100 comprimés, 20 mg | 100 tabletten, 20 mg | G | 15,79 | 15,79 | 2,08 | 3,46 | |
| | 3364-072 | | | | 7,83 | 7,83 | | | |
| B-41 * | 7714-033 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1010 | 0,1010 | | | |
| B-41 ** | 7714-033 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | | |
| B-41 *** | 7714-033 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | 0,0208 | 0,0346 | |
| SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 3364-080 | 100 comprimés, 40 mg | 100 tabletten, 40 mg | G | 20,24 | 20,24 | 2,98 | 4,96 | |
| | 3364-080 | | | | 11,22 | 11,22 | | | |
| B-41 * | 7714-041 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,1448 | 0,1448 | | | |
| B-41 ** | 7714-041 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,1189 | 0,1189 | | | |
| B-41 *** | 7714-041 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,1470 | 0,1470 | 0,0298 | 0,0496 | |
| SIMVASTATINE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 2062-024 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 9,95 | 9,95 | 0,89 | 1,49 | |
| | 2062-024 | | | | 3,37 | 3,37 | | | |
| B-41 | 2062-032 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 15,79 | 15,79 | 2,08 | 3,46 | |
| | 2062-032 | | | | 7,83 | 7,83 | | | |
| B-41 * | 0774-794 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1010 | 0,1010 | | | |
| B-41 ** | 0774-794 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0830 | 0,0830 | | | |
| B-41 *** | 0774-794 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | 0,0208 | 0,0346 | |
| SIMVASTATINE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 2062-008 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 11,61 | 11,61 | 1,23 | 2,05 | |
| | 2062-008 | | | | 4,64 | 4,64 | | | |
| B-41 | 2062-016 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 21,33 | 21,33 | 3,20 | 5,33 | |
| | 2062-016 | | | | 12,06 | 12,06 | | | |
| B-41 * | 0774-802 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-41 ** | 0774-802 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1278 | 0,1278 | | |
| B-41 *** | 0774-802 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1579 | 0,1579 | 0,0320 | 0,0533 |
| SIMVASTATINE TEVA 80 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C10AA01 | | | | |
| B-41 | 2249-464 2249-464 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 56,41 42,41 | 56,41 42,41 | 8,29 | 13,95 |
| B-41 * | 0780-684 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,5206 | 0,5206 | | |
| B-41 ** | 0780-684 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,4495 | 0,4495 | | |
| B-41 *** | 0780-684 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,5088 | 0,5088 | 0,0829 | 0,1395 |
| SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 1777-093 1777-093 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 10,01 3,42 | 10,01 3,42 | 0,91 | 1,51 |
| B-41 | 1777-127 1777-127 | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | 14,09 6,53 | 14,09 6,53 | 1,73 | 2,89 |
| B-41 * | 0774-737 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1004 | 0,1004 | | |
| B-41 ** | 0774-737 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,0824 | 0,0824 | | |
| B-41 *** | 0774-737 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | 0,1018 | 0,1018 | 0,0206 | 0,0344 |
| SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: C10AA01 | |
| B-41 | 1777-101 1777-101 | 56 comprimés pelliculés, 40 mg | 56 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 11,78 4,77 | 11,78 4,77 | 1,26 | 2,11 |
| B-41 | 1777-119 1777-119 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 19,76 10,85 | 19,76 10,85 | 2,88 | 4,80 |
| B-41 * | 7714-835 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1429 | 0,1429 | | |
| B-41 ** | 7714-835 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1173 | 0,1173 | | |
| B-41 *** | 7714-835 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | 0,0294 | 0,0490 |
| SINGULAIR 10 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 1418-532 1418-532 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 18,19 9,66 | 18,19 9,66 | 2,56 | 4,27 |
| B-241 | 1442-540 1442-540 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 51,86 38,44 | 51,86 38,44 | 7,65 | 12,88 |
| B-241 * | 0766-048 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,4884 | 0,4884 | | |
| B-241 ** | 0766-048 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,4158 | 0,4158 | | |
| B-241 *** | 0766-048 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,4727 | 0,4727 | 0,0781 | 0,1314 |
| SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 3185-634 3185-634 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 51,86 38,44 | 51,86 38,44 | 7,65 | 12,88 |
| B-241 * | 7712-466 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,4884 | 0,4884 | | |
| B-241 ** | 7712-466 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,4158 | 0,4158 | | |
| B-241 *** | 7712-466 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,4727 | 0,4727 | 0,0781 | 0,1314 |
| SINGULAIR 4 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | ATC: R03DC03 | | | | |
| B-241 | 1667-492 1667-492 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg | R | 18,19 9,66 | 18,19 9,66 | 2,56 | 4,27 |
| B-241 | 2986-610 2986-610 | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg | R | 49,39 36,29 | 49,39 36,29 | 7,31 | 12,30 |
| B-241 * | 0770-362 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | R | 0,4651 | 0,4651 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-241 ** | 0770-362 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | R | 0,3926 | 0,3926 | | |
| B-241 *** | 0770-362 | 1 comprimé à croquer, 4 mg | 1 kauwtablet, 4 mg | R | 0,4475 | 0,4475 | 0,0746 | 0,1255 |
| SINGULAIR 5 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: R03DC03 | | | |
| B-241 | 1418-524 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg | R | 18,19 | 18,19 | 2,56 | 4,27 |
| | 1418-524 | | | | 9,66 | 9,66 | | |
| B-241 | 1442-557 | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg | R | 51,86 | 51,86 | 7,65 | 12,88 |
| | 1442-557 | | | | 38,44 | 38,44 | | |
| B-241 * | 0766-030 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | R | 0,4884 | 0,4884 | | |
| B-241 ** | 0766-030 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | R | 0,4158 | 0,4158 | | |
| B-241 *** | 0766-030 | 1 comprimé à croquer, 5 mg | 1 kauwtablet, 5 mg | R | 0,4727 | 0,4727 | 0,0781 | 0,1314 |
| SINTROM 1 mg | | MERUS LABS LUXCO | | | ATC: B01AA07 | | | |
| B-34 | 0129-908 | 100 comprimés, 1 mg | 100 tabletten, 1 mg | | 7,83 | 7,83 | 0,44 | 0,74 |
| | 0129-908 | | | | 1,67 | 1,67 | | |
| B-34 * | 0717-157 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0216 | 0,0216 | | |
| B-34 ** | 0717-157 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0177 | 0,0177 | | |
| B-34 *** | 0717-157 | 1 comprimé, 1 mg | 1 tablet, 1 mg | | 0,0230 | 0,0230 | 0,0044 | 0,0074 |
| SINTROM 4 mg | | MERUS LABS LUXCO | | | ATC: B01AA07 | | | |
| B-34 | 0129-890 | 20 comprimés, 4 mg | 20 tabletten, 4 mg | | 7,38 | 7,38 | 0,34 | 0,56 |
| | 0129-890 | | | | 1,27 | 1,27 | | |
| B-34 * | 0717-140 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,0820 | 0,0820 | | |
| B-34 ** | 0717-140 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,0675 | 0,0675 | | |
| B-34 *** | 0717-140 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,0922 | 0,0922 | 0,0170 | 0,0280 |
| SIPRALEXA 10 mg | | LUNDBECK | | | ATC: N06AB10 | | | |
| B-73 | 1741-115 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 11,91 | 11,91 | 1,29 | 2,15 |
| | 1741-115 | | | | 4,87 | 4,87 | | |
| B-73 | 2405-058 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 13,73 | 13,73 | 1,66 | 2,77 |
| | 2405-058 | | | | 6,26 | 6,26 | | |
| B-73 | 2999-860 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 23,68 | 23,68 | 3,69 | 6,15 |
| | 2999-860 | | | | 13,92 | 13,92 | | |
| B-73 * | 0772-897 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1833 | 0,1833 | | |
| B-73 ** | 0772-897 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1506 | 0,1506 | | |
| B-73 *** | 0772-897 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1852 | 0,1852 | 0,0377 | 0,0628 |
| SIPRALEXA 20 mg | | LUNDBECK | | | ATC: N06AB10 | | | |
| B-73 | 2745-610 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 11,91 | 11,91 | 1,29 | 2,15 |
| | 2745-610 | | | | 4,87 | 4,87 | | |
| B-73 | 3093-903 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 23,68 | 23,68 | 3,69 | 6,15 |
| | 3093-903 | | | | 13,92 | 13,92 | | |
| B-73 * | 0759-001 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1833 | 0,1833 | | |
| B-73 ** | 0759-001 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1506 | 0,1506 | | |
| B-73 *** | 0759-001 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1852 | 0,1852 | 0,0377 | 0,0628 |
| SIRDALUD | | SANDOZ | | | ATC: M03BX02 | | | |
| B-80 | 0026-476 | 100 comprimés, 4 mg | 100 tabletten, 4 mg | | 24,41 | 24,41 | 3,83 | 6,43 |
| | 0026-476 | | | | 14,56 | 14,56 | | |
| B-80 * | 0729-749 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,1879 | 0,1879 | | |
| B-80 ** | 0729-749 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,1543 | 0,1543 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-80 *** | 0729-749 | 1 comprimé, 4 mg | 1 tablet, 4 mg | | 0,1888 | 0,1888 | 0,0383 | 0,0643 |
| SIROCTID 0,1 mg/ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02 | | | | | | | | |
| B-50 | 3109-683 | 20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml | 20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml | G | 92,24 | 92,24 | 8,30 | 12,50 |
| | 3109-683 | | | | 74,24 | 74,24 | | |
| B-50 * | 7708-407 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL | G | 4,2900 | 4,2900 | | |
| B-50 ** | 7708-407 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL | G | 3,9345 | 3,9345 | | |
| SIROCTID 0,5 mg/ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02 | | | | | | | | |
| B-50 | 3109-691 | 10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | G | 193,96 | 193,96 | 8,30 | 12,50 |
| | 3109-691 | | | | 167,02 | 167,02 | | |
| B-50 * | 7708-415 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G | 18,4150 | 18,4150 | | |
| B-50 ** | 7708-415 | 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G | 17,7040 | 17,7040 | | |
| SITAGLIPTIN EG 100 mg EG ATC: A10BH01 | | | | | | | | |
| A-91 | 4582-052 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 42,39 | 42,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4582-052 | | | | 30,20 | 30,20 | | |
| A-91 * | 7734-734 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3977 | 0,3977 | | |
| A-91 ** | 7734-734 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3266 | 0,3266 | | |
| A-91 *** | 7734-734 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3761 | 0,3761 | 0,0000 | 0,0000 |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: A10BH01 | | | | | | | | |
| A-91 | 4769-766 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 42,39 | 42,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4769-766 | | | | 30,20 | 30,20 | | |
| A-91 * | 7739-956 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3977 | 0,3977 | | |
| A-91 ** | 7739-956 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3266 | 0,3266 | | |
| A-91 *** | 7739-956 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3761 | 0,3761 | 0,0000 | 0,0000 |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: A10BH01 | | | | | | | | |
| A-91 | 4769-758 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 4769-758 | | | | 15,43 | 15,43 | | |
| A-91 * | 7739-949 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | |
| A-91 ** | 7739-949 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1669 | 0,1669 | | |
| A-91 *** | 7739-949 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2028 | 0,2028 | 0,0000 | 0,0000 |
| SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: A10BH01 | | | | | | | | |
| A-91 | 4493-896 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 42,39 | 42,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4493-896 | | | | 30,20 | 30,20 | | |
| A-91 * | 7734-882 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3977 | 0,3977 | | |
| A-91 ** | 7734-882 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3266 | 0,3266 | | |
| A-91 *** | 7734-882 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3761 | 0,3761 | 0,0000 | 0,0000 |
| SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: A10BH01 | | | | | | | | |
| A-91 | 4493-904 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 4493-904 | | | | 19,00 | 19,00 | | |
| A-91 * | 7734-866 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2502 | 0,2502 | | |
| A-91 ** | 7734-866 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2055 | 0,2055 | | |
| A-91 *** | 7734-866 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2448 | 0,2448 | 0,0000 | 0,0000 |

| SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BH01 | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| A-91 | 4493-888 4493-888 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 25,41 15,43 | 25,41 15,43 | 0,00 | 0,00 | |
| A-91 * | 7734-874 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | | |
| A-91 ** | 7734-874 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1669 | 0,1669 | | | |
| A-91 *** | 7734-874 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2028 | 0,2028 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: A10BD07 | | | | | |
| A-91 | 4769-733 4769-733 | 196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg | G | 43,21 30,92 | 43,21 30,92 | 0,00 | 0,00 | |
| A-91 * | 7739-915 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg | G | 0,2035 | 0,2035 | | | |
| A-91 ** | 7739-915 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg | G | 0,1672 | 0,1672 | | | |
| A-91 *** | 7739-915 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg | G | 0,1922 | 0,1922 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: A10BD07 | | | | | |
| A-91 | 4769-741 4769-741 | 196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg | G | 47,90 35,00 | 47,90 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-91 * | 7739-907 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg | G | 0,2256 | 0,2256 | | | |
| A-91 ** | 7739-907 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg | G | 0,1893 | 0,1893 | | | |
| A-91 *** | 7739-907 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg | G | 0,2162 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BD07 | | | | | |
| A-110 | 4495-123 4495-123 | 196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg | G | 43,21 30,92 | 43,21 30,92 | 0,00 | 0,00 | |
| A-110 * | 7735-087 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg | G | 0,2035 | 0,2035 | | | |
| A-110 ** | 7735-087 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg | G | 0,1672 | 0,1672 | | | |
| A-110 *** | 7735-087 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg | G | 0,1922 | 0,1922 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg | | SANDOZ | | ATC: A10BD07 | | | | | |
| A-110 | 4495-115 4495-115 | 196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg | G | 47,90 35,00 | 47,90 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-110 * | 7735-079 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg | G | 0,2256 | 0,2256 | | | |
| A-110 ** | 7735-079 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg | G | 0,1893 | 0,1893 | | | |
| A-110 *** | 7735-079 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg | G | 0,2162 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTINE AB 100 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A10BH01 | | | | | |
| A-91 | 4619-656 4619-656 | 28 comprimés pelliculés, 100 mg | 28 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 16,84 8,63 | 16,84 8,63 | 0,00 | 0,00 | |
| A-91 | 4619-672 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 42,39 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 4619-672 | | | | | 30,20 | 30,20 | | |
| A-91 * | 7736-598 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3977 | 0,3977 | | | |
| A-91 ** | 7736-598 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3266 | 0,3266 | | | |
| A-91 *** | 7736-598 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3761 | 0,3761 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTINE AB 25 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: A10BH01 | | | | |
| A-91 | 4619-631 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4619-631 | | | | 19,00 | 19,00 | | | |
| A-91 * | 7736-572 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2502 | 0,2502 | | | |
| A-91 ** | 7736-572 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2055 | 0,2055 | | | |
| A-91 *** | 7736-572 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2448 | 0,2448 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTINE AB 50 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: A10BH01 | | | | |
| A-91 | 4619-649 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4619-649 | | | | 15,43 | 15,43 | | | |
| A-91 * | 7736-580 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | | |
| A-91 ** | 7736-580 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1669 | 0,1669 | | | |
| A-91 *** | 7736-580 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2028 | 0,2028 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTINE KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: A10BH01 | | | | |
| A-91 | 4512-315 | 98 comprimés pelliculés, 100 mg | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg | G | 42,39 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4512-315 | | | | 30,20 | 30,20 | | | |
| A-91 * | 7734-502 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3977 | 0,3977 | | | |
| A-91 ** | 7734-502 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3266 | 0,3266 | | | |
| A-91 *** | 7734-502 | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | G | 0,3761 | 0,3761 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTINE KRKA 25 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: A10BH01 | | | | |
| A-91 | 4512-299 | 98 comprimés pelliculés, 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg | G | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4512-299 | | | | 19,00 | 19,00 | | | |
| A-91 * | 7734-486 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2502 | 0,2502 | | | |
| A-91 ** | 7734-486 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2055 | 0,2055 | | | |
| A-91 *** | 7734-486 | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | G | 0,2448 | 0,2448 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SITAGLIPTINE KRKA 50 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: A10BH01 | | | | |
| A-91 | 4512-307 | 98 comprimés pelliculés, 50 mg | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg | G | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4512-307 | | | | 15,43 | 15,43 | | | |
| A-91 * | 7734-494 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2032 | 0,2032 | | | |
| A-91 ** | 7734-494 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,1669 | 0,1669 | | | |
| A-91 *** | 7734-494 | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | G | 0,2028 | 0,2028 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SOFTACOR 3,35 mg/mL | | THEA PHARMA | | | ATC: S01BA02 | | | | |
| B-165 | 3690-963 | 30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL | 30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL | G | 15,84 | 15,84 | 2,09 | 3,48 | |
| | 3690-963 | | | | 7,87 | 7,87 | | | |
| B-165 * | 7725-641 | 1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL | G | 0,3387 | 0,3387 | | | |
| B-165 ** | 7725-641 | 1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL | 1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL | G | 0,2780 | 0,2780 | | | |
| SOLIAN 100 | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 1775-089 | 60 comprimés, 100 mg | 60 tabletten, 100 mg | R | 28,29 | 28,29 | 4,37 | 7,34 | |
| | 1775-089 | | | | 17,93 | 17,93 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-72 * | 0773-432 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3857 | 0,3857 | | |
| B-72 ** | 0773-432 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3168 | 0,3168 | | |
| B-72 *** | 0773-432 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3793 | 0,3793 | 0,0728 | 0,1223 |
| SOLIAN 100 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 3252-160 | 60 comprimés, 100 mg | 60 tabletten, 100 mg | R | 28,29 | 28,29 | 4,37 | 7,34 |
| | 3252-160 | | | | 17,93 | 17,93 | | |
| B-72 * | 7709-397 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3857 | 0,3857 | | |
| B-72 ** | 7709-397 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3168 | 0,3168 | | |
| B-72 *** | 7709-397 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,3793 | 0,3793 | 0,0728 | 0,1223 |
| SOLIAN 200 | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 1516-574 | 120 comprimés, 200 mg | 120 tabletten, 200 mg | R | 80,02 | 80,02 | 10,20 | 15,50 |
| | 1516-574 | | | | 63,09 | 63,09 | | |
| B-72 * | 0768-044 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,6166 | 0,6166 | | |
| B-72 ** | 0768-044 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,5573 | 0,5573 | | |
| B-72 *** | 0768-044 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,6207 | 0,6207 | 0,0850 | 0,1292 |
| SOLIAN 200 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 3252-194 | 30 comprimés, 200 mg | 30 tabletten, 200 mg | R | 27,83 | 27,83 | 4,30 | 7,23 |
| | 3252-194 | | | | 17,53 | 17,53 | | |
| B-72 | 3252-210 | 120 comprimés, 200 mg | 120 tabletten, 200 mg | R | 78,48 | 78,48 | 10,20 | 15,50 |
| | 3252-210 | | | | 61,70 | 61,70 | | |
| B-72 * | 7709-405 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,6043 | 0,6043 | | |
| B-72 ** | 7709-405 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,5450 | 0,5450 | | |
| B-72 *** | 7709-405 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,6079 | 0,6079 | 0,0850 | 0,1292 |
| SOLIAN 400 | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 1775-097 | 60 comprimés, 400 mg | 60 tabletten, 400 mg | R | 80,02 | 80,02 | 8,30 | 12,50 |
| | 1775-097 | | | | 63,09 | 63,09 | | |
| B-72 * | 0773-440 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,2332 | 1,2332 | | |
| B-72 ** | 0773-440 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,1147 | 1,1147 | | |
| B-72 *** | 0773-440 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,2414 | 1,2414 | 0,1383 | 0,2083 |
| SOLIAN 400 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 3252-236 | 60 comprimés, 400 mg | 60 tabletten, 400 mg | R | 78,49 | 78,49 | 8,30 | 12,50 |
| | 3252-236 | | | | 61,71 | 61,71 | | |
| B-72 * | 7709-413 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,2087 | 1,2087 | | |
| B-72 ** | 7709-413 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,0902 | 1,0902 | | |
| B-72 *** | 7709-413 | 1 comprimé, 400 mg | 1 tablet, 400 mg | R | 1,2160 | 1,2160 | 0,1383 | 0,2083 |
| SOLIAN 400 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 4791-661 | 60 comprimés pelliculés, 400 mg | 60 filmomhulde tabletten, 400 mg | R | 80,02 | 80,02 | 8,30 | 12,50 |
| | 4791-661 | | | | 63,09 | 63,09 | | |
| B-72 * | 7739-980 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | R | 1,2332 | 1,2332 | | |
| B-72 ** | 7739-980 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | R | 1,1147 | 1,1147 | | |
| B-72 *** | 7739-980 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | R | 1,2414 | 1,2414 | 0,1383 | 0,2083 |
| SOLIAN 50 | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 1516-582 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | R | 11,26 | 11,26 | 1,16 | 1,93 |
| | 1516-582 | | | | 4,37 | 4,37 | | |
| B-72 * | 0768-051 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1880 | 0,1880 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-72 ** | 0768-051 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1543 | 0,1543 | | |
| B-72 *** | 0768-051 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,1908 | 0,1908 | 0,0387 | 0,0643 |
| SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg Pfizer | | | | ATC: H02AB09 | | | | |
| B-83 | 3926-557 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 8,07 | 8,07 | 0,50 | 0,83 |
| | 3926-557 | | | | 1,87 | 1,87 | | |
| B-83 * | 7726-888 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 2,4100 | 2,4100 | | |
| B-83 ** | 7726-888 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 1,9800 | 1,9800 | | |
| SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB09 | | | | |
| B-83 | 3926-565 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL | R | 10,89 | 10,89 | 1,08 | 1,81 |
| | 3926-565 | | | | 4,09 | 4,09 | | |
| B-83 * | 7726-896 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL | R | 5,2800 | 5,2800 | | |
| B-83 ** | 7726-896 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL | R | 4,3400 | 4,3400 | | |
| SOLU-MEDROL 1000 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0081-240 | 1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml | 1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml | r | 53,32 | 53,32 | 7,85 | 12,50 |
| | 0081-240 | | | | 39,71 | 39,71 | | |
| B-83 * | 0717-389 | 1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL | 1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL | r | 49,2000 | 49,2000 | | |
| B-83 ** | 0717-389 | 1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL | 1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL | r | 42,0900 | 42,0900 | | |
| SOLU-MEDROL 500 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0081-232 | 1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml | 1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml | r | 33,04 | 33,04 | 5,03 | 8,46 |
| | 0081-232 | | | | 22,06 | 22,06 | | |
| B-83 * | 0717-371 | 1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL | 1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL | r | 28,4700 | 28,4700 | | |
| B-83 ** | 0717-371 | 1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL | 1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL | r | 23,3800 | 23,3800 | | |
| SOLU-MEDROL SAB 125 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 0152-884 | 1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml | 1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml | r | 13,53 | 13,53 | 1,62 | 2,70 |
| | 0152-884 | | | | 6,10 | 6,10 | | |
| B-83 * | 0728-584 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL | r | 7,8700 | 7,8700 | | |
| B-83 ** | 0728-584 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL | r | 6,4700 | 6,4700 | | |
| SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-83 | 0078-360 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml | 1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml | r | 13,53 | 13,53 | 1,62 | 2,70 |
| | 0078-360 | | | | 6,10 | 6,10 | | |
| B-83 * | 0717-363 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL | r | 7,8700 | 7,8700 | | |
| B-83 ** | 0717-363 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL | r | 6,4700 | 6,4700 | | |
| SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF) Pfizer | | | | ATC: H02AB04 | | | | |
| B-83 | 4117-735 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL | r | 8,87 | 8,87 | 0,68 | 1,13 |
| | 4117-735 | | | | 2,55 | 2,55 | | |
| B-83 | 4117-743 | 3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL | 3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL | r | 14,13 | 14,13 | 1,74 | 2,90 |
| | 4117-743 | | | | 6,56 | 6,56 | | |
| B-83 * | 7729-171 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL | r | 2,8233 | 2,8233 | | |
| B-83 ** | 7729-171 | 1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL | 1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL | r | 2,3167 | 2,3167 | | |
| SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg EUMEDICA | | | | ATC: H01CB01 | | | | |
| | 0783-506 | 1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml | 1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml | | 76,05 | 76,05 | | |
| B-50 * | 0783-506 | 1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL | 1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL | G | 87,7200 | 87,7200 | | |
| B-50 ** | 0783-506 | 1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL | 1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL | G | 80,6100 | 80,6100 | | |
| SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg EUMEDICA | | | | ATC: H01CB01 | | | | |
| | 0728-600 | 1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml | 1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml | | 76,05 | 76,05 | | |
| B-50 * | 0728-600 | 1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL | 1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL | R | 87,7200 | 87,7200 | | |
| B-50 ** | 0728-600 | 1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL | 1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL | R | 80,6100 | 80,6100 | | |
| SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB03 | | |
| B-50 | 1720-432 | 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml | | 1024,79 | 1024,79 | 8,30 | 12,50 |
| | 1720-432 | | | | 924,83 | 924,83 | | |
| B-50 * | 0771-915 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL | | 987,4300 | 987,4300 | | |
| B-50 ** | 0771-915 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL | | 980,3200 | 980,3200 | | |
| SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN | | | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB03 | | |
| B-50 | 1720-424 | 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml | | 673,87 | 673,87 | 8,30 | 12,50 |
| | 1720-424 | | | | 604,75 | 604,75 | | |
| B-50 * | 0771-899 | 1 seringue préremplie 0,5 mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL | | 648,1500 | 648,1500 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|--------|--------|
| B-50 ** | 0771-899 | solution injectable, 200 mg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL | oplossing voor injectie, 200 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL | | 641,0400 | 641,0400 | | |
| SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg | | IPSEN | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: H01CB03 | | |
| B-50 | 1720-440 | 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml | 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml | | 805,38 | 805,38 | 8,30 | 12,50 |
| | 1720-440 | | | | 724,70 | 724,70 | | |
| B-50 * | 0771-907 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL | | 775,2900 | 775,2900 | | |
| B-50 ** | 0771-907 | 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL | | 768,1800 | 768,1800 | | |
| SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram | | VIFOR PHARMA BELGIUM | | ATC: V03AE01 | | | | |
| A-34 | 2577-435 | 1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g | 1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g | | 32,19 | 32,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 2577-435 | | | | 21,33 | 21,33 | | |
| A-34 * | 0791-756 | 20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g | 20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g | | 1,1012 | 1,1012 | | |
| A-34 ** | 0791-756 | 20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g | 20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g | | 0,9044 | 0,9044 | | |
| SOTALEX 160 mg | | EUROCEPT | | ATC: C07AA07 | | | | |
| B-14 | 2666-261 | 50 comprimés, 160 mg | 50 tabletten, 160 mg | R | 9,69 | 9,69 | 0,84 | 1,40 |
| | 2666-261 | | | | 3,17 | 3,17 | | |
| B-14 * | 0717-546 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | R | 0,0818 | 0,0818 | | |
| B-14 ** | 0717-546 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | R | 0,0672 | 0,0672 | | |
| B-14 *** | 0717-546 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | R | 0,0831 | 0,0831 | 0,0168 | 0,0280 |
| SOTALOL SANDOZ 160 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AA07 | | | | |
| B-14 | 1530-377 | 56 comprimés, 160 mg | 56 tabletten, 160 mg | G | 9,39 | 9,39 | 0,78 | 1,30 |
| | 1530-377 | | | | 2,94 | 2,94 | | |
| B-14 | 3038-452 | 98 comprimés, 160 mg | 98 tabletten, 160 mg | G | 12,27 | 12,27 | 1,37 | 2,28 |
| | 3038-452 | | | | 5,15 | 5,15 | | |
| B-14 * | 0763-706 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | G | 0,0679 | 0,0679 | | |
| B-14 ** | 0763-706 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | G | 0,0557 | 0,0557 | | |
| B-14 *** | 0763-706 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | G | 0,0688 | 0,0688 | 0,0140 | 0,0233 |
| SOTALOL SANDOZ 80 mg | | SANDOZ | | ATC: C07AA07 | | | | |
| B-14 | 2318-533 | 60 comprimés, 80 mg | 60 tabletten, 80 mg | R | 9,15 | 9,15 | 0,73 | 1,22 |
| | 2318-533 | | | | 2,76 | 2,76 | | |
| B-14 * | 0784-413 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | R | 0,0593 | 0,0593 | | |
| B-14 ** | 0784-413 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | R | 0,0488 | 0,0488 | | |
| B-14 *** | 0784-413 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | R | 0,0602 | 0,0602 | 0,0122 | 0,0203 |
| SOTALOL VIATRIS 160 mg | | VIATRIS | | ATC: C07AA07 | | | | |
| B-14 | 1560-929 | 56 comprimés, 160 mg | 56 tabletten, 160 mg | G | 9,23 | 9,23 | 0,75 | 1,25 |
| | 1560-929 | | | | 2,82 | 2,82 | | |
| B-14 * | 0765-099 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | G | 0,0650 | 0,0650 | | |
| B-14 ** | 0765-099 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | G | 0,0534 | 0,0534 | | |
| B-14 *** | 0765-099 | 1 comprimé, 160 mg | 1 tablet, 160 mg | G | 0,0661 | 0,0661 | 0,0134 | 0,0223 |
| SPACYR 10 mg/20 mL | | AGUETTANT | | ATC: M03BX01 | | | | |
| | 7730-948 | 1 seringue préremplie 20 mL | 1 voorgevulde spuit 20 mL | | 34,89 | 34,89 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-80 * | 7730-948 | <i>solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL</i> | <i>oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL</i> | G | 44,0900 | 44,0900 | | |
| B-80 ** | 7730-948 | 1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL | G | 36,9800 | 36,9800 | | |
| SPACYR 40 mg/20 mL | | AGUETTANT | | ATC: M03BX01 | | | | |
| | 7731-045 | 1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | | 139,56 | 139,56 | | |
| B-80 * | 7731-045 | 1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 155,0400 | 155,0400 | | |
| B-80 ** | 7731-045 | 1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL | G | 147,9300 | 147,9300 | | |
| SPASMOMEN | | MENARINI BENELUX | | ATC: A03AB06 | | | | |
| Cx-10 | 0661-140 | 30 comprimés, 40 mg | 30 tabletten, 40 mg | | 12,30 | 12,30 | 7,30 | 7,30 |
| | 0661-140 | | | | 5,16 | 5,16 | | |
| Cx-10 | 1103-167 | 60 comprimés, 40 mg | 60 tabletten, 40 mg | | 16,32 | 16,32 | 11,65 | 11,65 |
| | 1103-167 | | | | 8,24 | 8,24 | | |
| Cx-10 * | 0732-362 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,1772 | 0,1772 | | |
| Cx-10 ** | 0732-362 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,1455 | 0,1455 | | |
| Cx-10 *** | 0732-362 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | | 0,1798 | 0,1798 | 0,1798 | 0,1798 |
| SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: R03AL06 | | | | |
| B-267 | 3264-793 | 60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose | 60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis | | 49,80 | 49,80 | 7,36 | 12,40 |
| | 3264-793 | | | | 36,65 | 36,65 | | |
| B-267 | 3264-785 | 180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose | 180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis | | 128,98 | 128,98 | 8,30 | 12,50 |
| | 3264-785 | | | | 107,75 | 107,75 | | |
| B-267 * | 7715-246 | 1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose | 1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis | | 40,4433 | 40,4433 | | |
| B-267 ** | 7715-246 | 1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose | 1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis | | 38,0733 | 38,0733 | | |
| SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: R03AL06 | | | | |
| B-267 | 4323-820 | 180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg | 180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg | | 127,76 | 127,76 | 8,30 | 12,50 |
| | 4323-820 | | | | 106,65 | 106,65 | | |
| B-267 * | 7733-827 | 1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg | 1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg | | 40,0533 | 40,0533 | | |
| B-267 ** | 7733-827 | 1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg | 1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg | | 37,6833 | 37,6833 | | |
| SPIRONOLACTONE EG 100 mg | | EG | | ATC: C03DA01 | | | | |
| B-27 | 1149-608 | 50 comprimés, 100 mg | 50 tabletten, 100 mg | G | 13,71 | 13,71 | 1,65 | 2,76 |
| | 1149-608 | | | | 6,24 | 6,24 | | |
| B-27 | 3142-395 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | G | 21,88 | 21,88 | 3,31 | 5,51 |
| | 3142-395 | | | | 12,47 | 12,47 | | |
| B-27 * | 0740-290 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1609 | 0,1609 | | |
| B-27 ** | 0740-290 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1322 | 0,1322 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-27 *** | 0740-290 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,1635 | 0,1635 | 0,0331 | 0,0551 |
| SPIRONOLACTONE EG 25 mg | | EG | | ATC: C03DA01 | | | | |
| B-27 | 1057-942 | 50 comprimés, 25 mg | 50 tabletten, 25 mg | G | 8,35 | 8,35 | 0,56 | 0,94 |
| | 1057-942 | | | | 2,12 | 2,12 | | |
| B-27 | 3142-387 | 100 comprimés, 25 mg | 100 tabletten, 25 mg | G | 10,71 | 10,71 | 1,05 | 1,75 |
| | 3142-387 | | | | 3,95 | 3,95 | | |
| B-27 * | 0740-282 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0510 | 0,0510 | | |
| B-27 ** | 0740-282 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0419 | 0,0419 | | |
| B-27 *** | 0740-282 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | 0,0517 | 0,0517 | 0,0105 | 0,0175 |
| SPORANOX | | JANSSEN-CILAG | | ATC: J02AC02 | | | | |
| B-134 | 0635-730 | 15 gélules, 100 mg | 15 capsules, hard, 100 mg | R | 15,34 | 15,34 | 1,98 | 3,31 |
| | 0635-730 | | | | 7,48 | 7,48 | | |
| B-134 | 1380-633 | 28 gélules, 100 mg | 28 capsules, hard, 100 mg | R | 20,63 | 20,63 | 3,06 | 5,09 |
| | 1380-633 | | | | 11,52 | 11,52 | | |
| B-134 | 2119-808 | 60 gélules, 100 mg | 60 capsules, hard, 100 mg | R | 41,80 | 41,80 | 6,25 | 10,52 |
| | 2119-808 | | | | 29,69 | 29,69 | | |
| B-134 * | 0734-574 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,6385 | 0,6385 | | |
| B-134 ** | 0734-574 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,5245 | 0,5245 | | |
| B-134 *** | 0734-574 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 0,6044 | 0,6044 | 0,1042 | 0,1753 |
| STAPHYCID | | LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER | | ATC: J01CF05 | | | | |
| C-37 | 0263-731 | 1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml | 1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml | R | 13,79 | 13,79 | 5,57 | 5,57 |
| | 0263-731 | | | | 6,30 | 6,30 | | |
| C-37 * | 0737-775 | 5 mL sirop, 50 mg/mL | 5 mL stroop, 50 mg/mL | R | 0,5081 | 0,5081 | | |
| C-37 ** | 0737-775 | 5 mL sirop, 50 mg/mL | 5 mL stroop, 50 mg/mL | R | 0,4175 | 0,4175 | | |
| STAPHYCID | | LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER | | ATC: J01CF05 | | | | |
| C-37 | 0841-965 | 16 gélules, 500 mg | 16 capsules, hard, 500 mg | R | 14,56 | 14,56 | 6,09 | 6,09 |
| | 0841-965 | | | | 6,89 | 6,89 | | |
| C-37 | 4148-862 | 32 gélules, 500 mg | 32 capsules, hard, 500 mg | R | 23,51 | 23,51 | 10,20 | 12,18 |
| | 4148-862 | | | | 13,78 | 13,78 | | |
| C-37 * | 0717-843 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | R | 0,5556 | 0,5556 | | |
| C-37 ** | 0717-843 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | R | 0,4566 | 0,4566 | | |
| C-37 *** | 0717-843 | 1 gélule, 500 mg | 1 capsule, hard, 500 mg | R | 0,5618 | 0,5618 | 0,3187 | 0,3806 |
| STRUMAZOL 10 mg | | ORIFARM HEALTHCARE BV | | ATC: H03BB02 | | | | |
| B-87 | 0083-725 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | | 10,30 | 10,30 | 0,97 | 1,61 |
| | 0083-725 | | | | 3,64 | 3,64 | | |
| B-87 * | 0718-015 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0470 | 0,0470 | | |
| B-87 ** | 0718-015 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0386 | 0,0386 | | |
| B-87 *** | 0718-015 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | | 0,0477 | 0,0477 | 0,0097 | 0,0161 |
| SUBOXONE 2 mg/0,5 mg | | INDIVIOR | | ATC: N07BC51 | | | | |
| B-148 | 2464-998 | 28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg | 28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg | R | 25,05 | 25,05 | 3,92 | 6,58 |
| | 2464-998 | | | | 15,11 | 15,11 | | |
| B-148 * | 0787-960 | 1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | R | 0,6964 | 0,6964 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-148 ** | 0787-960 | 1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | R | 0,5721 | 0,5721 | | |
| B-148 *** | 0787-960 | 1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg | R | 0,6970 | 0,6970 | 0,1400 | 0,2350 |
| SUBOXONE 8 mg/2 mg | | INDIVIOR | | ATC: N07BC51 | | | | |
| B-148 | 2464-972 | 28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg | 28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg | R | 66,66 | 66,66 | 8,30 | 12,50 |
| | 2464-972 | | | | 51,33 | 51,33 | | |
| B-148 * | 0787-986 | 1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | R | 2,1971 | 2,1971 | | |
| B-148 ** | 0787-986 | 1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | R | 1,9432 | 1,9432 | | |
| B-148 *** | 0787-986 | 1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg | R | 2,1832 | 2,1832 | 0,2964 | 0,4464 |
| SUBUTEX 2 mg | | INDIVIOR | | ATC: N07BC01 | | | | |
| B-148 | 1640-580 | 7 comprimés sublinguaux, 2 mg | 7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg | R | 11,38 | 11,38 | 1,19 | 1,98 |
| | 1640-580 | | | | 4,47 | 4,47 | | |
| B-148 * | 0774-216 | 1 comprimé sublingual, 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg | R | 0,8243 | 0,8243 | | |
| B-148 ** | 0774-216 | 1 comprimé sublingual, 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg | R | 0,6771 | 0,6771 | | |
| B-148 *** | 0774-216 | 1 comprimé sublingual, 2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg | R | 0,8359 | 0,8359 | 0,1700 | 0,2829 |
| SUBUTEX 8 mg | | INDIVIOR | | ATC: N07BC01 | | | | |
| B-148 | 1640-598 | 7 comprimés sublinguaux, 8 mg | 7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg | R | 23,34 | 23,34 | 3,61 | 6,02 |
| | 1640-598 | | | | 13,63 | 13,63 | | |
| B-148 * | 0774-224 | 1 comprimé sublingual, 8 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg | R | 2,5129 | 2,5129 | | |
| B-148 ** | 0774-224 | 1 comprimé sublingual, 8 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg | R | 2,0643 | 2,0643 | | |
| B-148 *** | 0774-224 | 1 comprimé sublingual, 8 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg | R | 2,5440 | 2,5440 | 0,5157 | 0,8600 |
| SUFENTA | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | ATC: N01AH03 | | | | |
| | 0718-064 | 5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml | 5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml | | 4,65 | 4,65 | | |
| A-30 * | 0718-064 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | R | 1,2000 | 1,2000 | | |
| A-30 ** | 0718-064 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | R | 0,9860 | 0,9860 | | |
| SUFENTA | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | ATC: N01AH03 | | | | |
| | 0718-056 | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml | | 1,15 | 1,15 | | |
| A-30 * | 0718-056 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | R | 0,2960 | 0,2960 | | |
| A-30 ** | 0718-056 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | R | 0,2440 | 0,2440 | | |
| SUFENTA FORTE | | PIRAMAL CRITICAL CARE | | ATC: N01AH03 | | | | |
| | 0718-072 | 5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml | 5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml | | 14,74 | 14,74 | | |
| A-30 * | 0718-072 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | R | 3,8040 | 3,8040 | | |
| A-30 ** | 0718-072 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | R | 3,1240 | 3,1240 | | |

| SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | | | ATC: N01AH03 | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--|--|--|
| | 7741-101 | 10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | | 2,30 | 2,30 | | | |
| A-30 * | 7741-101 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 0,2970 | 0,2970 | | | |
| A-30 ** | 7741-101 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 0,2440 | 0,2440 | | | |
| SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | | | ATC: N01AH03 | | | |
| | 7741-119 | 10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | | 9,60 | 9,60 | | | |
| A-30 * | 7741-119 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 1,2390 | 1,2390 | | | |
| A-30 ** | 7741-119 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 1,0180 | 1,0180 | | | |
| SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL | | GRINDEKS - KALCEKS | | | | ATC: N01AH03 | | | |
| | 7741-127 | 10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | | 29,50 | 29,50 | | | |
| A-30 * | 7741-127 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | G | 3,8070 | 3,8070 | | | |
| A-30 ** | 7741-127 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | G | 3,1270 | 3,1270 | | | |
| SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml | | VIATRIS | | | | ATC: N01AH03 | | | |
| | 0786-046 | 20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | | 18,60 | 18,60 | | | |
| A-30 * | 0786-046 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 1,2000 | 1,2000 | | | |
| A-30 ** | 0786-046 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 0,9860 | 0,9860 | | | |
| SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml | | VIATRIS | | | | ATC: N01AH03 | | | |
| | 0786-038 | 20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | | 4,62 | 4,62 | | | |
| A-30 * | 0786-038 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 0,2980 | 0,2980 | | | |
| A-30 ** | 0786-038 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL | G | 0,2450 | 0,2450 | | | |
| SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml | | VIATRIS | | | | ATC: N01AH03 | | | |
| | 0786-053 | 20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | | 58,74 | 58,74 | | | |
| A-30 * | 0786-053 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | G | 3,4685 | 3,4685 | | | |
| A-30 ** | 0786-053 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL | G | 3,1130 | 3,1130 | | | |
| SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | | | ATC: V03AB35 | | | |
| | 7738-479 | 10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 280,05 | 280,05 | | | |
| B-312 * | 7738-479 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 30,3960 | 30,3960 | | | |
| B-312 ** | 7738-479 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 29,6850 | 29,6850 | | | |
| SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | | | ATC: V03AB35 | | | |
| | 7738-461 | 10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 700,13 | 700,13 | | | |
| B-312 * | 7738-461 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,9250 | 74,9250 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--|--|
| B-312 ** | 7738-461 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,2140 | 74,2140 | | |
| SUGAMMADEX EG 100 mg/mL EG | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7738-107 | 10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 280,05 | 280,05 | | |
| B-312 * | 7738-107 | 1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 30,3960 | 30,3960 | | |
| B-312 ** | 7738-107 | 1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 29,6850 | 29,6850 | | |
| SUGAMMADEX EG 100 mg/mL EG | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7738-099 | 10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 700,13 | 700,13 | | |
| B-312 * | 7738-099 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,9250 | 74,9250 | | |
| B-312 ** | 7738-099 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,2140 | 74,2140 | | |
| SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL FRESENIUS KABI | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7739-121 | 10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 280,05 | 280,05 | | |
| B-312 * | 7739-121 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 30,3960 | 30,3960 | | |
| B-312 ** | 7739-121 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 29,6850 | 29,6850 | | |
| SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL FRESENIUS KABI | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7739-824 | 10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 700,13 | 700,13 | | |
| B-312 * | 7739-824 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,9250 | 74,9250 | | |
| B-312 ** | 7739-824 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,2140 | 74,2140 | | |
| SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL VIATRIS | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7736-853 | 10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 700,13 | 700,13 | | |
| B-312 * | 7736-853 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,9250 | 74,9250 | | |
| B-312 ** | 7736-853 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,2140 | 74,2140 | | |
| SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml VIATRIS | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7736-846 | 10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 280,05 | 280,05 | | |
| B-312 * | 7736-846 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 30,3960 | 30,3960 | | |
| B-312 ** | 7736-846 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 29,6850 | 29,6850 | | |
| SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ | | | | ATC: V03AB35 | | | | |
| | 7737-927 | 10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 700,13 | 700,13 | | |
| B-312 * | 7737-927 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,9250 | 74,9250 | | |
| B-312 ** | 7737-927 | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 74,2140 | 74,2140 | | |

| SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: V03AB35 | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | 7737-919 | 10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 280,05 | 280,05 | | |
| B-312 * | 7737-919 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 30,3960 | 30,3960 | | |
| B-312 ** | 7737-919 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | G | 29,6850 | 29,6850 | | |
| SULPIRIDE EG 200 mg | | EG | | ATC: N05AL01 | | | | |
| B-72 | 0017-780 | 12 comprimés, 200 mg | 12 tabletten, 200 mg | G | 8,42 | 8,42 | 0,58 | 0,96 |
| | 0017-780 | | | | 2,18 | 2,18 | | |
| B-72 | 2074-987 | 36 comprimés, 200 mg | 36 tabletten, 200 mg | G | 12,80 | 12,80 | 1,47 | 2,45 |
| | 2074-987 | | | | 5,55 | 5,55 | | |
| B-72 * | 0729-368 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,1989 | 0,1989 | | |
| B-72 ** | 0729-368 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,1633 | 0,1633 | | |
| B-72 *** | 0729-368 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | 0,0408 | 0,0681 |
| SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N05AL01 | | | | |
| B-72 | 4769-584 | 30 comprimés, 200 mg | 30 tabletten, 200 mg | G | 11,43 | 11,43 | 1,19 | 1,99 |
| | 4769-584 | | | | 4,50 | 4,50 | | |
| B-72 * | 7739-675 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,1937 | 0,1937 | | |
| B-72 ** | 7739-675 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,1590 | 0,1590 | | |
| B-72 *** | 7739-675 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | G | 0,1965 | 0,1965 | 0,0397 | 0,0663 |
| SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | ATC: N05AL01 | | | | |
| B-72 | 4769-592 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | G | 7,47 | 7,47 | 0,36 | 0,60 |
| | 4769-592 | | | | 1,35 | 1,35 | | |
| B-72 * | 7740-111 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0580 | 0,0580 | | |
| B-72 ** | 7740-111 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0477 | 0,0477 | | |
| B-72 *** | 7740-111 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0647 | 0,0647 | 0,0120 | 0,0200 |
| SUVEZEN 10mg/10mg | | SANOFI BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | | |
| B-289 | 3944-493 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 26,57 | 26,57 | 4,13 | 6,94 |
| | 3944-493 | | | | 16,44 | 16,44 | | |
| B-289 | 3944-485 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 3944-485 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7726-474 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7726-474 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7726-474 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| SUVEZEN 20mg/10mg | | SANOFI BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | ATC: C10BA06 | | |
| B-289 | 3944-469 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 26,79 | 26,79 | 4,16 | 6,99 |
| | 3944-469 | | | | 16,63 | 16,63 | | |
| B-289 | 3944-477 | 90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 3944-477 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7726-482 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-289 ** | 7726-482 | mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7726-482 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| SUIVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 3944-451 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | R | 26,79 | 26,79 | 4,16 | 6,99 |
| | 3944-451 | | | | 16,63 | 16,63 | | |
| B-289 | 3944-444 | 90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 3944-444 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7726-490 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7726-490 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7726-490 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| SUIVEZEN 40mg/10mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06 | | | | | | | | |
| B-289 | 4765-947 | 90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg | R | 54,67 | 54,67 | 8,04 | 13,54 |
| | 4765-947 | | | | 40,90 | 40,90 | | |
| B-289 * | 7742-810 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,5607 | 0,5607 | | |
| B-289 ** | 7742-810 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,4817 | 0,4817 | | |
| B-289 *** | 7742-810 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg | R | 0,5460 | 0,5460 | 0,0893 | 0,1504 |
| SYCREST 10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05 | | | | | | | | |
| B-322 | 2787-471 | 60 comprimés sublinguaux, 10 mg | 60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg | | 99,99 | 99,99 | 8,30 | 12,50 |
| | 2787-471 | | | | 81,31 | 81,31 | | |
| B-322 * | 7700-446 | 1 comprimé sublingual, 10 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg | | 1,5550 | 1,5550 | | |
| B-322 ** | 7700-446 | 1 comprimé sublingual, 10 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg | | 1,4365 | 1,4365 | | |
| B-322 *** | 7700-446 | 1 comprimé sublingual, 10 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg | | 1,5743 | 1,5743 | 0,1383 | 0,2083 |
| SYCREST 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05 | | | | | | | | |
| B-322 | 2787-455 | 60 comprimés sublinguaux, 5 mg | 60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg | | 99,99 | 99,99 | 8,30 | 12,50 |
| | 2787-455 | | | | 81,31 | 81,31 | | |
| B-322 * | 7700-438 | 1 comprimé sublingual, 5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg | | 1,5550 | 1,5550 | | |
| B-322 ** | 7700-438 | 1 comprimé sublingual, 5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg | | 1,4365 | 1,4365 | | |
| B-322 *** | 7700-438 | 1 comprimé sublingual, 5 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg | | 1,5743 | 1,5743 | 0,1383 | 0,2083 |
| SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07 | | | | | | | | |
| B-245 | 3483-831 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | R | 34,38 | 34,38 | 5,22 | 8,77 |
| | 3483-831 | | | | 23,23 | 23,23 | | |
| B-245 * | 7720-311 | 1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | R | 29,9800 | 29,9800 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-245 ** | 7720-311 | 1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | R | 24,6200 | 24,6200 | | |
| SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA | | | | ATC: R03AK07 | | | | |
| B-245 | 2047-371 | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | R | 32,90 | 32,90 | 5,01 | 8,43 |
| | 2047-371 | | | | 21,95 | 21,95 | | |
| B-245 | 3420-122 | 180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | 180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | R | 76,62 | 76,62 | 8,30 | 12,50 |
| | 3420-122 | | | | 59,99 | 59,99 | | |
| B-245 * | 0780-858 | 1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | R | 23,5667 | 23,5667 | | |
| B-245 ** | 0780-858 | 1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis | R | 21,1967 | 21,1967 | | |
| SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA | | | | ATC: R03AK07 | | | | |
| B-245 | 1610-187 | 120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | 120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | R | 32,90 | 32,90 | 5,01 | 8,43 |
| | 1610-187 | | | | 21,95 | 21,95 | | |
| B-245 | 3420-114 | 360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | 360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | R | 76,62 | 76,62 | 8,30 | 12,50 |
| | 3420-114 | | | | 59,99 | 59,99 | | |
| B-245 * | 0770-602 | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | R | 23,5667 | 23,5667 | | |
| B-245 ** | 0770-602 | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis | R | 21,1967 | 21,1967 | | |
| SYNTOCINON ALFASIGMA BELGIUM | | | | ATC: H01BB02 | | | | |
| | 0718-395 | 5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml | 5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml | | 5,06 | 5,06 | | |
| B-93 * | 0718-395 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL | R | 1,3060 | 1,3060 | | |
| B-93 ** | 0718-395 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL | R | 1,0720 | 1,0720 | | |
| TAMBOCOR VIATRIS | | | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 0829-770 | 5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml | 5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | r | 31,49 | 31,49 | 4,82 | 8,09 |
| | 0829-770 | | | | 20,72 | 20,72 | | |
| B-8 * | 0718-486 | 1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | r | 5,3480 | 5,3480 | | |
| B-8 ** | 0718-486 | 1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | r | 4,3920 | 4,3920 | | |
| TAMBOCOR VIATRIS | | | | ATC: C01BC04 | | | | |
| B-8 | 0829-788 | 40 comprimés, 100 mg | 40 tabletten, 100 mg | R | 20,34 | 20,34 | 3,00 | 4,99 |
| | 0829-788 | | | | 11,30 | 11,30 | | |
| B-8 | 0829-796 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | R | 25,48 | 25,48 | 3,98 | 6,68 |
| | 0829-796 | | | | 15,49 | 15,49 | | |
| B-8 * | 0718-494 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1999 | 0,1999 | | |
| B-8 ** | 0718-494 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1642 | 0,1642 | | |
| B-8 *** | 0718-494 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1995 | 0,1995 | 0,0398 | 0,0668 |
| TAMOPLEX 20 mg AREGA PHARMA | | | | ATC: L02BA01 | | | | |
| A-27 | 0383-281 | 84 comprimés, 20 mg | 84 tabletten, 20 mg | R | 23,78 | 23,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0383-281 | | | | 14,00 | 14,00 | | |
| A-27 * | 0739-565 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2151 | 0,2151 | | |
| A-27 ** | 0739-565 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1767 | 0,1767 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| A-27 *** | 0739-565 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,2172 | 0,2172 | 0,0000 | 0,0000 |
| TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: L02BA01 | | | | |
| A-27 | 2162-451 | 60 comprimés, 20 mg | 60 tabletten, 20 mg | G | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 2162-451 | | | | 10,00 | 10,00 | | |
| A-27 | 2162-469 | 90 comprimés, 20 mg | 90 tabletten, 20 mg | G | 24,91 | 24,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 2162-469 | | | | 14,99 | 14,99 | | |
| A-27 * | 0777-912 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,2149 | 0,2149 | | |
| A-27 ** | 0777-912 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,1766 | 0,1766 | | |
| A-27 *** | 0777-912 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,2153 | 0,2153 | 0,0000 | 0,0000 |
| TARADYL | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | ATC: M01AB15 | | | | |
| B-56 | 0398-677 | 5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml | 5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | | 9,06 | 9,06 | 0,71 | 1,19 |
| | 0398-677 | | | | 2,69 | 2,69 | | |
| B-56 * | 0739-086 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 0,6940 | 0,6940 | | |
| B-56 ** | 0739-086 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | | 0,5700 | 0,5700 | | |
| TARGOCID | | SANOFI BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01XA02 | |
| | 0734-848 | 1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml | 1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml | | 34,88 | 34,88 | | |
| B-124 ** | 0734-848 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL | | 36,9700 | 36,9700 | | |
| TAVANIC | | SANOFI BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA12 | |
| | 0763-102 | 10 comprimés pelliculés, 500 mg | 10 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 10,53 | 10,53 | | |
| C-37 * | 0763-102 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,3590 | 1,3590 | | |
| C-37 ** | 0763-102 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,1160 | 1,1160 | | |
| TAVANIC I.V. | | SANOFI BELGIUM | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01MA12 | |
| | 0763-771 | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml | | 12,34 | 12,34 | | |
| B-125 * | 0763-771 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL | R | 15,9200 | 15,9200 | | |
| B-125 ** | 0763-771 | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL | R | 13,0800 | 13,0800 | | |
| TAZKO 5 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09BB05 | | | | |
| B-288 | 2173-391 | 98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg | 98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg | R | 34,72 | 34,72 | 5,26 | 8,85 |
| | 2173-391 | | | | 23,52 | 23,52 | | |
| B-288 * | 0785-493 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg | R | 0,3097 | 0,3097 | | |
| B-288 ** | 0785-493 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2544 | 0,2544 | | |
| B-288 *** | 0785-493 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2978 | 0,2978 | 0,0537 | 0,0903 |
| TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BB05 | | | | |
| B-288 | 3078-359 | 98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg | 98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg | R | 34,72 | 34,72 | 5,26 | 8,85 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 3078-359 | | | | 23,52 | 23,52 | | |
| B-288 * | 7705-403 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg | R | 0,3097 | 0,3097 | | |
| B-288 ** | 7705-403 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2544 | 0,2544 | | |
| B-288 *** | 7705-403 | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg | R | 0,2978 | 0,2978 | 0,0537 | 0,0903 |
| TEBRAZID 500 mg BEPHARBEL ATC: J04AK01 | | | | | | | | |
| A-19 | 0085-910 | 100 comprimés, 500 mg | 100 tabletten, 500 mg | | 30,88 | 30,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0085-910 | | | | 20,18 | 20,18 | | |
| A-19 * | 0718-700 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,2604 | 0,2604 | | |
| A-19 ** | 0718-700 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,2139 | 0,2139 | | |
| A-19 *** | 0718-700 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | | 0,2534 | 0,2534 | 0,0000 | 0,0000 |
| TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01 | | | | | | | | |
| B-57 | 0132-167 | 50 comprimés, 200 mg | 50 tabletten, 200 mg | R | 8,03 | 8,03 | 0,49 | 0,81 |
| | 0132-167 | | | | 1,84 | 1,84 | | |
| B-57 * | 0718-718 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,0474 | 0,0474 | | |
| B-57 ** | 0718-718 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,0390 | 0,0390 | | |
| B-57 *** | 0718-718 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | R | 0,0500 | 0,0500 | 0,0098 | 0,0162 |
| TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01 | | | | | | | | |
| B-57 | 1256-999 | 1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml | 1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml | R | 7,42 | 7,42 | 0,34 | 0,57 |
| | 1256-999 | | | | 1,30 | 1,30 | | |
| B-57 * | 0747-329 | 5 mL solution buvable, 20 mg/mL | 5 mL drank, 20 mg/mL | R | 0,0336 | 0,0336 | | |
| B-57 ** | 0747-329 | 5 mL solution buvable, 20 mg/mL | 5 mL drank, 20 mg/mL | R | 0,0276 | 0,0276 | | |
| TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01 | | | | | | | | |
| B-57 | 0431-494 | 50 comprimés à libération modifiée, 400 mg | 50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg | R | 10,28 | 10,28 | 0,96 | 1,60 |
| | 0431-494 | | | | 3,62 | 3,62 | | |
| B-57 * | 0734-103 | 1 comprimé à libération modifiée, 400 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg | R | 0,0934 | 0,0934 | | |
| B-57 ** | 0734-103 | 1 comprimé à libération modifiée, 400 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg | R | 0,0768 | 0,0768 | | |
| B-57 *** | 0734-103 | 1 comprimé à libération modifiée, 400 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg | R | 0,0950 | 0,0950 | 0,0192 | 0,0320 |
| TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01 | | | | | | | | |
| B-57 | 0431-486 | 50 comprimés à libération modifiée, 200 mg | 50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg | R | 8,22 | 8,22 | 0,53 | 0,88 |
| | 0431-486 | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| B-57 * | 0734-095 | 1 comprimé à libération modifiée, 200 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg | R | 0,0516 | 0,0516 | | |
| B-57 ** | 0734-095 | 1 comprimé à libération modifiée, 200 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg | R | 0,0424 | 0,0424 | | |
| B-57 *** | 0734-095 | 1 comprimé à libération modifiée, 200 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg | R | 0,0536 | 0,0536 | 0,0106 | 0,0176 |
| TELEBRIX GASTRO GUERBET ATC: V08AA05 | | | | | | | | |
| B-176 | 0458-109 | 1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml | 1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml | | 19,43 | 19,43 | 2,81 | 4,69 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-176 * | 0458-109 0735-019 | 1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL | 1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL | | 10,60 13,6800 | 10,60 13,6800 | | |
| B-176 ** | 0735-019 | 1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL | 1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL | | 11,2400 | 11,2400 | | |
| TELEBRIX GASTRO GUERBET ATC: V08AA05 | | | | | | | | |
| B-176 | 0458-091 | 1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml | 1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml | | 13,44 | 13,44 | 1,60 | 2,67 |
| | 0458-091 | | | | 6,03 | 6,03 | | |
| B-176 * | 0735-001 | 1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL | 1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL | | 7,7800 | 7,7800 | | |
| B-176 ** | 0735-001 | 1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL | 1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL | | 6,3900 | 6,3900 | | |
| TELMISARTAN EG 40 mg EG ATC: C09CA07 | | | | | | | | |
| B-224 | 3046-315 | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | 30,57 | 30,57 | 4,69 | 7,88 |
| | 3046-315 | | | | 19,92 | 19,92 | | |
| B-224 * | 7702-756 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2623 | 0,2623 | | |
| B-224 ** | 7702-756 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2155 | 0,2155 | | |
| B-224 *** | 7702-756 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | 0,2555 | 0,2555 | 0,0479 | 0,0804 |
| TELMISARTAN EG 80 mg EG ATC: C09CA07 | | | | | | | | |
| B-224 | 3046-331 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 30,23 | 30,23 | 4,64 | 7,80 |
| | 3046-331 | | | | 19,62 | 19,62 | | |
| B-224 * | 7702-764 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,2584 | 0,2584 | | |
| B-224 ** | 7702-764 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,2122 | 0,2122 | | |
| B-224 *** | 7702-764 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,2520 | 0,2520 | 0,0473 | 0,0796 |
| TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA07 | | | | | | | | |
| B-224 | 3377-355 | 98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg | G | 32,34 | 32,34 | 4,93 | 8,29 |
| | 3377-355 | | | | 21,46 | 21,46 | | |
| B-224 * | 7708-068 | 1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2826 | 0,2826 | | |
| B-224 ** | 7708-068 | 1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2321 | 0,2321 | | |
| B-224 *** | 7708-068 | 1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg | G | 0,2735 | 0,2735 | 0,0503 | 0,0846 |
| TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA07 | | | | | | | | |
| B-224 | 3162-443 | 98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg | 98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg | G | 26,36 | 26,36 | 4,10 | 6,89 |
| | 3162-443 | | | | 16,25 | 16,25 | | |
| B-224 * | 7708-076 | 1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,2140 | 0,2140 | | |
| B-224 ** | 7708-076 | 1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1758 | 0,1758 | | |
| B-224 *** | 7708-076 | 1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,2125 | 0,2125 | 0,0418 | 0,0703 |
| TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg EG ATC: C09DA07 | | | | | | | | |
| B-224 | 3162-468 | 98 comprimés, 80 mg / 25 mg | 98 tabletten, 80 mg / 25 mg | G | 26,36 | 26,36 | 4,10 | 6,89 |
| | 3162-468 | | | | 16,25 | 16,25 | | |
| B-224 * | 7708-084 | 1 comprimé, 80 mg/ 25 mg | 1 tablet, 80 mg/ 25 mg | G | 0,2140 | 0,2140 | | |
| B-224 ** | 7708-084 | 1 comprimé, 80 mg/ 25 mg | 1 tablet, 80 mg/ 25 mg | G | 0,1758 | 0,1758 | | |
| B-224 *** | 7708-084 | 1 comprimé, 80 mg/ 25 mg | 1 tablet, 80 mg/ 25 mg | G | 0,2125 | 0,2125 | 0,0418 | 0,0703 |
| TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA07 | | | | | | | | |
| B-224 | 3043-148 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | G | 30,50 | 30,50 | 4,68 | 7,86 |
| | 3043-148 | | | | 19,86 | 19,86 | | |
| B-224 * | 7704-091 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2615 | 0,2615 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| B-224 ** | 7704-091 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2148 | 0,2148 | | |
| B-224 *** | 7704-091 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | G | 0,2547 | 0,2547 | 0,0478 | 0,0802 |
| TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: C09CA07 | | | | |
| B-224 | 3043-163 | 98 comprimés, 80 mg | 98 tabletten, 80 mg | G | 30,50 | 30,50 | 4,68 | 7,86 |
| | 3043-163 | | | | 19,86 | 19,86 | | |
| B-224 * | 7704-109 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | G | 0,2615 | 0,2615 | | |
| B-224 ** | 7704-109 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | G | 0,2148 | 0,2148 | | |
| B-224 *** | 7704-109 | 1 comprimé, 80 mg | 1 tablet, 80 mg | G | 0,2547 | 0,2547 | 0,0478 | 0,0802 |
| TELMISARTAN VIATRIS 80 mg | | VIATRIS | | ATC: C09CA07 | | | | |
| B-224 | 3050-168 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 31,34 | 31,34 | 4,79 | 8,06 |
| | 3050-168 | | | | 20,59 | 20,59 | | |
| B-224 * | 7703-952 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,2711 | 0,2711 | | |
| B-224 ** | 7703-952 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,2228 | 0,2228 | | |
| B-224 *** | 7703-952 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,2634 | 0,2634 | 0,0489 | 0,0822 |
| TEMGESIC SUBLINGUALIS | | EUMEDICA | | ATC: N02AE01 | | | | |
| B-56 | 0818-971 | 50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg | 50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg | R | 14,12 | 14,12 | 1,74 | 2,90 |
| | 0818-971 | | | | 6,55 | 6,55 | | |
| B-56 * | 0736-884 | 1 comprimé sublingual, 0,2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg | R | 0,1690 | 0,1690 | | |
| B-56 ** | 0736-884 | 1 comprimé sublingual, 0,2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg | R | 0,1388 | 0,1388 | | |
| B-56 *** | 0736-884 | 1 comprimé sublingual, 0,2 mg | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg | R | 0,1717 | 0,1717 | 0,0348 | 0,0580 |
| TEMODAL 100 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: L01AX03 | | | | |
| | 0767-210 | 5 gélules, 100 mg | 5 capsules, hard, 100 mg | | 148,64 | 148,64 | | |
| A-23 * | 0767-210 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 32,9340 | 32,9340 | | |
| A-23 ** | 0767-210 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | R | 31,5120 | 31,5120 | | |
| TEMODAL 140 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: L01AX03 | | | | |
| | 0757-930 | 5 gélules, 140 mg | 5 capsules, hard, 140 mg | | 204,92 | 204,92 | | |
| A-23 * | 0757-930 | 1 gélule, 140 mg | 1 capsule, hard, 140 mg | R | 44,8660 | 44,8660 | | |
| A-23 ** | 0757-930 | 1 gélule, 140 mg | 1 capsule, hard, 140 mg | R | 43,4440 | 43,4440 | | |
| TEMODAL 20 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: L01AX03 | | | | |
| | 0767-202 | 5 gélules, 20 mg | 5 capsules, hard, 20 mg | | 33,10 | 33,10 | | |
| A-23 * | 0767-202 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | R | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-23 ** | 0767-202 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | R | 7,0180 | 7,0180 | | |
| TEMODAL 250 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: L01AX03 | | | | |
| | 0767-228 | 5 gélules, 250 mg | 5 capsules, hard, 250 mg | | 350,55 | 350,55 | | |
| A-23 * | 0767-228 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 75,7380 | 75,7380 | | |
| A-23 ** | 0767-228 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 74,3160 | 74,3160 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01AX03 | | | | |
| | 7714-009 | 5 gélules, 100 mg | 5 capsules, hard, 100 mg | | 148,64 | 148,64 | | |
| A-23 * | 7714-009 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 32,9340 | 32,9340 | | |
| A-23 ** | 7714-009 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 31,5120 | 31,5120 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01AX03 | | | | |
| | 7728-637 | 5 gélules, 100 mg | 5 capsules, hard, 100 mg | | 148,64 | 148,64 | | |
| A-23 * | 7728-637 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 32,9340 | 32,9340 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-23 ** | 7728-637 | 1 gélule, 100 mg | 1 capsule, hard, 100 mg | G | 31,5120 | 31,5120 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01AX03 | | | |
| | 7719-412 | 5 gélules, 140 mg | 5 capsules, hard, 140 mg | | 204,92 | 204,92 | | |
| A-23 * | 7719-412 | 1 gélule, 140 mg | 1 capsule, hard, 140 mg | G | 44,8660 | 44,8660 | | |
| A-23 ** | 7719-412 | 1 gélule, 140 mg | 1 capsule, hard, 140 mg | G | 43,4440 | 43,4440 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01AX03 | | | |
| | 7714-017 | 5 gélules, 180 mg | 5 capsules, hard, 180 mg | | 259,56 | 259,56 | | |
| A-23 * | 7714-017 | 1 gélule, 180 mg | 1 capsule, hard, 180 mg | G | 56,4480 | 56,4480 | | |
| A-23 ** | 7714-017 | 1 gélule, 180 mg | 1 capsule, hard, 180 mg | G | 55,0260 | 55,0260 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01AX03 | | | |
| | 7713-993 | 5 gélules, 20 mg | 5 capsules, hard, 20 mg | | 33,10 | 33,10 | | |
| A-23 * | 7713-993 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 8,4400 | 8,4400 | | |
| A-23 ** | 7713-993 | 1 gélule, 20 mg | 1 capsule, hard, 20 mg | G | 7,0180 | 7,0180 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01AX03 | | | |
| | 7714-025 | 5 gélules, 250 mg | 5 capsules, hard, 250 mg | | 350,55 | 350,55 | | |
| A-23 * | 7714-025 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 75,7380 | 75,7380 | | |
| A-23 ** | 7714-025 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 74,3160 | 74,3160 | | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01AX03 | | | |
| | 7713-985 | 5 gélules, 5 mg | 5 capsules, hard, 5 mg | | 8,79 | 8,79 | | |
| A-23 * | 7713-985 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | G | 2,2680 | 2,2680 | | |
| A-23 ** | 7713-985 | 1 gélule, 5 mg | 1 capsule, hard, 5 mg | G | 1,8640 | 1,8640 | | |
| TENORETIC 100/25 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C07CB03 | | | |
| B-15 | 1181-502 | 56 comprimés, 100 mg / 25 mg | 56 tabletten, 100 mg / 25 mg | R | 15,95 | 15,95 | 2,11 | 3,51 |
| | 1181-502 | | | | 7,95 | 7,95 | | |
| B-15 | 4851-705 | 98 comprimés, 100 mg/ 25 mg | 98 tabletten, 100 mg/ 25 mg | R | 23,67 | 23,67 | 3,69 | 6,15 |
| | 4851-705 | | | | 13,91 | 13,91 | | |
| B-15 * | 0718-858 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1832 | 0,1832 | | |
| B-15 ** | 0718-858 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1504 | 0,1504 | | |
| B-15 *** | 0718-858 | 1 comprimé, 100 mg/ 25 mg | 1 tablet, 100 mg/ 25 mg | R | 0,1861 | 0,1861 | 0,0377 | 0,0627 |
| TENORETIC MITIS 50/12,5 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C07CB03 | | | |
| B-15 | 0015-024 | 56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg | 56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg | R | 11,36 | 11,36 | 1,18 | 1,97 |
| | 0015-024 | | | | 4,45 | 4,45 | | |
| B-15 | 4851-697 | 98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg | 98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg | R | 15,74 | 15,74 | 2,07 | 3,44 |
| | 4851-697 | | | | 7,79 | 7,79 | | |
| B-15 * | 0718-866 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | R | 0,1026 | 0,1026 | | |
| B-15 ** | 0718-866 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | R | 0,0843 | 0,0843 | | |
| B-15 *** | 0718-866 | 1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg | R | 0,1041 | 0,1041 | 0,0211 | 0,0352 |
| TENORMIN 100 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C07AB03 | | | |
| B-15 | 1181-288 | 56 comprimés, 100 mg | 56 tabletten, 100 mg | R | 13,67 | 13,67 | 1,65 | 2,74 |
| | 1181-288 | | | | 6,21 | 6,21 | | |
| B-15 | 4851-739 | 98 comprimés, 100 mg | 98 tabletten, 100 mg | R | 19,78 | 19,78 | 2,88 | 4,80 |
| | 4851-739 | | | | 10,87 | 10,87 | | |
| B-15 * | 0718-874 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1432 | 0,1432 | | |
| B-15 ** | 0718-874 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1176 | 0,1176 | | |
| B-15 *** | 0718-874 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1454 | 0,1454 | 0,0295 | 0,0489 |

| TENORMIN MINOR-25 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | ATC: C07AB03 | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-15 | 1193-333 1193-333 | 56 comprimés, 25 mg | 56 tabletten, 25 mg | R | 8,35 2,12 | 8,35 2,12 | 0,56 | 0,94 | |
| B-15 | 4851-713 4851-713 | 98 comprimés, 25 mg | 98 tabletten, 25 mg | R | 10,40 3,71 | 10,40 3,71 | 0,98 | 1,64 | |
| B-15 * | 0745-091 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0489 | 0,0489 | | | |
| B-15 ** | 0745-091 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0401 | 0,0401 | | | |
| B-15 *** | 0745-091 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | R | 0,0504 | 0,0504 | 0,0100 | 0,0168 | |
| TENORMIN MITIS-50 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | ATC: C07AB03 | | | |
| B-15 | 0015-032 0015-032 | 56 comprimés, 50 mg | 56 tabletten, 50 mg | R | 10,79 4,01 | 10,79 4,01 | 1,06 | 1,77 | |
| B-15 | 4851-721 4851-721 | 98 comprimés, 50 mg | 98 tabletten, 50 mg | R | 14,73 7,02 | 14,73 7,02 | 1,86 | 3,10 | |
| B-15 * | 0718-890 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,0924 | 0,0924 | | | |
| B-15 ** | 0718-890 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,0759 | 0,0759 | | | |
| B-15 *** | 0718-890 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | R | 0,0939 | 0,0939 | 0,0189 | 0,0316 | |
| TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml | | VIATRIS | | | | ATC: S01ED51 | | | |
| B-168 | 2919-934 2919-934 | 3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml | G | 18,54 9,92 | 18,54 9,92 | 2,63 | 4,38 | |
| B-168 * | 0752-253 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL | G | 4,2667 | 4,2667 | | | |
| B-168 ** | 0752-253 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL | G | 3,5067 | 3,5067 | | | |
| TERBINAFIN AB 250 mg | | AUROBINDO NV | | | | ATC: D01BA02 | | | |
| B-134 | 4148-763 4148-763 | 14 comprimés, 250 mg | 14 tabletten, 250 mg | G | 19,64 10,77 | 19,64 10,77 | 2,86 | 4,76 | |
| B-134 | 3595-162 3595-162 | 56 comprimés, 250 mg | 56 tabletten, 250 mg | G | 37,67 26,09 | 37,67 26,09 | 5,67 | 9,54 | |
| B-134 | 3595-170 3595-170 | 98 comprimés, 250 mg | 98 tabletten, 250 mg | G | 75,02 58,60 | 75,02 58,60 | 10,20 | 15,50 | |
| B-134 * | 7720-204 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7064 | 0,7064 | | | |
| B-134 ** | 7720-204 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,6339 | 0,6339 | | | |
| B-134 *** | 7720-204 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7090 | 0,7090 | 0,1041 | 0,1582 | |
| TERBINAFINE EG 250 mg | | EG | | | | ATC: D01BA02 | | | |
| B-134 | 2528-750 2528-750 | 14 comprimés, 250 mg | 14 tabletten, 250 mg | G | 19,64 10,77 | 19,64 10,77 | 2,86 | 4,76 | |
| B-134 | 2528-693 2528-693 | 56 comprimés, 250 mg | 56 tabletten, 250 mg | G | 39,53 27,71 | 39,53 27,71 | 5,93 | 9,98 | |
| B-134 | 2697-407 2697-407 | 98 comprimés, 250 mg | 98 tabletten, 250 mg | G | 78,18 61,41 | 78,18 61,41 | 10,20 | 15,50 | |
| B-134 * | 0791-087 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7367 | 0,7367 | | | |
| B-134 ** | 0791-087 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,6642 | 0,6642 | | | |
| B-134 *** | 0791-087 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7412 | 0,7412 | 0,1041 | 0,1582 | |
| TERBINAFINE SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | | | ATC: D01BA02 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-134 | 2274-645 2274-645 | 14 comprimés, 250 mg | 14 tabletten, 250 mg | G | 19,64 10,77 | 19,64 10,77 | 2,86 | 4,76 |
| B-134 | 2274-652 2274-652 | 28 comprimés, 250 mg | 28 tabletten, 250 mg | G | 28,22 17,87 | 28,22 17,87 | 4,36 | 7,32 |
| B-134 | 2274-660 2274-660 | 56 comprimés, 250 mg | 56 tabletten, 250 mg | G | 39,53 27,71 | 39,53 27,71 | 5,93 | 9,98 |
| B-134 | 2274-637 2274-637 | 98 comprimés, 250 mg | 98 tabletten, 250 mg | G | 78,05 61,30 | 78,05 61,30 | 10,20 | 15,50 |
| B-134 * | 0782-615 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7356 | 0,7356 | | |
| B-134 ** | 0782-615 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,6631 | 0,6631 | | |
| B-134 *** | 0782-615 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7399 | 0,7399 | 0,1041 | 0,1582 |
| TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: D01BA02 | | | | | | | | |
| B-134 | 4872-974 4872-974 | 98 comprimés, 250 mg | 98 tabletten, 250 mg | G | 78,05 61,30 | 78,05 61,30 | 10,20 | 15,50 |
| B-134 * | 7741-887 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7356 | 0,7356 | | |
| B-134 ** | 7741-887 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,6631 | 0,6631 | | |
| B-134 *** | 7741-887 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7399 | 0,7399 | 0,1041 | 0,1582 |
| TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: D01BA02 | | | | | | | | |
| B-134 | 2199-297 2199-297 | 14 comprimés, 250 mg | 14 tabletten, 250 mg | G | 20,26 11,24 | 20,26 11,24 | 2,98 | 4,97 |
| B-134 | 2199-305 2199-305 | 56 comprimés, 250 mg | 56 tabletten, 250 mg | G | 39,53 27,71 | 39,53 27,71 | 5,93 | 9,98 |
| B-134 | 2618-957 2618-957 | 98 comprimés, 250 mg | 98 tabletten, 250 mg | G | 78,19 61,42 | 78,19 61,42 | 10,20 | 15,50 |
| B-134 * | 0780-353 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7369 | 0,7369 | | |
| B-134 ** | 0780-353 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,6644 | 0,6644 | | |
| B-134 *** | 0780-353 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7414 | 0,7414 | 0,1041 | 0,1582 |
| TERBINAFINE VIATRIS 250 mg VIATRIS ATC: D01BA02 | | | | | | | | |
| B-134 | 2216-216 2216-216 | 14 comprimés, 250 mg | 14 tabletten, 250 mg | G | 19,88 10,95 | 19,88 10,95 | 2,90 | 4,84 |
| B-134 | 2216-224 2216-224 | 56 comprimés, 250 mg | 56 tabletten, 250 mg | G | 39,53 27,71 | 39,53 27,71 | 5,93 | 9,98 |
| B-134 | 2896-199 2896-199 | 98 comprimés, 250 mg | 98 tabletten, 250 mg | G | 78,19 61,42 | 78,19 61,42 | 10,20 | 15,50 |
| B-134 * | 0796-813 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7369 | 0,7369 | | |
| B-134 ** | 0796-813 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,6644 | 0,6644 | | |
| B-134 *** | 0796-813 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | G | 0,7414 | 0,7414 | 0,1041 | 0,1582 |
| TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B Pfizer ATC: S03CA04 | | | | | | | | |
| B-166 | 0132-407 0132-407 | 3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire | 3,5 g oog- en oorzalf | R | 7,63 1,49 | 7,63 1,49 | 0,40 | 0,66 |
| B-166 * | 0718-957 | 1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g | 1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g | R | 1,9200 | 1,9200 | | |
| B-166 ** | 0718-957 | 1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g | 1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g | R | 1,5800 | 1,5800 | | |
| TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B Pfizer ATC: S03CA04 | | | | | | | | |
| B-166 | 0132-423 | 1 tube 5 ml suspension | 1 tube 5 ml oog- en oordruppels, | R | 8,14 | 8,14 | 0,51 | 0,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| | | ophtalmique et auriculaire | suspensie | | | 1,94 | 1,94 | | |
| B-166 * | 0132-423 0718-940 | 1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g | 1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g | R | | 2,5000 | 2,5000 | | |
| B-166 ** | 0718-940 | 1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g | 1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g | R | | 2,0600 | 2,0600 | | |
| TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: N07XX06 | | | | |
| B-206 | 3093-911 3093-911 | 112 comprimés, 25 mg | 112 tabletten, 25 mg | G | | 149,50 126,47 | 149,50 126,47 | 10,20 | 15,50 |
| B-206 * | 7707-151 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | | 1,2604 | 1,2604 | | |
| B-206 ** | 7707-151 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | | 1,1970 | 1,1970 | | |
| B-206 *** | 7707-151 | 1 comprimé, 25 mg | 1 tablet, 25 mg | G | | 1,2854 | 1,2854 | 0,0911 | 0,1384 |
| TETRALYSAL | | GALDERMA BENELUX | | | ATC: J01AA04 | | | | |
| C-37 | 1668-052 1668-052 | 28 gélules, 300 mg | 28 capsules, hard, 300 mg | | | 19,90 10,96 | 19,90 10,96 | 9,69 | 9,69 |
| C-37 | 1233-493 1233-493 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | | | 27,80 17,51 | 27,80 17,51 | 10,20 | 14,46 |
| C-37 * | 0719-096 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,4036 | 0,4036 | | |
| C-37 ** | 0719-096 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,3314 | 0,3314 | | |
| C-37 *** | 0719-096 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,3977 | 0,3977 | 0,1821 | 0,2582 |
| TETRALYSAL (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: J01AA04 | | | | |
| C-37 | 4665-121 4665-121 | 28 gélules, 300 mg | 28 capsules, hard, 300 mg | | | 19,90 10,96 | 19,90 10,96 | 9,69 | 9,69 |
| C-37 | 4665-139 4665-139 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | | | 27,80 17,51 | 27,80 17,51 | 10,20 | 14,46 |
| C-37 * | 7737-513 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,4036 | 0,4036 | | |
| C-37 ** | 7737-513 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,3314 | 0,3314 | | |
| C-37 *** | 7737-513 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,3977 | 0,3977 | 0,1821 | 0,2582 |
| TETRALYSAL (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: J01AA04 | | | | |
| C-37 | 4686-507 4686-507 | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | | | 27,80 17,51 | 27,80 17,51 | 10,20 | 14,46 |
| C-37 * | 7738-768 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,4036 | 0,4036 | | |
| C-37 ** | 7738-768 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,3314 | 0,3314 | | |
| C-37 *** | 7738-768 | 1 gélule, 300 mg | 1 capsule, hard, 300 mg | | | 0,3977 | 0,3977 | 0,1821 | 0,2582 |
| TEVETEN 600 mg | | VIATRIS | | | ATC: C09CA02 | | | | |
| B-224 | 1727-064 1727-064 | 98 comprimés pelliculés, 600 mg | 98 filmomhulde tabletten, 600 mg | | | 52,22 38,75 | 52,22 38,75 | 7,70 | 12,96 |
| B-224 * | 0765-016 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | | | 0,4917 | 0,4917 | | |
| B-224 ** | 0765-016 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | | | 0,4192 | 0,4192 | | |
| B-224 *** | 0765-016 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | | | 0,4764 | 0,4764 | 0,0786 | 0,1322 |
| TEVETEN PLUS 600/12,5 mg | | VIATRIS | | | ATC: C09DA02 | | | | |
| B-224 | 2197-242 2197-242 | 98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg | | | 53,46 39,83 | 53,46 39,83 | 7,87 | 13,25 |
| B-224 * | 0780-130 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg / 12,5 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg / 12,5 | | | 0,5034 | 0,5034 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-224 ** | 0780-130 | mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg | mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg | | 0,4308 | 0,4308 | | |
| B-224 *** | 0780-130 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg | | 0,4890 | 0,4890 | 0,0803 | 0,1352 |
| THALIDOMIDE BMS 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L04AX02 | | | | |
| A-29 | 2489-946 2489-946 | 28 gélules, 50 mg | 28 capsules, hard, 50 mg | | 419,18 372,44 | 419,18 372,44 | 0,00 | 0,00 |
| A-29 * | 7714-926 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | | 14,3536 | 14,3536 | | |
| A-29 ** | 7714-926 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | | 14,0996 | 14,0996 | | |
| A-29 *** | 7714-926 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | | 14,7730 | 14,7730 | 0,0000 | 0,0000 |
| THYMOGLOBULINE | | SANOFI BELGIUM | | ATC: L04AA04 | | | | |
| | 0737-783 | 1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml | 1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 164,00 | 164,00 | | |
| A-29 * | 0737-783 | 1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 180,9500 | 180,9500 | | |
| A-29 ** | 0737-783 | 1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL | | 173,8400 | 173,8400 | | |
| TIBERAL 1 g/6 mL | | SERB SAS | | ATC: J01XD03 | | | | |
| | 0732-560 | 1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml | 1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml | | 8,92 | 8,92 | | |
| B-132 * | 0732-560 | 1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL | 1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL | | 11,5100 | 11,5100 | | |
| B-132 ** | 0732-560 | 1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL | 1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL | | 9,4600 | 9,4600 | | |
| TIBERAL 500 mg | | SERB SAS | | ATC: P01AB03 | | | | |
| B-132 | 0659-920 0659-920 | 3 comprimés pelliculés, 500 mg | 3 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 8,02 1,83 | 8,02 1,83 | 0,49 | 0,81 |
| B-132 | 0263-343 0263-343 | 10 comprimés pelliculés, 500 mg | 10 filmomhulde tabletten, 500 mg | | 12,41 5,25 | 12,41 5,25 | 1,39 | 2,32 |
| B-132 * | 0732-578 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,6780 | 0,6780 | | |
| B-132 ** | 0732-578 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,5570 | 0,5570 | | |
| B-132 *** | 0732-578 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | | 0,6879 | 0,6879 | 0,1390 | 0,2320 |
| TIGECYCLINE ACCORD 50 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: J01AA12 | | | | |
| | 7731-771 | 1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg | 1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg | | 18,12 | 18,12 | | |
| B-118 * | 7731-771 | 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg | 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg | G | 23,3800 | 23,3800 | | |
| B-118 ** | 7731-771 | 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg | 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg | G | 19,2100 | 19,2100 | | |
| TILCOTIL 20 mg | | VIATRIS | | ATC: M01AC02 | | | | |
| B-63 | 0054-502 0054-502 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | | 11,86 4,83 | 11,86 4,83 | 1,28 | 2,13 |
| B-63 | 0458-117 0458-117 | 60 comprimés, 20 mg | 60 tabletten, 20 mg | | 15,67 7,74 | 15,67 7,74 | 2,05 | 3,42 |
| B-63 * | 0731-034 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | | 0,1665 | 0,1665 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---|---|--------------|-------------|--------|--------|
| B-63 ** | 0731-034 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | | 0,1367 | 0,1367 | | |
| B-63 *** | 0731-034 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | | 0,1689 | 0,1689 | 0,0342 | 0,0570 |
| TILDIEM | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: C08DB01 | | | |
| B-6 | 0817-932 | 100 comprimés, 60 mg | 100 tabletten, 60 mg | R | 9,82 | 9,82 | 0,87 | 1,45 |
| | 0817-932 | | | | 3,27 | 3,27 | | |
| B-6 * | 0719-427 | 1 comprimé, 60 mg | 1 tablet, 60 mg | R | 0,0422 | 0,0422 | | |
| B-6 ** | 0719-427 | 1 comprimé, 60 mg | 1 tablet, 60 mg | R | 0,0347 | 0,0347 | | |
| B-6 *** | 0719-427 | 1 comprimé, 60 mg | 1 tablet, 60 mg | R | 0,0428 | 0,0428 | 0,0087 | 0,0145 |
| TILDIEM RETARD 200 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: C08DB01 | | | |
| B-20 | 1289-156 | 28 gélules à libération prolongée, 200 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 11,67 | 11,67 | 1,24 | 2,07 |
| | 1289-156 | | | | 4,68 | 4,68 | | |
| B-20 * | 0746-727 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 0,2157 | 0,2157 | | |
| B-20 ** | 0746-727 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 0,1771 | 0,1771 | | |
| B-20 *** | 0746-727 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 0,2192 | 0,2192 | 0,0443 | 0,0739 |
| TILDIEM RETARD 300 mg | | SANOFI BELGIUM | | | ATC: C08DB01 | | | |
| B-20 | 0386-185 | 28 gélules à libération prolongée, 300 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 13,08 | 13,08 | 1,53 | 2,55 |
| | 0386-185 | | | | 5,76 | 5,76 | | |
| B-20 * | 0739-300 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 0,2654 | 0,2654 | | |
| B-20 ** | 0739-300 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 0,2182 | 0,2182 | | |
| B-20 *** | 0739-300 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | R | 0,2695 | 0,2695 | 0,0546 | 0,0911 |
| TIMABAK 0,25 % | | THEA PHARMA | | | ATC: S01ED01 | | | |
| B-168 | 1626-571 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml | G | 10,14 | 10,14 | 0,93 | 1,56 |
| | 1626-571 | | | | 3,52 | 3,52 | | |
| B-168 * | 0770-776 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL | G | 4,5400 | 4,5400 | | |
| B-168 ** | 0770-776 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL | G | 3,7300 | 3,7300 | | |
| TIMABAK 0,5 % | | THEA PHARMA | | | ATC: S01ED01 | | | |
| B-168 | 1626-589 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml | G | 10,21 | 10,21 | 0,95 | 1,58 |
| | 1626-589 | | | | 3,57 | 3,57 | | |
| B-168 * | 0770-768 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | G | 4,6100 | 4,6100 | | |
| B-168 ** | 0770-768 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | G | 3,7800 | 3,7800 | | |
| TIMO-COMOD 0,5 % | | URSAPHARM BENELUX | | | ATC: S01ED01 | | | |
| B-168 | 1643-485 | 1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml | 1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml | G | 10,90 | 10,90 | 1,09 | 1,81 |
| | 1643-485 | | | | 4,10 | 4,10 | | |
| B-168 * | 0767-640 | 1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | G | 5,2900 | 5,2900 | | |
| B-168 ** | 0767-640 | 1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL | 1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL | G | 4,3500 | 4,3500 | | |

| TIMOLATEARS | | SUBSTIPHARM | | | | ATC: S01ED51 | | | |
|------------------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|------|-------|--|
| B-168 | 2999-803 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml | G | 18,14 | 18,14 | 2,55 | 4,25 | |
| | 2999-803 | | | | 9,62 | 9,62 | | | |
| B-168 * | 7701-873 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL | G | 4,1367 | 4,1367 | | | |
| B-168 ** | 7701-873 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL | G | 3,4000 | 3,4000 | | | |
| TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg | | LABORATOIRES SMB | | | | ATC: R03BB04 | | | |
| B-267 | 4831-897 | 30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg | 30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg | G | 22,74 | 22,74 | 3,48 | 5,80 | |
| | 4831-897 | | | | 13,13 | 13,13 | | | |
| B-267 | 4831-905 | 90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg | 90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg | G | 52,95 | 52,95 | 7,80 | 13,14 | |
| | 4831-905 | | | | 39,39 | 39,39 | | | |
| B-267 * | 7741-424 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg | G | 0,5429 | 0,5429 | | | |
| B-267 ** | 7741-424 | 1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg | 1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg | G | 0,4639 | 0,4639 | | | |
| TOBRADEX | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01CA01 | | | |
| B-166 | 0324-087 | 3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g/ 3 mg/g | 3,5 g oogzalf, 1 mg/g/ 3 mg/g | R | 7,44 | 7,44 | 0,35 | 0,58 | |
| | 0324-087 | | | | 1,32 | 1,32 | | | |
| B-166 * | 0742-932 | 1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g | 1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g | R | 1,7000 | 1,7000 | | | |
| B-166 ** | 0742-932 | 1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g | 1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g | R | 1,4000 | 1,4000 | | | |
| TOBRADEX | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01CA01 | | | |
| B-166 | 0324-079 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml | R | 8,06 | 8,06 | 0,49 | 0,82 | |
| | 0324-079 | | | | 1,86 | 1,86 | | | |
| B-166 * | 0742-924 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL | R | 2,4000 | 2,4000 | | | |
| B-166 ** | 0742-924 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL | R | 1,9700 | 1,9700 | | | |
| TOBREX | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01AA12 | | | |
| B-162 | 0022-897 | 3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g | 3,5 g oogzalf, 3 mg/g | R | 7,99 | 7,99 | 0,48 | 0,80 | |
| | 0022-897 | | | | 1,81 | 1,81 | | | |
| B-162 * | 0728-105 | 1 tube, 3 mg/g | 1 tube, 3 mg/g | R | 2,3400 | 2,3400 | | | |
| B-162 ** | 0728-105 | 1 tube, 3 mg/g | 1 tube, 3 mg/g | R | 1,9200 | 1,9200 | | | |
| TOBREX | | NOVARTIS PHARMA | | | | ATC: S01AA12 | | | |
| B-162 | 0850-263 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml | R | 8,67 | 8,67 | 0,63 | 1,06 | |
| | 0850-263 | | | | 2,39 | 2,39 | | | |
| B-162 * | 0727-560 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL | R | 3,0800 | 3,0800 | | | |
| B-162 ** | 0727-560 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL | R | 2,5300 | 2,5300 | | | |
| TOFRANIL 10 mg | | AMDIPHARM | | | | ATC: N06AA02 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73 | 0133-686 0133-686 | 60 comprimés enrobés, 10 mg | 60 omhulde tabletten, 10 mg | | 7,25 1,15 | 7,25 1,15 | 0,30 | 0,51 |
| B-73 * | 0719-492 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | | 0,0247 | 0,0247 | | |
| B-73 ** | 0719-492 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | | 0,0203 | 0,0203 | | |
| B-73 *** | 0719-492 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | | 0,0286 | 0,0286 | 0,0050 | 0,0085 |
| TOFRANIL 25 mg AMDIPHARM ATC: N06AA02 | | | | | | | | |
| B-73 | 0133-702 0133-702 | 200 comprimés enrobés, 25 mg | 200 omhulde tabletten, 25 mg | | 12,09 5,01 | 12,09 5,01 | 1,33 | 2,21 |
| B-73 * | 0719-500 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | | 0,0324 | 0,0324 | | |
| B-73 ** | 0719-500 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | | 0,0266 | 0,0266 | | |
| B-73 *** | 0719-500 | 1 comprimé enrobé, 25 mg | 1 omhulde tablet, 25 mg | | 0,0328 | 0,0328 | 0,0066 | 0,0110 |
| TOMUDEX Pfizer ATC: L01BA03 | | | | | | | | |
| | 0747-980 | 3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg | 3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg | | 215,69 | 215,69 | | |
| A-24 * | 0747-980 | 1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg | 1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg | | 78,5800 | 78,5800 | | |
| A-24 ** | 0747-980 | 1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg | 1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg | | 76,2100 | 76,2100 | | |
| TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CE01 | | | | | | | | |
| | 7702-079 | 1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | | 22,35 | 22,35 | | |
| A-28 * | 7702-079 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | G | 28,8400 | 28,8400 | | |
| A-28 ** | 7702-079 | 1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | G | 23,6900 | 23,6900 | | |
| TORASEMIDE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C03CA04 | | | | | | | | |
| B-25 | 2159-952 2159-952 | 30 comprimés, 10 mg | 30 tabletten, 10 mg | G | 11,87 4,84 | 11,87 4,84 | 1,28 | 2,14 |
| B-25 * | 0777-797 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2083 | 0,2083 | | |
| B-25 ** | 0777-797 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,1710 | 0,1710 | | |
| B-25 *** | 0777-797 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | G | 0,2113 | 0,2113 | 0,0427 | 0,0713 |
| TORASEMIDE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C03CA04 | | | | | | | | |
| B-25 | 2159-986 2159-986 | 30 comprimés, 20 mg | 30 tabletten, 20 mg | G | 19,50 10,66 | 19,50 10,66 | 2,83 | 4,71 |
| B-25 * | 0777-805 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,4587 | 0,4587 | | |
| B-25 ** | 0777-805 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,3767 | 0,3767 | | |
| B-25 *** | 0777-805 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | G | 0,4657 | 0,4657 | 0,0943 | 0,1570 |
| TORASEMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C03CA04 | | | | | | | | |
| B-25 | 2159-929 2159-929 | 30 comprimés, 5 mg | 30 tabletten, 5 mg | G | 8,37 2,14 | 8,37 2,14 | 0,57 | 0,95 |
| B-25 * | 0777-789 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0920 | 0,0920 | | |
| B-25 ** | 0777-789 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0757 | 0,0757 | | |
| B-25 *** | 0777-789 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,0947 | 0,0947 | 0,0190 | 0,0317 |
| TORREM 10 mg VIATRIS ATC: C03CA04 | | | | | | | | |
| B-25 | 1182-963 | 20 comprimés, 10 mg | 20 tabletten, 10 mg | R | 10,52 | 10,52 | 1,01 | 1,68 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--|--------------|--------------|--------|--------|
| | 1182-963 | | | | | 3,80 | 3,80 | | |
| B-25 * | 0743-583 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | | 0,2450 | 0,2450 | | |
| B-25 ** | 0743-583 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | | 0,2015 | 0,2015 | | |
| B-25 *** | 0743-583 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | | 0,2491 | 0,2491 | 0,0505 | 0,0840 |
| TORREM 2,5 mg VIATRIS ATC: C03CA04 | | | | | | | | | |
| B-23 | 4201-570 | 50 comprimés, 2,5 mg | 50 tabletten, 2,5 mg | R | | 8,86 | 8,86 | 0,67 | 1,12 |
| | 4201-570 | | | | | 2,54 | 2,54 | | |
| B-23 * | 0739-292 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | | 0,0656 | 0,0656 | | |
| B-23 ** | 0739-292 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | | 0,0538 | 0,0538 | | |
| B-23 *** | 0739-292 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | | 0,0666 | 0,0666 | 0,0134 | 0,0224 |
| TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | | |
| B-41 | 2893-576 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | | 9,95 | 9,95 | 0,89 | 1,49 |
| | 2893-576 | | | | | 3,37 | 3,37 | | |
| B-41 | 2893-592 | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | G | | 13,38 | 13,38 | 1,59 | 2,65 |
| | 2893-592 | | | | | 5,99 | 5,99 | | |
| B-41 * | 0753-236 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | | 0,0773 | 0,0773 | | |
| B-41 ** | 0753-236 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | | 0,0635 | 0,0635 | | |
| B-41 *** | 0753-236 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | | 0,0784 | 0,0784 | 0,0159 | 0,0265 |
| TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | | |
| B-41 | 2893-618 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | | 11,86 | 11,86 | 1,28 | 2,13 |
| | 2893-618 | | | | | 4,83 | 4,83 | | |
| B-41 | 2893-634 | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | G | | 24,60 | 24,60 | 3,86 | 6,48 |
| | 2893-634 | | | | | 14,73 | 14,73 | | |
| B-41 * | 0753-228 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-41 ** | 0753-228 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | | 0,1561 | 0,1561 | | |
| B-41 *** | 0753-228 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | G | | 0,1907 | 0,1907 | 0,0386 | 0,0648 |
| TOTALIP 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | | |
| B-41 | 2893-667 | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | G | | 24,60 | 24,60 | 3,86 | 6,48 |
| | 2893-667 | | | | | 14,73 | 14,73 | | |
| B-41 * | 0753-210 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-41 ** | 0753-210 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | | 0,1561 | 0,1561 | | |
| B-41 *** | 0753-210 | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | G | | 0,1907 | 0,1907 | 0,0386 | 0,0648 |
| TOTALIP 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 | | | | | | | | | |
| B-41 | 2893-550 | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | | 24,58 | 24,58 | 3,85 | 6,47 |
| | 2893-550 | | | | | 14,71 | 14,71 | | |
| B-41 * | 0753-202 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | | 0,1898 | 0,1898 | | |
| B-41 ** | 0753-202 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | | 0,1559 | 0,1559 | | |
| B-41 *** | 0753-202 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | | 0,1905 | 0,1905 | 0,0385 | 0,0647 |
| TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04 | | | | | | | | | |
| A-69 | 3954-765 | 3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL | 3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL | | | 79,81 | 79,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 3954-765 | | | | | 62,90 | 62,90 | | |
| A-69 * | 7726-656 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL | | | 24,5933 | 24,5933 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| A-69 ** | 7726-656 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/ml | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL | | 22,2233 | 22,2233 | | |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml | | SANOFI BELGIUM | | ATC: A10AE04 | | | | |
| A-69 | 3277-589 | 5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml | 5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml | | 67,91 | 67,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 3277-589 | | | | 52,42 | 52,42 | | |
| A-69 * | 7714-975 | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL | | 12,5360 | 12,5360 | | |
| A-69 ** | 7714-975 | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL | | 11,1140 | 11,1140 | | |
| TRACRIUM | | SANDOZ | | ATC: M03AC04 | | | | |
| | 0733-782 | 5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml | 5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | | 11,57 | 11,57 | | |
| B-140 * | 0733-782 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 2,9860 | 2,9860 | | |
| B-140 ** | 0733-782 | 1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 2,4520 | 2,4520 | | |
| TRACRIUM | | SANDOZ | | ATC: M03AC04 | | | | |
| | 0732-701 | 10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml | 10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml | | 12,19 | 12,19 | | |
| B-140 * | 0732-701 | 1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 1,5730 | 1,5730 | | |
| B-140 ** | 0732-701 | 1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL | 1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL | R | 1,2920 | 1,2920 | | |
| TRACTOCILE 7,5 mg/ml | | FERRING | | ATC: G02CX01 | | | | |
| | 0770-735 | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml | | 30,86 | 30,86 | | |
| B-94 * | 0770-735 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL | R | 39,8200 | 39,8200 | | |
| B-94 ** | 0770-735 | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL | R | 32,7100 | 32,7100 | | |
| TRACTOCILE 7,5 mg/ml | | FERRING | | ATC: G02CX01 | | | | |
| | 0770-727 | 1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml | 1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml | | 9,95 | 9,95 | | |
| B-94 * | 0770-727 | 1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL | R | 12,8400 | 12,8400 | | |
| B-94 ** | 0770-727 | 1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL | 1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL | R | 10,5500 | 10,5500 | | |
| TRADONAL | | VIATRIS | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 1280-395 | 10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml | 10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml | R | 9,34 | 9,34 | 0,77 | 1,28 |
| | 1280-395 | | | | 2,90 | 2,90 | | |
| B-56 * | 0748-426 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 0,3740 | 0,3740 | | |
| B-56 ** | 0748-426 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL | R | 0,3070 | 0,3070 | | |
| TRADONAL | | VIATRIS | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 1280-361 | 1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | R | 7,53 | 7,53 | 0,37 | 0,62 |
| | 1280-361 | | | | 1,40 | 1,40 | | |
| B-56 | 1280-379 | 1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | R | 11,37 | 11,37 | 1,18 | 1,97 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| | | mg/ml | oplossing, 100 mg/ml | | | | | | |
| B-56 * | 1280-379 0748-442 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | R | 4,46 0,1920 | 4,46 0,1920 | | | |
| B-56 ** | 0748-442 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | R | 0,1577 | 0,1577 | | | |
| TRADONAL VIATRIS ATC: N02AX02 | | | | | | | | | |
| B-56 | 1280-346 1280-346 | 30 gélules, 50 mg | 30 capsules, hard, 50 mg | R | 8,29 2,07 | 8,29 2,07 | 0,55 | 0,91 | |
| B-56 | 1280-353 1280-353 | 60 gélules, 50 mg | 60 capsules, hard, 50 mg | R | 10,40 3,71 | 10,40 3,71 | 0,98 | 1,64 | |
| B-56 * | 0748-434 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,0798 | 0,0798 | | | |
| B-56 ** | 0748-434 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,0655 | 0,0655 | | | |
| B-56 *** | 0748-434 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | R | 0,0811 | 0,0811 | 0,0163 | 0,0273 | |
| TRADONAL ODIS 50 mg VIATRIS ATC: N02AX02 | | | | | | | | | |
| B-56 | 2214-906 2214-906 | 30 comprimés orodispersibles, 50 mg | 30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg | G | 8,29 2,07 | 8,29 2,07 | 0,55 | 0,91 | |
| B-56 * | 0780-148 | 1 comprimé orodispersible, 50 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 50 mg | G | 0,0890 | 0,0890 | | | |
| B-56 ** | 0780-148 | 1 comprimé orodispersible, 50 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 50 mg | G | 0,0730 | 0,0730 | | | |
| B-56 *** | 0780-148 | 1 comprimé orodispersible, 50 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 50 mg | G | 0,0919 | 0,0919 | 0,0183 | 0,0303 | |
| TRADONAL Retard 100 mg VIATRIS ATC: N02AX02 | | | | | | | | | |
| B-56 | 1531-409 1531-409 | 60 gélules à libération prolongée, 100 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg | R | 14,56 6,89 | 14,56 6,89 | 1,83 | 3,05 | |
| B-56 * | 0762-674 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | R | 0,1482 | 0,1482 | | | |
| B-56 ** | 0762-674 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | R | 0,1217 | 0,1217 | | | |
| B-56 *** | 0762-674 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | R | 0,1505 | 0,1505 | 0,0305 | 0,0508 | |
| TRADONAL Retard 150 mg VIATRIS ATC: N02AX02 | | | | | | | | | |
| B-56 | 1531-417 1531-417 | 60 gélules à libération prolongée, 150 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 19,78 10,87 | 19,78 10,87 | 2,88 | 4,80 | |
| B-56 * | 0762-682 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 0,2338 | 0,2338 | | | |
| B-56 ** | 0762-682 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 0,1920 | 0,1920 | | | |
| B-56 *** | 0762-682 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | R | 0,2374 | 0,2374 | 0,0480 | 0,0800 | |
| TRADONAL Retard 200 mg VIATRIS ATC: N02AX02 | | | | | | | | | |
| B-56 | 1531-425 1531-425 | 60 gélules à libération prolongée, 200 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 21,63 12,29 | 21,63 12,29 | 3,26 | 5,43 | |
| B-56 * | 0762-690 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 0,2643 | 0,2643 | | | |
| B-56 ** | 0762-690 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 0,2172 | 0,2172 | | | |
| B-56 *** | 0762-690 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | R | 0,2684 | 0,2684 | 0,0543 | 0,0905 | |
| TRADONAL Retard 50 mg VIATRIS ATC: N02AX02 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 | 1532-431 | 60 gélules à libération prolongée, 50 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg | R | 11,95 | 11,95 | 1,30 | 2,17 |
| | 1532-431 | | | | 4,90 | 4,90 | | |
| B-56 * | 0762-666 | 1 gélule à libération prolongée, 50 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg | R | 0,1053 | 0,1053 | | |
| B-56 ** | 0762-666 | 1 gélule à libération prolongée, 50 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg | R | 0,0865 | 0,0865 | | |
| B-56 *** | 0762-666 | 1 gélule à libération prolongée, 50 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg | R | 0,1069 | 0,1069 | 0,0217 | 0,0362 |
| TRAFLOXAL OPHTIOLE | | BAUSCH & LOMB PHARMA | | | ATC: S01AE01 | | | |
| B-162 | 0379-578 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml | R | 7,52 | 7,52 | 0,37 | 0,61 |
| | 0379-578 | | | | 1,39 | 1,39 | | |
| B-162 * | 0739-888 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL | R | 1,7900 | 1,7900 | | |
| B-162 ** | 0739-888 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL | R | 1,4700 | 1,4700 | | |
| TRAMADOL EG 100 mg/ml | | EG | | | ATC: N02AX02 | | | |
| B-56 | 2059-038 | 1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | G | 13,11 | 13,11 | 1,53 | 2,55 |
| | 2059-038 | | | | 5,78 | 5,78 | | |
| B-56 * | 0774-679 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | G | 0,1492 | 0,1492 | | |
| B-56 ** | 0774-679 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | G | 0,1226 | 0,1226 | | |
| TRAMADOL EG 50 mg | | EG | | | ATC: N02AX02 | | | |
| B-56 | 1691-203 | 30 comprimés, 50 mg | 30 tabletten, 50 mg | G | 8,26 | 8,26 | 0,54 | 0,90 |
| | 1691-203 | | | | 2,04 | 2,04 | | |
| B-56 | 1677-798 | 60 comprimés, 50 mg | 60 tabletten, 50 mg | G | 10,37 | 10,37 | 0,98 | 1,63 |
| | 1677-798 | | | | 3,69 | 3,69 | | |
| B-56 * | 0768-663 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0793 | 0,0793 | | |
| B-56 ** | 0768-663 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0652 | 0,0652 | | |
| B-56 *** | 0768-663 | 1 comprimé, 50 mg | 1 tablet, 50 mg | G | 0,0806 | 0,0806 | 0,0163 | 0,0272 |
| TRAMADOL KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N02AX02 | | | |
| B-56 | 3923-737 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 10,34 | 10,34 | 0,97 | 1,62 |
| | 3923-737 | | | | 3,67 | 3,67 | | |
| B-56 | 3923-745 | 60 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 13,92 | 13,92 | 1,70 | 2,83 |
| | 3923-745 | | | | 6,40 | 6,40 | | |
| B-56 | 3924-818 | 100 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 21,27 | 21,27 | 3,18 | 5,31 |
| | 3924-818 | | | | 12,01 | 12,01 | | |
| B-56 * | 7725-468 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1550 | 0,1550 | | |
| B-56 ** | 7725-468 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1273 | 0,1273 | | |
| B-56 *** | 7725-468 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1574 | 0,1574 | 0,0318 | 0,0531 |
| TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | ATC: N02AX02 | | | |
| B-56 | 3910-510 | 10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 9,22 | 9,22 | 0,75 | 1,24 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|----------------|----------------|--------|--------|
| B-56 * | 3910-510 7725-450 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 2,81 0,3630 | 2,81 0,3630 | | |
| B-56 ** | 7725-450 | 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL | G | 0,2980 | 0,2980 | | |
| TRAMADOL KRKA 150 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02 | | | | | | | | |
| B-56 | 3923-679 | 20 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 10,34 | 10,34 | 0,97 | 1,62 |
| | 3923-679 | | | | 3,67 | 3,67 | | |
| B-56 | 3923-687 | 60 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 19,72 | 19,72 | 2,87 | 4,79 |
| | 3923-687 | | | | 10,83 | 10,83 | | |
| B-56 | 3923-695 | 100 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 26,36 | 26,36 | 4,10 | 6,89 |
| | 3923-695 | | | | 16,25 | 16,25 | | |
| B-56 * | 7725-476 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,2097 | 0,2097 | | |
| B-56 ** | 7725-476 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,1723 | 0,1723 | | |
| B-56 *** | 7725-476 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,2083 | 0,2083 | 0,0410 | 0,0689 |
| TRAMADOL KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02 | | | | | | | | |
| B-56 | 3923-711 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 20,16 | 20,16 | 2,96 | 4,93 |
| | 3923-711 | | | | 11,16 | 11,16 | | |
| B-56 | 3923-729 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 30,09 | 30,09 | 4,62 | 7,76 |
| | 3923-729 | | | | 19,50 | 19,50 | | |
| B-56 * | 7725-484 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2516 | 0,2516 | | |
| B-56 ** | 7725-484 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2067 | 0,2067 | | |
| B-56 *** | 7725-484 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2456 | 0,2456 | 0,0462 | 0,0776 |
| TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02 | | | | | | | | |
| B-56 | 3739-380 | 30 gélules, 50 mg | 30 capsules, hard, 50 mg | G | 8,25 | 8,25 | 0,54 | 0,90 |
| | 3739-380 | | | | 2,03 | 2,03 | | |
| B-56 | 3739-372 | 60 gélules, 50 mg | 60 capsules, hard, 50 mg | G | 10,15 | 10,15 | 0,94 | 1,56 |
| | 3739-372 | | | | 3,53 | 3,53 | | |
| B-56 * | 7724-164 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,0760 | 0,0760 | | |
| B-56 ** | 7724-164 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,0623 | 0,0623 | | |
| B-56 *** | 7724-164 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,0770 | 0,0770 | 0,0157 | 0,0260 |
| TRAMADOL RETARD EG 100 mg EG ATC: N02AX02 | | | | | | | | |
| B-56 | 2448-371 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 10,37 | 10,37 | 0,98 | 1,63 |
| | 2448-371 | | | | 3,69 | 3,69 | | |
| B-56 | 2448-397 | 60 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 13,95 | 13,95 | 1,70 | 2,84 |
| | 2448-397 | | | | 6,42 | 6,42 | | |
| B-56 | 2453-694 | 90 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 19,72 | 19,72 | 2,87 | 4,79 |
| | 2453-694 | | | | 10,83 | 10,83 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 * | 0787-333 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1553 | 0,1553 | | |
| B-56 ** | 0787-333 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1276 | 0,1276 | | |
| B-56 *** | 0787-333 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1576 | 0,1576 | 0,0319 | 0,0532 |
| TRAMADOL RETARD EG 150 mg EG | | | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 2448-363 | 20 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 10,37 | 10,37 | 0,98 | 1,63 |
| | 2448-363 | | | | 3,69 | 3,69 | | |
| B-56 | 2448-389 | 60 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 19,74 | 19,74 | 2,87 | 4,79 |
| | 2448-389 | | | | 10,84 | 10,84 | | |
| B-56 | 2453-702 | 90 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 26,38 | 26,38 | 4,10 | 6,89 |
| | 2453-702 | | | | 16,27 | 16,27 | | |
| B-56 * | 0787-341 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,2333 | 0,2333 | | |
| B-56 ** | 0787-341 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,1917 | 0,1917 | | |
| B-56 *** | 0787-341 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,2317 | 0,2317 | 0,0456 | 0,0766 |
| TRAMADOL RETARD EG 200 mg EG | | | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 2448-405 | 20 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 11,31 | 11,31 | 1,17 | 1,95 |
| | 2448-405 | | | | 4,41 | 4,41 | | |
| B-56 | 2448-355 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 21,63 | 21,63 | 3,26 | 5,43 |
| | 2448-355 | | | | 12,29 | 12,29 | | |
| B-56 | 2453-678 | 90 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 30,10 | 30,10 | 4,62 | 7,77 |
| | 2453-678 | | | | 19,51 | 19,51 | | |
| B-56 * | 0787-358 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2798 | 0,2798 | | |
| B-56 ** | 0787-358 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2298 | 0,2298 | | |
| B-56 *** | 0787-358 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2730 | 0,2730 | 0,0513 | 0,0863 |
| TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ | | | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 1784-123 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 10,34 | 10,34 | 0,97 | 1,62 |
| | 1784-123 | | | | 3,67 | 3,67 | | |
| B-56 | 1784-099 | 60 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 13,92 | 13,92 | 1,70 | 2,83 |
| | 1784-099 | | | | 6,40 | 6,40 | | |
| B-56 | 2562-833 | 100 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | G | 21,27 | 21,27 | 3,18 | 5,31 |
| | 2562-833 | | | | 12,01 | 12,01 | | |
| B-56 * | 0774-232 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1550 | 0,1550 | | |
| B-56 ** | 0774-232 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1273 | 0,1273 | | |
| B-56 *** | 0774-232 | 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg | G | 0,1397 | 0,1397 | 0,0283 | 0,0472 |

| TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: N02AX02 | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 | 2312-585 | 1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | G | 7,45 | 7,45 | 0,35 | 0,59 |
| | 2312-585 | | | | 1,33 | 1,33 | | |
| B-56 | 2312-601 | 1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | G | 12,74 | 12,74 | 1,46 | 2,43 |
| | 2312-601 | | | | 5,50 | 5,50 | | |
| B-56 * | 0783-357 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | G | 0,1420 | 0,1420 | | |
| B-56 ** | 0783-357 | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL | G | 0,1166 | 0,1166 | | |
| TRAMADOL SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 1784-131 | 20 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 10,34 | 10,34 | 0,97 | 1,62 |
| | 1784-131 | | | | 3,67 | 3,67 | | |
| B-56 | 1784-149 | 60 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 19,01 | 19,01 | 2,73 | 4,54 |
| | 1784-149 | | | | 10,28 | 10,28 | | |
| B-56 | 2562-858 | 100 comprimés à libération prolongée, 150 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg | G | 26,36 | 26,36 | 4,10 | 6,89 |
| | 2562-858 | | | | 16,25 | 16,25 | | |
| B-56 * | 0774-240 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,2097 | 0,2097 | | |
| B-56 ** | 0774-240 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,1723 | 0,1723 | | |
| B-56 *** | 0774-240 | 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg | G | 0,2083 | 0,2083 | 0,0410 | 0,0689 |
| TRAMADOL SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 1784-156 | 20 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 11,30 | 11,30 | 1,17 | 1,94 |
| | 1784-156 | | | | 4,40 | 4,40 | | |
| B-56 | 1784-164 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 21,32 | 21,32 | 3,20 | 5,33 |
| | 1784-164 | | | | 12,05 | 12,05 | | |
| B-56 | 2562-866 | 100 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 30,09 | 30,09 | 4,62 | 7,76 |
| | 2562-866 | | | | 19,50 | 19,50 | | |
| B-56 * | 0774-257 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2516 | 0,2516 | | |
| B-56 ** | 0774-257 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2067 | 0,2067 | | |
| B-56 *** | 0774-257 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2456 | 0,2456 | 0,0462 | 0,0776 |
| TRAMADOL SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AX02 | | | | |
| B-56 | 2103-356 | 30 gélules, 50 mg | 30 capsules, hard, 50 mg | G | 8,25 | 8,25 | 0,54 | 0,90 |
| | 2103-356 | | | | 2,03 | 2,03 | | |
| B-56 | 2103-349 | 60 gélules, 50 mg | 60 capsules, hard, 50 mg | G | 10,15 | 10,15 | 0,94 | 1,56 |
| | 2103-349 | | | | 3,53 | 3,53 | | |
| B-56 * | 0776-062 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,0760 | 0,0760 | | |
| B-56 ** | 0776-062 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,0623 | 0,0623 | | |
| B-56 *** | 0776-062 | 1 gélule, 50 mg | 1 capsule, hard, 50 mg | G | 0,0770 | 0,0770 | 0,0157 | 0,0260 |

| TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg | | SANDOZ | | ATC: N02AX02 | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-56 | 2446-805 | 60 comprimés à libération prolongée, 200 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg | G | 21,32 | 21,32 | 3,20 | 5,33 |
| | 2446-805 | | | | 12,05 | 12,05 | | |
| B-56 * | 0788-307 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2592 | 0,2592 | | |
| B-56 ** | 0788-307 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2128 | 0,2128 | | |
| B-56 *** | 0788-307 | 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg | G | 0,2631 | 0,2631 | 0,0533 | 0,0888 |
| TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 4381-067 | 20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg | 20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg | G | 7,88 | 7,88 | 1,50 | 1,50 |
| | 4381-067 | | | | 1,70 | 1,70 | | |
| C-29 | 4381-075 | 60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg | 60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg | G | 11,89 | 11,89 | 4,29 | 4,29 |
| | 4381-075 | | | | 4,85 | 4,85 | | |
| C-29 | 4381-083 | 100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg | 100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg | G | 16,21 | 16,21 | 7,20 | 7,20 |
| | 4381-083 | | | | 8,15 | 8,15 | | |
| C-29 * | 7731-805 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1052 | 0,1052 | | |
| C-29 ** | 7731-805 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,0864 | 0,0864 | | |
| C-29 *** | 7731-805 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1067 | 0,1067 | 0,0720 | 0,0720 |
| TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg | | EG | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 3046-273 | 20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 7,88 | 7,88 | 1,50 | 1,50 |
| | 3046-273 | | | | 1,70 | 1,70 | | |
| C-29 | 3046-281 | 60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 12,07 | 12,07 | 4,41 | 4,41 |
| | 3046-281 | | | | 4,99 | 4,99 | | |
| C-29 | 3046-299 | 100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 16,21 | 16,21 | 7,20 | 7,20 |
| | 3046-299 | | | | 8,15 | 8,15 | | |
| C-29 * | 7703-259 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1052 | 0,1052 | | |
| C-29 ** | 7703-259 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,0864 | 0,0864 | | |
| C-29 *** | 7703-259 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1067 | 0,1067 | 0,0720 | 0,0720 |
| TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 3477-809 | 60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 11,89 | 11,89 | 4,29 | 4,29 |
| | 3477-809 | | | | 4,85 | 4,85 | | |
| C-29 | 3484-078 | 90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 15,14 | 15,14 | 6,48 | 6,48 |
| | 3484-078 | | | | 7,33 | 7,33 | | |
| C-29 * | 7716-129 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1051 | 0,1051 | | |
| C-29 ** | 7716-129 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,0863 | 0,0863 | | |
| C-29 *** | 7716-129 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1067 | 0,1067 | 0,0720 | 0,0720 |

| | | mg | mg | | | | | | |
|----------|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| | | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA | | ATC: N02AJ13 | | | | | |
| C-29 | 3007-317 | 20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 7,88 | 7,88 | 1,50 | 1,50 | |
| | 3007-317 | | | | 1,70 | 1,70 | | | |
| C-29 | 3007-325 | 60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 11,94 | 11,94 | 4,32 | 4,32 | |
| | 3007-325 | | | | 4,89 | 4,89 | | | |
| C-29 | 3007-333 | 90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 15,15 | 15,15 | 6,49 | 6,49 | |
| | 3007-333 | | | | 7,34 | 7,34 | | | |
| C-29 | 3455-193 | 120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | G | 18,32 | 18,32 | 8,63 | 8,63 | |
| | 3455-193 | | | | 9,76 | 9,76 | | | |
| C-29 * | 7702-426 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1050 | 0,1050 | | | |
| C-29 ** | 7702-426 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,0863 | 0,0863 | | | |
| C-29 *** | 7702-426 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg | G | 0,1065 | 0,1065 | 0,0719 | 0,0719 | |
| | | TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 2044-949 | 30 gélules à libération prolongée, 100 mg | 30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 10,72 | 10,72 | 1,05 | 1,75 | |
| | 2044-949 | | | | 3,96 | 3,96 | | | |
| B-56 * | 0774-901 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,1703 | 0,1703 | | | |
| B-56 ** | 0774-901 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,1400 | 0,1400 | | | |
| B-56 *** | 0774-901 | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg | G | 0,1728 | 0,1728 | 0,0350 | 0,0583 | |
| | | TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 2044-931 | 30 gélules à libération prolongée, 150 mg | 30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 14,49 | 14,49 | 1,81 | 3,02 | |
| | 2044-931 | | | | 6,83 | 6,83 | | | |
| B-56 * | 0774-919 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,2937 | 0,2937 | | | |
| B-56 ** | 0774-919 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,2413 | 0,2413 | | | |
| B-56 *** | 0774-919 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,2986 | 0,2986 | 0,0603 | 0,1007 | |
| | | TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB | | ATC: N02AX02 | | | | | |
| B-56 | 2044-956 | 30 gélules à libération prolongée, 200 mg | 30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 16,41 | 16,41 | 2,20 | 3,67 | |
| | 2044-956 | | | | 8,30 | 8,30 | | | |
| B-56 * | 0774-927 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,3570 | 0,3570 | | | |
| B-56 ** | 0774-927 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,2933 | 0,2933 | | | |
| B-56 *** | 0774-927 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | G | 0,3625 | 0,3625 | 0,0733 | 0,1223 | |
| | | TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | ATC: C07AG01 | | | | | |
| B-16 | 0091-173 | 75 comprimés, 100 mg | 75 tabletten, 100 mg | | 13,65 | 13,65 | 1,64 | 2,74 | |
| | 0091-173 | | | | 6,20 | 6,20 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-16 * | 0719-666 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1067 | 0,1067 | | |
| B-16 ** | 0719-666 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,0876 | 0,0876 | | |
| B-16 *** | 0719-666 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | | 0,1083 | 0,1083 | 0,0219 | 0,0365 |
| TRANDATE 200 mg | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | | ATC: C07AG01 | | | |
| B-16 | 0091-207 | 75 comprimés, 200 mg | 75 tabletten, 200 mg | | 18,54 | 18,54 | 2,63 | 4,38 |
| | 0091-207 | | | | 9,92 | 9,92 | | |
| B-16 * | 0719-674 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | | 0,1707 | 0,1707 | | |
| B-16 ** | 0719-674 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | | 0,1403 | 0,1403 | | |
| B-16 *** | 0719-674 | 1 comprimé, 200 mg | 1 tablet, 200 mg | | 0,1734 | 0,1734 | 0,0351 | 0,0584 |
| TRANDATE 5 mg/ml | | ASPEN PHARMA IRELAND LTD | | | ATC: C07AG01 | | | |
| | 0719-658 | 5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml | 5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml | | 11,89 | 11,89 | | |
| B-16 * | 0719-658 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | | 3,0680 | 3,0680 | | |
| B-16 ** | 0719-658 | 1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5) | 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) | | 2,5200 | 2,5200 | | |
| TRANSTEC 35 µg/h | | GRUNENTHAL | | | ATC: N02AE01 | | | |
| B-56 | 1719-723 | 5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h | R | 23,28 | 23,28 | 3,60 | 6,00 |
| | 1719-723 | | | | 13,57 | 13,57 | | |
| B-56 | 2308-443 | 10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h | R | 35,30 | 35,30 | 5,35 | 8,99 |
| | 2308-443 | | | | 24,04 | 24,04 | | |
| B-56 * | 0771-923 | 1 dispositif transdermique, 35 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h | R | 3,1020 | 3,1020 | | |
| B-56 ** | 0771-923 | 1 dispositif transdermique, 35 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h | R | 2,5480 | 2,5480 | | |
| TRANSTEC 52,5 µg/h | | GRUNENTHAL | | | ATC: N02AE01 | | | |
| B-56 | 1719-749 | 5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h | R | 30,42 | 30,42 | 4,67 | 7,84 |
| | 1719-749 | | | | 19,79 | 19,79 | | |
| B-56 | 2308-450 | 10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h | R | 48,03 | 48,03 | 7,12 | 11,98 |
| | 2308-450 | | | | 35,11 | 35,11 | | |
| B-56 * | 0771-931 | 1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h | R | 4,4330 | 4,4330 | | |
| B-56 ** | 0771-931 | 1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h | R | 3,7220 | 3,7220 | | |
| TRANSTEC 70 µg/h | | GRUNENTHAL | | | ATC: N02AE01 | | | |
| B-56 | 1719-756 | 5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h | R | 37,76 | 37,76 | 5,69 | 9,57 |
| | 1719-756 | | | | 26,17 | 26,17 | | |
| B-56 | 2308-435 | 10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h | R | 61,18 | 61,18 | 8,30 | 12,50 |
| | 2308-435 | | | | 46,56 | 46,56 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-56 * | 0771-949 | 1 dispositif transdermique, 70 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h | R | 5,6460 | 5,6460 | | |
| B-56 ** | 0771-949 | 1 dispositif transdermique, 70 µg/h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h | R | 4,9350 | 4,9350 | | |
| TRAVATAN 40 µg/ml | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: S01EE04 | | | | |
| B-168 | 2730-521 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml | R | 19,14 | 19,14 | 2,76 | 4,59 |
| | 2730-521 | | | | 10,39 | 10,39 | | |
| B-168 * | 0771-055 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL | R | 4,4700 | 4,4700 | | |
| B-168 ** | 0771-055 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL | R | 3,6700 | 3,6700 | | |
| TRAVOGEN | | LEO PHARMA | | ATC: D01AC05 | | | | |
| B-154 | 0826-297 | 1 tube 20 g crème, 10 mg/g | 1 tube 20 g crème, 10 mg/g | | 7,81 | 7,81 | 0,44 | 0,73 |
| | 0826-297 | | | | 1,65 | 1,65 | | |
| B-154 * | 0719-724 | 1 g crème, 10 mg/g | 1 g crème, 10 mg/g | | 0,1065 | 0,1065 | | |
| B-154 ** | 0719-724 | 1 g crème, 10 mg/g | 1 g crème, 10 mg/g | | 0,0875 | 0,0875 | | |
| TRAVOPROST EG 40 µg/ml | | EG | | ATC: S01EE04 | | | | |
| B-168 | 3167-475 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml | G | 10,07 | 10,07 | 0,92 | 1,53 |
| | 3167-475 | | | | 3,46 | 3,46 | | |
| B-168 | 3167-491 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml | G | 19,14 | 19,14 | 2,76 | 4,59 |
| | 3167-491 | | | | 10,39 | 10,39 | | |
| B-168 * | 7717-580 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL | G | 4,4700 | 4,4700 | | |
| B-168 ** | 7717-580 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL | G | 3,6700 | 3,6700 | | |
| TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml | | SANDOZ | | ATC: S01EE04 | | | | |
| B-168 | 3183-308 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml | G | 19,14 | 19,14 | 2,76 | 4,59 |
| | 3183-308 | | | | 10,39 | 10,39 | | |
| B-168 * | 7718-323 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL | G | 4,4700 | 4,4700 | | |
| B-168 ** | 7718-323 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL | G | 3,6700 | 3,6700 | | |
| TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml | | EG | | ATC: S01ED51 | | | | |
| B-168 | 3631-298 | 3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | 3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | G | 23,12 | 23,12 | 3,56 | 5,94 |
| | 3631-298 | | | | 13,43 | 13,43 | | |
| B-168 * | 7721-558 | 1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | 1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | G | 5,7767 | 5,7767 | | |
| B-168 ** | 7721-558 | 1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | 1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL | G | 4,7467 | 4,7467 | | |
| TRAZODONE EG 100 mg | | EG | | ATC: N06AX05 | | | | |
| B-73 | 3069-408 | 30 comprimés, 100 mg | 30 tabletten, 100 mg | G | 8,43 | 8,43 | 0,58 | 0,97 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--------|
| B-73 | 3069-408 3069-416 | 90 comprimés, 100 mg | 90 tabletten, 100 mg | G | 2,19 11,85 | 2,19 11,85 | 1,28 | 2,13 |
| B-73 | 3069-416 3069-424 | 120 comprimés, 100 mg | 120 tabletten, 100 mg | G | 4,82 14,35 | 4,82 14,35 | 1,78 | 2,97 |
| B-73 * | 3069-424 7706-609 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 6,73 0,0724 | 6,73 0,0724 | | |
| B-73 ** | 7706-609 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0594 | 0,0594 | | |
| B-73 *** | 7706-609 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0735 | 0,0735 | 0,0148 | 0,0247 |
| TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX05 | | | | | | | | |
| B-73 | 1768-779 | 30 comprimés, 100 mg | 30 tabletten, 100 mg | G | 8,35 | 8,35 | 0,56 | 0,94 |
| B-73 | 1768-779 1768-787 | 90 comprimés, 100 mg | 90 tabletten, 100 mg | G | 2,12 11,59 | 2,12 11,59 | 1,23 | 2,04 |
| B-73 | 1768-787 2828-523 | 120 comprimés, 100 mg | 120 tabletten, 100 mg | G | 4,62 14,35 | 4,62 14,35 | 1,78 | 2,97 |
| B-73 * | 2828-523 0773-671 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 6,73 0,0724 | 6,73 0,0724 | | |
| B-73 ** | 0773-671 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0594 | 0,0594 | | |
| B-73 *** | 0773-671 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | G | 0,0673 | 0,0673 | 0,0137 | 0,0227 |
| TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AL08 | | | | | | | | |
| B-346 | 3718-046 | 30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose | 30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 63,34 | 63,34 | 8,30 | 12,50 |
| B-346 | 3718-046 3718-038 | 90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose | 90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 48,44 163,79 | 48,44 163,79 | 8,30 | 12,50 |
| B-346 * | 3718-038 7722-911 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 139,50 51,6600 | 139,50 51,6600 | | |
| B-346 ** | 7722-911 | 1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose | 1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis | | 49,2900 | 49,2900 | | |
| TRESIBA 100 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06 | | | | | | | | |
| A-69 | 3877-271 | 5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 52,53 | 52,53 | 0,00 | 0,00 |
| A-69 * | 3877-271 7724-867 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 39,03 9,6960 | 39,03 9,6960 | | |
| A-69 ** | 7724-867 | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | | 8,2740 | 8,2740 | | |
| TRESIBA 200 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06 | | | | | | | | |
| A-69 | 3804-788 | 3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL | | 61,54 | 61,54 | 0,00 | 0,00 |
| A-69 * | 3804-788 7724-594 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL | | 46,87 18,9300 | 46,87 18,9300 | | |
| A-69 ** | 7724-594 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL | | 16,5600 | 16,5600 | | |
| TRI-MINULET Pfizer (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AB06 | | | | | | | | |
| Cx-2 | 0253-146 | 63 comprimés (trihasiques) | 63 tabletten (trifasisch) | R | 13,71 | 13,71 | 8,83 | 8,83 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| Cx-2 * | 0253-146 0737-791 | 21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg | 21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg | R | 6,24 2,6833 | 6,24 2,6833 | | |
| Cx-2 ** | 0737-791 | 21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg | 21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg | R | 2,2033 | 2,2033 | | |
| Cx-2 *** | 0737-791 | 1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg | 1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg | R | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 |
| TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg | | CHIESI | | ATC: R03AL09 | | | | |
| B-346 | 4347-787 | 120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose | 120 doses aérosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis | CR | 63,34 | 63,34 | 8,30 | 12,50 |
| | 4347-787 | | | | 48,44 | 48,44 | | |
| B-346 | 4347-753 | 360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose | 360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis | CR | 163,79 | 163,79 | 8,30 | 12,50 |
| | 4347-753 | | | | 139,50 | 139,50 | | |
| B-346 * | 7735-707 | 1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose | 1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis | CR | 51,6600 | 51,6600 | | |
| B-346 ** | 7735-707 | 1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose | 1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis | CR | 49,2900 | 49,2900 | | |
| TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg | | CHIESI | | ATC: R03AL09 | | | | |
| B-346 | 3593-308 | 120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose | 120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis | CR | 63,99 | 63,99 | 8,30 | 12,50 |
| | 3593-308 | | | | 49,00 | 49,00 | | |
| B-346 | 3593-316 | 360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose | 360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis | CR | 165,44 | 165,44 | 8,30 | 12,50 |
| | 3593-316 | | | | 141,01 | 141,01 | | |
| B-346 * | 7722-184 | 1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose | 1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis | CR | 52,1933 | 52,1933 | | |
| B-346 ** | 7722-184 | 1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose | 1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis | CR | 49,8233 | 49,8233 | | |
| TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg | | CHIESI | | ATC: R03AL09 | | | | |
| B-346 | 4347-779 | 120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | 120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | CR | 63,99 | 63,99 | 8,30 | 12,50 |
| | 4347-779 | | | | 49,00 | 49,00 | | |
| B-346 | 4347-761 | 360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | 360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | CR | 165,44 | 165,44 | 8,30 | 12,50 |
| | 4347-761 | | | | 141,01 | 141,01 | | |
| B-346 * | 7732-035 | 1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | 1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | CR | 52,1933 | 52,1933 | | |
| B-346 ** | 7732-035 | 1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | 1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg | CR | 49,8233 | 49,8233 | | |
| TRINIPATCH 10 | | AREGA PHARMA | | ATC: C01DA02 | | | | |
| B-3 | 1287-929 | 30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h | | 25,09 | 25,09 | 3,92 | 6,59 |
| | 1287-929 | | | | 15,15 | 15,15 | | |
| B-3 * | 0746-172 | 1 dispositif transdermique, 10 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h | | 0,6517 | 0,6517 | | |
| B-3 ** | 0746-172 | 1 dispositif transdermique, 10 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h | | 0,5353 | 0,5353 | | |
| TRINIPATCH 15 | | AREGA PHARMA | | ATC: C01DA02 | | | | |
| B-3 | 1287-945 | 30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h | | 33,36 | 33,36 | 5,07 | 8,53 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|----|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-3 * | 1287-945 0746-578 | 1 dispositif transdermique, 15 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h | | 22,34 0,9610 | 22,34 0,9610 | | |
| B-3 ** | 0746-578 | 1 dispositif transdermique, 15 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h | | 0,7893 | 0,7893 | | |
| TRINIPATCH 5 AREGA PHARMA ATC: C01DA02 | | | | | | | | |
| B-3 | 1287-903 | 30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h | | 18,69 10,04 | 18,69 10,04 | 2,66 | 4,44 |
| B-3 * | 0746-164 | 1 dispositif transdermique, 5 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h | | 0,4320 | 0,4320 | | |
| B-3 ** | 0746-164 | 1 dispositif transdermique, 5 mg/24h | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h | | 0,3547 | 0,3547 | | |
| TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06 | | | | | | | | |
| B-341 | 3411-972 3411-972 | 98 gélules | 98 capsules, hard | CR | 49,42 36,32 | 49,42 36,32 | 7,31 | 12,31 |
| B-341 * | 7716-111 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg | CR | 0,4654 | 0,4654 | | |
| B-341 ** | 7716-111 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg | CR | 0,3929 | 0,3929 | | |
| B-341 *** | 7716-111 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg | CR | 0,4478 | 0,4478 | 0,0746 | 0,1256 |
| TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06 | | | | | | | | |
| B-341 | 3411-998 3411-998 | 98 gélules | 98 capsules, hard | CR | 34,12 23,01 | 34,12 23,01 | 5,18 | 8,71 |
| B-341 * | 7716-095 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg | CR | 0,3030 | 0,3030 | | |
| B-341 ** | 7716-095 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg | CR | 0,2489 | 0,2489 | | |
| B-341 *** | 7716-095 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg | CR | 0,2917 | 0,2917 | 0,0529 | 0,0889 |
| TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06 | | | | | | | | |
| B-341 | 3412-020 3412-020 | 98 gélules | 98 capsules, hard | CR | 39,44 27,64 | 39,44 27,64 | 5,92 | 9,96 |
| B-341 * | 7716-103 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg | CR | 0,3640 | 0,3640 | | |
| B-341 ** | 7716-103 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg | CR | 0,2990 | 0,2990 | | |
| B-341 *** | 7716-103 | 1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg | CR | 0,3460 | 0,3460 | 0,0604 | 0,1016 |
| TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06 | | | | | | | | |
| B-341 | 3926-706 3926-706 | 98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | 98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | CR | 49,42 36,32 | 49,42 36,32 | 7,31 | 12,31 |
| B-341 * | 7725-435 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | CR | 0,4654 | 0,4654 | | |
| B-341 ** | 7725-435 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | CR | 0,3929 | 0,3929 | | |
| B-341 *** | 7725-435 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg | CR | 0,4478 | 0,4478 | 0,0746 | 0,1256 |
| TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06 | | | | | | | | |
| B-341 | 3926-714 | 98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | 98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | CR | 34,12 | 34,12 | 5,18 | 8,71 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|----|--------------|--------------|--------|--------|
| | 3926-714 | | | | 23,01 | 23,01 | | |
| B-341 * | 7725-419 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | CR | 0,3030 | 0,3030 | | |
| B-341 ** | 7725-419 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | CR | 0,2489 | 0,2489 | | |
| B-341 *** | 7725-419 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg | CR | 0,2917 | 0,2917 | 0,0529 | 0,0889 |
| TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg | | THERABEL PHARMA | | | ATC: C10BX06 | | | |
| B-341 | 3926-730 | 98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | 98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | CR | 39,44 | 39,44 | 5,92 | 9,96 |
| | 3926-730 | | | | 27,64 | 27,64 | | |
| B-341 * | 7725-427 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | CR | 0,3640 | 0,3640 | | |
| B-341 ** | 7725-427 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | CR | 0,2990 | 0,2990 | | |
| B-341 *** | 7725-427 | 1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | 1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg | CR | 0,3460 | 0,3460 | 0,0604 | 0,1016 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C09BX01 | | | |
| B-21 | 3158-292 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | R | 28,79 | 28,79 | 4,44 | 7,46 |
| | 3158-292 | | | | 18,37 | 18,37 | | |
| B-21 | 3158-300 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | R | 58,71 | 58,71 | 8,61 | 14,49 |
| | 3158-300 | | | | 44,41 | 44,41 | | |
| B-21 * | 7708-522 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,6020 | 0,6020 | | |
| B-21 ** | 7708-522 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,5230 | 0,5230 | | |
| B-21 *** | 7708-522 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,5909 | 0,5909 | 0,0957 | 0,1610 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | | ATC: C09BX01 | | | |
| B-21 | 4772-034 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 61,56 | 61,56 | 9,00 | 15,16 |
| | 4772-034 | | | | 46,89 | 46,89 | | |
| B-21 * | 7739-881 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,6312 | 0,6312 | | |
| B-21 ** | 7739-881 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,5522 | 0,5522 | | |
| B-21 *** | 7739-881 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,6226 | 0,6226 | 0,1000 | 0,1684 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: C09BX01 | | | |
| B-21 | 4625-901 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 58,71 | 58,71 | 8,61 | 14,49 |
| | 4625-901 | | | | 44,41 | 44,41 | | |
| B-21 * | 7735-962 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,6020 | 0,6020 | | |
| B-21 ** | 7735-962 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,5230 | 0,5230 | | |
| B-21 *** | 7735-962 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,5909 | 0,5909 | 0,0957 | 0,1610 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | | SERVIER BENELUX | | | ATC: C09BX01 | | | |
| B-21 | 3158-276 | 30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | R | 29,23 | 29,23 | 4,50 | 7,57 |
| | 3158-276 | | | | 18,76 | 18,76 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 | 3158-284 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | R | 47,69 | 47,69 | 7,07 | 11,90 |
| | 3158-284 | | | | 34,82 | 34,82 | | |
| B-21 * | 7708-514 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4891 | 0,4891 | | |
| B-21 ** | 7708-514 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4101 | 0,4101 | | |
| B-21 *** | 7708-514 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4684 | 0,4684 | 0,0786 | 0,1322 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 4772-026 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 50,01 | 50,01 | 7,39 | 12,45 |
| | 4772-026 | | | | 36,84 | 36,84 | | |
| B-21 * | 7739-873 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,5129 | 0,5129 | | |
| B-21 ** | 7739-873 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4339 | 0,4339 | | |
| B-21 *** | 7739-873 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4942 | 0,4942 | 0,0821 | 0,1383 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 3412-632 | 90 comprimés pelliculés | 90 filmomhulde tabletten | R | 50,01 | 50,01 | 7,39 | 12,45 |
| | 3412-632 | | | | 36,84 | 36,84 | | |
| B-21 * | 7715-154 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,5129 | 0,5129 | | |
| B-21 ** | 7715-154 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4339 | 0,4339 | | |
| B-21 *** | 7715-154 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4942 | 0,4942 | 0,0821 | 0,1383 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 4625-919 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 47,69 | 47,69 | 7,07 | 11,90 |
| | 4625-919 | | | | 34,82 | 34,82 | | |
| B-21 * | 7735-954 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4891 | 0,4891 | | |
| B-21 ** | 7735-954 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4101 | 0,4101 | | |
| B-21 *** | 7735-954 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg | R | 0,4684 | 0,4684 | 0,0786 | 0,1322 |
| TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 3435-195 | 90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | R | 61,56 | 61,56 | 9,00 | 15,16 |
| | 3435-195 | | | | 46,89 | 46,89 | | |
| B-21 * | 7716-186 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,6312 | 0,6312 | | |
| B-21 ** | 7716-186 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,5522 | 0,5522 | | |
| B-21 *** | 7716-186 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg | R | 0,6226 | 0,6226 | 0,1000 | 0,1684 |
| TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 3158-250 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg | R | 19,55 | 19,55 | 2,84 | 4,73 |
| | 3158-250 | | | | 10,70 | 10,70 | | |
| B-21 | 3158-268 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg | R | 43,54 | 43,54 | 6,49 | 10,92 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 3158-268 | | | | 31,20 | 31,20 | | |
| B-21 * | 7708-506 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg | R | 0,4464 | 0,4464 | | |
| B-21 ** | 7708-506 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg | R | 0,3674 | 0,3674 | | |
| B-21 *** | 7708-506 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg | R | 0,4224 | 0,4224 | 0,0721 | 0,1213 |
| TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO | | | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 3435-229 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | R | 43,54 | 43,54 | 6,49 | 10,92 |
| | 3435-229 | | | | 31,20 | 31,20 | | |
| B-21 * | 7742-828 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | R | 0,4464 | 0,4464 | | |
| B-21 ** | 7742-828 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | R | 0,3674 | 0,3674 | | |
| B-21 *** | 7742-828 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg | R | 0,4224 | 0,4224 | 0,0721 | 0,1213 |
| TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg SERVIER BENELUX | | | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 3158-235 | 30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | R | 20,08 | 20,08 | 2,94 | 4,91 |
| | 3158-235 | | | | 11,10 | 11,10 | | |
| B-21 | 3158-243 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | R | 30,49 | 30,49 | 4,68 | 7,86 |
| | 3158-243 | | | | 19,85 | 19,85 | | |
| B-21 * | 7708-498 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | R | 0,2847 | 0,2847 | | |
| B-21 ** | 7708-498 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | R | 0,2338 | 0,2338 | | |
| B-21 *** | 7708-498 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | R | 0,2772 | 0,2772 | 0,0520 | 0,0873 |
| TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO | | | | ATC: C09BX01 | | | | |
| B-21 | 3435-161 | 90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | 90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | R | 31,99 | 31,99 | 4,88 | 8,21 |
| | 3435-161 | | | | 21,15 | 21,15 | | |
| B-21 * | 7716-160 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | R | 0,3032 | 0,3032 | | |
| B-21 ** | 7716-160 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | R | 0,2491 | 0,2491 | | |
| B-21 *** | 7716-160 | 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg | R | 0,2940 | 0,2940 | 0,0542 | 0,0912 |
| TRISEQUENS 2 mg NOVO NORDISK PHARMA | | | | ATC: G03FB05 | | | | |
| B-214 | 0386-615 | 84 comprimés (triphasiques) | 84 tabletten (trifasisch) | | 17,04 | 17,04 | 2,33 | 3,89 |
| | 0386-615 | | | | 8,79 | 8,79 | | |
| B-214 * | 0743-609 | 28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg | 28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg | | 3,7800 | 3,7800 | | |
| B-214 ** | 0743-609 | 28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg | 28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg | | 3,1067 | 3,1067 | | |
| B-214 *** | 0743-609 | 1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg | 1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg | | 0,1370 | 0,1370 | 0,0277 | 0,0463 |
| TRITACE 10 mg SANOFI BELGIUM | | | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 2115-079 | 56 comprimés, 10 mg | 56 tabletten, 10 mg | R | 21,48 | 21,48 | 3,23 | 5,38 |
| | 2115-079 | | | | 12,17 | 12,17 | | |
| B-21 * | 0777-425 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2805 | 0,2805 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-21 ** | 0777-425 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2304 | 0,2304 | | |
| B-21 *** | 0777-425 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2847 | 0,2847 | 0,0577 | 0,0961 |
| TRITACE 10 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4800-801 | 56 comprimés, 10 mg | 56 tabletten, 10 mg | R | 21,48 | 21,48 | 3,23 | 5,38 |
| | 4800-801 | | | | 12,17 | 12,17 | | |
| B-21 * | 7740-343 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2805 | 0,2805 | | |
| B-21 ** | 7740-343 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2304 | 0,2304 | | |
| B-21 *** | 7740-343 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2847 | 0,2847 | 0,0577 | 0,0961 |
| TRITACE 10 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4679-791 | 56 comprimés, 10 mg | 56 tabletten, 10 mg | R | 21,48 | 21,48 | 3,23 | 5,38 |
| | 4679-791 | | | | 12,17 | 12,17 | | |
| B-21 * | 7737-125 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2805 | 0,2805 | | |
| B-21 ** | 7737-125 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2304 | 0,2304 | | |
| B-21 *** | 7737-125 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2847 | 0,2847 | 0,0577 | 0,0961 |
| TRITACE 10 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 2650-703 | 56 comprimés, 10 mg | 56 tabletten, 10 mg | R | 21,48 | 21,48 | 3,23 | 5,38 |
| | 2650-703 | | | | 12,17 | 12,17 | | |
| B-21 | 4134-755 | 100 comprimés, 10 mg | 100 tabletten, 10 mg | R | 38,15 | 38,15 | 5,74 | 9,66 |
| | 4134-755 | | | | 26,51 | 26,51 | | |
| B-21 * | 0795-138 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,3421 | 0,3421 | | |
| B-21 ** | 0795-138 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2810 | 0,2810 | | |
| B-21 *** | 0795-138 | 1 comprimé, 10 mg | 1 tablet, 10 mg | R | 0,2847 | 0,2847 | 0,0577 | 0,0961 |
| TRITACE 2,5 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 0430-660 | 28 comprimés, 2,5 mg | 28 tabletten, 2,5 mg | R | 9,39 | 9,39 | 0,78 | 1,30 |
| | 0430-660 | | | | 2,94 | 2,94 | | |
| B-21 * | 0747-618 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | 0,1354 | 0,1354 | | |
| B-21 ** | 0747-618 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | 0,1114 | 0,1114 | | |
| B-21 *** | 0747-618 | 1 comprimé, 2,5 mg | 1 tablet, 2,5 mg | R | 0,1378 | 0,1378 | 0,0279 | 0,0464 |
| TRITACE 5 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 1260-827 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | R | 14,30 | 14,30 | 1,77 | 2,96 |
| | 1260-827 | | | | 6,69 | 6,69 | | |
| B-21 * | 0747-626 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1541 | 0,1541 | | |
| B-21 ** | 0747-626 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1266 | 0,1266 | | |
| B-21 *** | 0747-626 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1565 | 0,1565 | 0,0316 | 0,0529 |
| TRITACE 5 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 4800-793 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | R | 14,30 | 14,30 | 1,77 | 2,96 |
| | 4800-793 | | | | 6,69 | 6,69 | | |
| B-21 * | 7740-335 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1541 | 0,1541 | | |
| B-21 ** | 7740-335 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1266 | 0,1266 | | |
| B-21 *** | 7740-335 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1565 | 0,1565 | 0,0316 | 0,0529 |
| TRITACE 5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09AA05 | | | | |
| B-21 | 2650-695 | 56 comprimés, 5 mg | 56 tabletten, 5 mg | R | 14,30 | 14,30 | 1,77 | 2,96 |
| | 2650-695 | | | | 6,69 | 6,69 | | |
| B-21 * | 0795-120 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1541 | 0,1541 | | |
| B-21 ** | 0795-120 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1266 | 0,1266 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| B-21 *** | 0795-120 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,1565 | 0,1565 | 0,0316 | 0,0529 |
| TRITAZIDE 5 mg/25 mg | | SANOFI BELGIUM | | ATC: C09BA05 | | | | |
| B-21 | 2545-986 2545-986 | 56 comprimés, 5 mg / 25 mg | 56 tabletten, 5 mg / 25 mg | R | 17,86 9,41 | 17,86 9,41 | 2,50 | 4,16 |
| B-21 * | 0745-141 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | R | 0,2168 | 0,2168 | | |
| B-21 ** | 0745-141 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | R | 0,1780 | 0,1780 | | |
| B-21 *** | 0745-141 | 1 comprimé, 5 mg/ 25 mg | 1 tablet, 5 mg/ 25 mg | R | 0,2201 | 0,2201 | 0,0446 | 0,0743 |
| TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg | | ASTRAZENECA | | ATC: R03AL11 | | | | |
| B-346 | 4332-292 4332-292 | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | 120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | CR | 63,34 48,44 | 63,34 48,44 | 8,30 | 12,50 |
| B-346 | 4332-284 4332-284 | 360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | 360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | CR | 163,79 139,50 | 163,79 139,50 | 8,30 | 12,50 |
| B-346 * | 7731-284 | 1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | 1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | CR | 51,6600 | 51,6600 | | |
| B-346 ** | 7731-284 | 1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | 1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg | CR | 49,2900 | 49,2900 | | |
| TRUSOPT | | SANTEN | | ATC: S01EC03 | | | | |
| B-168 | 1531-276 1531-276 | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml | | 12,67 5,45 | 12,67 5,45 | 1,45 | 2,41 |
| B-168 * | 0770-560 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | | 7,0300 | 7,0300 | | |
| B-168 ** | 0770-560 | 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL | | 5,7800 | 5,7800 | | |
| TWINSTA 80 mg/10 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09DB04 | | | | |
| B-224 | 2755-346 2755-346 | 98 comprimés, 80 mg / 10 mg | 98 tabletten, 80 mg / 10 mg | R | 74,67 58,29 | 74,67 58,29 | 10,20 | 15,50 |
| B-224 * | 0754-689 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,7031 | 0,7031 | | |
| B-224 ** | 0754-689 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,6305 | 0,6305 | | |
| B-224 *** | 0754-689 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,7054 | 0,7054 | 0,1041 | 0,1582 |
| TWINSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09DB04 | | | | |
| B-224 | 3585-304 3585-304 | 98 comprimés, 80 mg/ 10 mg | 98 tabletten, 80 mg/ 10 mg | R | 74,67 58,29 | 74,67 58,29 | 10,20 | 15,50 |
| B-224 * | 7719-941 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,7031 | 0,7031 | | |
| B-224 ** | 7719-941 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,6305 | 0,6305 | | |
| B-224 *** | 7719-941 | 1 comprimé, 80 mg/ 10 mg | 1 tablet, 80 mg/ 10 mg | R | 0,7054 | 0,7054 | 0,1041 | 0,1582 |
| TWINSTA 80 mg/5 mg | | BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM | | ATC: C09DB04 | | | | |
| B-224 | 2755-361 2755-361 | 28 comprimés, 80 mg / 5 mg | 28 tabletten, 80 mg / 5 mg | R | 27,69 17,41 | 27,69 17,41 | 4,29 | 7,20 |
| B-224 | 2755-379 2755-379 | 98 comprimés, 80 mg / 5 mg | 98 tabletten, 80 mg / 5 mg | R | 55,08 41,25 | 55,08 41,25 | 8,10 | 13,64 |
| B-224 * | 0754-697 | 1 comprimé, 80 mg/ 5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 5 mg | R | 0,5188 | 0,5188 | | |
| B-224 ** | 0754-697 | 1 comprimé, 80 mg/ 5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 5 mg | R | 0,4462 | 0,4462 | | |
| B-224 *** | 0754-697 | 1 comprimé, 80 mg/ 5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 5 mg | R | 0,5056 | 0,5056 | 0,0827 | 0,1392 |
| TWINSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: C09DB04 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--------|
| B-224 | 3585-296 3585-296 | 98 comprimés, 80 mg/ 5 mg | 98 tabletten, 80 mg/ 5 mg | R | 55,08 41,25 | 55,08 41,25 | 8,10 | 13,64 |
| B-224 * | 7719-875 | 1 comprimé, 80 mg/ 5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 5 mg | R | 0,5188 | 0,5188 | | |
| B-224 ** | 7719-875 | 1 comprimé, 80 mg/ 5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 5 mg | R | 0,4462 | 0,4462 | | |
| B-224 *** | 7719-875 | 1 comprimé, 80 mg/ 5 mg | 1 tablet, 80 mg/ 5 mg | R | 0,5056 | 0,5056 | 0,0827 | 0,1392 |
| TYGACIL 50 mg Pfizer ATC: J01AA12 | | | | | | | | |
| B-118 * | 0785-964 0785-964 | 10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | R | 184,88 20,3080 | 184,88 20,3080 | | |
| B-118 ** | 0785-964 | 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | R | 19,5970 | 19,5970 | | |
| ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AL04 | | | | | | | | |
| B-267 | 3085-644 3085-644 | 30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg | 30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg | | 49,80 36,65 | 49,80 36,65 | 7,36 | 12,40 |
| B-267 | 3085-636 3085-636 | 90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg | 90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg | | 128,98 107,75 | 128,98 107,75 | 10,20 | 15,50 |
| B-267 * | 7708-449 | 1 gélule, 85 µg/ 43 µg | 1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg | | 1,3481 | 1,3481 | | |
| B-267 ** | 7708-449 | 1 gélule, 85 µg/ 43 µg | 1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg | | 1,2691 | 1,2691 | | |
| ULTIVA ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AH06 | | | | | | | | |
| A-30 * | 0761-015 0761-015 | 5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg 1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg | 5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg 1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg | R | 34,11 8,6540 | 34,11 8,6540 | | |
| A-30 ** | 0761-015 | 1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg | 1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg | R | 7,2320 | 7,2320 | | |
| ULTIVA ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AH06 | | | | | | | | |
| A-30 * | 0760-991 0760-991 | 5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg 1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg | 5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg 1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg | R | 13,64 3,5200 | 13,64 3,5200 | | |
| A-30 ** | 0760-991 | 1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg | 1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg | R | 2,8920 | 2,8920 | | |
| ULTRAVIST 300 AMDIPHARM ATC: V08AB05 | | | | | | | | |
| B-178 * | 0741-298 0741-298 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml 10 ml solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL | | 51,63 3,0920 | 51,63 3,0920 | | |
| B-178 ** | 0741-298 | 10 ml solution injectable, 623 mg/mL | 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL | | 2,7365 | 2,7365 | | |
| ULTRAVIST 300 AMDIPHARM ATC: V08AB05 | | | | | | | | |
| | 0784-181 | 1 flacon injectable 500 mL | 1 injectieflacon 500 mL | | 129,07 | 129,07 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|------|-------|
| B-178 * | 0784-181 | solution injectable, 623,4 mg/mL 10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL 10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | 2,8784 | 2,8784 | | |
| B-178 ** | 0784-181 | 10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | 2,7362 | 2,7362 | | |
| ULTRAVIST 300 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | |
| B-178 | 1082-841 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml | 52,17 | 52,17 | 7,70 | 12,50 |
| | 1082-841 | | | 38,72 | 38,72 | | |
| B-178 * | 0741-272 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 48,1500 | 48,1500 | | |
| B-178 ** | 0741-272 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 41,0400 | 41,0400 | | |
| ULTRAVIST 300 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | |
| B-178 | 0066-134 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml | 12,90 | 12,90 | 1,49 | 2,48 |
| | 0066-134 | | | 5,62 | 5,62 | | |
| B-178 * | 0728-964 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 7,2500 | 7,2500 | | |
| B-178 ** | 0728-964 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 5,9600 | 5,9600 | | |
| ULTRAVIST 300 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | |
| B-178 | 0066-159 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml | 22,57 | 22,57 | 3,45 | 5,75 |
| | 0066-159 | | | 13,00 | 13,00 | | |
| B-178 * | 0728-972 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 16,7800 | 16,7800 | | |
| B-178 ** | 0728-972 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 13,7800 | 13,7800 | | |
| ULTRAVIST 300 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | |
| B-178 | 0833-327 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml | 38,35 | 38,35 | 5,77 | 9,71 |
| | 0833-327 | | | 26,69 | 26,69 | | |
| B-178 * | 0730-184 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 34,4400 | 34,4400 | | |
| B-178 ** | 0730-184 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 28,2900 | 28,2900 | | |
| ULTRAVIST 300 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | |
| B-178 | 0833-285 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml | 9,96 | 9,96 | 0,90 | 1,49 |
| | 0833-285 | | | 3,38 | 3,38 | | |
| B-178 * | 0730-176 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 4,3600 | 4,3600 | | |
| B-178 ** | 0730-176 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL | 3,5800 | 3,5800 | | |
| ULTRAVIST 370 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| | 0730-986 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml | | 60,97 | 60,97 | | |
| B-178 * | 0730-986 | 10 ml solution injectable, 769 mg/mL | 10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 3,5870 | 3,5870 | | |
| B-178 ** | 0730-986 | 10 ml solution injectable, 769 mg/mL | 10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 3,2315 | 3,2315 | | |
| ULTRAVIST 370 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | | |
| | 0784-199 | 1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL | | 152,46 | 152,46 | | |
| B-178 * | 0784-199 | 10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,3744 | 3,3744 | | |
| B-178 ** | 0784-199 | 10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 3,2322 | 3,2322 | | |
| ULTRAVIST 370 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | | |
| B-178 | 0833-699 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml | | 43,98 | 43,98 | 6,55 | 11,03 |
| | 0833-699 | | | | 31,59 | 31,59 | | |
| B-178 * | 0730-192 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 40,6000 | 40,6000 | | |
| B-178 ** | 0730-192 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 33,4900 | 33,4900 | | |
| ULTRAVIST 370 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | | |
| B-178 | 0066-167 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml | | 25,96 | 25,96 | 4,04 | 6,79 |
| | 0066-167 | | | | 15,90 | 15,90 | | |
| B-178 * | 0728-980 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 20,5200 | 20,5200 | | |
| B-178 ** | 0728-980 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 16,8500 | 16,8500 | | |
| ULTRAVIST 370 | | AMDIPHARM | | ATC: V08AB05 | | | | |
| B-178 | 1280-502 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml | | 62,35 | 62,35 | 8,30 | 12,50 |
| | 1280-502 | | | | 47,57 | 47,57 | | |
| B-178 * | 0773-630 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 57,5300 | 57,5300 | | |
| B-178 ** | 0773-630 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL | | 50,4200 | 50,4200 | | |
| UNI DIAMICRON 60 mg | | SERVIER BENELUX | | ATC: A10BB09 | | | | |
| A-12 | 2689-685 | 30 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | R | 9,48 | 9,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 2689-685 | | | | 3,01 | 3,01 | | |
| A-12 | 2689-693 | 90 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | R | 15,02 | 15,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 2689-693 | | | | 7,24 | 7,24 | | |
| A-12 * | 0799-098 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg | R | 0,1038 | 0,1038 | | |
| A-12 ** | 0799-098 | 1 comprimé à libération modifiée, | 1 tablet met gereguleerde afgifte, | R | 0,0852 | 0,0852 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|--|-----------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-12 *** | 0799-098 | 60 mg 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 60 mg 1 tablet met geregeleerde afgifte, 60 mg | R | 0,1054 | 0,1054 | 0,0000 | 0,0000 |
| UNI GLICLAZIDE EG 60 mg | | | | EG | ATC: A10BB09 | | | |
| A-12 | 3212-008 | 90 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 90 tabletten met geregeleerde afgifte, 60 mg | G | 14,59 | 14,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 3212-008 | | | | 6,91 | 6,91 | | |
| A-12 | 3212-016 | 180 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 180 tabletten met geregeleerde afgifte, 60 mg | G | 23,57 | 23,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 3212-016 | | | | 13,83 | 13,83 | | |
| A-12 * | 7709-116 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 60 mg | G | 0,0992 | 0,0992 | | |
| A-12 ** | 7709-116 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 60 mg | G | 0,0814 | 0,0814 | | |
| A-12 *** | 7709-116 | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg | 1 tablet met geregeleerde afgifte, 60 mg | G | 0,1002 | 0,1002 | 0,0000 | 0,0000 |
| URFAMYCINE 500 | | | | ZAMBON | ATC: J01BA02 | | | |
| B-117 | 0094-086 | 3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml | 3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml | | 18,23 | 18,23 | 2,57 | 4,28 |
| | 0094-086 | | | | 9,69 | 9,69 | | |
| B-117 * | 0720-375 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL | | 4,1667 | 4,1667 | | |
| B-117 ** | 0720-375 | 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL | 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL | | 3,4233 | 3,4233 | | |
| UROMITEXAN 400 mg | | | | BAXTER | ATC: V03AF01 | | | |
| B-151 | 0895-730 | 15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml | 15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | | 38,36 | 38,36 | 5,77 | 9,71 |
| | 0895-730 | | | | 26,70 | 26,70 | | |
| B-151 * | 0727-578 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 2,2973 | 2,2973 | | |
| B-151 ** | 0727-578 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | | 1,8867 | 1,8867 | | |
| URSOCHOL 150 | | | | ZAMBON | ATC: A05AA02 | | | |
| B-52 | 0093-492 | 50 comprimés, 150 mg | 50 tabletten, 150 mg | R | 14,68 | 14,68 | 1,85 | 3,09 |
| | 0093-492 | | | | 6,98 | 6,98 | | |
| B-52 * | 0726-224 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | R | 0,1802 | 0,1802 | | |
| B-52 ** | 0726-224 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | R | 0,1480 | 0,1480 | | |
| B-52 *** | 0726-224 | 1 comprimé, 150 mg | 1 tablet, 150 mg | R | 0,1830 | 0,1830 | 0,0370 | 0,0618 |
| URSOCHOL 300 | | | | ZAMBON | ATC: A05AA02 | | | |
| B-52 | 1413-053 | 100 comprimés, 300 mg | 100 tabletten, 300 mg | R | 33,34 | 33,34 | 5,07 | 8,53 |
| | 1413-053 | | | | 22,32 | 22,32 | | |
| B-52 * | 0760-942 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,2880 | 0,2880 | | |
| B-52 ** | 0760-942 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,2366 | 0,2366 | | |
| B-52 *** | 0760-942 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,2780 | 0,2780 | 0,0507 | 0,0853 |
| URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg | | | | AMDIPHARM | ATC: A05AA02 | | | |
| B-52 | 3425-600 | 100 gélules, 250 mg | 100 capsules, hard, 250 mg | G | 27,81 | 27,81 | 4,30 | 7,23 |
| | 3425-600 | | | | 17,52 | 17,52 | | |
| B-52 * | 7715-717 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,2261 | 0,2261 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|----|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-52 ** | 7715-717 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,1857 | 0,1857 | | |
| B-52 *** | 7715-717 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,2228 | 0,2228 | 0,0430 | 0,0723 |
| URSOFALK | | DR FALK PHARMA BENELUX | | | ATC: A05AA02 | | | |
| B-52 | 1556-414 1556-414 | 100 gélules, 250 mg | 100 capsules, hard, 250 mg | R | 27,81 17,52 | 27,81 17,52 | 4,30 | 7,23 |
| B-52 * | 0726-232 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 0,2261 | 0,2261 | | |
| B-52 ** | 0726-232 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 0,1857 | 0,1857 | | |
| B-52 *** | 0726-232 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | R | 0,2228 | 0,2228 | 0,0430 | 0,0723 |
| URSOFALK 500 mg | | DR FALK PHARMA BENELUX | | | ATC: A05AA02 | | | |
| B-52 | 3567-906 3567-906 | 100 comprimés pelliculés, 500 mg | 100 filmomhulde tabletten, 500 mg | R | 52,61 39,10 | 52,61 39,10 | 7,76 | 13,06 |
| B-52 * | 7719-297 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,4856 | 0,4856 | | |
| B-52 ** | 7719-297 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,4145 | 0,4145 | | |
| B-52 *** | 7719-297 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 0,4707 | 0,4707 | 0,0776 | 0,1306 |
| URSOGRIX 250 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | ATC: A05AA02 | | | |
| B-52 | 4769-774 4769-774 | 100 gélules, 250 mg | 100 capsules, hard, 250 mg | G | 27,81 17,52 | 27,81 17,52 | 4,30 | 7,23 |
| B-52 * | 7739-667 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,2261 | 0,2261 | | |
| B-52 ** | 7739-667 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,1857 | 0,1857 | | |
| B-52 *** | 7739-667 | 1 gélule, 250 mg | 1 capsule, hard, 250 mg | G | 0,2228 | 0,2228 | 0,0430 | 0,0723 |
| UTROGESTAN VAGINAL 200 mg | | CONGRESS PHARMA | | | ATC: G03DA04 | | | |
| B-232 | 2311-066 2311-066 | 45 capsules molles vaginales, 200 mg | 45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg | R | 24,05 14,24 | 24,05 14,24 | 3,78 | 6,29 |
| B-232 * | 0785-063 | 1 capsule molle vaginale, 200 mg | 1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg | R | 0,4084 | 0,4084 | | |
| B-232 ** | 0785-063 | 1 capsule molle vaginale, 200 mg | 1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg | R | 0,3353 | 0,3353 | | |
| VABOREM 1 g/1 g | | MENARINI BENELUX | | | ATC: J01DH52 | | | |
| | 7733-801 | 6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g | 6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g | | 375,00 | 375,00 | | |
| B-114 ** | 7733-801 | 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g | 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g | CR | 66,2500 | 66,2500 | | |
| VALPROATE RETARD EG 300 mg | | EG | | | ATC: N03AG01 | | | |
| A-5 | 2455-772 2455-772 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 13,35 5,96 | 13,35 5,96 | 0,00 | 0,00 |
| A-5 * | 0787-390 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,0769 | 0,0769 | | |
| A-5 ** | 0787-390 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,0632 | 0,0632 | | |
| A-5 *** | 0787-390 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,0781 | 0,0781 | 0,0000 | 0,0000 |
| VALPROATE RETARD EG 500 mg | | EG | | | ATC: N03AG01 | | | |
| A-5 | 2455-798 2455-798 | 100 comprimés à libération prolongée, 500 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg | G | 18,48 9,88 | 18,48 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| A-5 * | 0787-408 | 1 comprimé à libération prolongée, 500 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,1275 | 0,1275 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-5 ** | 0787-408 | 1 comprimé à libération prolongée, 500 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,1047 | 0,1047 | | |
| A-5 *** | 0787-408 | 1 comprimé à libération prolongée, 500 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,1294 | 0,1294 | 0,0000 | 0,0000 |
| VALPROATE SANDOZ 300 mg | | SANDOZ | | ATC: N03AG01 | | | | |
| A-5 | 2352-441 | 100 comprimés à libération prolongée, 300 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg | G | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 2352-441 | | | | 6,15 | 6,15 | | |
| A-5 * | 0785-576 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,0794 | 0,0794 | | |
| A-5 ** | 0785-576 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,0652 | 0,0652 | | |
| A-5 *** | 0785-576 | 1 comprimé à libération prolongée, 300 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg | G | 0,0807 | 0,0807 | 0,0000 | 0,0000 |
| VALPROATE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: N03AG01 | | | | |
| A-5 | 2352-466 | 100 comprimés à libération prolongée, 500 mg | 100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg | G | 18,86 | 18,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 2352-466 | | | | 10,17 | 10,17 | | |
| A-5 * | 0785-584 | 1 comprimé à libération prolongée, 500 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,1312 | 0,1312 | | |
| A-5 ** | 0785-584 | 1 comprimé à libération prolongée, 500 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,1078 | 0,1078 | | |
| A-5 *** | 0785-584 | 1 comprimé à libération prolongée, 500 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg | G | 0,1332 | 0,1332 | 0,0000 | 0,0000 |
| VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: N03AG01 | | | | |
| A-5 | 2363-596 | 5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml | 5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | r | 24,26 | 24,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 2363-596 | | | | 14,43 | 14,43 | | |
| A-5 * | 0784-835 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | r | 3,7240 | 3,7240 | | |
| A-5 ** | 0784-835 | 1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | r | 3,0600 | 3,0600 | | |
| VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml | | VIATRIS | | ATC: N03AG01 | | | | |
| A-5 | 2363-588 | 5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml | 5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml | r | 62,96 | 62,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 2363-588 | | | | 48,11 | 48,11 | | |
| A-5 * | 0784-843 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | r | 11,6220 | 11,6220 | | |
| A-5 ** | 0784-843 | 1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL | 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL | r | 10,2000 | 10,2000 | | |
| VALSARTAN EG 160 mg | | EG | | ATC: C09CA03 | | | | |
| B-224 | 2732-691 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg | G | 24,31 | 24,31 | 3,82 | 6,41 |
| | 2732-691 | | | | 14,47 | 14,47 | | |
| B-224 * | 0759-902 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1905 | 0,1905 | | |
| B-224 ** | 0759-902 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1565 | 0,1565 | | |
| B-224 *** | 0759-902 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1916 | 0,1916 | 0,0390 | 0,0654 |
| VALSARTAN EG 320 mg | | EG | | ATC: C09CA03 | | | | |
| B-224 | 2732-634 | 98 comprimés pelliculés, 320 mg | 98 filmomhulde tabletten, 320 mg | G | 27,01 | 27,01 | 4,19 | 7,04 |
| | 2732-634 | | | | 16,82 | 16,82 | | |
| B-224 * | 0759-894 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,2215 | 0,2215 | | |
| B-224 ** | 0759-894 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,1819 | 0,1819 | | |
| B-224 *** | 0759-894 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,2191 | 0,2191 | 0,0428 | 0,0718 |

| VALSARTAN EG 80 mg | | EG | | ATC: C09CA03 | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-224 | 2732-683 2732-683 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 22,92 13,27 | 22,92 13,27 | 3,52 | 5,87 | |
| B-224 * | 0759-506 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1747 | 0,1747 | | | |
| B-224 ** | 0759-506 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1436 | 0,1436 | | | |
| B-224 *** | 0759-506 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1774 | 0,1774 | 0,0359 | 0,0599 | |
| VALSARTAN KRKA 160 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09CA03 | | | | | |
| B-224 | 3026-606 3026-606 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg | G | 14,13 6,56 | 14,13 6,56 | 1,74 | 2,90 | |
| B-224 | 3026-622 3026-622 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg | G | 24,27 14,44 | 24,27 14,44 | 3,81 | 6,40 | |
| B-224 * | 7705-932 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | | |
| B-224 ** | 7705-932 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | | |
| B-224 *** | 7705-932 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1912 | 0,1912 | 0,0389 | 0,0653 | |
| VALSARTAN KRKA 320 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09CA03 | | | | | |
| B-224 | 3026-648 3026-648 | 98 comprimés pelliculés, 320 mg | 98 filmomhulde tabletten, 320 mg | G | 26,91 16,74 | 26,91 16,74 | 4,18 | 7,02 | |
| B-224 * | 7705-940 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,2204 | 0,2204 | | | |
| B-224 ** | 7705-940 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,1810 | 0,1810 | | | |
| B-224 *** | 7705-940 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,2182 | 0,2182 | 0,0427 | 0,0716 | |
| VALSARTAN KRKA 80 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09CA03 | | | | | |
| B-224 | 3026-572 3026-572 | 28 comprimés pelliculés, 80 mg | 28 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 12,67 5,45 | 12,67 5,45 | 1,45 | 2,41 | |
| B-224 | 3026-598 3026-598 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 22,84 13,21 | 22,84 13,21 | 3,50 | 5,84 | |
| B-224 * | 7705-924 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1740 | 0,1740 | | | |
| B-224 ** | 7705-924 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1429 | 0,1429 | | | |
| B-224 *** | 7705-924 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1766 | 0,1766 | 0,0357 | 0,0596 | |
| VALSARTAN SANDOZ 160 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA03 | | | | | |
| B-224 | 2748-267 2748-267 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg | G | 14,13 6,56 | 14,13 6,56 | 1,74 | 2,90 | |
| B-224 | 2748-275 2748-275 | 56 comprimés pelliculés, 160 mg | 56 filmomhulde tabletten, 160 mg | G | 21,22 11,97 | 21,22 11,97 | 3,17 | 5,29 | |
| B-224 | 2748-291 2748-291 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg | G | 25,55 15,55 | 25,55 15,55 | 3,99 | 6,70 | |
| B-224 * | 0757-674 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,2048 | 0,2048 | | | |
| B-224 ** | 0757-674 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,1682 | 0,1682 | | | |
| B-224 *** | 0757-674 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg | G | 0,2042 | 0,2042 | 0,0407 | 0,0684 | |
| VALSARTAN SANDOZ 320 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA03 | | | | | |
| B-224 | 2748-317 2748-317 | 28 comprimés pelliculés, 320 mg | 28 filmomhulde tabletten, 320 mg | G | 12,25 5,13 | 12,25 5,13 | 1,36 | 2,27 | |
| B-224 | 2748-192 2748-192 | 98 comprimés pelliculés, 320 mg | 98 filmomhulde tabletten, 320 mg | G | 27,00 16,81 | 27,00 16,81 | 4,19 | 7,04 | |
| B-224 * | 0757-666 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,2213 | 0,2213 | | | |
| B-224 ** | 0757-666 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,1818 | 0,1818 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-224 *** | 0757-666 | 1 comprimé pelliculé, 320 mg | 1 filmomhulde tablet, 320 mg | G | 0,2190 | 0,2190 | 0,0428 | 0,0718 | |
| VALSARTAN SANDOZ 80 mg | | SANDOZ | | ATC: C09CA03 | | | | | |
| B-224 | 2748-200 | 28 comprimés pelliculés, 80 mg | 28 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 12,67 | 12,67 | 1,45 | 2,41 | |
| | 2748-200 | | | | 5,45 | 5,45 | | | |
| B-224 | 2748-218 | 56 comprimés pelliculés, 80 mg | 56 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 17,49 | 17,49 | 2,42 | 4,03 | |
| | 2748-218 | | | | 9,12 | 9,12 | | | |
| B-224 | 2748-226 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | G | 22,91 | 22,91 | 3,52 | 5,86 | |
| | 2748-226 | | | | 13,26 | 13,26 | | | |
| B-224 * | 0757-682 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1746 | 0,1746 | | | |
| B-224 ** | 0757-682 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1435 | 0,1435 | | | |
| B-224 *** | 0757-682 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | G | 0,1773 | 0,1773 | 0,0359 | 0,0598 | |
| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09DA03 | | | | | |
| B-224 | 3315-462 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg | G | 13,15 | 13,15 | 1,54 | 2,57 | |
| | 3315-462 | | | | 5,82 | 5,82 | | | |
| B-224 | 3315-470 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg | G | 26,24 | 26,24 | 4,08 | 6,86 | |
| | 3315-470 | | | | 16,14 | 16,14 | | | |
| B-224 * | 7721-715 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,2126 | 0,2126 | | | |
| B-224 ** | 7721-715 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,1746 | 0,1746 | | | |
| B-224 *** | 7721-715 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg | G | 0,2112 | 0,2112 | 0,0416 | 0,0700 | |
| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09DA03 | | | | | |
| B-224 | 3315-488 | 28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg | G | 14,36 | 14,36 | 1,79 | 2,98 | |
| | 3315-488 | | | | 6,74 | 6,74 | | | |
| B-224 | 3315-496 | 98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg | G | 26,24 | 26,24 | 4,08 | 6,86 | |
| | 3315-496 | | | | 16,14 | 16,14 | | | |
| B-224 * | 7721-723 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,2126 | 0,2126 | | | |
| B-224 ** | 7721-723 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,1746 | 0,1746 | | | |
| B-224 *** | 7721-723 | 1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg | 1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg | G | 0,2112 | 0,2112 | 0,0416 | 0,0700 | |
| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: C09DA03 | | | | | |
| B-224 | 3315-413 | 28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg | G | 11,66 | 11,66 | 1,24 | 2,06 | |
| | 3315-413 | | | | 4,67 | 4,67 | | | |
| B-224 | 3315-421 | 98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg | G | 24,27 | 24,27 | 3,81 | 6,40 | |
| | 3315-421 | | | | 14,44 | 14,44 | | | |
| B-224 * | 7721-764 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | | |
| B-224 ** | 7721-764 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | | |
| B-224 *** | 7721-764 | 1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg | 1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg | G | 0,1912 | 0,1912 | 0,0389 | 0,0653 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01XA01 | |
| B-124 ** | 0799-395 | 10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg | 10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg | G | 139,25 | 139,25 | | |
| | 0799-395 | 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mg | | 14,7610 | 14,7610 | | |
| VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01XA01 | |
| B-124 ** | 0799-387 | 10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg | 10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg | G | 77,24 | 77,24 | | |
| | 0799-387 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mg | | 8,1870 | 8,1870 | | |
| VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01XA01 | |
| B-124 ** | 0784-116 | 1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg | G | 13,93 | 13,93 | | |
| | 0784-116 | 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg | 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg | | 14,7700 | 14,7700 | | |
| VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg | | VIATRIS | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | ATC: J01XA01 | |
| B-124 ** | 0784-108 | 1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg | G | 7,73 | 7,73 | | |
| | 0784-108 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg | | 8,1900 | 8,1900 | | |
| VELCADE 3,5 mg | | JANSSEN-CILAG | | | | | ATC: L01XG01 | |
| A-76 * | 0778-597 | 1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg | R | 321,57 | 321,57 | | |
| | 0778-597 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | | 347,9700 | 347,9700 | | |
| A-76 ** | 0778-597 | 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg | 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg | R | 340,8600 | 340,8600 | | |
| VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | | | | ATC: N06AX16 | |
| B-73 | 4263-232 | 28 gélules à libération prolongée, 150 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 17,41 | 17,41 | 2,40 | 4,00 |
| | 4263-232 | | | | 9,06 | 9,06 | | |
| B-73 | 4263-240 | 56 gélules à libération prolongée, 150 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 23,85 | 23,85 | 3,73 | 6,22 |
| | 4263-240 | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| B-73 | 4263-257 | 98 gélules à libération prolongée, 150 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 45,16 | 45,16 | 6,72 | 11,30 |
| | 4263-257 | | | | 32,61 | 32,61 | | |
| B-73 * | 7728-900 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4253 | 0,4253 | | |
| B-73 ** | 7728-900 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3528 | 0,3528 | | |
| B-73 *** | 7728-900 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4043 | 0,4043 | 0,0686 | 0,1153 |
| VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg | | SANDOZ | | | | | ATC: N06AX16 | |
| B-73 | 4263-190 | 28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 11,59 | 11,59 | 1,23 | 2,04 |
| | 4263-190 | | | | 4,62 | 4,62 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 | 4264-552 | 56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 16,84 | 16,84 | 2,29 | 3,81 |
| | 4264-552 | | | | 8,63 | 8,63 | | |
| B-73 * | 7728-884 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,1989 | 0,1989 | | |
| B-73 ** | 7728-884 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,1634 | 0,1634 | | |
| B-73 *** | 7728-884 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,2020 | 0,2020 | 0,0409 | 0,0680 |
| VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg | | SANDOZ | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 4263-208 | 28 gélules à libération prolongée, 75 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 10,58 | 10,58 | 1,02 | 1,70 |
| | 4263-208 | | | | 3,85 | 3,85 | | |
| B-73 | 4263-216 | 56 gélules à libération prolongée, 75 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 19,26 | 19,26 | 2,78 | 4,63 |
| | 4263-216 | | | | 10,47 | 10,47 | | |
| B-73 | 4263-224 | 98 gélules à libération prolongée, 75 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 24,65 | 24,65 | 3,86 | 6,49 |
| | 4263-224 | | | | 14,76 | 14,76 | | |
| B-73 * | 7728-892 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1944 | 0,1944 | | |
| B-73 ** | 7728-892 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1597 | 0,1597 | | |
| B-73 *** | 7728-892 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1950 | 0,1950 | 0,0394 | 0,0662 |
| VENLAFAXINE APOTEX 150 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 2581-759 | 98 gélules à libération prolongée, 150 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 44,90 | 44,90 | 6,68 | 11,25 |
| | 2581-759 | | | | 32,39 | 32,39 | | |
| B-73 * | 0790-097 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4229 | 0,4229 | | |
| B-73 ** | 0790-097 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3503 | 0,3503 | | |
| B-73 *** | 0790-097 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4017 | 0,4017 | 0,0682 | 0,1148 |
| VENLAFAXINE APOTEX 75 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 2550-341 | 28 gélules à libération prolongée, 75 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 10,55 | 10,55 | 1,02 | 1,69 |
| | 2550-341 | | | | 3,83 | 3,83 | | |
| B-73 | 2581-775 | 98 gélules à libération prolongée, 75 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 24,50 | 24,50 | 3,84 | 6,45 |
| | 2581-775 | | | | 14,63 | 14,63 | | |
| B-73 * | 0790-089 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1927 | 0,1927 | | |
| B-73 ** | 0790-089 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1583 | 0,1583 | | |
| B-73 *** | 0790-089 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1935 | 0,1935 | 0,0392 | 0,0658 |
| VENLAFAXINE EG 150 mg | | EG | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 2549-277 | 98 gélules à libération prolongée, 150 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 45,18 | 45,18 | 6,72 | 11,31 |
| | 2549-277 | | | | 32,63 | 32,63 | | |
| B-73 * | 0790-592 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4255 | 0,4255 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 ** | 0790-592 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3530 | 0,3530 | | |
| B-73 *** | 0790-592 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4045 | 0,4045 | 0,0686 | 0,1154 |
| VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 4799-722 | 98 gélules à libération prolongée, 150 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 45,18 | 45,18 | 6,72 | 11,31 |
| | 4799-722 | | | | 32,63 | 32,63 | | |
| B-73 * | 7740-038 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4255 | 0,4255 | | |
| B-73 ** | 7740-038 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3530 | 0,3530 | | |
| B-73 *** | 7740-038 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4045 | 0,4045 | 0,0686 | 0,1154 |
| VENLAFAXINE EG 37,5 mg | | EG | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 2617-322 | 56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 17,11 | 17,11 | 2,34 | 3,90 |
| | 2617-322 | | | | 8,83 | 8,83 | | |
| B-73 * | 0794-107 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,2036 | 0,2036 | | |
| B-73 ** | 0794-107 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,1671 | 0,1671 | | |
| B-73 *** | 0794-107 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,2067 | 0,2067 | 0,0418 | 0,0696 |
| VENLAFAXINE EG 75 mg | | EG | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 2549-285 | 28 gélules à libération prolongée, 75 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 10,61 | 10,61 | 1,03 | 1,71 |
| | 2549-285 | | | | 3,87 | 3,87 | | |
| B-73 | 2549-301 | 98 gélules à libération prolongée, 75 mg | 98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 24,61 | 24,61 | 3,86 | 6,48 |
| | 2549-301 | | | | 14,74 | 14,74 | | |
| B-73 * | 0790-584 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1941 | 0,1941 | | |
| B-73 ** | 0790-584 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1594 | 0,1594 | | |
| B-73 *** | 0790-584 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1947 | 0,1947 | 0,0394 | 0,0661 |
| VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AX16 | | | | |
| B-73 | 2546-240 | 28 gélules à libération prolongée, 150 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 17,41 | 17,41 | 2,40 | 4,00 |
| | 2546-240 | | | | 9,06 | 9,06 | | |
| B-73 | 2546-257 | 56 gélules à libération prolongée, 150 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 23,85 | 23,85 | 3,73 | 6,22 |
| | 2546-257 | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| B-73 | 2551-240 | 100 gélules à libération prolongée, 150 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 45,65 | 45,65 | 6,79 | 11,42 |
| | 2551-240 | | | | 33,05 | 33,05 | | |
| B-73 * | 0790-147 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4214 | 0,4214 | | |
| B-73 ** | 0790-147 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,3503 | 0,3503 | | |
| B-73 *** | 0790-147 | 1 gélule à libération prolongée, 150 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg | G | 0,4012 | 0,4012 | 0,0679 | 0,1142 |
| VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: N06AX16 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73 | 2615-672 | 28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 11,58 | 11,58 | 1,22 | 2,04 |
| | 2615-672 | | | | 4,61 | 4,61 | | |
| B-73 | 2615-680 | 56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 16,30 | 16,30 | 2,18 | 3,63 |
| | 2615-680 | | | | 8,22 | 8,22 | | |
| B-73 * | 0794-099 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,1895 | 0,1895 | | |
| B-73 ** | 0794-099 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,1555 | 0,1555 | | |
| B-73 *** | 0794-099 | 1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg | G | 0,1923 | 0,1923 | 0,0389 | 0,0648 |
| VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16 | | | | | | | | |
| B-73 | 2546-224 | 28 gélules à libération prolongée, 75 mg | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 10,55 | 10,55 | 1,02 | 1,69 |
| | 2546-224 | | | | 3,83 | 3,83 | | |
| B-73 | 2546-208 | 56 gélules à libération prolongée, 75 mg | 56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 18,60 | 18,60 | 2,64 | 4,41 |
| | 2546-208 | | | | 9,97 | 9,97 | | |
| B-73 | 2551-232 | 100 gélules à libération prolongée, 75 mg | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 24,84 | 24,84 | 3,89 | 6,53 |
| | 2551-232 | | | | 14,92 | 14,92 | | |
| B-73 * | 0790-238 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1925 | 0,1925 | | |
| B-73 ** | 0790-238 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1582 | 0,1582 | | |
| B-73 *** | 0790-238 | 1 gélule à libération prolongée, 75 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg | G | 0,1930 | 0,1930 | 0,0389 | 0,0653 |
| VENLAFAXINE TEVA 225 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16 | | | | | | | | |
| B-73 | 2675-791 | 30 comprimés à libération prolongée, 225 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg | G | 38,47 | 38,47 | 5,79 | 9,73 |
| | 2675-791 | | | | 26,79 | 26,79 | | |
| B-73 * | 0796-946 | 1 comprimé à libération prolongée, 225 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg | G | 1,1523 | 1,1523 | | |
| B-73 ** | 0796-946 | 1 comprimé à libération prolongée, 225 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg | G | 0,9467 | 0,9467 | | |
| B-73 *** | 0796-946 | 1 comprimé à libération prolongée, 225 mg | 1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg | G | 1,0978 | 1,0978 | 0,1930 | 0,3243 |
| VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02 | | | | | | | | |
| | 0720-946 | 1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | 1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | | 3,23 | 3,23 | | |
| B-96 * | 0720-946 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | r | 4,1700 | 4,1700 | | |
| B-96 ** | 0720-946 | 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL | 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL | r | 3,4200 | 3,4200 | | |
| VENTOLIN 0,5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02 | | | | | | | | |
| B-96 | 4608-311 | 5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | r | 8,45 | 8,45 | 0,59 | 0,98 |
| | 4608-311 | | | | 2,21 | 2,21 | | |
| B-96 * | 0720-938 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | r | 0,5700 | 0,5700 | | |
| B-96 ** | 0720-938 | 1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | r | 0,4680 | 0,4680 | | |

| VENTOLIN 100 µg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03AC02 | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-96 | 0135-913 | 200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose | 200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis | R | 9,15 | 9,15 | 0,73 | 1,22 | |
| | 0135-913 | | | | 2,76 | 2,76 | | | |
| B-96 * | 0720-987 | 1 nébulisateur, 100 µg/dose | 1 vernevelaar, 100 µg/dosis | R | 3,5600 | 3,5600 | | | |
| B-96 ** | 0720-987 | 1 nébulisateur, 100 µg/dose | 1 vernevelaar, 100 µg/dosis | R | 2,9300 | 2,9300 | | | |
| VENTOLIN 5 mg/mL | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03AC02 | | | |
| B-96 | 0094-987 | 1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml | 1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml | R | 8,38 | 8,38 | 0,57 | 0,95 | |
| | 0094-987 | | | | 2,15 | 2,15 | | | |
| B-96 * | 0727-594 | 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL | 1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL | R | 0,2770 | 0,2770 | | | |
| B-96 ** | 0727-594 | 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL | 1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL | R | 0,2280 | 0,2280 | | | |
| VEPESID 100 mg | | EUROCEPT | | | | ATC: L01CB01 | | | |
| A-28 | 0198-085 | 10 capsules molles, 100 mg | 10 capsules, zacht, 100 mg | R | 57,49 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0198-085 | | | | 43,35 | 43,35 | | | |
| A-28 * | 0721-001 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | R | 5,3060 | 5,3060 | | | |
| A-28 ** | 0721-001 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | R | 4,5950 | 4,5950 | | | |
| A-28 *** | 0721-001 | 1 capsule molle, 100 mg | 1 capsule, zacht, 100 mg | R | 5,1961 | 5,1961 | 0,0000 | 0,0000 | |
| VERORAB | | SANOFI BELGIUM | | | | ATC: J07BG01 | | | |
| B-201 | 4867-487 | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis | | 65,18 | 65,18 | 8,30 | 12,50 | |
| | 4867-487 | | | | 50,04 | 50,04 | | | |
| B-201 * | 7741-762 | 1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose | 1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis | | 60,1500 | 60,1500 | | | |
| B-201 ** | 7741-762 | 1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose | 1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis | | 53,0400 | 53,0400 | | | |
| VIBRATAB | | Pfizer | | | | ATC: J01AA02 | | | |
| C-37 | 0867-713 | 10 comprimés, 100 mg | 10 tabletten, 100 mg | R | 7,80 | 7,80 | 1,45 | 1,45 | |
| | 0867-713 | | | | 1,64 | 1,64 | | | |
| C-37 * | 0728-196 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,2120 | 0,2120 | | | |
| C-37 ** | 0728-196 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1740 | 0,1740 | | | |
| C-37 *** | 0728-196 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,2268 | 0,2268 | 0,1450 | 0,1450 | |
| VINBLASTINE TEVA 1 mg/ml | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01CA01 | | | |
| | 0793-927 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 15,87 | 15,87 | | | |
| A-26 * | 0793-927 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 20,4800 | 20,4800 | | | |
| A-26 ** | 0793-927 | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | G | 16,8200 | 16,8200 | | | |
| VINCRISIN 1 mg/mL | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01CA02 | | | |
| | 0749-994 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 14,25 | 14,25 | | | |
| A-26 * | 0749-994 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 18,3900 | 18,3900 | | | |
| A-26 ** | 0749-994 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 15,1100 | 15,1100 | | | |

| VINCRISIN 1 mg/ml | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01CA02 | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|------|-------|
| | 0749-986 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | | 9,21 | 9,21 | | |
| A-26 * | 0749-986 | 1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 11,8900 | 11,8900 | | |
| A-26 ** | 0749-986 | 1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL | 1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL | R | 9,7600 | 9,7600 | | |
| VISIPAQUE 270 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB09 | | |
| B-178 | 1563-725 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml | | 22,16 | 22,16 | 3,37 | 5,61 |
| | 1563-725 | | | | 12,69 | 12,69 | | |
| B-178 * | 0764-621 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL | | 16,3800 | 16,3800 | | |
| B-178 ** | 0764-621 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL | | 13,4500 | 13,4500 | | |
| VISIPAQUE 270 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB09 | | |
| B-178 | 1563-733 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml | | 37,42 | 37,42 | 5,64 | 9,49 |
| | 1563-733 | | | | 25,88 | 25,88 | | |
| B-178 * | 0764-639 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL | | 33,4000 | 33,4000 | | |
| B-178 ** | 0764-639 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL | | 27,4300 | 27,4300 | | |
| VISIPAQUE 320 l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB09 | | |
| | 0787-135 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml | | 132,32 | 132,32 | | |
| B-178 * | 0787-135 | 10 mL solution injectable, 652 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 2,9474 | 2,9474 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | |
| B-178 ** | 0787-135 | 10 mL solution injectable, 652 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 2,8052 | 2,8052 | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | |
| VISIPAQUE 320 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB09 | | |
| B-178 | 1563-741 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml | | 24,87 | 24,87 | 3,89 | 6,54 |
| | 1563-741 | | | | 14,95 | 14,95 | | |
| B-178 * | 0764-647 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 19,2900 | 19,2900 | | |
| B-178 ** | 0764-647 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 15,8500 | 15,8500 | | |
| VISIPAQUE 320 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB09 | | |
| B-178 | 1563-758 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml | | 42,50 | 42,50 | 6,35 | 10,68 |
| | 1563-758 | | | | 30,29 | 30,29 | | |
| B-178 * | 0764-654 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 39,0900 | 39,0900 | | |
| B-178 ** | 0764-654 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 32,1100 | 32,1100 | | |
| VISIPAQUE 320 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V08AB09 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-178 | 2274-462 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml | | 58,86 | 58,86 | 8,30 | 12,50 |
| | 2274-462 | | | | 44,54 | 44,54 | | |
| B-178 * | 0783-209 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 54,3200 | 54,3200 | | |
| B-178 ** | 0783-209 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 47,2100 | 47,2100 | | |
| VISIPAQUE 320 mg l/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V08AB09 | | | |
| B-178 | 1563-766 | 1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml | 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml | | 75,29 | 75,29 | 8,30 | 12,50 |
| | 1563-766 | | | | 58,83 | 58,83 | | |
| B-178 * | 0764-662 | 1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 69,4700 | 69,4700 | | |
| B-178 ** | 0764-662 | 1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL | 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL | | 62,3600 | 62,3600 | | |
| VOLTAREN | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M01AB05 | | | |
| B-60 | 0817-940 | 50 comprimés gastro-résistants, 50 mg | 50 maagsapresistente tabletten, 50 mg | R | 10,42 | 10,42 | 0,99 | 1,65 |
| | 0817-940 | | | | 3,73 | 3,73 | | |
| B-60 * | 0721-357 | 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg | 1 maagsapresistente tablet, 50 mg | R | 0,0962 | 0,0962 | | |
| B-60 ** | 0721-357 | 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg | 1 maagsapresistente tablet, 50 mg | R | 0,0790 | 0,0790 | | |
| B-60 *** | 0721-357 | 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg | 1 maagsapresistente tablet, 50 mg | R | 0,0977 | 0,0977 | 0,0198 | 0,0330 |
| VOLTAREN | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M01AB05 | | | |
| B-60 | 0098-624 | 30 comprimés gastro-résistants, 25 mg | 30 maagsapresistente tabletten, 25 mg | R | 7,50 | 7,50 | 0,37 | 0,61 |
| | 0098-624 | | | | 1,38 | 1,38 | | |
| B-60 * | 0721-340 | 1 comprimé gastro-résistant, 25 mg | 1 maagsapresistente tablet, 25 mg | R | 0,0593 | 0,0593 | | |
| B-60 ** | 0721-340 | 1 comprimé gastro-résistant, 25 mg | 1 maagsapresistente tablet, 25 mg | R | 0,0487 | 0,0487 | | |
| B-60 *** | 0721-340 | 1 comprimé gastro-résistant, 25 mg | 1 maagsapresistente tablet, 25 mg | R | 0,0657 | 0,0657 | 0,0123 | 0,0203 |
| VOLTAREN | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M01AB05 | | | |
| B-60 | 0098-640 | 12 suppositoires, 100 mg | 12 zetpillen, 100 mg | R | 7,81 | 7,81 | 0,44 | 0,73 |
| | 0098-640 | | | | 1,65 | 1,65 | | |
| B-60 * | 0721-365 | 1 suppositoire, 100 mg | 1 zetpil, 100 mg | R | 0,1775 | 0,1775 | | |
| B-60 ** | 0721-365 | 1 suppositoire, 100 mg | 1 zetpil, 100 mg | R | 0,1458 | 0,1458 | | |
| VOLTAREN | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M01AB05 | | | |
| B-60 | 0098-574 | 6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml | 6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml | R | 7,88 | 7,88 | 0,45 | 0,75 |
| | 0098-574 | | | | 1,70 | 1,70 | | |
| B-60 * | 0721-332 | 1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL | R | 0,3650 | 0,3650 | | |
| B-60 ** | 0721-332 | 1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL | 1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL | R | 0,3000 | 0,3000 | | |
| VOLTAREN RETARD 100 | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M01AB05 | | | |
| B-60 | 0861-443 | 30 comprimés à libération prolongée, 100 mg | 30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg | R | 10,31 | 10,31 | 0,97 | 1,61 |
| | 0861-443 | | | | 3,65 | 3,65 | | |
| B-60 * | 0721-373 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1570 | 0,1570 | | |
| B-60 ** | 0721-373 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1290 | 0,1290 | | |
| B-60 *** | 0721-373 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,1594 | 0,1594 | 0,0323 | 0,0537 |
| VOLTAREN RETARD 75 | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: M01AB05 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-60 | 1115-716 | 60 comprimés à libération prolongée, 75 mg | 60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg | R | 11,56 | 11,56 | 1,22 | 2,03 |
| | 1115-716 | | | | 4,60 | 4,60 | | |
| B-60 * | 0741-793 | 1 comprimé, 75 mg | 1 tablet, 75 mg | R | 0,0990 | 0,0990 | | |
| B-60 ** | 0741-793 | 1 comprimé, 75 mg | 1 tablet, 75 mg | R | 0,0813 | 0,0813 | | |
| B-60 *** | 0741-793 | 1 comprimé, 75 mg | 1 tablet, 75 mg | R | 0,1005 | 0,1005 | 0,0203 | 0,0338 |
| VORINA 350 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: V03AF06 | | | | |
| | 0772-335 | 1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml | | 40,15 | 40,15 | | |
| A-33 * | 0772-335 | 1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 49,6700 | 49,6700 | | |
| A-33 ** | 0772-335 | 1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL | R | 42,5600 | 42,5600 | | |
| WELLBUTRIN XR 150 mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: N06AX12 | | | | |
| B-73 | 2415-867 | 30 comprimés à libération modifiée, 150 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg | R | 18,40 | 18,40 | 2,60 | 4,34 |
| | 2415-867 | | | | 9,82 | 9,82 | | |
| B-73 | 2464-550 | 90 comprimés à libération modifiée, 150 mg | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg | R | 34,76 | 34,76 | 5,27 | 8,86 |
| | 2464-550 | | | | 23,56 | 23,56 | | |
| B-73 * | 0788-000 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg | R | 0,3378 | 0,3378 | | |
| B-73 ** | 0788-000 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg | R | 0,2774 | 0,2774 | | |
| B-73 *** | 0788-000 | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg | R | 0,3247 | 0,3247 | 0,0586 | 0,0984 |
| WELLBUTRIN XR 300 mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: N06AX12 | | | | |
| B-73 | 2415-859 | 30 comprimés à libération modifiée, 300 mg | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg | R | 27,98 | 27,98 | 4,33 | 7,27 |
| | 2415-859 | | | | 17,67 | 17,67 | | |
| B-73 | 2464-568 | 90 comprimés à libération modifiée, 300 mg | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg | R | 56,41 | 56,41 | 8,29 | 13,95 |
| | 2464-568 | | | | 42,41 | 42,41 | | |
| B-73 * | 0788-018 | 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg | R | 0,5784 | 0,5784 | | |
| B-73 ** | 0788-018 | 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg | R | 0,4994 | 0,4994 | | |
| B-73 *** | 0788-018 | 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg | R | 0,5653 | 0,5653 | 0,0921 | 0,1550 |
| XALACOM | | VIATRIS | | ATC: S01ED51 | | | | |
| B-168 | 1670-652 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml | R | 18,14 | 18,14 | 2,55 | 4,25 |
| | 1670-652 | | | | 9,62 | 9,62 | | |
| B-168 * | 0772-475 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL | R | 4,1367 | 4,1367 | | |
| B-168 ** | 0772-475 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL | R | 3,4000 | 3,4000 | | |
| XALATAN 0,005 % | | VIATRIS | | ATC: S01EE01 | | | | |
| B-168 | 1326-164 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml | R | 11,18 | 11,18 | 1,14 | 1,90 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|------------------------|------------------------|--------|--------|
| B-168 | 1326-164 1416-676 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml | R | 4,31 18,31 | 4,31 18,31 | 2,59 | 4,31 |
| B-168 * | 1416-676 0762-633 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL | R | 9,75 4,1933 | 9,75 4,1933 | | |
| B-168 ** | 0762-633 | 1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL | 1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL | R | 3,4467 | 3,4467 | | |
| XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g LEO PHARMA ATC: D05AX52 | | | | | | | | |
| B-275 | 2565-877 | 1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g | R | 25,04 | 25,04 | 3,92 | 6,58 |
| B-275 * | 2565-877 0795-674 | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | R | 15,10 0,3248 | 15,10 0,3248 | | |
| B-275 ** | 0795-674 | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | 1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g | R | 0,2668 | 0,2668 | | |
| XANTHIUM 200 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04 | | | | | | | | |
| B-97 | 0835-454 | 60 gélules à libération prolongée, 200 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 8,95 | 8,95 | 0,69 | 1,15 |
| B-97 * | 0835-454 0730-721 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 2,61 0,0562 | 2,61 0,0562 | | |
| B-97 ** | 0730-721 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 0,0462 | 0,0462 | | |
| B-97 *** | 0730-721 | 1 gélule à libération prolongée, 200 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg | | 0,0569 | 0,0569 | 0,0115 | 0,0192 |
| XANTHIUM 300 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04 | | | | | | | | |
| B-97 | 0381-210 | 60 gélules à libération prolongée, 300 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg | | 10,19 | 10,19 | 0,94 | 1,57 |
| B-97 * | 0381-210 0739-573 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | | 3,55 0,0763 | 3,55 0,0763 | | |
| B-97 ** | 0739-573 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | | 0,0627 | 0,0627 | | |
| B-97 *** | 0739-573 | 1 gélule à libération prolongée, 300 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg | | 0,0776 | 0,0776 | 0,0157 | 0,0262 |
| XANTHIUM 400 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04 | | | | | | | | |
| B-97 | 0835-488 | 60 gélules à libération prolongée, 400 mg | 60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg | | 11,03 | 11,03 | 1,11 | 1,86 |
| B-97 * | 0835-488 0730-952 | 1 gélule à libération prolongée, 400 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg | | 4,20 0,0903 | 4,20 0,0903 | | |
| B-97 ** | 0730-952 | 1 gélule à libération prolongée, 400 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg | | 0,0742 | 0,0742 | | |
| B-97 *** | 0730-952 | 1 gélule à libération prolongée, 400 mg | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg | | 0,0917 | 0,0917 | 0,0185 | 0,0310 |
| XELODA 150 mg EUROCEPT ATC: L01BC06 | | | | | | | | |
| A-28 | 1415-314 | 60 comprimés pelliculés, 150 mg | 60 filmomhulde tabletten, 150 mg | R | 32,30 | 32,30 | 0,00 | 0,00 |
| A-28 * | 1415-314 0768-093 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 21,42 0,4607 | 21,42 0,4607 | | |
| A-28 ** | 0768-093 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 0,3785 | 0,3785 | | |
| A-28 *** | 0768-093 | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | R | 0,4461 | 0,4461 | 0,0000 | 0,0000 |

| XELODA 500 mg | | EUROCEPT | | | | ATC: L01BC06 | | | |
|---------------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| A-28 | 1415-322 1415-322 | 120 comprimés pelliculés, 500 mg | 120 filmomhulde tabletten, 500 mg | R | 156,90 133,22 | 156,90 133,22 | 0,00 | 0,00 | |
| A-28 * | 0768-101 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,2360 | 1,2360 | | | |
| A-28 ** | 0768-101 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,1768 | 1,1768 | | | |
| A-28 *** | 0768-101 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,2614 | 1,2614 | 0,0000 | 0,0000 | |
| XENETIX 300 | | GUERBET | | | | ATC: V08AB11 | | | |
| B-178 * | 0787-572 0787-572 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml 10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 108,03 2,4324 | 108,03 2,4324 | | | |
| B-178 ** | 0787-572 | 10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 2,2902 | 2,2902 | | | |
| XENETIX 300 | | GUERBET | | | | ATC: V08AB11 | | | |
| B-178 | 1294-586 1294-586 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml | | 13,24 5,88 | 13,24 5,88 | 1,56 | 2,60 | |
| B-178 * | 0748-160 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL | | 7,5900 | 7,5900 | | | |
| B-178 ** | 0748-160 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL | | 6,2300 | 6,2300 | | | |
| XENETIX 300 | | GUERBET | | | | ATC: V08AB11 | | | |
| B-178 | 1294-602 1294-602 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml | | 39,60 27,78 | 39,60 27,78 | 5,94 | 10,00 | |
| B-178 * | 0748-186 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL | | 35,8500 | 35,8500 | | | |
| B-178 ** | 0748-186 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL | | 29,4500 | 29,4500 | | | |
| XENETIX 300 | | GUERBET | | | | ATC: V08AB11 | | | |
| B-178 | 2162-444 2162-444 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml | | 52,58 39,07 | 52,58 39,07 | 7,75 | 12,50 | |
| B-178 * | 0777-854 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL | | 48,5200 | 48,5200 | | | |
| B-178 ** | 0777-854 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL | | 41,4100 | 41,4100 | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | | | ATC: V08AB11 | | | |
| B-178 * | 0785-469 0785-469 | 1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 126,27 2,8192 | 126,27 2,8192 | | | |
| B-178 ** | 0785-469 | 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 10 mL oplossing voor injectie, | | 2,6770 | 2,6770 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|-------|--|
| | | mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | | | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB11 | | | | | |
| B-178 * | 0787-580 | 1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 126,27 | 126,27 | | | |
| B-178 ** | 0787-580 | 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 2,8192 | 2,8192 | | | |
| B-178 ** | 0787-580 | 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) | 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) | | 2,6770 | 2,6770 | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB11 | | | | | |
| B-178 | 1294-651 | 1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml | | 41,85 | 41,85 | 6,26 | 10,53 | |
| | 1294-651 | | | | 29,73 | 29,73 | | | |
| B-178 * | 0748-301 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 38,3700 | 38,3700 | | | |
| B-178 ** | 0748-301 | 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 31,5100 | 31,5100 | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB11 | | | | | |
| B-178 | 2393-080 | 1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml | 1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml | | 41,85 | 41,85 | 6,26 | 10,53 | |
| | 2393-080 | | | | 29,73 | 29,73 | | | |
| B-178 * | 0785-436 | 1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 38,3700 | 38,3700 | | | |
| B-178 ** | 0785-436 | 1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 31,5100 | 31,5100 | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB11 | | | | | |
| B-178 | 1294-644 | 1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml | 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml | | 25,64 | 25,64 | 4,00 | 6,72 | |
| | 1294-644 | | | | 15,63 | 15,63 | | | |
| B-178 * | 0748-293 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 20,1700 | 20,1700 | | | |
| B-178 ** | 0748-293 | 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 16,5700 | 16,5700 | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB11 | | | | | |
| B-178 | 1395-771 | 1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml | 1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml | | 60,16 | 60,16 | 8,30 | 12,50 | |
| | 1395-771 | | | | 45,66 | 45,66 | | | |
| B-178 * | 0748-277 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 55,5100 | 55,5100 | | | |
| B-178 ** | 0748-277 | 1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | 48,4000 | 48,4000 | | | |
| XENETIX 350 | | GUERBET | | ATC: V08AB11 | | | | | |
| B-178 | 2393-098 | 1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml | 1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml | | 60,16 | 60,16 | 8,30 | 12,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| | 2393-098 | | | | | 45,66 | 45,66 | | |
| B-178 * | 0785-444 | 1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | | 55,5100 | 55,5100 | | |
| B-178 ** | 0785-444 | 1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL | 1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL | | | 48,4000 | 48,4000 | | |
| XERAVA 100 mg VIATRIS ATC: J01AA13 | | | | | | | | | |
| | 7739-477 | 10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg | 10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg | | | 1250,00 | 1250,00 | | |
| B-382 * | 7739-477 | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | | | 133,2110 | 133,2110 | | |
| B-382 ** | 7739-477 | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | | | 132,5000 | 132,5000 | | |
| XYZALL 5 mg UCB PHARMA ATC: R06AE09 | | | | | | | | | |
| Cs-7 | 1654-102 1654-102 | 20 comprimés pelliculés, 5 mg | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | | 7,81 1,65 | 7,81 1,65 | 1,75 | 1,75 |
| Cs-7 | 1744-176 1744-176 | 40 comprimés pelliculés, 5 mg | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | | 9,49 3,02 | 9,49 3,02 | 3,20 | 3,20 |
| Cs-7 | 4436-952 4436-952 | 100 comprimés pelliculés, 5 mg | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg | R | | 14,61 6,93 | 14,61 6,93 | 7,35 | 7,35 |
| Cs-7 * | 0770-370 | 1 comprimé péliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | | 0,0894 | 0,0894 | | |
| Cs-7 ** | 0770-370 | 1 comprimé péliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | | 0,0735 | 0,0735 | | |
| Cs-7 *** | 0770-370 | 1 comprimé péliculé, 5 mg | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | R | | 0,0907 | 0,0907 | 0,0735 | 0,0735 |
| ZALASTA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03 | | | | | | | | | |
| B-72 | 3892-056 3892-056 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | G | | 26,82 16,65 | 26,82 16,65 | 4,16 | 7,00 |
| B-72 * | 7724-131 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | | 0,7675 | 0,7675 | | |
| B-72 ** | 7724-131 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | | 0,6304 | 0,6304 | | |
| B-72 *** | 7724-131 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | G | | 0,7602 | 0,7602 | 0,1486 | 0,2500 |
| ZALASTA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03 | | | | | | | | | |
| B-72 | 3892-031 3892-031 | 28 comprimés, 10 mg | 28 tabletten, 10 mg | G | | 26,82 16,65 | 26,82 16,65 | 4,16 | 7,00 |
| B-72 * | 7724-123 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | | 0,7675 | 0,7675 | | |
| B-72 ** | 7724-123 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | | 0,6304 | 0,6304 | | |
| B-72 *** | 7724-123 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G | | 0,7602 | 0,7602 | 0,1486 | 0,2500 |
| ZALASTA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03 | | | | | | | | | |
| B-72 | 3892-023 3892-023 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | G | | 19,37 10,56 | 19,37 10,56 | 2,80 | 4,67 |
| B-72 * | 7724-107 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | | 0,4868 | 0,4868 | | |
| B-72 ** | 7724-107 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | | 0,3996 | 0,3996 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-72 *** | 7724-107 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | G | 0,4940 | 0,4940 | 0,1000 | 0,1668 |
| ZALASTA 5 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: N05AH03 | | | | |
| B-72 | 3892-049 | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | G | 19,37 | 19,37 | 2,80 | 4,67 |
| | 3892-049 | | | | 10,56 | 10,56 | | |
| B-72 * | 7724-115 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg | G | 0,4868 | 0,4868 | | |
| B-72 ** | 7724-115 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg | G | 0,3996 | 0,3996 | | |
| B-72 *** | 7724-115 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg | G | 0,4940 | 0,4940 | 0,1000 | 0,1668 |
| ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 1799-931 | 20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | R | 7,88 | 7,88 | 1,50 | 1,50 |
| | 1799-931 | | | | 1,70 | 1,70 | | |
| C-29 | 2752-897 | 60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | R | 11,94 | 11,94 | 4,32 | 4,32 |
| | 2752-897 | | | | 4,89 | 4,89 | | |
| C-29 | 3677-879 | 100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | R | 16,21 | 16,21 | 7,20 | 7,20 |
| | 3677-879 | | | | 8,15 | 8,15 | | |
| C-29 * | 0774-695 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg | R | 0,1052 | 0,1052 | | |
| C-29 ** | 0774-695 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg | R | 0,0864 | 0,0864 | | |
| C-29 *** | 0774-695 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg | R | 0,1067 | 0,1067 | 0,0720 | 0,0720 |
| ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N02AJ13 | | | | |
| C-29 | 3417-896 | 60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | R | 11,94 | 11,94 | 4,32 | 4,32 |
| | 3417-896 | | | | 4,89 | 4,89 | | |
| C-29 | 3926-698 | 100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg | 100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg | R | 16,21 | 16,21 | 7,20 | 7,20 |
| | 3926-698 | | | | 8,15 | 8,15 | | |
| C-29 * | 7717-077 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg | R | 0,1052 | 0,1052 | | |
| C-29 ** | 7717-077 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg | R | 0,0864 | 0,0864 | | |
| C-29 *** | 7717-077 | 1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg | 1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg | R | 0,1067 | 0,1067 | 0,0720 | 0,0720 |
| ZALVOR 5 % | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: P03AC04 | | | | |
| B-355 | 1028-190 | 1 tube 30 g crème, 50 mg/g | 1 tube 30 g crème, 50 mg/g | | 15,54 | 15,54 | 2,02 | 3,37 |
| | 1028-190 | | | | 7,63 | 7,63 | | |
| B-355 * | 7726-201 | 1 tube crème, 50 mg/g | 1 tube crème, 50 mg/g | | 9,8500 | 9,8500 | | |
| B-355 ** | 7726-201 | 1 tube crème, 50 mg/g | 1 tube crème, 50 mg/g | | 8,0900 | 8,0900 | | |
| ZANICOMBO 10 mg/10 mg | | RECORDATI | | ATC: C09BB02 | | | | |
| B-288 | 2582-450 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 13,94 | 13,94 | 1,70 | 2,83 |
| | 2582-450 | | | | 6,41 | 6,41 | | |
| B-288 | 2582-443 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 19,83 | 19,83 | 2,89 | 4,82 |
| | 2582-443 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-288 | 2582-435 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg | R | 24,30 | 24,30 | 3,81 | 6,40 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2582-435 | | | | 14,46 | 14,46 | | |
| B-288 * | 0793-315 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,1904 | 0,1904 | | |
| B-288 ** | 0793-315 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,1564 | 0,1564 | | |
| B-288 *** | 0793-315 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg | R | 0,1914 | 0,1914 | 0,0389 | 0,0653 |
| ZANICOMBO 20 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02 | | | | | | | | |
| B-288 | 2652-063 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg | R | 16,45 | 16,45 | 2,21 | 3,68 |
| | 2652-063 | | | | 8,33 | 8,33 | | |
| B-288 | 2652-071 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg | R | 22,99 | 22,99 | 3,53 | 5,89 |
| | 2652-071 | | | | 13,32 | 13,32 | | |
| B-288 | 2652-055 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg | R | 28,61 | 28,61 | 4,41 | 7,42 |
| | 2652-055 | | | | 18,21 | 18,21 | | |
| B-288 * | 0795-922 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,2398 | 0,2398 | | |
| B-288 ** | 0795-922 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,1969 | 0,1969 | | |
| B-288 *** | 0795-922 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg | R | 0,2355 | 0,2355 | 0,0450 | 0,0757 |
| ZANIDIP 10 mg RECORDATI ATC: C08CA13 | | | | | | | | |
| B-20 | 1383-637 | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 11,12 | 11,12 | 1,13 | 1,88 |
| | 1383-637 | | | | 4,26 | 4,26 | | |
| B-20 | 2139-632 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 16,13 | 16,13 | 2,15 | 3,58 |
| | 2139-632 | | | | 8,09 | 8,09 | | |
| B-20 | 2695-864 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 18,79 | 18,79 | 2,68 | 4,47 |
| | 2695-864 | | | | 10,12 | 10,12 | | |
| B-20 * | 0760-355 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1333 | 0,1333 | | |
| B-20 ** | 0760-355 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1095 | 0,1095 | | |
| B-20 *** | 0760-355 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1353 | 0,1353 | 0,0273 | 0,0456 |
| ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C08CA13 | | | | | | | | |
| B-20 | 4818-951 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 18,79 | 18,79 | 2,68 | 4,47 |
| | 4818-951 | | | | 10,12 | 10,12 | | |
| B-20 * | 7740-806 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1333 | 0,1333 | | |
| B-20 ** | 7740-806 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1095 | 0,1095 | | |
| B-20 *** | 7740-806 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1353 | 0,1353 | 0,0273 | 0,0456 |
| ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13 | | | | | | | | |
| B-20 | 2618-478 | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 16,13 | 16,13 | 2,15 | 3,58 |
| | 2618-478 | | | | 8,09 | 8,09 | | |
| B-20 | 2804-474 | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | R | 18,79 | 18,79 | 2,68 | 4,47 |
| | 2804-474 | | | | 10,12 | 10,12 | | |
| B-20 * | 0794-495 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1333 | 0,1333 | | |
| B-20 ** | 0794-495 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1095 | 0,1095 | | |
| B-20 *** | 0794-495 | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | R | 0,1353 | 0,1353 | 0,0273 | 0,0456 |
| ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13 | | | | | | | | |
| B-20 | 2233-211 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 15,58 | 15,58 | 2,03 | 3,39 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|----|---------------|---------------|--------|--------|
| | 2233-211 | | | | 7,67 | 7,67 | | |
| B-20 | 2233-203 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 21,60 | 21,60 | 3,25 | 5,42 |
| | 2233-203 | | | | 12,26 | 12,26 | | |
| B-20 | 2695-856 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 26,00 | 26,00 | 4,05 | 6,80 |
| | 2695-856 | | | | 15,94 | 15,94 | | |
| B-20 * | 0781-526 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2099 | 0,2099 | | |
| B-20 ** | 0781-526 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1724 | 0,1724 | | |
| B-20 *** | 0781-526 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2089 | 0,2089 | 0,0413 | 0,0694 |
| ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C08CA13 | | | | | | | | |
| B-20 | 4818-969 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 26,00 | 26,00 | 4,05 | 6,80 |
| | 4818-969 | | | | 15,94 | 15,94 | | |
| B-20 * | 7740-814 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2099 | 0,2099 | | |
| B-20 ** | 7740-814 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1724 | 0,1724 | | |
| B-20 *** | 7740-814 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2089 | 0,2089 | 0,0413 | 0,0694 |
| ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13 | | | | | | | | |
| B-20 | 2618-460 | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 21,60 | 21,60 | 3,25 | 5,42 |
| | 2618-460 | | | | 12,26 | 12,26 | | |
| B-20 | 2804-482 | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | R | 26,00 | 26,00 | 4,05 | 6,80 |
| | 2804-482 | | | | 15,94 | 15,94 | | |
| B-20 * | 0794-503 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2099 | 0,2099 | | |
| B-20 ** | 0794-503 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,1724 | 0,1724 | | |
| B-20 *** | 0794-503 | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | R | 0,2089 | 0,2089 | 0,0413 | 0,0694 |
| ZARONTIN ESSENTIAL PHARMA ATC: N03AD01 | | | | | | | | |
| A-5 | 1414-366 | 1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml | 1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml | | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 1414-366 | | | | 5,16 | 5,16 | | |
| A-5 * | 0721-472 | 5 mL sirop, 50 mg/mL | 5 mL stroop, 50 mg/mL | | 0,1665 | 0,1665 | | |
| A-5 ** | 0721-472 | 5 mL sirop, 50 mg/mL | 5 mL stroop, 50 mg/mL | | 0,1368 | 0,1368 | | |
| ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg Pfizer ATC: J01DD52 | | | | | | | | |
| | 7723-828 | 10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2 g/ 0,5 g | 10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,5 g | | 996,08 | 996,08 | | |
| B-350 * | 7723-828 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | CR | 106,2950 | 106,2950 | | |
| B-350 ** | 7723-828 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | CR | 105,5840 | 105,5840 | | |
| ZEPHIRUS 120 µg/20 µg LABORATOIRES SMB ATC: R03AK12 | | | | | | | | |
| B-245 | 3373-651 | 60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg | CR | 17,50 | 17,50 | 2,42 | 4,04 |
| | 3373-651 | | | | 9,13 | 9,13 | | |
| B-245 | 3373-677 | 180 poudres pour inhalation en | 180 inhalatiepoeders in harde | CR | 39,18 | 39,18 | 5,89 | 9,90 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|----|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | gélule, 120 µg / 20 µg | capsule, 120 µg / 20 µg | | | | | | |
| | 3373-677 | | | | | 27,41 | 27,41 | | |
| B-245 * | 7715-766 | 1 gélule, 120 µg/ 20 µg | 1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg | CR | 0,1965 | 0,1965 | | | |
| B-245 ** | 7715-766 | 1 gélule, 120 µg/ 20 µg | 1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg | CR | 0,1614 | 0,1614 | | | |
| ZEPHIRUS 240 µg/20 µg | | LABORATOIRES SMB | | | ATC: R03AK12 | | | | |
| B-245 | 3373-628 | 60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg | CR | 19,76 | 19,76 | 2,88 | 4,80 | |
| | 3373-628 | | | | 10,85 | 10,85 | | | |
| B-245 | 3373-644 | 180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg | 180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg | CR | 45,12 | 45,12 | 6,71 | 11,30 | |
| | 3373-644 | | | | 32,58 | 32,58 | | | |
| B-245 * | 7715-774 | 1 gélule, 240 µg/ 20 µg | 1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg | CR | 0,2313 | 0,2313 | | | |
| B-245 ** | 7715-774 | 1 gélule, 240 µg/ 20 µg | 1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg | CR | 0,1918 | 0,1918 | | | |
| ZERBAXA 1 g/0,5 g | | MSD BELGIUM | | | ATC: J01DI54 | | | | |
| | 7731-110 | 10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g | 10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g | | 807,91 | 807,91 | | | |
| B-350 * | 7731-110 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g | | 86,3490 | 86,3490 | | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | | | | | | |
| B-350 ** | 7731-110 | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g | | 85,6380 | 85,6380 | | | |
| | | (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | | | | | | |
| ZESTORETIC 20/12,5 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C09BA03 | | | | |
| B-21 | 0689-851 | 28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | R | 12,07 | 12,07 | 1,32 | 2,21 | |
| | 0689-851 | | | | 4,99 | 4,99 | | | |
| B-21 | 1415-264 | 56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg | 56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg | R | 15,61 | 15,61 | 2,04 | 3,40 | |
| | 1415-264 | | | | 7,69 | 7,69 | | | |
| B-21 | 4679-858 | 98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg | 98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg | R | 23,14 | 23,14 | 3,57 | 5,94 | |
| | 4679-858 | | | | 13,45 | 13,45 | | | |
| B-21 * | 0736-124 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,1771 | 0,1771 | | | |
| B-21 ** | 0736-124 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,1455 | 0,1455 | | | |
| B-21 *** | 0736-124 | 1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg | 1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg | R | 0,1797 | 0,1797 | 0,0364 | 0,0606 | |
| ZESTRIL 20 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | ATC: C09AA03 | | | | |
| B-21 | 0613-422 | 28 comprimés, 20 mg | 28 tabletten, 20 mg | R | 11,26 | 11,26 | 1,16 | 1,93 | |
| | 0613-422 | | | | 4,37 | 4,37 | | | |
| B-21 | 1184-027 | 56 comprimés, 20 mg | 56 tabletten, 20 mg | R | 16,05 | 16,05 | 2,13 | 3,54 | |
| | 1184-027 | | | | 8,02 | 8,02 | | | |
| B-21 | 4643-482 | 98 comprimés, 20 mg | 98 tabletten, 20 mg | R | 22,85 | 22,85 | 3,51 | 5,84 | |
| | 4643-482 | | | | 13,22 | 13,22 | | | |
| B-21 * | 0731-240 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1741 | 0,1741 | | | |
| B-21 ** | 0731-240 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1430 | 0,1430 | | | |
| B-21 *** | 0731-240 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1767 | 0,1767 | 0,0358 | 0,0596 | |

| ZESTRIL 5 | | PHARMANOVIA BENELUX B.V. | | | | ATC: C09AA03 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|--------|--------------|--|
| B-21 | 0613-414 0613-414 | 28 comprimés, 5 mg | 28 tabletten, 5 mg | R | 6,65 0,62 | 6,65 0,62 | 0,16 | 0,27 | |
| B-21 * | 0731-232 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,0286 | 0,0286 | | | |
| B-21 ** | 0731-232 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,0236 | 0,0236 | | | |
| B-21 *** | 0731-232 | 1 comprimé, 5 mg | 1 tablet, 5 mg | R | 0,0398 | 0,0398 | 0,0057 | 0,0096 | |
| ZINACEF 1500 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01DC02 | |
| | 0743-344 | 1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg | 1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg | | 2,41 | 2,41 | | | |
| B-111 ** | 0743-344 | 1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg | 1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg | R | 2,5500 | 2,5500 | | | |
| ZINACEF 750 mg | | SANDOZ | | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) | | | | ATC: J01DC02 | |
| | 0743-302 | 1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg | 1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg | | 1,22 | 1,22 | | | |
| B-111 ** | 0743-302 | 1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg | 1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg | R | 1,2900 | 1,2900 | | | |
| ZINFORO 600 mg | | Pfizer | | ATC: J01DI02 | | | | | |
| | 7705-536 | 10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg | 10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg | | 621,00 | 621,00 | | | |
| B-327 ** | 7705-536 | 1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg | 1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 600 mg | | 65,8260 | 65,8260 | | | |
| ZINNAT 250 | | SANDOZ | | ATC: J01DC02 | | | | | |
| C-37 | 1531-441 1531-441 | 1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml | 1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml | R | 11,54 4,59 | 11,54 4,59 | 4,06 | 4,06 | |
| C-37 * | 0762-658 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,2960 | 0,2960 | | | |
| C-37 ** | 0762-658 | 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL | R | 0,2435 | 0,2435 | | | |
| ZINNAT 250 | | SANDOZ | | ATC: J01DC02 | | | | | |
| C-37 | 0679-118 0679-118 | 10 comprimés, 250 mg | 10 tabletten, 250 mg | R | 8,48 2,23 | 8,48 2,23 | 1,97 | 1,97 | |
| C-37 * | 0734-251 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,2880 | 0,2880 | | | |
| C-37 ** | 0734-251 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,2360 | 0,2360 | | | |
| C-37 *** | 0734-251 | 1 comprimé, 250 mg | 1 tablet, 250 mg | R | 0,2947 | 0,2947 | 0,1970 | 0,1970 | |
| ZINNAT 500 | | SANDOZ | | ATC: J01DC02 | | | | | |
| C-37 | 1089-689 1089-689 | 10 comprimés, 500 mg | 10 tabletten, 500 mg | R | 11,29 4,39 | 11,29 4,39 | 3,88 | 3,88 | |
| C-37 | 1557-396 1557-396 | 20 comprimés, 500 mg | 20 tabletten, 500 mg | R | 16,32 8,24 | 16,32 8,24 | 7,28 | 7,28 | |
| C-37 * | 0741-439 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,5315 | 0,5315 | | | |
| C-37 ** | 0741-439 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,4365 | 0,4365 | | | |
| C-37 *** | 0741-439 | 1 comprimé, 500 mg | 1 tablet, 500 mg | R | 0,5395 | 0,5395 | 0,3640 | 0,3640 | |
| ZITROMAX 200 mg/ 5 ml | | Pfizer | | ATC: J01FA10 | | | | | |
| C-37 | 1114-503 | 1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | R | 7,82 | 7,82 | 1,47 | 1,47 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| C-37 | 1114-503 1114-511 | 1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | R | 1,66 8,82 | 1,66 8,82 | 2,21 | 2,21 |
| C-37 | 1114-511 1719-830 | 1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml | 1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml | R | 2,50 11,01 | 2,50 11,01 | 3,69 | 3,69 |
| C-37 * | 1719-830 0742-403 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | R | 4,18 0,7700 | 4,18 0,7700 | | |
| C-37 ** | 0742-403 | 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL | 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL | R | 0,6329 | 0,6329 | | |
| ZITROMAX 250 mg Pfizer ATC: J01FA10 | | | | | | | | |
| C-37 | 1417-450 1417-450 | 6 comprimés pelliculés, 250 mg | 6 filmomhulde tabletten, 250 mg | R | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 |
| C-37 * | 0760-363 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | R | 0,7467 | 0,7467 | | |
| C-37 ** | 0760-363 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | R | 0,6133 | 0,6133 | | |
| C-37 *** | 0760-363 | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | R | 0,7579 | 0,7579 | 0,5117 | 0,5117 |
| ZITROMAX 500 mg Pfizer ATC: J01FA10 | | | | | | | | |
| C-37 | 1417-468 1417-468 | 3 comprimés pelliculés, 500 mg | 3 filmomhulde tabletten, 500 mg | R | 10,08 3,47 | 10,08 3,47 | 3,07 | 3,07 |
| C-37 * | 0760-371 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,4933 | 1,4933 | | |
| C-37 ** | 0760-371 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,2267 | 1,2267 | | |
| C-37 *** | 0760-371 | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | R | 1,5158 | 1,5158 | 1,0233 | 1,0233 |
| ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 1391-077 1391-077 | 84 comprimés, 20 mg | 84 tabletten, 20 mg | R | 14,44 6,80 | 14,44 6,80 | 1,80 | 3,01 |
| B-41 * | 0734-129 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1045 | 0,1045 | | |
| B-41 ** | 0734-129 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,0858 | 0,0858 | | |
| B-41 *** | 0734-129 | 1 comprimé, 20 mg | 1 tablet, 20 mg | R | 0,1060 | 0,1060 | 0,0214 | 0,0358 |
| ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01 | | | | | | | | |
| B-41 | 1432-855 1432-855 | 98 comprimés, 40 mg | 98 tabletten, 40 mg | R | 21,00 11,80 | 21,00 11,80 | 3,13 | 5,22 |
| B-41 * | 0760-769 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,1554 | 0,1554 | | |
| B-41 ** | 0760-769 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,1277 | 0,1277 | | |
| B-41 *** | 0760-769 | 1 comprimé, 40 mg | 1 tablet, 40 mg | R | 0,1578 | 0,1578 | 0,0319 | 0,0533 |
| ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01 | | | | | | | | |
| | 0736-033 | 10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 27,34 | 27,34 | | |
| B-200 * | 0736-033 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 3,5280 | 3,5280 | | |
| B-200 ** | 0736-033 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 2,8980 | 2,8980 | | |
| ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01 | | | | | | | | |
| | 0736-041 | 8 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 8 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | | 20,83 | 20,83 | | |
| B-200 * | 0736-041 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | R | 3,3600 | 3,3600 | | |
| B-200 ** | 0736-041 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, | 1 ampul 4 mL oplossing voor | R | 2,7600 | 2,7600 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|--|
| | | 2 mg/mL | injectie, 2 mg/mL | | | | | | |
| ZOFRAN-ZYDIS 8 mg | | SANDOZ | | ATC: A04AA01 | | | | | |
| | 0788-067 | 10 lyophilisats oraux, 8 mg | 10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg | | 29,63 | 29,63 | | | |
| B-200 * | 0788-067 | 1 lyophilisat oral, 8 mg | 1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg | R | 3,8240 | 3,8240 | | | |
| B-200 ** | 0788-067 | 1 lyophilisat oral, 8 mg | 1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg | R | 3,1410 | 3,1410 | | | |
| ZOFSETRON 4 mg/2 ml | | SANDOZ | | ATC: A04AA01 | | | | | |
| | 0752-147 | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 13,67 | 13,67 | | | |
| B-200 * | 0752-147 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,5280 | 3,5280 | | | |
| B-200 ** | 0752-147 | 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,8980 | 2,8980 | | | |
| ZOFSETRON 8 mg/4 ml | | SANDOZ | | ATC: A04AA01 | | | | | |
| | 0752-139 | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | | 13,02 | 13,02 | | | |
| B-200 * | 0752-139 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 3,3600 | 3,3600 | | | |
| B-200 ** | 0752-139 | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL | G | 2,7600 | 2,7600 | | | |
| ZOLADEX (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: L02AE03 | | | | | |
| A-27 | 2125-300 | 3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg | 3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg | | 122,02 | 122,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2125-300 | | | | 101,40 | 101,40 | | | |
| A-27 * | 0776-450 | 1 cylindre pour injection, 3,6 mg | 1 staafje voor injectie, 3,6 mg | | 114,5900 | 114,5900 | | | |
| A-27 ** | 0776-450 | 1 cylindre pour injection, 3,6 mg | 1 staafje voor injectie, 3,6 mg | | 107,4800 | 107,4800 | | | |
| ZOLADEX 3,6 mg | | ASTRAZENECA | | ATC: L02AE03 | | | | | |
| A-27 | 0603-159 | 1 cylindre pour injection, 3,6 mg | 1 staafje voor injectie, 3,6 mg | | 122,02 | 122,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0603-159 | | | | 101,40 | 101,40 | | | |
| A-27 * | 0730-739 | 1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg | 1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg | | 114,5900 | 114,5900 | | | |
| A-27 ** | 0730-739 | 1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg | 1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg | | 107,4800 | 107,4800 | | | |
| ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg | | ASTRAZENECA | | ATC: L02AE03 | | | | | |
| A-27 | 1278-480 | 1 cylindre pour injection, 10,8 mg | 1 staafje voor injectie, 10,8 mg | | 297,04 | 297,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1278-480 | | | | 261,04 | 261,04 | | | |
| A-27 * | 0748-129 | 1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg | 1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg | | 283,8100 | 283,8100 | | | |
| A-27 ** | 0748-129 | 1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg | 1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg | | 276,7000 | 276,7000 | | | |
| ZYLORIC | | LABORATOIRES SMB | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 0137-810 | 100 comprimés, 100 mg | 100 tabletten, 100 mg | R | 7,81 | 7,81 | 0,44 | 0,73 | |
| | 0137-810 | | | | 1,65 | 1,65 | | | |
| B-68 * | 0721-571 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,0213 | 0,0213 | | | |
| B-68 ** | 0721-571 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,0175 | 0,0175 | | | |
| B-68 *** | 0721-571 | 1 comprimé, 100 mg | 1 tablet, 100 mg | R | 0,0228 | 0,0228 | 0,0044 | 0,0073 | |
| ZYLORIC 300 | | LABORATOIRES SMB | | ATC: M04AA01 | | | | | |
| B-68 | 0099-457 | 30 comprimés, 300 mg | 30 tabletten, 300 mg | R | 8,63 | 8,63 | 0,63 | 1,04 | |
| | 0099-457 | | | | 2,36 | 2,36 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-68 | 0866-236 0866-236 | 90 comprimés, 300 mg | 90 tabletten, 300 mg | R | 10,40 3,71 | 10,40 3,71 | 0,98 | 1,64 |
| B-68 * | 0721-589 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,0532 | 0,0532 | | |
| B-68 ** | 0721-589 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,0437 | 0,0437 | | |
| B-68 *** | 0721-589 | 1 comprimé, 300 mg | 1 tablet, 300 mg | R | 0,0541 | 0,0541 | 0,0109 | 0,0182 |
| ZYPREXA 10 mg | | EUROCEPT | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 2783-389 2783-389 | 98 comprimés enrobés, 10 mg | 98 omhulde tabletten, 10 mg | R | 44,66 32,18 | 44,66 32,18 | 6,65 | 11,19 |
| B-72 * | 0749-978 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | R | 0,4206 | 0,4206 | | |
| B-72 ** | 0749-978 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | R | 0,3481 | 0,3481 | | |
| B-72 *** | 0749-978 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | R | 0,3992 | 0,3992 | 0,0679 | 0,1142 |
| ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 2839-488 2839-488 | 28 comprimés enrobés, 10 mg | 28 omhulde tabletten, 10 mg | R | 27,77 17,48 | 27,77 17,48 | 4,30 | 7,22 |
| B-72 | 3109-931 3109-931 | 98 comprimés enrobés, 10 mg | 98 omhulde tabletten, 10 mg | R | 44,66 32,18 | 44,66 32,18 | 6,65 | 11,19 |
| B-72 * | 0756-064 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | R | 0,4206 | 0,4206 | | |
| B-72 ** | 0756-064 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | R | 0,3481 | 0,3481 | | |
| B-72 *** | 0756-064 | 1 comprimé enrobé, 10 mg | 1 omhulde tablet, 10 mg | R | 0,3992 | 0,3992 | 0,0679 | 0,1142 |
| ZYPREXA 5 mg | | EUROCEPT | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 2783-405 2783-405 | 98 comprimés enrobés, 5 mg | 98 omhulde tabletten, 5 mg | R | 37,25 25,73 | 37,25 25,73 | 5,62 | 9,45 |
| B-72 * | 0749-952 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | R | 0,3388 | 0,3388 | | |
| B-72 ** | 0749-952 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | R | 0,2783 | 0,2783 | | |
| B-72 *** | 0749-952 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | R | 0,3236 | 0,3236 | 0,0573 | 0,0964 |
| ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 2839-470 2839-470 | 28 comprimés enrobés, 5 mg | 28 omhulde tabletten, 5 mg | R | 20,09 11,11 | 20,09 11,11 | 2,95 | 4,91 |
| B-72 | 3109-923 3109-923 | 98 comprimés enrobés, 5 mg | 98 omhulde tabletten, 5 mg | R | 37,25 25,73 | 37,25 25,73 | 5,62 | 9,45 |
| B-72 * | 0756-072 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | R | 0,3388 | 0,3388 | | |
| B-72 ** | 0756-072 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | R | 0,2783 | 0,2783 | | |
| B-72 *** | 0756-072 | 1 comprimé enrobé, 5 mg | 1 omhulde tablet, 5 mg | R | 0,3236 | 0,3236 | 0,0573 | 0,0964 |
| ZYPREXA 7,5 mg | | EUROCEPT | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 1302-900 1302-900 | 56 comprimés enrobés, 7,5 mg | 56 omhulde tabletten, 7,5 mg | R | 27,40 17,16 | 27,40 17,16 | 4,25 | 7,13 |
| B-72 * | 0749-960 | 1 comprimé enrobé, 7,5 mg | 1 omhulde tablet, 7,5 mg | R | 0,3954 | 0,3954 | | |
| B-72 ** | 0749-960 | 1 comprimé enrobé, 7,5 mg | 1 omhulde tablet, 7,5 mg | R | 0,3248 | 0,3248 | | |
| B-72 *** | 0749-960 | 1 comprimé enrobé, 7,5 mg | 1 omhulde tablet, 7,5 mg | R | 0,3905 | 0,3905 | 0,0759 | 0,1273 |
| ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | ATC: N05AH03 | | | |
| B-72 | 3901-550 3901-550 | 56 comprimés enrobés, 7,5 mg | 56 omhulde tabletten, 7,5 mg | R | 27,40 17,16 | 27,40 17,16 | 4,25 | 7,13 |
| B-72 * | 7725-013 | 1 comprimé enrobé, 7,5 mg | 1 omhulde tablet, 7,5 mg | R | 0,3954 | 0,3954 | | |
| B-72 ** | 7725-013 | 1 comprimé enrobé, 7,5 mg | 1 omhulde tablet, 7,5 mg | R | 0,3248 | 0,3248 | | |
| B-72 *** | 7725-013 | 1 comprimé enrobé, 7,5 mg | 1 omhulde tablet, 7,5 mg | R | 0,3905 | 0,3905 | 0,0759 | 0,1273 |

| ZYPREXA VELOTAB 10 mg | | EUROCEPT | | ATC: N05AH03 | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| B-72 | 2789-089 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | R | 44,66 | 44,66 | 6,65 | 11,19 | |
| | 2789-089 | | | | 32,18 | 32,18 | | | |
| B-72 * | 0771-121 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,4206 | 0,4206 | | | |
| B-72 ** | 0771-121 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,3481 | 0,3481 | | | |
| B-72 *** | 0771-121 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,3992 | 0,3992 | 0,0679 | 0,1142 | |
| ZYPREXA VELOTAB 5 mg | | EUROCEPT | | ATC: N05AH03 | | | | | |
| B-72 | 2789-071 | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | R | 37,25 | 37,25 | 5,62 | 9,45 | |
| | 2789-071 | | | | 25,73 | 25,73 | | | |
| B-72 * | 0771-113 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,3388 | 0,3388 | | | |
| B-72 ** | 0771-113 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,2783 | 0,2783 | | | |
| B-72 *** | 0771-113 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,3236 | 0,3236 | 0,0573 | 0,0964 | |
| ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N05AH03 | | | | | |
| B-72 | 3270-311 | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | R | 27,77 | 27,77 | 4,30 | 7,22 | |
| | 3270-311 | | | | 17,48 | 17,48 | | | |
| B-72 | 3270-329 | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | R | 44,66 | 44,66 | 6,65 | 11,19 | |
| | 3270-329 | | | | 32,18 | 32,18 | | | |
| B-72 * | 7714-470 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,4206 | 0,4206 | | | |
| B-72 ** | 7714-470 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,3481 | 0,3481 | | | |
| B-72 *** | 7714-470 | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | R | 0,3992 | 0,3992 | 0,0679 | 0,1142 | |
| ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: N05AH03 | | | | | |
| B-72 | 3270-337 | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | R | 20,09 | 20,09 | 2,95 | 4,91 | |
| | 3270-337 | | | | 11,11 | 11,11 | | | |
| B-72 | 3270-345 | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | R | 37,25 | 37,25 | 5,62 | 9,45 | |
| | 3270-345 | | | | 25,73 | 25,73 | | | |
| B-72 * | 7714-462 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,3388 | 0,3388 | | | |
| B-72 ** | 7714-462 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,2783 | 0,2783 | | | |
| B-72 *** | 7714-462 | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | R | 0,3236 | 0,3236 | 0,0573 | 0,0964 | |
| ZYRTEC | | UCB PHARMA | | ATC: R06AE07 | | | | | |
| Cs-7 | 1001-528 | 1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml | 1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml | R | 8,95 | 8,95 | 2,77 | 2,77 | |
| | 1001-528 | | | | 2,61 | 2,61 | | | |
| Cs-7 * | 0740-027 | 10 mL solution buvable, 1 mg/mL | 10 mL drank, 1 mg/mL | R | 0,1685 | 0,1685 | | | |
| Cs-7 ** | 0740-027 | 10 mL solution buvable, 1 mg/mL | 10 mL drank, 1 mg/mL | R | 0,1385 | 0,1385 | | | |
| ZYRTEC | | UCB PHARMA | | ATC: R06AE07 | | | | | |
| Cs-7 | 1001-536 | 1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml | 1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml | R | 8,95 | 8,95 | 2,77 | 2,77 | |
| | 1001-536 | | | | 2,61 | 2,61 | | | |
| Cs-7 * | 0740-019 | 1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL | R | 0,1685 | 0,1685 | | | |
| Cs-7 ** | 0740-019 | 1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL | R | 0,1385 | 0,1385 | | | |

