

## CHAPITRE II

Conditions de remboursement des spécialités remboursables sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle a posteriori

## HOOFDSTUK II

Vergoedingsvoorwaarden voor de vergoedbare specialiteiten zonder voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer, met een controle achteraf

### A.- Modalités d'application

Lorsque le médecin prescripteur prescrit une spécialité reprise dans ce chapitre pour une indication remboursée selon les modalités de remboursement telles qu'elles ont été élaborées à cet effet au chapitre IV de cette liste, il appose sur l'ordonnance la mention "IV". Dans ce cas, la spécialité concernée est remboursable qu'après la soumission d'une autorisation du médecin conseil.

B.- Liste des spécialités remboursables sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle a posteriori.

#### Paragraphe 10000

§ 10000 est supprimé au 01/06/2020.

#### Paragraphe 20000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie B :

### A.- Toepassingsmodaliteiten

Wanneer de voorschrijvende arts een specialiteit opgenomen in dit hoofdstuk voorschrijft voor een indicatie die terugbetaald wordt volgens de vergoedingsmodaliteiten zoals ze daarvoor uitgewerkt zijn in hoofdstuk IV van deze lijst, brengt hij op het voorschrift de vermelding "IV" aan. In dat geval wordt de betrokken specialiteit slechts vergoed mits voorlegging van een machtiging van de adviserend geneesheer.

B.- Lijst van de zonder voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer vergoedbare specialiteiten, met een controle achteraf.

#### Paragraaf 10000

§ 10000 is geschrapt op 01/06/2020.

#### Paragraaf 20000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie B:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE AB 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC05		
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,22	18,22	2,57	4,28
	<b>2990-703</b>				<b>9,68</b>	<b>9,68</b>		
B-48 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249		
B-48 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269	0,0257	0,0428

ESOMEPRAZOLE AB 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC05				
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,82	12,82	1,47	2,46
	<b>2990-729</b>				<b>5,56</b>	<b>5,56</b>		
B-48 *	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2564	0,2564		
B-48 **	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2104	0,2104		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2601	0,2601	0,0525	0,0879
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EG		ATC: A02BC05				
B-48	2894-236	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,98	15,98	2,12	3,53
	<b>2894-236</b>				<b>7,98</b>	<b>7,98</b>		
B-48	2893-519	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,00	18,00	2,52	4,20
	<b>2893-519</b>				<b>9,51</b>	<b>9,51</b>		
B-48 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
B-48 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
B-48 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC05	
B-48	2893-527	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,15	13,15	1,54	2,57
	<b>2893-527</b>				<b>5,82</b>	<b>5,82</b>		
B-48 *	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
B-48 **	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-48 ***	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2722	0,2722	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC05				
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,91	15,91	2,10	3,50
	<b>3494-234</b>				<b>7,92</b>	<b>7,92</b>		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,98	17,98	2,52	4,20
	<b>2738-532</b>				<b>9,50</b>	<b>9,50</b>		
B-48 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
B-48 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1270	0,1270	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC05	
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,83	12,83	1,48	2,46
	<b>2738-557</b>				<b>5,57</b>	<b>5,57</b>		
B-48 *	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2568	0,2568		
B-48 **	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2107	0,2107		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2605	0,2605	0,0529	0,0879

			hard, 40 mg						
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC05					
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,74	15,74	2,07	3,44	
	<b>2886-695</b>				<b>7,79</b>	<b>7,79</b>			
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,47	19,47	2,82	4,70	
	<b>2889-905</b>				<b>10,64</b>	<b>10,64</b>			
B-48 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1373	0,1373			
B-48 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1128	0,1128			
B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1394	0,1394	0,0282	0,0470	
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC05	
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,15	13,15	1,54	2,57	
	<b>2880-862</b>				<b>5,82</b>	<b>5,82</b>			
B-48 *	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2682	0,2682			
B-48 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204			
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2722	0,2722	0,0550	0,0918	
LANSOPRAZOL AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC03					
B-48	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G	14,83	14,83	1,88	3,13	
	<b>2248-508</b>				<b>7,09</b>	<b>7,09</b>			
B-48 *	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1634	0,1634			
B-48 **	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1343	0,1343			
B-48 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1660	0,1660	0,0336	0,0559	
LANSOPRAZOL AB 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03	
B-48	2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	23,70	23,70	3,70	6,16	
	<b>2248-524</b>				<b>13,94</b>	<b>13,94</b>			
B-48	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,07	23,07	3,55	5,92	
	<b>2650-745</b>				<b>13,39</b>	<b>13,39</b>			
B-48 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2057	0,2057			
B-48 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1689	0,1689			
B-48 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2087	0,2087	0,0423	0,0705	
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03					
B-48	3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,88	14,88	1,89	3,15	
	<b>3318-813</b>				<b>7,13</b>	<b>7,13</b>			
B-48 *	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1643	0,1643			
B-48 **	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1350	0,1350			
B-48 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1670	0,1670	0,0337	0,0562	
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03					
B-48	3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30	56 maagsapresistente capsules,	G	23,74	23,74	3,70	6,17	

		mg	hard, 30 mg							
	<b>3318-755</b>				<b>13,97</b>	<b>13,97</b>				
B-48 *	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3220	0,3220				
B-48 **	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2645	0,2645				
B-48 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3252	0,3252	0,0661	0,1102		
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03						
B-48	2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,58	15,58	2,03	3,39		
	<b>2341-493</b>				<b>7,67</b>	<b>7,67</b>				
B-48 *	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768				
B-48 **	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452				
B-48 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,0362	0,0605		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03		
B-48	2341-527	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,34	24,34	3,82	6,41		
	<b>2341-527</b>				<b>14,49</b>	<b>14,49</b>				
B-48	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,17	28,17	4,35	7,32		
	<b>2341-519</b>				<b>17,84</b>	<b>17,84</b>				
B-48 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349				
B-48 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930				
B-48 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2310	0,2310	0,0444	0,0747		
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG		ATC: A02BC03						
B-48	2257-608	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,58	15,58	2,03	3,39		
	<b>2257-608</b>				<b>7,67</b>	<b>7,67</b>				
B-48 *	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768				
B-48 **	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452				
B-48 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,0362	0,0605		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03		
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,67	24,67	3,86	6,49		
	<b>2257-632</b>				<b>14,78</b>	<b>14,78</b>				
B-48	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,16	28,16	4,35	7,31		
	<b>2257-590</b>				<b>17,83</b>	<b>17,83</b>				
B-48 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2348	0,2348				
B-48 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1929	0,1929				
B-48 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2309	0,2309	0,0444	0,0746		

			hard, 30 mg						
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC03					
B-48	3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,58	15,58	2,03	3,39	
	<b>3494-804</b>				<b>7,67</b>	<b>7,67</b>			
B-48 *	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768			
B-48 **	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452			
B-48 ***	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,0362	0,0605	
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03	
B-48	2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,34	24,34	3,82	6,41	
	<b>2328-557</b>				<b>14,49</b>	<b>14,49</b>			
B-48	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,95	26,95	4,18	7,03	
	<b>2328-565</b>				<b>16,77</b>	<b>16,77</b>			
B-48 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2208	0,2208			
B-48 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1814	0,1814			
B-48 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2185	0,2185	0,0427	0,0717	
LOSEC MUPS 10 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01					
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	14,08	14,08	1,73	2,88	
	<b>1618-214</b>				<b>6,52</b>	<b>6,52</b>			
B-48 *	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1502	0,1502			
B-48 **	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1234	0,1234			
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1526	0,1526	0,0309	0,0514	
LOSEC MUPS 20 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01					
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,83	19,83	2,89	4,82	
	<b>2095-438</b>				<b>10,91</b>	<b>10,91</b>			
B-48 *	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2514	0,2514			
B-48 **	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2064	0,2064			
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2553	0,2553	0,0516	0,0861	
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05					
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	15,91	15,91	2,10	3,50	
	<b>1597-004</b>				<b>7,92</b>	<b>7,92</b>			
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,19	19,19	2,76	4,61	
	<b>2692-010</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>			
B-48 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372			
B-48 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128			
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1393	0,1393	0,0282	0,0470	
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC05	
B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40	28 maagsapresistente tabletten, 40	R	13,14	13,14	1,54	2,57	

		mg	mg						
	<b>1596-998</b>					<b>5,81</b>	<b>5,81</b>		
B-48 *	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2679	0,2679			
B-48 **	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2200	0,2200			
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2718	0,2718	0,0550	0,0918	
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01				
B-48	4380-119	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,48	13,48	1,61	2,68	
	<b>4380-119</b>				<b>6,07</b>	<b>6,07</b>			
B-48	4380-127	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,07	18,07	2,54	4,23	
	<b>4380-127</b>				<b>9,57</b>	<b>9,57</b>			
B-48 *	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1235	0,1235			
B-48 **	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1014	0,1014			
B-48 ***	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1254	0,1254	0,0254	0,0423	
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,05	19,05	2,73	4,56	
	<b>3527-686</b>				<b>10,31</b>	<b>10,31</b>			
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,30	23,30	3,60	6,01	
	<b>3078-151</b>				<b>13,59</b>	<b>13,59</b>			
B-48 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1754	0,1754			
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1441	0,1441			
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1777	0,1777	0,0360	0,0601	
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01				
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,02	20,02	2,93	4,89	
	<b>3078-169</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>			
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,07	32,07	4,90	8,23	
	<b>3527-694</b>				<b>21,22</b>	<b>21,22</b>			
B-48 *	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4889	0,4889			
B-48 **	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4016	0,4016			
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4738	0,4738	0,0875	0,1470	
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01				
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,01	20,01	2,93	4,88	
	<b>2227-171</b>				<b>11,05</b>	<b>11,05</b>			
B-48 *	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5093	0,5093			
B-48 **	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4182	0,4182			

B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5171	0,5171	0,1046	0,1743
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,25	14,25	1,76	2,94
	<b>1767-227</b>				<b>6,65</b>	<b>6,65</b>		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,59
	<b>1767-243</b>				<b>10,39</b>	<b>10,39</b>		
B-48 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
B-48 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1389	0,1389	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,83	19,83	2,89	4,82
	<b>1767-367</b>				<b>10,91</b>	<b>10,91</b>		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,27	24,27	3,81	6,40
	<b>1767-318</b>				<b>14,44</b>	<b>14,44</b>		
B-48 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,83	19,83	2,89	4,82
	<b>2647-089</b>				<b>10,91</b>	<b>10,91</b>		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,27	24,27	3,81	6,40
	<b>3373-594</b>				<b>14,44</b>	<b>14,44</b>		
B-48 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2553	0,2553	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	14,18	14,18	1,75	2,92
	<b>1767-300</b>				<b>6,60</b>	<b>6,60</b>		
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,02	20,02	2,93	4,89
	<b>1767-342</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>		
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49	33,49	5,09	8,56
	<b>1767-292</b>				<b>22,45</b>	<b>22,45</b>		
B-48 *	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		

B-48 **	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,02	20,02	2,93	4,89
	<b>3520-350</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49	33,49	5,09	8,56
	<b>2647-097</b>				<b>22,45</b>	<b>22,45</b>		
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,18	14,18	1,75	2,92
	<b>3494-812</b>				<b>6,60</b>	<b>6,60</b>		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencorridor)	G	18,41	18,41	2,61	4,34
	<b>2705-713</b>				<b>9,83</b>	<b>9,83</b>		
B-48 *	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1269	0,1269		
B-48 **	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1042	0,1042		
B-48 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1288	0,1288	0,0261	0,0434
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorridor)	G	19,64	19,64	2,86	4,76
	<b>2726-172</b>				<b>10,77</b>	<b>10,77</b>		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorridor)	G	24,15	24,15	3,80	6,33
	<b>2705-747</b>				<b>14,33</b>	<b>14,33</b>		
B-48 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1849	0,1849		
B-48 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
B-48 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1861	0,1861	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencorridor)	G	20,39	20,39	3,01	5,01
	<b>2726-180</b>				<b>11,34</b>	<b>11,34</b>		
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,41	32,41	4,94	8,31
	<b>3494-820</b>				<b>21,52</b>	<b>21,52</b>		
B-48 *	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4959	0,4959		
B-48 **	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4073	0,4073		



B-48 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4800	0,4800	0,0882	0,1484
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,27	14,27	1,77	2,95
	<b>1712-249</b>				<b>6,67</b>	<b>6,67</b>		
B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,43	19,43	2,81	4,69
	<b>2417-731</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-48 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
B-48 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1390	0,1390	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,83	19,83	2,89	4,82
	<b>1705-466</b>				<b>10,91</b>	<b>10,91</b>		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,55	24,55	3,85	6,46
	<b>2417-749</b>				<b>14,68</b>	<b>14,68</b>		
B-48 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,69	20,69	3,07	5,11
	<b>1712-231</b>				<b>11,57</b>	<b>11,57</b>		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49	33,49	5,09	8,56
	<b>2119-584</b>				<b>22,45</b>	<b>22,45</b>		
B-48 *	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EG		ATC: A02BC01				
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,25	14,25	1,76	2,94
	<b>2141-224</b>				<b>6,65</b>	<b>6,65</b>		
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,12	18,12	2,55	4,24
	<b>2455-293</b>				<b>9,60</b>	<b>9,60</b>		
B-48 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
B-48 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
B-48 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1258	0,1258	0,0255	0,0424

OMEPRAZOLE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	2393-114 <b>2393-114</b>	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,83 <b>10,91</b>	19,83 <b>10,91</b>	2,89	4,82
B-48	2455-301 <b>2455-301</b>	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,55 <b>14,68</b>	24,55 <b>14,68</b>	3,85	6,46
B-48 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	4705-174 <b>4705-174</b>	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,83 <b>10,91</b>	19,83 <b>10,91</b>	2,89	4,82
B-48	4581-203 <b>4581-203</b>	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,55 <b>14,68</b>	24,55 <b>14,68</b>	3,85	6,46
B-48 *	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	2753-200 <b>2753-200</b>	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,83 <b>10,91</b>	19,83 <b>10,91</b>	2,89	4,82
B-48	2753-218 <b>2753-218</b>	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,55 <b>14,68</b>	24,55 <b>14,68</b>	3,85	6,46
B-48 *	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EG				ATC: A02BC01		
B-48	2179-935 <b>2179-935</b>	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,02 <b>11,06</b>	20,02 <b>11,06</b>	2,93	4,89
B-48	2181-642 <b>2181-642</b>	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49 <b>22,45</b>	33,49 <b>22,45</b>	5,09	8,56
B-48 *	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529

OMEPRAZOLE EG 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A02BC01					
B-48	4765-251	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49	33,49	5,09	8,56	
	<b>4765-251</b>				<b>22,45</b>	<b>22,45</b>			
B-48 *	7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173			
B-48 **	7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250			
B-48 ***	7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529	
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01					
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49	33,49	5,09	8,56	
	<b>2600-559</b>				<b>22,45</b>	<b>22,45</b>			
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173			
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250			
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529	
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01					
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,49	33,49	5,09	8,56	
	<b>2616-530</b>				<b>22,45</b>	<b>22,45</b>			
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173			
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250			
B-48 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4991	0,4991	0,0909	0,1529	
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02					
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,76	11,76	1,26	2,10	
	<b>2557-205</b>				<b>4,75</b>	<b>4,75</b>			
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,18	16,18	2,15	3,59	
	<b>2557-213</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>			
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,18	16,18	2,15	3,59	
	<b>2626-968</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>			
B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048			
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861			
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359	
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02					
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,95	11,95	1,30	2,17	
	<b>2732-782</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>			
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,18	16,18	2,15	3,59	
	<b>2732-790</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>			
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048			
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861			
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359	

PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02					
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>2557-163</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOMED 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A02BC02					
B-48	4204-442	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>4204-442</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOMED 40 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: A02BC02					
B-48	4771-663	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,92	19,92	2,91	4,85	
	<b>4771-663</b>				<b>10,98</b>	<b>10,98</b>			
B-48 *	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530			
B-48 **	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079			
B-48 ***	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2569	0,2569	0,0520	0,0866	
PANTOMED 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A02BC02					
B-48	4819-595	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>4819-595</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	7740-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	7740-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	7740-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02					
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>2732-808</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02					
B-48	4844-288	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,89	15,89	2,09	3,49	
	<b>4844-288</b>				<b>7,90</b>	<b>7,90</b>			
B-48	4381-109	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,76	11,76	1,26	2,10	
	<b>4381-109</b>				<b>4,75</b>	<b>4,75</b>			
B-48	4381-117	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,78	15,78	2,07	3,46	
	<b>4381-117</b>				<b>7,82</b>	<b>7,82</b>			
B-48	4381-125	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,89	15,89	2,09	3,49	
	<b>4381-125</b>				<b>7,90</b>	<b>7,90</b>			
B-48 *	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019			

B-48 **	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
B-48 ***	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0211	0,0353
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	4381-141	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,80	18,80	2,69	4,48
	<b>4381-141</b>				<b>10,13</b>	<b>10,13</b>		
B-48	4844-296	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,80	18,80	2,69	4,48
	<b>4844-296</b>				<b>10,13</b>	<b>10,13</b>		
B-48 *	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2334	0,2334		
B-48 **	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918		
B-48 ***	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2370	0,2370	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,76	11,76	1,26	2,10
	<b>2650-422</b>				<b>4,75</b>	<b>4,75</b>		
B-48	4582-128	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,08	16,08	2,13	3,56
	<b>4582-128</b>				<b>8,05</b>	<b>8,05</b>		
B-48 *	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1039	0,1039		
B-48 **	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0853	0,0853		
B-48 ***	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1055	0,1055	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC02				
B-48	4582-136	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,07	19,07	2,74	4,57
	<b>4582-136</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>		
B-48 *	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2380	0,2380		
B-48 **	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955		
B-48 ***	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2417	0,2417	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,79	11,79	1,27	2,11
	<b>2568-061</b>				<b>4,78</b>	<b>4,78</b>		
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,96	15,96	2,11	3,52
	<b>2568-079</b>				<b>7,96</b>	<b>7,96</b>		
B-48 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,96	15,96	2,11	3,52
	<b>3689-940</b>				<b>7,96</b>	<b>7,96</b>		
B-48 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74

	<b>2568-095</b>					<b>10,72</b>	<b>10,72</b>		
B-48 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02				
B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>3689-957</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EG			ATC: A02BC02				
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,95	11,95	1,30	2,17	
	<b>2555-175</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>			
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,96	15,96	2,11	3,52	
	<b>2555-142</b>				<b>7,96</b>	<b>7,96</b>			
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,18	16,18	2,15	3,59	
	<b>3303-930</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>			
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048			
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861			
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359	
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,95	11,95	1,30	2,17	
	<b>3678-018</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>			
B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,96	15,96	2,11	3,52	
	<b>3678-059</b>				<b>7,96</b>	<b>7,96</b>			
B-48 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048			
B-48 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861			
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG			ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>2555-126</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74	
	<b>3678-075</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>			
B-48 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470			
B-48 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029			
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846	
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC02				

B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,95	11,95	1,30	2,17
	<b>3494-838</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,94	15,94	2,11	3,51
	<b>3025-152</b>				<b>7,94</b>	<b>7,94</b>		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,18	16,18	2,15	3,59
	<b>3093-200</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>		
B-48 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,21	19,21	2,77	4,61
	<b>3494-846</b>				<b>10,44</b>	<b>10,44</b>		
B-48	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,21	19,21	2,77	4,61
	<b>3912-128</b>				<b>10,44</b>	<b>10,44</b>		
B-48 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2405	0,2405		
B-48 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1977	0,1977		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2442	0,2442	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	4877-742	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,21	19,21	2,77	4,61
	<b>4877-742</b>				<b>10,44</b>	<b>10,44</b>		
B-48 *	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2405	0,2405		
B-48 **	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1977	0,1977		
B-48 ***	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2442	0,2442	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,76	11,76	1,26	2,10
	<b>2575-579</b>				<b>4,75</b>	<b>4,75</b>		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,18	16,18	2,15	3,59
	<b>2575-553</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>		
B-48 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,59	19,59	2,84	4,74
	<b>2575-538</b>				<b>10,72</b>	<b>10,72</b>		
B-48 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846
PARIET 10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: A02BC04				

B-48	1555-804 <b>1555-804</b>	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	13,46 <b>6,05</b>	13,46 <b>6,05</b>	1,60	2,67
B-48 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1395	0,1395		
B-48 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1145	0,1145		
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1416	0,1416	0,0286	0,0477
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-728 <b>2108-728</b>	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,53 <b>6,10</b>	13,53 <b>6,10</b>	1,62	2,70
B-48 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1405	0,1405		
B-48 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1155	0,1155		
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1427	0,1427	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2108-751 <b>2108-751</b>	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,06 <b>10,32</b>	19,06 <b>10,32</b>	2,74	4,56
B-48	2451-961 <b>2451-961</b>	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,30 <b>13,59</b>	23,30 <b>13,59</b>	3,60	6,01
B-48 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1754	0,1754		
B-48 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		
B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1777	0,1777	0,0360	0,0601

### Paragraphe 30000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie C:

### Paragraaf 30000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie C:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg EG ATC: A02BC05								
C-31	2893-477 <b>2893-477</b>	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,71 <b>2,43</b>	8,71 <b>2,43</b>	2,15	2,15
C-31	2893-485 <b>2893-485</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,98 <b>4,16</b>	10,98 <b>4,16</b>	3,68	3,68
C-31 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
C-31 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
C-31 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0257	0,0429



ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC05					
C-31	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,72	10,72	3,50	3,50	
	<b>2738-516</b>				<b>3,96</b>	<b>3,96</b>			
C-31 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1251	0,1251			
C-31 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1028	0,1028			
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1270	0,1270	0,0257	0,0429	
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC05					
C-31	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	11,08	11,08	3,74	3,74	
	<b>2886-687</b>				<b>4,23</b>	<b>4,23</b>			
C-31 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1373	0,1373			
C-31 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1128	0,1128			
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1394	0,1394	0,0282	0,0470	
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03					
C-31	3318-771	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,88	14,88	6,30	6,30	
	<b>3318-771</b>				<b>7,13</b>	<b>7,13</b>			
C-31 *	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3220	0,3220			
C-31 **	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2645	0,2645			
C-31 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3252	0,3252	0,0661	0,1102	
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03					
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	10,55	10,55	3,39	3,39	
	<b>2341-485</b>				<b>3,83</b>	<b>3,83</b>			
C-31 *	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768			
C-31 **	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452			
C-31 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,0362	0,0605	
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03	
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,39	15,39	6,65	6,65	
	<b>2341-535</b>				<b>7,52</b>	<b>7,52</b>			
C-31 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349			
C-31 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930			
C-31 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2310	0,2310	0,0444	0,0747	
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05					
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	11,09	11,09	3,75	3,75	
	<b>1596-980</b>				<b>4,24</b>	<b>4,24</b>			

C-31 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
C-31 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1393	0,1393	0,0282	0,0470
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
C-31	4380-101	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,04	9,04	2,37	2,37
	<b>4380-101</b>				<b>2,68</b>	<b>2,68</b>		
C-31 *	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1235	0,1235		
C-31 **	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1014	0,1014		
C-31 ***	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1254	0,1254	0,0254	0,0423
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,03	13,03	5,06	5,06
	<b>3078-144</b>				<b>5,72</b>	<b>5,72</b>		
C-31 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1754	0,1754		
C-31 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1777	0,1777	0,0360	0,0601
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,03	13,03	5,06	5,06
	<b>2227-130</b>				<b>5,72</b>	<b>5,72</b>		
C-31 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2636	0,2636		
C-31 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2164	0,2164		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2677	0,2677	0,1807	0,1807
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,90	7,90	1,52	1,52
	<b>1767-235</b>				<b>1,72</b>	<b>1,72</b>		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,12	9,12	2,42	2,42
	<b>1767-250</b>				<b>2,74</b>	<b>2,74</b>		
C-31 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
C-31 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1389	0,1389	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,02	9,02	2,35	2,35
	<b>1724-772</b>				<b>2,66</b>	<b>2,66</b>		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,05	13,05	5,06	5,06

	<b>1767-326</b>				<b>5,73</b>	<b>5,73</b>		
C-31 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-31 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,05	13,05	5,06	5,06
	<b>3546-116</b>				<b>5,73</b>	<b>5,73</b>		
C-31 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-31 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2553	0,2553	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	9,04	9,04	2,37	2,37
	<b>2801-504</b>				<b>2,68</b>	<b>2,68</b>		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	13,14	13,14	5,14	5,14
	<b>2726-164</b>				<b>5,81</b>	<b>5,81</b>		
C-31 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1849	0,1849		
C-31 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1861	0,1861	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: A02BC01								
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,37	9,37	2,59	2,59
	<b>1712-215</b>				<b>2,93</b>	<b>2,93</b>		
C-31 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
C-31 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1390	0,1390	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,19	9,19	2,47	2,47
	<b>1712-223</b>				<b>2,79</b>	<b>2,79</b>		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,38	13,38	5,29	5,29
	<b>1705-441</b>				<b>5,99</b>	<b>5,99</b>		
C-31 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
C-31 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0646

OMEPRAZOLE EG 10 mg		EG		ATC: A02BC01				
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,26	9,26	2,52	2,52
	<b>2141-158</b>				<b>2,85</b>	<b>2,85</b>		
C-31 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
C-31 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1258	0,1258	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,14	9,14	2,43	2,43
	<b>2582-831</b>				<b>2,75</b>	<b>2,75</b>		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,32	13,32	5,26	5,26
	<b>1729-169</b>				<b>5,95</b>	<b>5,95</b>		
C-31 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
C-31 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0646
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,73	8,73	2,16	2,16
	<b>2557-197</b>				<b>2,44</b>	<b>2,44</b>		
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,72	12,72	4,84	4,84
	<b>2557-155</b>				<b>5,48</b>	<b>5,48</b>		
C-31 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-091	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	2,11	2,11
	<b>4381-091</b>				<b>2,39</b>	<b>2,39</b>		
C-31 *	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
C-31 **	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
C-31 ***	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0211	0,0353
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-133	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,32	12,32	4,58	4,58
	<b>4381-133</b>				<b>5,18</b>	<b>5,18</b>		
C-31 *	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2334	0,2334		
C-31 **	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918		

C-31 ***	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2370	0,2370	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC02			
C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	2,11	2,11
	<b>2650-414</b>				<b>2,39</b>	<b>2,39</b>		
C-31 *	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1039	0,1039		
C-31 **	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0853	0,0853		
C-31 ***	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1055	0,1055	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC02			
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,32	12,32	4,58	4,58
	<b>2650-448</b>				<b>5,18</b>	<b>5,18</b>		
C-31 *	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2380	0,2380		
C-31 **	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955		
C-31 ***	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2417	0,2417	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,70	8,70	2,14	2,14
	<b>2568-053</b>				<b>2,42</b>	<b>2,42</b>		
C-31 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,41	12,41	4,64	4,64
	<b>2568-087</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
C-31 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EG			ATC: A02BC02			
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,73	8,73	2,16	2,16
	<b>2555-159</b>				<b>2,44</b>	<b>2,44</b>		
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG			ATC: A02BC02			
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,43	12,43	4,66	4,66
	<b>2555-118</b>				<b>5,27</b>	<b>5,27</b>		
C-31 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC02			
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,73	8,73	2,16	2,16
	<b>3025-145</b>				<b>2,44</b>	<b>2,44</b>		
C-31 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		

C-31 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,36	12,36	4,61	4,61
	<b>3025-160</b>				<b>5,21</b>	<b>5,21</b>		
C-31 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2405	0,2405		
C-31 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1977	0,1977		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2442	0,2442	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,73	8,73	2,16	2,16
	<b>2575-512</b>				<b>2,44</b>	<b>2,44</b>		
C-31 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,72	12,72	4,84	4,84
	<b>2575-546</b>				<b>5,48</b>	<b>5,48</b>		
C-31 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2510	0,2510	0,0507	0,0846
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: A02BC01				
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	7,91	7,91	1,53	1,53
	<b>2108-694</b>				<b>1,73</b>	<b>1,73</b>		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	9,06	9,06	2,38	2,38
	<b>2108-702</b>				<b>2,69</b>	<b>2,69</b>		
C-31 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1405	0,1405		
C-31 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1155	0,1155		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1427	0,1427	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	9,06	9,06	2,38	2,38
	<b>2108-736</b>				<b>2,69</b>	<b>2,69</b>		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	13,17	13,17	5,15	5,15
	<b>2108-744</b>				<b>5,83</b>	<b>5,83</b>		
C-31 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1754	0,1754		
C-31 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		
C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1777	0,1777	0,0360	0,0601

Paragraphe 40000

Paragraaf 40000

## Fibrates (ATC C10AB):

1° recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur les principes de «evidence-based medicine», comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la Loi, dont le respect donne lieu à une prescription remboursée :

a) Les spécialités mentionnées au point c) font l'objet d'un rem-boursement en catégorie B, pour autant qu'elles soient admin-istrées chez des bénéficiaires pour :

1. le traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total  $\geq$  190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol  $\geq$  115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans la situation à risque suivante:

Le calcul du risque cardiovasculaire absolu indivi-duel donne actuellement (ou a, ou aurait donné (\*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme

(\*) dans le cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque.

Le remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que le traitement vise une des trois situations suivantes :

1. soit intolérance ou contre-indications aux statines
2. soit taux de triglycérides sériques supérieur à 190 mg/dl ;
3. soit cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl.

2. le traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total  $\geq$  175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol  $\geq$  100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes

2.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans le dossier médical tenu par le prescripteur pour le patient concerné :

2.1.1. soit coronaire : infarctus, angor objectif, syndrome coronarien aigu, pontage aorto-coronaire, angioplastie coronaire ;

2.1.2. soit cérébrale: accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique transitoire documenté ;

2.1.3. soit périphérique : claudication intermit-tente documentée.

2.2. Diabète type 2 si le patient est âgé de plus de 40 ans ; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie

Le remboursement en monothérapie d'une hypercho-lestérolémie primaire est autorisé pour autant que le traitement vise une des trois situations suivantes :

1. Soit intolérance ou contre-indications aux stati-nes ;
2. Soit taux de triglycérides sériques supérieur à 190 mg/dl ;
3. Soit cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl.

3. Traitement en bi-thérapie

## Fibraten (ATC C10AB) :

1° wetenschappelijk verantwoorde aanbevelingen over het gebruik en het voorschrijven van de betrokken therapeutische klassen of sub-klassen van farmaceutische specialiteiten, gebaseerd op de principes van "evidence-based medicine", zoals bedoeld in artikel 73, § 2, tweede lid van de Wet, waarvan de naleving aanleiding geeft tot de vergoeding van het voorschrift:

a) De specialiteiten vermeld in punt c) komen voor vergoeding in aanmerking in categorie B, wanneer ze zijn toegediend bij rechthebbenden voor :

1. de behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie (gedefinieerd als totaal cholesterol  $\geq$  190 mg/dl, of LDL-cholesterol  $\geq$  115 mg/dl, nuchter gemeten tijdens minstens twee afnames met 1 tot 8 weken tussentijd, in een stabiele toestand, onder een aangepast dieet), voor zover deze zich in de volgende risicosituatie bevinden:

de berekening van het individuele absolute cardio-vasculaire risico een resultaat geeft nu (of had, of zou geven op een bepaalde datum (\*)) gelijk of hoger dan 5 % op 10 jaar, waarbij dit risico werd berekend op basis van het SCORE model aangepast aan de Belgische situatie ((Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) rekening houdend met de leeftijd, het geslacht, het cholesterolniveau, de systolische arteriële druk en tabagisme.

(\*) in het geval dat het volgen van een behandeling met een hypolipemiërend geneesmiddel momen-teel een verbetering van zijn/haar risicoprofiel heeft veroorzaakt.

De vergoeding in monotherapie van een primaire hyper-cholesterolemie is toegestaan voor zover de behandeling een van de drie volgende situaties beoogt:

1. Ofwel intolerantie of contra-indicaties voor statines;
2. Ofwel een triglyceridenspiegel hoger dan 190 mg/dl;
3. Ofwel een HDL cholesterol lager dan 40 mg/dl.

2. de behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie (gedefinieerd als totaal cholesterol  $\geq$  175 mg/dl, of LDL-cholesterol  $\geq$  100 mg/dl, nuchter gemeten tijdens minstens twee afnames met 1 tot 8 weken tussentijd, in een stabiele toestand, onder een aangepast dieet), voor zover deze zich in minstens één van de twee volgende risicosituaties bevinden:

2.1. Antecedent van minstens een arteriële aandoe-ning, grondig gedocumenteerd door een bijko-mend technisch onderzoek in het medisch dossier dat door de voorschrijver voor deze patiënt wordt bijgehouden:

2.1.1. ofwel coronair : infarctus, geobjectiveerde angor, acuut coronair syndroom, aorto-coronaire bypass, coronaire angioplastie;

2.1.2. ofwel cerebraal : cerebrovasculair throm-botisch accident, gedocumenteerd transitoir ischemisch accident;

2.1.3. ofwel perifeer: gedocumenteerd claudica-tio intermittens.

2.2. Type 2 diabetes indien de patiënt ouder is dan 40 jaar ; Type 1 diabetes indien microalbuminurie aanwezig is.

De vergoeding in monotherapie van een primaire hyper-cholesterolemie is toegestaan voor zover de behandeling een van de drie volgende situaties beoogt:

1. Ofwel intolerantie of contra-indicaties voor statines;
2. Ofwel een triglyceridenspiegel hoger dan 190 mg/dl;
3. Ofwel een HDL cholesterol lager dan 40 mg/dl.

3. Behandeling in bi-therapie

3.1. Soit le fibrate est ajouté à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que le taux de triglycérides du patient reste supérieur à 190 mg/dl malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable.

3.2. Soit il s'agit de la situation où de l'acipimox est ajouté à un traitement préalable d'au moins 3 mois par fibrate, en application du point a) 3.2. du paragraphe relatif à l'acipimox dans le chapitre IV de l'AR du 21.12.2001.

Dans tous les cas de bi-thérapie, le médecin prescripteur dispose, dans le dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si le patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie.

4. Réduction du risque de pancréatite aiguë chez des bénéficiaires qui présentent une hypertriglycéridémie sévère, définie par un taux de triglycérides restant supérieur à 400 mg/dl malgré des mesures hygiéno-diététiques adéquates.

b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes :

1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle ;
2. le médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans le dossier médical tenu pour ce patient ;
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement d'une spécialité figurant au point c) simultanément avec celui d'une autre spécialité hypolipémiante (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.

c) Mesures transitoires :

A titre transitoire, les autorisations dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans le présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver leur validité dans leur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations.

2° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si les spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par le dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies :

Critère figurant dans les recommandations :

#### 1. Hypercholestérolémie primaire (\*)

- Éléments à conserver dans le dossier : /
- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et dans le cas où le médecin prescripteur ne disposerait plus des anciens protocoles biologiques, on peut considérer que la condition relative à l'établissement du diagnostic de d'hypercholestérolémie primaire est remplie sur base de l'existence du remboursement accordé dans le cadre des anciennes dispositions.

3.1. Hetzij het fibraat wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling met een statine, voor zover de voorafgaande toediening van deze statine terugbetaald was aan de patiënt in categorie B conform aan de voorwaarden in de paragraaf met betrekking tot dit statine en als het triglyceridegehalte van de patiënt hoger blijft dan 190 mg/dl ondanks een behandeling van tenminste 3 maanden met dit statine, gebruikt in monotherapie aan de maximaal getolereerde dosis toegelaten voor terugbetaling.

3.2. Hetzij het gaat om de situatie waarbij acipimox wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling van tenminste 3 maanden met een fibraat, van toepassing in punt a) 3.2. van de paragraaf met betrekking tot acipimox in het hoofdstuk IV van het KB van 21.12.2001.

In het geval van een bi-therapie beschikt de voorschrijvende arts, in het medisch dossier dat hij bijhoudt voor deze patiënt, over een voorafgaand advies van een geneesheer-specialist in de interne geneeskunde, in de cardiologie of in de pediatrie (als de patiënt jonger is dan 18 jaar) die de noodzaak van deze bi-therapie bevestigt.

4. Beperking van het risico op acute pancreatitis bij de rechthebbenden die een ernstige hypertriglyceridemie vertonen, gedefinieerd door een triglyceridegehalte dat hoger blijft dan de 400 mg/dl ondanks adequate hygiëno-dietische maatregelen.

b) Bovendien moet het voorschrift dat aanleiding geeft tot vergoeding opgesteld zijn, conform aan volgende voorwaarden:

1. de voorschrijvend arts houdt rekening met een vergoedbare maximale dosering die beperkt is tot de dagelijkse maximumdosis die in de officiële bijsluiter is bepaald;
2. de voorschrijvend arts gaat de impact van de behandeling na door jaarlijks een lipidenprofiel uit te voeren, waarvan melding wordt gemaakt in het medisch dossier dat voor deze patiënt wordt bijgehouden ;
3. de voorschrijvend arts houdt rekening met de niet vergoeding van een specialiteit voorkomend onder punt c), tegelijk met een ander hypolipemiërend geneesmiddel (statine, fibraat, resinaat, of een nicotinezuurderivaat), behalve indien aan de voorwaarden voor de bedoelde associatie, zoals ze voorkomen in de reglementering van het andere hypolipemiërend geneesmiddel, is voldaan.

c) Overgangsmaatregelen:

Ten titel van overgangsmaatregel kunnen attesten waarvan het model is vastgelegd onder "d" van bijlage III van het huidig besluit, en die afgeleverd zijn voor het in voege treden van de huidige reglementering voor specialiteiten die in deze paragraaf vermeld zijn, hun geldigheid bewaren binnen hun vergoedings-categorie tot de uiterste datum van de toegestane periode, vermeld op deze machtigingen.

2° de elementen waarover de zorgverlener moet beschikken teneinde de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de adviserend geneesheren van de verzekeringsinstelling in staat te stellen na te gaan of de afgeleverde farmaceutische specialiteiten die aanleiding hebben gegeven tot vergoeding door de zorgverlener werden voorgeschreven overeenkomstig de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden:

Criterium dat voorkomt in de aanbevelingen:

#### 1. Primaire hypercholesterolemie (\*)

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard: /
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemiërend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, en wanneer de voorschrijvend arts niet meer over de oude biologische protocollen zou beschikken, mag worden aangenomen dat de voorwaarde voor het stellen van de diagnose van primaire hypercholesterolemie is vervuld op grond van de vergoeding die is toegekend in het raam van de oude bepalingen.



2. Présence d'un cholestérol sérique total  $\geq 190$  mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol  $\geq 115$  mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète – cfr points 1.2.1 et 1.2.2), mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines (\*) d'intervalle, en état stable, sous régime approprié

- Eléments à conserver dans le dossier :

Protocoles (datés) des deux biologies, émanant de laboratoires de biologie clinique.

- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, la condition relative à l'intervalle de 1 à 8 semaines entre les deux examens sanguins est considérée comme remplie sur base du respect de la période "d'au moins 3 mois" qui était fixée dans les anciennes dispositions.

### 3. Calcul (\*) du risque cardiovasculaire absolu indivi-duel

- Eléments à conserver dans le dossier : /

- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'une statine depuis au moins 3 ans en date du 30 novembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et qui, à cette date, étaient âgés d'au moins 75 ans sans avoir présenté aucune atteinte artérielle documentée, il n'est pas nécessaire de réaliser chez eux un calcul du risque cardiovasculaire global pour que la prescription d'un fibrate puisse continuer à leur être remboursée.

3.1.  $\geq 5\%$  à 10 ans ((Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) ) en tenant compte de l'âge, du sexe

- Eléments à conserver dans le dossier :

Mention du résultat du calcul et des différents éléments qui ont été pris en compte pour son établissement, ainsi que mention de la date, ou de la période (\*), à laquelle se rapporte ce calcul

- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) Les différentes mesures prises en compte dans le calcul doivent avoir été effectuées pendant une même période ne dépassant pas 30 jours.

### 3.2. Du taux de cholestérol sérique (\*)

- Eléments à conserver dans le dossier :

S'il s'agit d'une biologie autre que celles figurant au point 1.1. : Protocole (daté) émanant d'un laboratoire de biologie clinique.

- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et dans le cas où le médecin prescripteur ne disposerait plus des anciens protocoles biologiques, on peut utiliser une valeur présumée de cholestérol total de 250mg/dl pour effectuer le calcul.

### 3.3. De la pression artérielle systolique

- Eléments à conserver dans le dossier :

Mention de la valeur (datée) effectivement mesurée (\*) et du traitement anti-hypertensif éventuel.

- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) Si la valeur effectivement mesurée est normalisée du fait de l'existence d'un traitement anti-hypertensif, on peut utiliser une valeur

2. Aanwezigheid van een totaal serumcholesterol  $\geq 190$  mg/dl, of van een LDL-cholesterol  $\geq 115$  mg/dl (respectievelijk 175 mg/dl en 100 mg/dl in geval van antecedent van minstens één arteriële aandoening of van diabetes – cfr punten 1.2.1 en 1.2.2), in een nuchtere toestand en ten minste tweemaal gemeten, met een tussentijd van 1 tot 8 weken (\*), in een stabiele toestand en met een aangepast dieet

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

(Gedateerde) protocollen van de twee biologische testen door laboratoria voor klinische biologie.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemiërend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, wordt de voorwaarde betreffende de tussentijd van 1 tot 8 weken tussen de twee bloedonderzoeken als vervuld beschouwd op grond van de naleving van de periode «van minstens 3 maanden» die in de oude bepalingen was vastgesteld.

### 3. Berekening (\*) van het individueel absoluut cardiovasculair risico

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard: /

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) Voor de rechthebbenden die al op 30 november 2003 sedert minstens 3 jaar een vergoeding hadden gekregen voor een statine ter behandeling van hypercholesterolemie, en welke op die datum ten minste 75 jaar oud waren en geen enkele gedocumenteerde arteriële aandoening vertoonden, moet het globaal cardiovasculair risico niet worden berekend opdat zij de vergoeding van het voorschrift voor een fibraat kunnen blijven genieten.

3.1.  $\geq 5\%$  op 10 jaar (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) ) rekening houdende met de leeftijd, het geslacht,

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van het berekeningsresultaat en van de verschillende elementen die voor de vaststelling ervan in aanmerking zijn genomen, alsook vermelding van de datum of het tijdvak (\*) waarop die berekening betrekking heeft

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) De verschillende metingen die bij de berekening in aanmerking worden genomen, moeten binnen een zelfde tijdvak van maximaal 30 dagen zijn verricht.

### 3.2. Het serumcholesterol-gehalte (\*),

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Als het om een andere biologische test gaat dan die vermeld in punt 1.1.: (Gedateerd) protocol van een laboratorium voor klinische biologie.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemiërend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, en wanneer de voorschrijvend arts niet meer over de oude biologische protocollen zou beschikken, mag worden uitgegaan van een totale cholesterolwaarde van 250mg/dl voor het uitvoeren van de berekening.

### 3.3. De arteriële systolische druk

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van de (gedateerde) effectief gemeten waarde (\*) en van de eventuele behandeling met antihypertensiva.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) Indien de effectief gemeten waarde genormaliseerd is ten gevolge van een behandeling met anti-hypertensiva, mag voor de berekening

présumée de 160/90 mm Hg pour effectuer le calcul.

#### 3.4. Du tabagisme

- Eléments à conserver dans le dossier :

Mention de la nature du tabagisme, de son intensité (\*), et de son ancienneté

- Remarques et/ou situations particulières :

(\*) nombre de cigarettes, ou de paquets, ou quantité de tabac, etc.

#### 4. Diabète sucré

- Eléments à conserver dans le dossier :

Mention du type de diabète et de son ancienneté, avec confirmation du diagnostic par une ou des biologies démonstratives, et/ou par un ou des protocoles médicaux.

Mention de la présence de microalbuminurie pour le diabète de type 1, avec confirmation du diagnostic par une ou des biologies démonstratives, et/ou par un ou des protocoles médicaux.

- Remarques et/ou situations particulières : /

#### 5. Intolérance ou contre-indications aux statines

- Eléments à conserver dans le dossier :

Description et documentation des effets secondaires, donnant lieu au diagnostic d'intolérance ou contre-indications aux statines

- Remarques et/ou situations particulières : /

3° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer si un autre dispensateur de soins a entamé le traitement :

Attestation, rapport, ou protocole d'un autre médecin qui confirme qu'il dispose dans son propre dossier des éléments nécessaires pour démontrer que la prescription d'une fibrate figurant au point 1°, c) du présent § chez le patient concerné est conforme aux recommandations figurant au point 1° et aux conditions figurant au point 2° de ce §. Ce document n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une prescription faisant l'objet d'une délivrance par une officine hospitalière pour un patient hospitalisé en vue de poursuivre à l'hôpital un traitement ambulatoire en cours, et, dans ce cas, le prescripteur en fait mention dans le dossier.

4° La période de validité maximale au terme de laquelle les éléments mentionnés aux points 2° et 3° doivent être renouvelés :

Ces éléments ne doivent pas être renouvelés, mais peuvent, le cas échéant, être complétés par d'autres éléments confirmant le respect des recommandations.

worden uitgegaan van een waarde van 160/90 mm Hg.

#### 3.4. Tabaksgebruik

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van de aard, de ernst (\*) en het aantal jaren tabaksgebruik,

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(\*) aantal sigaretten, of pakjes of hoeveelheid tabak, enz.

#### 4. Diabetes mellitus

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van het type diabetes, het aantal jaren dat men aan diabetes lijdt, met bevestiging van de diagnose door een of meer afdoende biologische testen en/of een of meer medische protocollen.

Vermelding van de aanwezigheid van microalbuminurie indien type 1 diabetes, met bevestiging van de diagnose door een of meer afdoende biologische testen en/of een of meer medische protocollen.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties: /

#### 5. Intolerantie of contra-indicatie voor statines

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Beschrijving en documentatie van de nevenwerkingen en/of andere elementen die aanleiding gegeven hebben tot de diagnose van intolerantie of contra-indicatie voor statines

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties: /

3° de elementen waarover de zorgverlener moet beschikken indien de behandeling door een andere zorgverlener werd gestart:

Attest, verslag of protocol van een andere geneesheer die bevestigt dat hij in zijn eigen dossier over de elementen beschikt die nodig zijn om aan te tonen dat het voorschrift van een fibraat vermeld in punt 1°, c) van deze paragraaf bij de betrokken patiënt overeenstemt met de aanbevelingen in punt 1° en met de voorwaarden in punt 2° van die paragraaf. Dit document is niet nodig wanneer het gaat om een voorschrift dat voor een in een ziekenhuis opgenomen patiënt afgeleverd is door een ziekenhuisapotheek met het oog op de voortzetting van een lopende ambulante behandeling in het ziekenhuis; in dat geval vermeldt de voorschrijver dat in het dossier.

4° de maximale geldigheidsperiode waarna de in 2° en 3° bedoelde elementen hernieuwd moeten worden:

Die elementen moeten niet worden hernieuwd, maar kunnen eventueel worden aangevuld met andere elementen die bevestigen dat de aanbevelingen zijn nageleefd.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>		
CEDUR		AUROBINDO NV			ATC: C10AB02			
B-39	1132-901	60 comprimés enrobés, 200 mg	60 omhulde tabletten, 200 mg		11,51	11,51	1,21	2,02
	<b>1132-901</b>				<b>4,56</b>	<b>4,56</b>		
B-39 *	0741-926	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0980	0,0980		

B-39 **	0741-926	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0805	0,0805		
B-39 ***	0741-926	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0996	0,0996	0,0202	0,0337
EULITOP		AUROBINDO NV			ATC: C10AB02			
B-39	1158-658	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		11,52	11,52	1,21	2,02
	<b>1158-658</b>				<b>4,57</b>	<b>4,57</b>		
B-39 *	0743-591	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg		0,1967	0,1967		
B-39 **	0743-591	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg		0,1613	0,1613		
B-39 ***	0743-591	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg		0,1996	0,1996	0,0403	0,0673
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EG			ATC: C10AB05			
B-39	2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	14,54	14,54	1,82	3,04
	<b>2060-838</b>				<b>6,88</b>	<b>6,88</b>		
B-39 *	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0987	0,0987		
B-39 **	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0810	0,0810		
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1001	0,1001	0,0202	0,0338
FENOFIBRATE AB 145 mg		AUROBINDO NV			ATC: C10AB05			
B-39	4654-026	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	G	12,08	12,08	1,33	2,21
	<b>4654-026</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
B-39 *	7737-745	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	G	0,2150	0,2150		
B-39 **	7737-745	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	G	0,1767	0,1767		
B-39 ***	7737-745	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	G	0,2184	0,2184	0,0443	0,0737
FENOGAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05			
B-39	1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,91	8,91	0,68	1,14
	<b>1416-411</b>				<b>2,58</b>	<b>2,58</b>		
B-39	1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,89	13,89	1,69	2,82
	<b>1447-796</b>				<b>6,38</b>	<b>6,38</b>		
B-39 *	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0840	0,0840		
B-39 **	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0690	0,0690		
B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0852	0,0852	0,0172	0,0288
FENOGAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05			
B-39	2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	9,72	9,72	0,85	1,41
	<b>2210-946</b>				<b>3,19</b>	<b>3,19</b>		
B-39	2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	18,13	18,13	2,55	4,25
	<b>2211-209</b>				<b>9,61</b>	<b>9,61</b>		
B-39 *	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1378	0,1378		
B-39 **	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1132	0,1132		
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1399	0,1399	0,0283	0,0472
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05			
B-39	2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	14,30	14,30	1,77	2,96
	<b>2451-979</b>				<b>6,69</b>	<b>6,69</b>		
B-39 *	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1438	0,1438		
B-39 **	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1182	0,1182		
B-39 ***	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1461	0,1461	0,0295	0,0493
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C10AB08			

B-39	0226-464 <b>0226-464</b>	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	R	10,41 <b>3,72</b>	10,41 <b>3,72</b>	0,99	1,64
B-39 *	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1600	0,1600		
B-39 **	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1313	0,1313		
B-39 ***	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0547
LIPANTHYL 67 MICRONISED		VIATRIS		ATC: C10AB05				
B-39	1440-585 <b>1440-585</b>	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	11,50 <b>4,55</b>	11,50 <b>4,55</b>	1,21	2,01
B-39 *	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0652	0,0652		
B-39 **	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0536	0,0536		
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0663	0,0663	0,0134	0,0223
LIPANTHYLNANO 145 mg		VIATRIS		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700 <b>2388-700</b>	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	12,12 <b>5,03</b>	12,12 <b>5,03</b>	1,33	2,22
B-39	2388-692 <b>2388-692</b>	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	21,12 <b>11,89</b>	21,12 <b>11,89</b>	3,15	5,26
B-39 *	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1704	0,1704		
B-39 **	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1400	0,1400		
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1731	0,1731	0,0350	0,0584

#### Paragraphe 50000

§ 50000 est supprimé au 01/06/2020.

#### Paragraaf 50000

§ 50000 is geschrapt op 01/06/2020.

#### Paragraphe 50100

§ 50100 est supprimé au 01/04/2020.

#### Paragraaf 50100

§ 50100 is geschrapt op 01/04/2020.

#### Paragraphe 50200

§ 50200 est supprimé au 01/04/2020.

#### Paragraaf 50200

§ 50200 is geschrapt op 01/04/2020.

#### Paragraphe 50300

§ 50300 est supprimé au 01/04/2020.

#### Paragraaf 50300

§ 50300 is geschrapt op 01/04/2020.

#### Paragraphe 50400

§ 50400 est supprimé au 01/04/2020.

#### Paragraaf 50400

§ 50400 is geschrapt op 01/04/2020.

#### Paragraphe 50500

§ 50500 est supprimé au 01/04/2020.

#### Paragraaf 50500

§ 50500 is geschrapt op 01/04/2020.

#### Paragraphe 50600

§ 50600 est supprimé au 01/04/2020.

#### Paragraaf 50600

§ 50600 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraphe 50700**

§ 50700 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 50800**

§ 50800 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 50900**

§ 50900 est supprimé au 01/06/2020.

**Paragraphe 51000**

§ 51000 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60000**

§ 60000 est supprimé au 01/06/2020.

**Paragraphe 60100**

§ 60100 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60200**

§ 60200 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60300**

§ 60300 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60400**

§ 60400 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60600**

§ 60600 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60700**

§ 60700 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60800**

§ 60800 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraphe 60900**

§ 60900 est supprimé au 01/04/2020.

**Paragraaf 50700**

§ 50700 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 50800**

§ 50800 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 50900**

§ 50900 is geschrapt op 01/06/2020.

**Paragraaf 51000**

§ 51000 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60000**

§ 60000 is geschrapt op 01/06/2020.

**Paragraaf 60100**

§ 60100 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60200**

§ 60200 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60300**

§ 60300 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60400**

§ 60400 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60600**

§ 60600 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60700**

§ 60700 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60800**

§ 60800 is geschrapt op 01/04/2020.

**Paragraaf 60900**

§ 60900 is geschrapt op 01/04/2020.