

Testliste zur Bewertung des Stotterns

Die Tests zur Bewertung des Stotterns sind in zwei Kategorien unterteilt:

- Kategorie A: Diese Tests prüfen das Vorhandensein des Stotterns (Objektive Messungen des Stotterns und des Schweregrads des Stotterns).
- Kategorie B: Diese Tests erfassen die emotionalen Auswirkungen des Stotterns und dessen Begleitsymptome.

Es ist in allen Fällen verpflichtend, sowohl einen Test der Kategorie A als auch einen Test der Kategorie B durchzuführen.

Stuttering Severity Instrument – 4 – SSI-4 (A) 	
Dénomination	Stutteverity Instrument – 4th Edition-SSI-4
Auteurs	Riley G.
Edition	2009
Editeur	Pro-Ed, Inc.
Domaines investigués	Standardisierte Analyse der Kernsymptome in Quantität und Qualität.
Durée	15-20 Minuten
Population	Vorschulalter: 2;10-5;11 Schulalter: 6;0-16;11 Jahre Erwachsene: ab 17 Jahre
Echantillonnage	Vorschulalter : N = 72 Kinder Schulalter : N= 139 Kinder Erwachsene: N = 60 Personen
Etalonnage	Perzentile
Genehmigung	Die Abnahme dieses Tests reicht nicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. Es sollte noch ein Test aus der Kategorie B durchgeführt werden.
Valeur de critères	Der Gesamtwert muss keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen. Auch die Ergebnisse der anderen durchgeführten Tests müssen keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen.

AAUS - Aachener Analyse unflüssigen Sprechens (A+B)



Dénomination	Aachener Analyse unflüssigen Sprechens
Auteurs	P. Schneider, H. Zückner
Edition	2005
Editeur	Natke-Verlag
Domaines investigués	Qualitative und quantitative Auswertung der Spontansprache bei Personen mit Redefluss-Störungen.
Durée	20 Minuten
Population	Die AAUS ist als Analyseverfahren sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene geeignet.
Echantillonnage	Vorschulalter : N = 72 Kinder Schulalter : N= 139 Kinder Erwachsene: N = 60 Personen
Etalonnage	Prozentsatz gestotterter Silben - Perzentile
Genehmigung	Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen da sie alle quantitativen und qualitativen Aspekte durchleuchtet.
Valeur de critères	Der Gesamtwert muss keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen. Auch die Ergebnisse der anderen durchgeführten Tests müssen keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen.

StotterKompass (B)



Dénomination	StotterKompass
Auteurs	Jürgen Kohler und Wolfgang Braun
Edition	2014
Editeur	Stotternerkennen Online : https://www.stotternerkennen.hfh.ch/stotterkompass.html
Domaines investigués	Therapeutische Einschätzung ob Stottern vorliegt: - Erfassung der Primärsymptomatik - Erfassung der Sekundärsymptomatik und Risikofaktoren
Durée	20 Minuten
Population	Der Redeflusskompass ist als Analyseverfahren sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene geeignet.
Echantillonnage	N=60
Etalonnage	Durch den Erhalt von Punkten (von 0-65) entsteht eine abschließende Grafik mit der aus dem Ergebnis abgeleiteten Empfehlung
Genehmigung	Nein, die Abnahme dieses Tests reicht nicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen da sie nur die qualitativen Aspekte durchleuchtet.
Valeur de critères	Der Gesamtwert muss keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen. Auch die Ergebnisse der anderen durchgeführten Tests müssen keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen.